

ESTADÍSTICAS 2024

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD)
Begoña BRIME, Alberto DOMÍNGUEZ, Luz LEÓN, Luisa M LÓPEZ, Eva SÁNCHEZ.
Experta externa del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)
Noelia LLORENS

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Rosario BALLESTA
Lara FORNOVI
Ara MILLÁN
Antonio SUÁREZ
Mónica TENA

Aragón

Carmen BARANGUAN
Marta SARTO

Asturias

José Antonio GONZÁLEZ
Luisa María GONZÁLEZ

Baleares

Rut SUÁREZ
Elena TEJERA

Canarias

Amelia María HERNÁNDEZ
Nicolás PERDOMO
Ángel RODRÍGUEZ
María del Mar VELASCO

Cantabria

María del Carmen DIEGO
María Antonia RUEDA

Castilla-La Mancha

Carlos ALONSO
Carmen DE PEDRO

Castilla y León

Mónica ELÍAS
Susana REDONDO
Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Natàlia ALMATÓ
Irene LANA
Pere MILLÁN
Pol ROVIRA
Dolores RUIZ

Extremadura

Catalina CUELLO DE ORO
Nerea SÁNCHEZ
José Antonio SANTOS

Galicia

Sara CERDEIRA
Mercedes LIJÓ
Silvia SUÁREZ
María TAJES
Sergio VEIGA

Madrid

Piedad HERNANDO
Nelva MATA
Andrea TANJALA

Murcia

Mónica BALLESTA
M^a Dolores CHIRLAQUE
Daniel RODRÍGUEZ

Navarra

Esther FIGUERAS
Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Elena ALDASORO
Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

M^a Gemma CESTAFE
María FERNÁNDEZ

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU
Begoña RODRIGO
Noelia SELLES
Francesc J. VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA
Ana POSTIGO
Cleopatra R'KAINA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO
Natalia MARTÍNEZ

CONTACTO

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid
Teléfono: 91 822 00 00
Correo electrónico: cendocupnd@sanidad.gob.es
Internet: <https://pnsd.sanidad.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 133-24-119-2

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE): <https://cpage.mpr.gob.es>

CITA SUGERIDA: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Estadísticas 2024. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Madrid: Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; 2024. 301 p.

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las comunidades autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Departamentos de Educación de las comunidades autónomas.
- Miembros de la Red ESAR-Net: José Benito Quintana, Rosa Montes, Xiana González-Gómez, Andrea Estévez-Danta, Carlos Pernas, Rosario Rodil (Universidade de Santiago de Compostela, RIAPAd); Félix Hernández, Lubertus Bijlsma, Elisa Gracia-Marín, Claudia Simarro-Gimeno (Universitat Jaume I); Yolanda Picó, Vicente Andreu, Daniele Sadutto, Lucía Herrera-Vera (Centro de Investigación sobre Desertificación, UV-CSIC-GV); Miren López de Alda, Rocío I. Bonansea, Paula Montiel (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, CSIC); Yolanda Valcárcel, Noelia Domínguez-Morueco, Salomé Martínez (Universidad Rey Juan Carlos); Eva Pocerull, Rosa María Marcé, Núria Fontanals (Universitat Rovira i Virgili); Iria González-Mariño (Universidad de Salamanca); Andreu Rico (Universitat de València); Lluís Corominas, Sara Rodríguez-Mozaz (Institut Català de Recerca de l'Aigua); Manuel Miró, Calos Pagan (Universitat de les Illes Balears); Ailette Prieto, Nestor Etxebarria, Olatz Zuloaga, Gorka Orive (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea); Pablo Antonio Lara-Martín, Rubén Rios-Quintero (Universidad de Cádiz); Sergio Santana-Viera (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria); Manuel Isorna (Universidade de Vigo, RIAPAd); Unax Lertxundi (Osakidetza-Servicio Vasco de Salud).
- Miembros del grupo de Análisis de Residuos de Jeringas: Rosa Montes, Carlos Pernas-Fraguela, Xiana González-Gómez, Andrea Estévez-Danta, Rosario Rodil, Ruth Olmos, Unax Lertxundi, María Gabriela Barbaglia, Amaia Garrido, Manuel Isorna, Joan Mestre, Marta Torrens y José Benito Quintana.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, Instituciones Penitenciarias, responsables en las diferentes comunidades y ciudades autónomas, responsables en las diferentes entidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, responsables de los servicios de toxicología clínica del Hospital Clínic Barcelona y del Hospital Universitari Son Espases, representantes de la red ESAR-Net y Organizaciones No Gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

En estas páginas se presenta el documento de Estadísticas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones 2024. Es una herramienta que complementa el Informe del Observatorio de cada año, y que se ha mostrado fundamental para conocer la realidad relacionada con las drogas en nuestro país, no sólo sobre la oferta y demanda, sino también sobre los problemas derivados de su consumo.

Conocer la realidad es el primer paso para diseñar las políticas e intervenciones para transformarla, así como para evaluar su eficacia. Es por esto que consideramos este Informe una herramienta de ayuda para todos los actores implicados en la prevención y atención a este fenómeno.

Sus capítulos se construyen gracias a la información obtenida de diferentes fuentes y sistemas de información que se analizan en el marco del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.

Quiero mostrar mi reconocimiento a todas las personas e instituciones que, con su trabajo, contribuyen anualmente a esta publicación. Sin olvidar agradecer a todo el equipo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones su esfuerzo, que hace posible su edición.

Joan R. Villalbí

Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

ESTADÍSTICAS 2024

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

ÍNDICE

Presentación	4
Introducción	32
1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas	33
1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2024	34
1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2023	35
Metodología: tamaño muestra	
1.2.1. Tamaño de muestra (alumnos, aulas y colegios) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023	35
1.2.2. Tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023	36
1.2.3. Error muestral de la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p=q=0,5$). España, 2023	36
1.2.4. Distribución de los estudiantes de 14 a 18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 2000-2023	37
1.2.5. Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia (números absolutos). España, 2000-2023	38
Prevalencia del consumo de drogas 1997-2023: evolución temporal. Edad y sexo	
1.2.6. Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2023	39
1.2.7. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023	40
1.2.8. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023	40
1.2.9. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021-2023	41
1.2.10. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023	41

1.2.11.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023	42
1.2.12.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023	42
1.2.13.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023	43
1.2.14.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023	43
1.2.15.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023	44
1.2.16.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	44
1.2.17.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	46
1.2.18.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	48
1.2.19.	Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	48
1.2.20.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2023	49
1.2.21.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2023	49
1.2.22.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2023	50
1.2.23.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2023	50
1.2.24.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	51
1.2.25.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	52
1.2.26.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	53
1.2.27.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	53
1.2.28.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2023	54
1.2.29.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2023	55
1.2.30.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2023	56
1.2.31.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2023	56
1.2.32.	Edad media (años) de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2023	57

1.2.33.	Edad media (años) de inicio en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2023	57
1.2.34.	Edad media (años) de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2019-2023	58

Prevalencia del consumo de drogas 2023: comunidad/ciudad autónoma

1.2.35.	Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma según sexo y edad (número de casos). España, 2023	59
1.2.36.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	60
1.2.37.	Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023	61
1.2.38.	Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	62
1.2.39.	Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023	63
1.2.40.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	64
1.2.41.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023	65
1.2.42.	Prevalencia de hacer botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	66
1.2.43.	Prevalencia de botellon entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023	67
1.2.44.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	68
1.2.45.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023	69
1.2.46.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023	70
1.2.47.	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	71
1.2.48.	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023	72
1.2.49.	Prevalencias de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	73
1.2.50.	Prevalencias de consumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023	74
1.2.51.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	75

1.2.52.	Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023 . . .	76
1.2.53.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	77
1.2.54.	Prevalencias de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023	78
1.2.55.	Edad media de inicio en el consumo (años) de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma. España, 2023 . .	79
1.2.56.	Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2023	80
1.2.57.	Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	81
1.2.58.	Valoración de la importancia (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	82
1.2.59.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023 . . .	83
1.2.60.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	83
1.2.61.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	84
1.2.62.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	84
1.2.63.	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	85
1.2.64.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	85
1.2.65.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	86
1.2.66.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	86
1.2.67.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	87
1.2.68.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023	87
1.2.69.	Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine... por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (euros). España, 2023	88

Consumo por tipo de droga: bebidas alcohólicas

1.2.70.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2000-2023	88
1.2.71.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2023	89
1.2.72.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023	90
1.2.73.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 2000-2023	91
1.2.74.	Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 2000-2023	91
1.2.75.	Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	92
1.2.76.	Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	92
1.2.77.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y según sexo (%). España, 2023 . . .	93
1.2.78.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2023	93
1.2.79.	Prevalencia de borracheras (últimos 30 días), de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023	94
1.2.80.	Prevalencia de borracheras, binge drinking y botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años, según sexo (%). España, 2023	94
1.2.81.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2023	95
1.2.82.	Prevalencia de borracheras (últimos 30 días), de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2008-2023	95
1.2.83.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2010-2023	96
1.2.84.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	96
1.2.85.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2000-2023	97
1.2.86.	Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023 . .	97
1.2.87.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2023	98

1.2.88.	Prevalencia de binge drinking o consumo de alcohol en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2008-2023	98
1.2.89.	Prevalencia de botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	99
1.2.90.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	99
1.2.91.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2023	100
1.2.92.	Prevalencia de borracheras y de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho o no botellón en los últimos 30 días y según sexo (%). España, 2023	100
1.2.93.	Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2023	100
1.2.94.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2023	101
1.2.95.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días que han conseguido bebidas alcohólicas por ellos mismos (%). España, 2016-2023	101
1.2.96.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023	102
1.2.97.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2016-2023	102
1.2.98.	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2023	103
1.2.99.	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023	103
1.2.100.	Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2023	104
1.2.101.	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2023	104
1.2.102.	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023	105
1.2.103.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2023	105
1.2.104.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023	106
1.2.105.	Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según la edad (%). España, 2023	106
1.2.106.	Prevalencia de consumo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias según el consumo de alcohol que hayan realizado sus padres (%). España, 2023	107

1.2.107.	Prevalencia del consumo de alcohol en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de alcohol que hayan realizado sus padres, según sexo (%). España, 2023 . . .	107
1.2.108.	Motivos principales por los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años beben alcohol, según sexo (%). España, 2023	108
1.2.109.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de alcohol (porcentaje de estudiantes que piensa que tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana, o tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2004-2023	108

Consumo por tipo de droga: bebidas energéticas

1.2.110.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014-2023	109
1.2.111.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2023	109
1.2.112.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	110
1.2.113.	Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido bebidas energéticas o bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2023	110
1.2.114.	Características sociodemográficas de los estudiantes de 14-18 años y de los que consumen bebidas energéticas y bebidas energéticas + alcohol (%). España, 2023	111

Consumo por tipo de droga: tabaco

1.2.115.	Prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2023.	111
1.2.116.	Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2000-2023	112
1.2.117.	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2023	112
1.2.118.	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2000-2023	113
1.2.119.	Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	113
1.2.120.	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2023	114
1.2.121.	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	114
1.2.122.	Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (nº cigarrillos). España, 2000-2023	115
1.2.123.	Prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	115

1.2.124.	Percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia de consumo diario de tabaco. España, 2000-2023	116
1.2.125.	Prevalencia de consumo diario de tabaco y riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	116
1.2.126.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente y prevalencia de consumo de tabaco diario en los estudiantes de 14 a 18 años. España, 2000-2023 . . .	117
1.2.127.	Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	117
1.2.128.	Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	118
1.2.129.	Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2023	118
1.2.130.	Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023	119
1.2.131.	Prevalencia de consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado tabaco en los últimos 30 días y entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023	119
1.2.132.	Porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro (%). España, 2014-2023	120
1.2.133.	Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2016-2023	120
1.2.134.	Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la prevalencia de consumo de tabaco y según sexo (%). España, 2023	120
1.2.135.	Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan fumado tabaco o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2023	121
1.2.136.	Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2023	121

Consumo por tipo de droga: cigarrillos electrónicos

1.2.137.	Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2023	122
1.2.138.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos electrónicos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2023	122
1.2.139.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el contenido del cigarrillo electrónico y según sexo (%). España, 2023	123

1.2.140.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	123
1.2.141.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016-2023	124
1.2.142.	Prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2023	124
1.2.143.	Prevalencia del consumo de tabaco alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2023	125
1.2.144.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2023	125
1.2.145.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo (%). España, 2019-2023	125

Consumo por tipo de droga: pipas de agua

1.2.146.	Prevalencia de consumo de pipas de agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	126
1.2.147.	Prevalencia de uso de pipas de agua (cachimbas shisahs hookah, narguile...) agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, edad de inicio, y número de días que las ha usado en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años, total, según sexo y edad (%). España, 2023	126
1.2.148.	Prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua alguna vez en la vida en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021-2023	126
1.2.149.	Prevalencia de uso de cada tipo de sustancia en pipas de agua (cachimbas shisahs hookah, narguile...) en la población de estudiantes de 14-18 años que ha utilizado pipas de agua alguna vez en la vida, total, según sexo y edad (%). España, 2023	127
1.2.150.	Prevalencia de binge drinking, borracheras y consumo de cannabis en los últimos 30 días, consumo problemático de cannabis, consumo de cigarrillos electrónicos y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14 a 18 años y en la población que ha consumido tabaco o cannabis en pipas de agua alguna vez en la vida (%). España, 2023 . .	127

Consumo por tipo de droga: hipnosedantes

1.2.151.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023	128
1.2.152.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	128
1.2.153.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	129
1.2.154.	Prevalencia del consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	129
1.2.155.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023 . .	130

1.2.156. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	130
1.2.157. Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	131
1.2.158. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad de inicio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2023	131
1.2.159. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	132
1.2.160. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 1994-2023 ..	132

Consumo por tipo de droga: analgésicos opioides

1.2.161. Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2019-2023	133
1.2.162. Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023	133
1.2.163. Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2023	133

Consumo por tipo de droga: cannabis

1.2.164. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) y edad media de inicio del consumo (años). España, 2000-2023	134
1.2.165. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	134
1.2.166. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2023	135
1.2.167. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023	135
1.2.168. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	136
1.2.169. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	136
1.2.170. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2012-2023	137
1.2.171. Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	137
1.2.172. Número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (número de porros). España, 2016-2023	138
1.2.173. Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido una cantidad media de porros al día por término medio en los últimos 30 días y número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (% y número de porros). España, 2016-2023 ...	138

1.2.174.	Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2016-2023	138
1.2.175.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2016-2023	139
1.2.176.	Modo de consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad. (%) España, 2016-2023 . . .	139
1.2.177.	Orden de inicio en el consumo de cannabis y tabaco (%). España, 2002-2023	140
1.2.178.	Porcentaje de estudiantes de 14-18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal, entre los estudiantes de 14-18 años que no lo han probado nunca y en función de si han consumido tabaco alguna vez en la vida (%). España 2016-2023	140
1.2.179.	Evolución del % de THC (tetrahidrocannabinol) presente en cannabis según el tipo de presentación analizada; THC contenido en la resina de cannabis y THC contenido en la hierba de cannabis o marihuana. España, 2002-2022	141
1.2.180.	Categorización de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2006-2023	142
1.2.181.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España 2006-2023	142
1.2.182.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 2006-2023 . .	143
1.2.183.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España 2012-2023 . .	143
1.2.184.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4), según sexo y edad. (%) España, 2016-2023	144
1.2.185.	Modo de consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4), según sexo y edad. (%) España, 2016-2023	144
1.2.186.	Características de la forma de consumo de cannabis entre los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) y entre la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2023	145
1.2.187.	Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses y número de drogas consumidas entre la población de estudiantes de 14 a 18 años y entre los consumidores problemáticos de cannabis (CAST ≥ 4) (%). España, 2023	145
1.2.188.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2023	146
1.2.189.	Categorización de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST, según sexo y edad (%). España, 2023	146

Consumo por tipo de droga: cocaína

1.2.190.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023	147
1.2.191.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo (%). España, 2000-2023	147

1.2.192.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	148
1.2.193.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	148
1.2.194.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, riesgo percibido ante el consumo de cocaína en polvo habitual y disponibilidad de cocaína en polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023	149
1.2.195.	Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	149
1.2.196.	Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2023	150
1.2.197.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2023	150
1.2.198.	Prevalencia de consumo de cocaína base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2023	151

Consumo por tipo de droga: éxtasis

1.2.199.	Prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023	151
1.2.200.	Prevalencia del consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	152
1.2.201.	Prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	152
1.2.202.	Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	153
1.2.203.	Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	153

Consumo por tipo de droga: anfetaminas

1.2.204.	Prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023	154
1.2.205.	Prevalencia del consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	154
1.2.206.	Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	155
1.2.207.	Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 2000-2023	155
1.2.208.	Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	156

Consumo por tipo de droga: metanfetaminas

1.2.209.	Prevalencia de consumo de metanfetamina (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2010-2023	156
1.2.210.	Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2023	157
1.2.211.	Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	157

Consumo por tipo de droga: alucinógenos

1.2.212. Prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023	158
1.2.213. Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	158
1.2.214. Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 2000-2023	159
1.2.215. Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	159

Consumo por tipo de droga: setas mágicas

1.2.216. Prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%) y edad media (años) de inicio en el consumo. España, 2010-2023	160
1.2.217. Prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	160

Consumo por tipo de droga: heroína

1.2.218. Prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023	161
1.2.219. Percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y percepción de disponibilidad de heroína (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir heroína si quisiera) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023	161
1.2.220. Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	162
1.2.221. Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	162

Consumo por tipo de droga: inhalables volátiles

1.2.222. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023	163
1.2.223. Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023	163
1.2.224. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023	164

Consumo por tipo de droga: esteroides anabolizantes

1.2.225. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2012-2023	164
1.2.226. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2023	165

Consumo por tipo de droga: GHB

1.2.227. Prevalencia de consumo de GHB (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2023	165
1.2.228. Prevalencia de consumo de GHB alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 2006-2023	166
1.2.229. Prevalencia de consumo de GHB entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023	166

Consumo por tipo de droga: éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, esteroides anabolizantes y heroína

1.2.230. Prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, esteroides anabolizantes y heroína alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023	167
1.2.231. Prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, esteroides anabolizantes y heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023	168
1.2.232. Prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, esteroides anabolizantes y heroína en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023	169

Consumo por tipo de droga: sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio

1.2.233. Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2023	170
1.2.234. Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2019-2023	170
1.2.235. Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido estas sustancias alguna vez en la vida (%). España, 2019-2023	171
1.2.236. Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2019-2023	171
1.2.237. Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de 14 a 18 años que han consumido dichas sustancias (%). España, 2019-2023	171
1.2.238. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, borracheras, tabaco y consumo problemático de cannabis en los últimos 12 meses y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida y entre el total de los estudiantes de 14 a 18 años. (%). España, 2023	172

Consumo por tipo de droga: nuevas sustancias psicoactivas

1.2.239. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2023	172
1.2.240. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2014-2023	173

1.2.241.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2023	173
1.2.242.	Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 2014-2023 . .	174
1.2.243.	Forma de obtención de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2023	174
1.2.244.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (%). España, 2023	174
1.2.245.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023	175
1.2.246.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	175
1.2.247.	Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2023	175
1.2.248.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales alguna vez en la vida en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023	176
1.2.249.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2014-2023	176

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

1.2.250.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023	177
1.2.251.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023 . .	177
1.2.252.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2023 . .	178
1.2.253.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023	178
1.2.254.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2023	178
1.2.255.	Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad y sexo (%). España, 2023	179
1.2.256.	Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad y sexo (%). España, 2023	179
1.2.257.	Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) sin incluir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023	180

1.2.258.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) sin incluir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023	180
1.2.259.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) sin incluir ni alcohol ni tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023	181
1.2.260.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023	181
1.2.261.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2023	182
1.2.262.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023	182
1.2.263.	Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos, cannabis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, éxtasis, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2023	183
1.2.264.	Prevalencia de consumo de una, dos, tres o cuatro o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2023	184
1.2.265.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2023	184
1.2.266.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2023	185
1.2.267.	Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2023	185
1.2.268.	Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2023	186
1.2.269.	Prevalencia de personas que refieren consumo de tabaco y consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2012-2023	186
1.2.270.	Prevalencia de personas que refieren consumo de tabaco diario y consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2012-2023	187

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.2.271.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2004-2023	187
1.2.272.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2000-2023	188

1.2.273. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de cannabis y tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2000-2023	189
1.2.274. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo (%). España, 2000-2023	189
1.2.275. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2023	190
1.2.276. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2023	190
1.2.277. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de hipnosedantes (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2019-2023 . . .	191
1.2.278. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2023	191
1.2.279. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2006-2023	192
1.2.280. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2023	192
1.2.281. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2023	193

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.2.282. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2023	193
1.2.283. Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 2000-2023	194
1.2.284. Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023	195
1.2.285. Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2016-2023	195

1.2.286.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023	196
1.2.287.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2014-2023	196

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: información y formación sobre drogas

1.2.288.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y edad (%). España, 2023	197
1.2.289.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo (%). España, 2016-2023	197
1.2.290.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal y según sexo (%). España, 2023	198
1.2.291.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga legal y según sexo (%). España, 2023	198
1.2.292.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según sexo (%). España, 2016-2023	199
1.2.293.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones, según sexo (%). España, 2016-2023	199
1.2.294.	Prevalencia de consumo de sustancias legales e ilegales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones (%). España, 2016-2023	200
1.2.295.	Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones (%). España, 2016-2023	200

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

1.2.296.	Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2023	201
1.2.297.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” distintas medidas para resolver el problema de las drogas, según sexo y edad (%). España, 2016-2023	202
1.2.298.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo (%). España 2012-2023	204
1.2.299.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2023	204
1.2.300.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2023	205

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: permisividad de los padres

1.2.301. Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2006-2023	205
1.2.302. Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de tabaco según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan. España, 2023	206
1.2.303. Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han fumado en los últimos 30 días según sean sus padres permisivos frente al consumo de tabaco o no. España, 2023	206
1.2.304. Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de alcohol según el consumo de alcohol que los estudiantes tengan. España, 2023	206
1.2.305. Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que beben alcohol según sean sus padres son permisivos frente al consumo de alcohol o no. España, 2023	207
1.2.306. Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de cannabis según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan. España, 2023	207
1.2.307. Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sean sus padres son permisivos frente al consumo de cannabis o no. España, 2023	207

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: ocio y entorno escolar

1.2.308. Frecuencia de actividades de ocio realizadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo (%). España, 2021-2023	208
1.2.309. Prevalencia de consumo de sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas (%). España, 2021-2023	209
1.2.310. Prevalencia de consumo de sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas, según sexo (%). España, 2021-2023	209
1.2.311. Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2021-2023	210
1.2.312. Prevalencia de experimentar ciertas situaciones entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2021-2023	211

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: salidas nocturnas y hora de regreso

1.2.313. Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo y edad (%). España, 2023	212
1.2.314. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	212
1.2.315. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2023	213
1.2.316. Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	213
1.2.317. Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2023	214

1.2.318. Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	214
1.2.319. Frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2023	215
1.2.320. Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	216
1.2.321. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	216
1.2.322. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	217
1.2.323. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	217
1.2.324. Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	218
1.2.325. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	218
1.2.326. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	219
1.2.327. Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	219
1.2.328. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023	220
1.2.329. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y edad (%). España, 2023	220
1.2.330. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana) en cada una de las franjas horarias señaladas (%). España, 2006-2023	221
1.2.331. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023	221
1.2.332. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según sexo (%). España, 2023	222
1.2.333. Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023	222

1.2.334. Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según sexo (%). España, 2023	223
1.2.335. Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023	223
1.2.336. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023	224
1.2.337. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa y según sexo (última salida en fin de semana) (%). España, 2023	224

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: dinero disponible

1.2.338. Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad. España, 2014-2023	225
1.2.339. Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2023	225
1.2.340. Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, en función de tipo de estudios, titularidad del centro y notas que sacan habitualmente. España, 2023	225
1.2.341. Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2023	226
1.2.342. Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, en función de los hobbies que practican. España, 2023	226
1.2.343. Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses. España, 2023	226
1.2.344. Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). España, 2023	227
1.2.345. Situación económica de la familia entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2021-2023 . . .	227

Consumo de sustancias psicoactivas: consecuencias negativas del consumo

1.2.346. Prevalencia de experimentar ciertas situaciones en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (%). España, 2023	228
1.2.347. Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2023	229

1.2.348.	Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2023	229
1.2.349.	Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido alcohol o alguna droga ilegal, según sexo (%). España, 2016-2023	229

2. Problemas relacionados con las drogas 230

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2022 . . 231

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2022

2.1.1.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2022	231
2.1.2.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales y por alcohol. España, 1998-2022	232
2.1.3.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales, total, con tratamiento previo y tratados por primera vez en la vida. España, 1998-2022	233
2.1.4.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2022	234
2.1.5.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1998-2022	235
2.1.6.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1998-2022	236
2.1.7.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1998-2022	237
2.1.8.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1998-2022	238
2.1.9.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de estimulantes distintos de la cocaína: anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis. España, 1998-2022	239
2.1.10.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alucinógenos (ketamina u otros alucinógenos). España, 2005-2022	240
2.1.11.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2022	241
2.1.12.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2022	241
2.1.13.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1998-2022	242
2.1.14.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1998-2022	243
2.1.15.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1998-2022	244
2.1.16.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1998-2022	245
2.1.17.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1998-2022	246
2.1.18.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1998-2022	247

2.1.19.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1998-2022	248
2.1.20.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1998-2022	249
2.1.21.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general) , según la vía principal de administración de esta droga. España, 1998-2022	250
2.1.22.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1998-2022	251
2.1.23.	Proporción de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA (%). España, 1995-2022	252
2.1.24.	Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2022 . .	253
2.1.25.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2015-2022	254
2.1.26.	Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1998-2022	254
2.1.27.	Prevalencia (%) de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1998-2022	255
2.1.28.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (%). España, 2019-2022	256

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2022

2.1.29.	Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal por sexo (%). España, 2022	257
2.1.30.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2022	258
2.1.31.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2022	258
2.1.32.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2022	259
2.1.33.	Número de casos y tasas por 100.000 habitantes de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2022	259
2.1.34.	Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2022	260
2.1.35.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2022	263
2.1.36.	Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2022	266

2.1.37.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento por sexo. España, 2022	268
2.1.38.	Edad media de inicio en el tratamiento actual, del primer uso y latencia primer uso hasta el tratamiento actual. España, 2022	271
2.1.39.	Número de casos admitidos a tratamiento por grupos de edad en función de la droga principal. España, 2022	272
2.1.40.	Número de casos que entran a tratamiento en función de que presenten policonsumo de sustancias, total y en función del tratamiento previo. España, 2022	272

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1987-2022 . . 273

Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2022

2.2.1.	Evolución de las urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España, 1998-2022	273
2.2.2.	Evolución del número de urgencias relacionadas con el uso de analgésicos opioides. España, 2005-2022	274
2.2.3.	Proporción de urgencias por tipo de opiáceo notificado en el total de urgencias relacionadas con opiáceos. España, 2005-2022	274
2.2.4.	Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España, 1998-2022	275
2.2.5.	Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1998-2022	276
2.2.6.	Evolución vía de administración (número y porcentaje) de los episodios de urgencias hospitalarias en consumidores de drogas, según tipo de droga. España, 2012-2022	277

Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas. Datos 2022

2.2.7.	Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España, 2022	278
2.2.8.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes si están acompañados de otra sustancia). Total, según sexo y según droga. España, 2022	278
2.2.9.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancia única). Total, según sexo y según droga. España, 2022	279
2.2.10.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes si están acompañados de otra sustancia), según sexo. España, 2022	279
2.2.11.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancia única), según sexo. España, 2022	280
2.2.12.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas). España, 2020-2022	280
2.2.13.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según sexo. España, 2022	281
2.2.14.	Sintomatología que provoca la urgencia en función de las drogas que se relacionan (%). España, 2022	281
2.2.15.	Prevalencia de patología dual en los episodios de urgencias en los que se detecta únicamente una sustancia, en función de la sustancia detectada (%). España, 2021-2022	282
2.2.16.	Tipo de consumo de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2022	282

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2022 283

Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2022

2.3.1.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2022	283
2.3.2.	Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2022	284

Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y Registro General de Mortalidad

2.3.3.	Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2004-2022	284
2.3.4.	Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en función del sexo. España, 2022	286
2.3.5.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1996-2022	287
2.3.6.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1996-2022	287
2.3.7.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España, 2022	288
2.3.8.	Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España, 2005-2022	288
2.3.9.	Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España, 2003-2022	289
2.3.10.	Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide, aunque haya otras sustancias). España, 2005-2022	290
2.3.11.	Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína(cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 2000-2022	290
2.3.12.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos). España, 2005-2022	291
2.3.13.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en hombres). España, 2010-2022	291
2.3.14.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en mujeres). España, 2010-2022	292
2.3.15.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo. España, 2004-2022	292
2.3.16.	Evolución número de fallecidos por código CIE en el Registro General de Mortalidad. España, 2010-2022	293
2.3.17.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas según el Registro General de Mortalidad, según sexo. España, 1999-2022	294
2.3.18.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas en el Registro General de Mortalidad, según edad. España, 1999-2022	295

2.3.19. Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2022	296
2.3.20. Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad de las 6 ciudades españolas. España, 2005-2022	296
2.3.21. Evolución del índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad-Registro Específico). España, 2005-2022	297
2.3.22. Estimación nacional del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2022	298

Información complementaria	299
-----------------------------------	------------

Páginas web de interés	300
----------------------------------	-----

INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, analgésicos opioides, drogas ilegales y nuevas sustancias), otros trastornos comportamentales y los problemas asociados, en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

Este documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2024*, se publica junto con otro documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2024*, al que complementa con una selección de tablas y gráficos.

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población de estudiantes de 14 a 18 años ante el consumo de drogas y otros trastornos comportamentales desde el año 1994 hasta 2023. La fuente de información es la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), en sus sucesivas ediciones. ESTUDES se realiza de forma bienal y se promueve y financia directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando con la estrecha colaboración de las comunidades y ciudades autónomas.

En el presente documento no se incluye información de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), en población general, ya que los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2024, se publicaban coincidiendo con el cierre de este informe. Pueden consultar los resultados de EDADES 2024 en el siguiente enlace:

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_EDADES.htm

En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2022. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las comunidades y ciudades autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998:

<https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/CinformesOED.htm>

Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2024

En 2024, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1995, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha llevado a cabo la décimo-cuarta edición de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES). Esta encuesta se realiza en todo el territorio nacional, en la población general residente en hogares (15-64 años), y se realiza a domicilio.

El objetivo general de la misma es conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre la población general en todo el territorio nacional, con la finalidad de conseguir información que permita diseñar, desarrollar y evaluar estrategias y políticas dirigidas a prevenir el consumo y a abordar las consecuencias negativas del uso de drogas, del mal uso de las tecnologías y de otras conductas relacionadas.

Los objetivos concretos y comunes a toda la serie de encuestas son conocer:

- La prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
- Las características sociodemográficas de los consumidores.
- Los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
- La disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante diversas conductas de consumo.
- La visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
- La opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas para reducirlos.
- La evolución temporal (desde 1995) de los aspectos antes expuestos.

Al cierre de este informe los resultados de EDADES 2024 se acaban de publicar. No ha sido posible incluirlos en este informe pero están disponibles en el siguiente enlace:

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_EDADES.htm

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2023*

1.2.1.

Tamaño de muestra (alumnos, aulas y colegios) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.




FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

* En muchos gráficos y tablas de este capítulo se recogen solamente algunos años (por lo general, a partir del año 2000); la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>

1.2.2.

Tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.3.

Error muestral de la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p=q=0,5$). España, 2023.

	Número de puntos muestrales*			Número de alumnos			Error muestral****
	DGPNSD**	Ampliación***	Tamaño final	DGPNSD**	Ampliación***	Tamaño final	(±)
Andalucía	62	30	92	2.658	1.363	4.021	1,6%
Aragón	23	33	56	974	1.277	2.251	2,1%
Asturias	18	33	51	724	1.291	2.015	2,2%
Baleares	21	32	53	886	1.321	2.207	2,1%
Canarias	30	33	63	1.160	1.328	2.488	2,0%
Cantabria	15	33	48	568	1.297	1.865	2,2%
Castilla y León	29	35	64	1.209	1.365	2.574	1,9%
Castilla-La Mancha	30	21	51	1.209	901	2.110	2,1%
Cataluña	59		59	2.675	0	2.675	1,9%
C. Valenciana	46	35	81	2.146	1.490	3.636	1,6%
Extremadura	21		21	847	0	847	3,4%
Galicia	32	20	52	1.325	860	2.185	2,1%
Madrid	53	32	85	2.380	1.521	3.901	1,6%
Murcia	26	26	52	1.096	1.004	2.100	2,1%
Navarra	17	33	50	724	1.427	2.151	2,1%
País Vasco	30		30	1.184	0	1.184	2,9%
La Rioja	12	25	37	554	1.032	1.586	2,3%
Ceuta	7	11	18	280	402	682	3,5%
Melilla	7	32	39	286	1.444	1.730	1,7%
Total España	538	464	1.002	22.885	19.323	42.208	0,6%

* El punto muestral es el centro educativo para la enseñanza para la que ha sido seleccionada. De esta manera, es posible que un mismo centro educativo haya podido ser seleccionado para dos enseñanzas diferentes y por ello tenga asignado 2 o más puntos muestrales.

** Muestra financiada por la DGPNSD.

*** Muestra financiada por las CCAA (colegios ampliados en la muestra).

**** Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0,5$.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.4.

Distribución de los estudiantes de 14 a 18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
COMUNIDAD AUTÓNOMA												
Andalucía	2.372	2.552	2.464	2.750	6.143	3.724	2.378	4.636	2.970	2.884	2.659	4.021
Aragón	671	2.185	1.757	1.764	785	1.377	2.464	2.710	2.781	2.590	952	2.251
Asturias	661	744	584	1.737	627	1.155	2.024	1.890	1.898	2.039	789	2.015
Baleares	602	1.762	1.795	622	599	1.203	806	859	913	840	864	2.207
Canarias	739	960	835	2.079	1.398	1.815	1.155	3.592	3.214	1.328	1.150	2.488
Cantabria	1.244	1.169	1.478	1.376	352	906	1.923	1.885	1.859	1.960	609	1.865
Castilla y León	919	1.140	983	1.107	1.697	1.865	1.151	2.284	1.220	2.538	1.156	2.574
C.-La Mancha	1.749	2.501	860	984	1.359	1.818	1.721	1.941	2.133	2.036	1.195	2.110
Cataluña	1.552	1.885	2.831	2.177	4.628	3.415	2.353	2.510	2.617	2.640	2.493	2.675
C. Valenciana	2.287	1.685	1.362	1.657	3.119	2.727	1.696	3.260	3.502	3.628	1.891	3.636
Extremadura	443	796	1.693	777	807	1.370	860	905	817	907	848	847
Galicia	1.170	2.108	1.245	2.244	1.799	1.945	2.022	2.102	2.089	2.026	1.244	2.185
Madrid	2.929	3.308	3.033	3.055	3.904	3.056	3.250	4.404	4.321	4.172	2.343	3.901
Murcia	727	1.394	1.468	1.601	998	1.551	1.054	1.085	1.259	2.240	1.131	2.100
Navarra	627	530	600	570	361	960	605	662	773	2.353	824	2.151
País Vasco	852	806	990	884	1.316	1.726	1.096	1.164	1.286	1.314	1.226	1.184
La Rioja	462	457	975	525	190	647	477	507	1.076	1.033	451	1.586
Ceuta	323	130	140	289	46	325	232	224	319	668	251	682
Melilla	121	464	428	256	57	382	236	866	322	814	245	1.730
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO												
Pública	10.421	14.445	14.889	13.050	20.720	22.081	18.848	25.976	24.383	25.402	14.824	28.748
Privada	10.029	12.131	10.632	13.404	9.463	9.886	8.655	11.510	10.986	12.608	7.497	13.460
TIPO DE ESTUDIOS												
ESO	13.664	14.400	14.415	15.983	15.671	17.816	14.953	21.278	20.219	21.224	12.636	23.157
Bachillerato	5.869	10.733	9.468	8.468	10.348	11.683	10.384	14.624	13.496	13.858	7.994	15.123
FP	917	1.443	1.638	2.003	4.164	2.468	2.166	1.584	1.654	2.928	1.691	3.928
TOTAL	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369	38.010	22.321	42.208

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.5.

Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia (números absolutos). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
CENTROS												
Andalucía	54	60	64	70	77	62	63	110	68	68	61	90
Aragón	17	35	32	33	49	63	68	69	69	66	22	54
Asturias	17	18	16	29	48	63	59	55	53	51	18	46
Baleares	15	32	32	15	41	77	22	20	23	21	21	48
Canarias	21	23	22	33	57	30	32	92	80	33	30	56
Cantabria	28	29	28	28	39	58	58	50	49	51	15	42
Castilla y León	25	30	27	32	35	29	33	61	32	65	29	57
C.-La Mancha	44	58	22	25	31	29	43	52	53	51	30	49
Cataluña	37	43	70	53	56	53	55	58	59	59	55	57
C. Valenciana	56	37	35	40	46	66	48	78	86	89	45	76
Extremadura	10	19	31	19	25	22	27	27	23	22	19	20
Galicia	25	36	30	39	62	65	60	57	53	52	30	48
Madrid	66	75	71	71	85	81	81	98	96	95	52	79
Murcia	17	38	25	25	48	25	27	25	29	52	26	49
Navarra	15	14	14	13	16	15	17	17	18	52	17	43
País Vasco	21	22	26	28	30	28	30	32	33	32	29	28
La Rioja	12	12	17	12	25	37	12	11	25	23	11	28
Ceuta	5	3	5	7	7	6	6	6	7	17	6	8
Melilla	3	7	6	5	7	48	6	23	7	18	7	10
Total	488	591	573	577	784	857	747	941	863	917	523	888
AULAS												
Andalucía	108	119	128	139	154	125	126	218	136	127	160	182
Aragón	31	101	95	92	98	128	136	138	137	127	52	112
Asturias	30	35	32	84	96	125	125	106	106	99	52	101
Baleares	24	84	93	30	82	153	43	40	46	40	52	105
Canarias	41	46	44	98	114	60	66	182	160	59	74	126
Cantabria	48	58	84	81	78	116	117	98	98	98	30	96
Castilla y León	47	58	54	64	70	60	71	121	64	126	68	126
C.-La Mancha	69	116	44	50	62	63	96	104	106	100	63	100
Cataluña	74	87	140	103	112	111	115	116	118	117	113	117
C. Valenciana	90	72	70	80	92	136	92	154	172	169	118	162
Extremadura	19	37	92	38	50	45	57	50	46	44	47	42
Galicia	43	102	60	116	124	129	120	114	104	101	66	104
Madrid	119	144	142	142	170	160	166	196	190	185	168	168
Murcia	29	72	74	75	96	51	55	50	58	104	85	104
Navarra	22	26	28	26	32	32	30	32	36	102	35	100
País Vasco	40	44	51	56	60	56	60	60	66	61	58	60
La Rioja	20	22	50	24	50	74	24	22	50	44	26	74
Ceuta	15	6	10	14	14	12	12	12	19	32	23	35
Melilla	6	22	24	10	14	94	12	45	14	34	21	78
Total	875	1.251	1.315	1.322	1.568	1.730	1.523	1.858	1.726	1.769	1.311	1.992

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnscd.salud.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.6.

Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	33,4	27,7	21,0	7,5
Alcohol	75,9	73,6	56,6	1,5
Hipnosedantes*	19,6	14,8	8,2	4,9
Hipnosedantes**	9,7	7,4	3,8	2,1
Cannabis	26,9	21,8	15,6	1,3
Éxtasis	3,1	2,2	0,9	-
Alucinógenos	1,9	1,3	0,5	-
Anfetaminas	1,7	1,3	0,7	-
Cocaína polvo y/o base	2,9	2,3	1,0	-
Cocaína polvo	2,5	2,0	0,9	-
Cocaína base	1,5	1,2	0,5	-
Heroína	0,7	0,5	0,4	-
Analgésicos opioides***	1,8	1,3	0,6	-
Inhalables volátiles	2,8	2,1	1,0	-
GHB	0,7	0,5	0,3	-
Metanfetamina	1,5	1,1	0,6	-
Setas mágicas	1,5	1,1	0,5	-
Esteroides anabolizantes	0,6	0,5	0,4	-
Nuevas sustancias	3,7	1,3	0,6	-
Ketamina	1,0	-	-	-
Spice	0,9	-	-	-
Mefedrona	0,5	-	-	-
Salvia divinorum	0,5	-	-	-
Ayahuasca	0,6	-	-	-
Óxido nitroso	1,5	-	-	-
Cloretilo	1,2	-	-	-

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.


** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

*** Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023.




* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. *** Para colocarte

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.8.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023.




* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. *** Para colocarte

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.9.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021-2023.




* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. *** Para colocarte

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.10.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023.




* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. *** Para colocarte

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.11.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023.



* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. *** Para colocarte

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.12.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9	75,9
Tabaco	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3	38,2	33,4
Cannabis	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1	33,0	28,6	26,9
Hipnosedantes*	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9	18,4	19,6	19,6
Hipnosedantes**	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0	8,6	10,3	9,7
Cocaína polvo y/o base	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9	2,7	2,9
Éxtasis	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,6	3,1	3,1
Alucinógenos	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9
Inhalables volátiles	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0	1,7	1,8	2,8
Setas mágicas	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7	1,3	1,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5	1,5
Anfetaminas	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,5	1,7
Heroína	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7
GHB	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6	0,4	0,7
Est. anabolizantes	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.13.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	70,5	73,6
Tabaco	–	–	–	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7	35,0	30,7	27,7
Cannabis	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3	27,5	22,2	21,8
Hipnosedantes*	–	–	–	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6	12,5	13,6	14,8
Hipnosedantes**	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	6,1	7,2	7,4
Cocaína polvo y/o base	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4	2,1	2,3
Éxtasis	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	1,8	2,2
Alucinógenos	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,4	1,0	1,3
Inhalables volátiles	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	0,9	2,1
Setas mágicas	–	–	–	–	–	1,6	1,4	0,8	0,9	1,1	0,9	1,1
Metanfetamina	–	–	–	–	–	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2	1,1	1,1
Anfetaminas	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	0,8	1,3
Heroína	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5
GHB	–	–	–	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3	0,5
Est. anabolizantes	–	–	–	–	–	–	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.14.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6	56,6
Tabaco	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7	23,9	21,0
Cannabis	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3	19,3	14,9	15,6
Hipnosedantes*	–	–	–	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9	6,4	7,5	8,2
Hipnosedantes**	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6	2,9	3,6	3,8
Cocaína polvo y/o base	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0	0,9	0,6	1,0
Éxtasis	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7	0,6	0,9
Alucinógenos	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5	0,3	0,5
Inhalables volátiles	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4	1,0
Setas mágicas	–	–	–	–	–	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5
Metanfetamina	–	–	–	–	–	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6
Anfetaminas	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,2	0,7
Heroína	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
GHB	–	–	–	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3
Est. anabolizantes	–	–	–	–	–	–	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	–	–	–	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7	1,6	1,0	1,1	1,5
Tabaco	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8	9,8	9,0	7,5
Cannabis	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8	2,0	2,3	1,6	1,3
Hipnosedantes*	–	–	–	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	2,7	3,0	3,7	4,9
Hipnosedantes**	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	1,1	1,2	1,4	2,1

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.16.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	33,4	30,0	36,8	17,2	13,7	20,7	27,6	23,9	31,3	37,0	34,0	40,4	43,4	39,6	47,3	50,2	47,2	53,7	32,1	28,7	35,6
CE	54,6	52,5	56,8	41,5	37,0	45,9	50,5	47,4	53,6	57,9	56,8	59,1	62,3	60,7	63,9	66,1	65,8	66,3	53,7	51,4	56,1
CE con nicotina	21,3	17,6	25,2	12,3	8,2	16,2	18,1	14,6	21,8	24,3	20,7	28,1	27,0	23,0	31,2	28,6	24,4	33,2	20,8	17,1	24,6
CE con cannabis	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,1	0,6	0,8	0,3	0,8	1,1	0,4	0,4	0,5	0,3
CE con nicotina y con cannabis	1,1	1,2	0,9	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,2	1,7	0,8	2,5	2,9	2,1	1,0	1,1	0,8
CE sin nicotina y sin cannabis	27,4	28,5	26,2	24,1	23,5	24,7	27,2	27,6	26,8	27,8	29,8	25,6	29,2	30,8	27,4	29,6	32,8	26,0	27,2	28,2	26,2
CE dejar de fumar	13,5	12,3	14,7	9,0	7,5	10,4	12,6	11,0	14,1	14,2	13,6	15,0	16,0	14,7	17,3	17,2	15,5	19,2	13,2	12,0	14,4
Pipas de agua	57,9	59,1	56,7	39,8	40,0	39,5	49,9	50,0	49,7	62,2	63,9	60,3	71,3	72,7	69,9	74,6	75,7	73,4	56,7	57,8	55,6
PA con nicotina	25,4	25,7	25,1	11,2	10,3	12,0	19,6	19,4	19,9	29,3	29,2	29,4	35,6	37,2	34,0	36,3	36,0	36,8	24,6	24,9	24,3
PA con cannabis	1,3	1,8	0,8	0,6	0,8	0,4	0,9	1,1	0,8	1,6	2,3	0,9	1,4	1,9	0,9	3,3	4,5	1,9	1,2	1,6	0,7
PA con nicotina y con cannabis	2,3	2,7	1,9	0,9	0,9	0,9	1,7	1,8	1,7	2,6	3,1	2,0	3,0	3,7	2,3	4,6	5,2	3,9	2,1	2,5	1,8
PA sin nicotina y sin cannabis	15,0	15,0	14,9	8,4	8,1	8,7	11,5	11,3	11,6	15,4	16,2	14,6	21,5	20,7	22,4	21,8	22,0	21,6	14,5	14,5	14,5
Alcohol	75,9	73,7	78,1	58,0	53,7	62,2	70,1	66,4	73,9	81,2	79,6	83,0	86,7	85,7	87,8	88,2	88,0	88,4	75,0	72,6	77,4
Borracheras	47,5	43,9	51,2	22,5	17,4	27,4	38,3	31,8	44,8	54,1	51,3	57,1	63,8	62,2	65,5	68,5	65,8	71,4	45,9	42,2	49,7
Hipnosedantes con o sin receta	19,6	13,3	26,1	15,9	10,3	21,3	17,5	11,3	23,7	19,9	13,4	26,8	22,2	15,9	28,7	27,4	18,7	36,9	19,0	12,9	25,3
Hipnosedantes sin receta	9,7	6,9	12,7	7,6	4,8	10,3	8,2	5,4	11,1	10,2	7,3	13,4	11,3	8,5	14,3	13,5	10,6	16,7	9,5	6,6	12,4
Cannabis	26,9	27,6	26,2	12,8	12,2	13,3	20,5	20,7	20,4	29,1	30,4	27,6	37,2	37,8	36,5	45,8	47,2	44,2	25,6	26,2	25,0
Cannabis lo probaría si fuese legal	9,4	8,8	10,0	10,3	9,0	11,4	10,6	9,7	11,6	9,1	8,0	10,2	8,3	8,9	7,8	7,3	7,3	7,3	9,5	8,9	10,2

1.2.16. (continuación)

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cocaína																					
polvo y/o base	2,9	3,8	1,9	1,8	2,1	1,5	2,3	2,9	1,7	3,0	3,9	2,0	3,5	4,8	2,2	5,4	7,6	2,9	2,7	3,5	1,9
Cocaína en polvo	2,5	3,4	1,7	1,5	1,9	1,2	2,0	2,5	1,4	2,6	3,5	1,7	3,2	4,3	2,0	5,2	7,3	2,7	2,4	3,1	1,6
Cocaína base	1,5	2,0	0,9	1,1	1,3	0,9	1,4	1,8	0,9	1,5	2,0	0,9	1,7	2,7	0,8	2,0	2,8	1,1	1,4	2,0	0,9
Éxtasis	3,1	3,6	2,5	1,3	1,3	1,3	1,9	2,2	1,5	3,3	3,8	2,8	4,0	4,6	3,4	8,0	10,0	5,7	2,7	3,1	2,3
Anfetaminas/speed	1,7	2,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,5	0,8	1,8	2,4	1,2	2,0	3,0	1,0	4,0	5,4	2,4	1,6	2,1	1,1
Alucinógenos	1,9	2,4	1,4	1,0	1,1	1,0	1,5	1,8	1,2	1,9	2,3	1,4	2,5	3,3	1,6	3,7	4,6	2,8	1,8	2,2	1,3
Heroína	0,7	1,0	0,4	0,6	0,7	0,5	0,8	1,1	0,5	0,6	1,0	0,3	0,8	1,3	0,2	0,8	0,9	0,7	0,7	1,0	0,4
Analgésicos opioides																					
para colcarte	1,8	2,2	1,4	1,1	1,1	1,2	1,4	1,7	1,0	1,9	2,4	1,3	2,2	2,7	1,6	3,2	3,8	2,5	1,7	2,1	1,3
Inhalables volátiles	2,8	3,1	2,5	1,4	1,2	1,5	2,0	2,1	1,9	2,9	3,3	2,4	3,9	4,2	3,6	5,6	7,1	4,1	2,6	2,8	2,4
GHB	0,7	1,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0	0,3	0,7	1,0	0,4	0,8	1,1	0,5	0,9	1,0	0,8	0,7	1,0	0,4
Metanfetamina	1,5	1,9	1,1	0,9	0,8	1,1	1,1	1,4	0,8	1,6	2,0	1,1	1,8	2,5	1,1	3,1	3,9	2,3	1,4	1,7	1,0
Setas mágicas	1,5	2,0	1,0	0,8	0,7	0,9	1,3	1,9	0,8	1,7	2,4	1,0	1,6	2,2	0,9	3,0	4,2	1,7	1,4	1,9	0,9
Est. anabolizantes	0,6	1,0	0,2	0,5	0,8	0,3	0,7	1,2	0,2	0,5	0,9	0,1	0,6	1,0	0,2	0,8	1,2	0,4	0,6	1,0	0,2
Sust. estimulantes																					
para estudiar	7,3	6,9	7,6	5,1	4,1	6,0	6,7	5,9	7,4	6,7	6,7	6,7	9,0	8,9	9,1	11,5	11,2	11,9	7,0	6,6	7,3
Metilfenidato	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6	0,4	0,6	0,7	0,5	0,6	0,8	0,4	0,9	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,7	0,8	0,5
Nuevas sustancias	3,7	4,5	2,8	2,0	1,8	2,2	2,9	3,4	2,3	4,0	5,0	2,9	4,3	5,6	2,9	7,8	9,1	6,4	3,4	4,1	2,6
Ketamina	1,0	1,3	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	1,1	0,4	0,8	1,2	0,4	1,2	1,7	0,6	2,3	3,0	1,6	0,9	1,2	0,5
Spice	0,9	1,1	0,7	0,7	0,5	0,9	0,8	1,1	0,5	0,8	1,0	0,6	1,0	1,4	0,5	1,6	1,9	1,2	0,8	1,0	0,6
Mefedrona	0,5	0,7	0,3	0,6	0,6	0,7	0,5	0,8	0,2	0,5	0,6	0,3	0,5	0,7	0,2	0,4	0,6	0,1	0,5	0,7	0,3
Salvia divinorum	0,5	0,7	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,2	0,4	0,6	0,3	0,6	0,9	0,2	0,6	1,0	0,2	0,4	0,6	0,3
Ayahuasca	0,6	0,8	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,1	0,6	0,8	0,3	0,6	1,0	0,2	0,7	1,1	0,3	0,5	0,8	0,3
Óxido nítrico	1,5	1,9	1,1	0,9	0,8	0,9	1,4	1,8	1,0	1,7	2,1	1,2	1,7	2,2	1,2	2,5	3,3	1,6	1,4	1,8	1,1
Cloretilo	1,2	1,5	0,9	0,6	0,5	0,8	0,7	1,0	0,5	1,3	1,6	1,0	1,4	2,0	0,8	2,9	3,8	1,9	1,1	1,3	0,8
Alguna droga ilegal																					
EUDA ¹	33,4	32,3	34,4	19,6	16,8	22,1	26,8	25,4	28,2	35,3	34,8	35,8	43,4	42,5	44,4	52,0	51,4	52,8	32,0	30,8	33,1
Alguna droga ilegal sin																					
cannabis EUDA ²	14,2	12,2	16,2	10,3	7,7	12,9	11,6	9,7	13,6	14,5	12,3	17,0	17,3	15,4	19,3	21,8	21,4	22,3	13,6	11,5	15,8

T = total; H = hombres; M = mujeres; CE = cigarrillos electrónicos; PA = pipas de agua.

1. Algunos drogas ilegales EUDA (definición de la EUDA)= hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

2. Algunos drogas ilegales sin cannabis (definición de la EUDA)= hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.17.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	27,7	24,7	30,8	13,8	10,2	17,3	23,3	19,8	26,8	30,8	28,2	33,6	36,2	33,2	39,3	40,8	37,4	44,7	26,7	23,7	29,8
CE	46,0	43,8	48,1	36,1	31,3	40,6	43,2	40,0	46,2	49,1	47,3	50,9	51,1	50,3	51,9	53,8	53,8	53,9	45,4	43,0	47,7
Pipas de agua	44,8	46,2	43,4	27,5	28,1	27,0	37,2	37,1	37,4	48,3	50,0	46,4	57,8	60,2	55,4	60,2	61,1	59,2	43,7	45,0	42,3
Alcohol	73,6	71,2	76,1	55,0	49,9	59,8	67,7	63,6	71,7	79,3	77,5	81,3	84,7	84,0	85,5	86,5	86,2	86,8	72,7	70,1	75,3
Borracheras	42,1	39,3	45,1	19,5	14,9	23,9	33,9	28,0	39,7	48,5	46,7	50,3	57,0	56,1	58,0	59,8	57,7	62,0	40,9	37,9	43,9
Botellón	47,4	44,8	50,0	26,6	21,5	31,4	40,9	36,5	45,3	54,9	53,2	56,7	59,6	58,5	60,7	57,8	57,1	58,5	46,6	43,9	49,4
Bebidas alcohólicas y cannabis	11,6	12,0	11,1	4,1	3,5	4,8	7,9	7,6	8,3	12,9	13,8	12,0	17,4	18,3	16,4	20,3	22,4	17,9	10,9	11,2	10,6
Bebidas alcohólicas y cocaína polvo y/o base	1,1	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	1,1	0,5	1,0	1,2	0,7	1,4	2,1	0,7	2,4	3,4	1,4	1,0	1,3	0,6
Hipnosedantes con o sin receta	14,8	9,7	20,0	11,9	7,5	16,0	13,5	8,6	18,5	14,9	9,8	20,4	16,6	11,1	22,2	20,7	14,0	28,2	14,3	9,3	19,4
Hipnosedantes sin receta	7,4	5,3	9,5	5,6	3,7	7,3	6,4	4,2	8,6	8,0	5,8	10,4	8,4	6,3	10,5	10,3	7,8	13,0	7,2	5,1	9,3
Cannabis	21,8	22,5	21,0	9,8	9,1	10,6	16,6	16,6	16,7	23,9	24,8	22,9	30,3	31,6	29,0	35,6	38,2	32,7	20,7	21,3	20,2
Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)	2,4	2,7	2,0	0,8	0,6	1,0	1,5	1,4	1,5	3,0	3,7	2,2	3,2	3,3	3,0	4,6	6,2	2,8	2,2	2,4	2,0
Tratamiento hachís	7,6	7,7	7,5	9,6	12,1	7,8	8,4	8,2	8,6	7,8	7,0	8,7	6,6	6,7	6,5	7,6	9,1	5,3	7,6	7,5	7,8
Cocaína polvo y/o base	2,3	3,2	1,5	1,5	1,7	1,4	1,9	2,4	1,3	2,4	3,3	1,4	2,8	4,0	1,6	4,5	6,0	2,8	2,2	2,9	1,4
Cocaína en polvo	2,0	2,8	1,3	1,3	1,4	1,1	1,6	2,1	1,1	2,1	2,9	1,2	2,5	3,5	1,4	4,1	5,7	2,5	1,9	2,6	1,2
Cocaína base	1,2	1,7	0,7	0,9	1,0	0,8	1,1	1,5	0,7	1,2	1,7	0,6	1,4	2,2	0,5	1,7	2,3	1,1	1,1	1,6	0,6
Éxtasis	2,2	2,6	1,8	1,0	0,9	1,0	1,3	1,5	1,2	2,4	2,9	1,9	3,0	3,6	2,3	5,4	6,9	3,8	2,0	2,3	1,6
Anfetaminas/speed	1,3	1,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	1,1	0,5	1,3	1,8	0,8	1,6	2,5	0,6	2,7	3,5	1,8	1,2	1,6	0,7

1.2.17. (continuación)

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alucinógenos	1,3	1,8	0,8	0,8	0,8	0,7	1,1	1,5	0,7	1,4	1,9	0,9	1,6	2,4	0,8	2,7	3,6	1,6	1,3	1,7	0,8
Heroína	0,5	0,8	0,2	0,5	0,5	0,4	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,1	0,6	1,0	0,1	0,6	0,8	0,2	0,5	0,8	0,2
Analgésicos opioides																					
para colocarte	1,3	1,7	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,4	0,8	1,4	1,9	0,9	1,5	2,1	1,0	2,3	3,0	1,5	1,3	1,6	0,9
Inhalables volátiles	2,1	2,4	1,8	0,8	0,7	1,0	1,3	1,5	1,1	2,3	2,5	2,0	3,0	3,4	2,7	4,9	6,2	3,4	1,9	2,1	1,7
GHB	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6	0,9	0,3	0,6	0,8	0,3	0,6	0,8	0,3	0,5	0,6	0,4	0,5	0,8	0,3
Metanfetamina	1,1	1,5	0,8	0,6	0,5	0,7	0,8	1,0	0,5	1,1	1,4	0,8	1,5	2,2	0,8	2,6	3,5	1,7	1,0	1,3	0,7
Setas mágicas	1,1	1,5	0,6	0,5	0,5	0,6	1,0	1,4	0,5	1,2	1,8	0,7	1,1	1,8	0,5	1,8	2,6	0,9	1,0	1,4	0,6
Est. anabolizantes	0,5	0,8	0,1	0,4	0,6	0,3	0,5	0,9	0,2	0,4	0,7	0,1	0,4	0,8	0,1	0,7	1,1	0,2	0,4	0,8	0,1
Nuevas sustancias	1,3	1,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,8	1,2	1,5	0,9	1,7	2,4	0,9	3,0	4,1	1,8	1,2	1,5	0,9
Conducir + alcohol	2,9	4,1	1,6	1,2	1,5	1,0	1,7	2,3	1,1	3,3	4,8	1,8	4,0	6,1	1,9	5,6	7,7	3,2	2,7	3,8	1,5
Conducir + hachís	1,5	2,3	0,6	0,4	0,6	0,2	0,9	1,3	0,4	2,0	2,9	1,0	2,0	3,3	0,8	2,9	4,8	0,7	1,4	2,1	0,6
Conducir + cocaína	0,4	0,6	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,6	0,1	0,4	0,8	0,0	0,5	0,9	0,1	0,4	0,6	0,1
Pasajero + alcohol	17,1	16,0	18,2	10,9	9,4	12,3	13,7	10,8	16,5	17,9	16,7	19,2	22,2	22,4	22,1	25,4	26,4	24,3	16,5	15,2	17,8
Pasajero + hachís	6,8	6,9	6,7	2,8	2,5	3,1	4,6	4,2	5,0	7,2	7,2	7,1	9,9	10,3	9,6	13,6	14,8	12,3	6,3	6,3	6,3
Pasajero + cocaína	1,9	2,1	1,6	1,1	0,8	1,3	1,4	1,4	1,3	1,9	2,2	1,6	2,4	2,8	2,0	3,6	4,7	2,3	1,7	1,9	1,6
Accidente + droga	1,0	1,3	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,9	0,5	1,1	1,4	0,9	1,1	1,6	0,5	1,4	1,8	1,1	0,9	1,2	0,6
Pelea + droga	4,9	5,9	3,9	2,6	2,7	2,5	3,6	3,9	3,2	5,3	6,1	4,4	6,5	8,5	4,5	8,7	10,8	6,3	4,6	5,5	3,7
Alguna droga ilegal																					
EUDA ¹	27,1	26,4	27,7	14,8	12,6	16,9	21,7	20,5	22,9	29,1	28,7	29,6	35,7	35,7	35,8	42,3	42,6	41,8	26,0	25,2	26,8
Alguna droga ilegal sin																					
cannabis EUDA ²	11,1	9,8	12,4	7,6	5,8	9,3	9,0	7,6	10,5	11,5	10,0	13,2	13,5	12,5	14,6	17,5	17,4	17,6	10,6	9,2	12,0

T = total; H = hombres; M = mujeres; CE = cigarrillos electrónicos.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

1. Alguna droga ilegal EUDA (definición de la EUDA)= hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

2. Alguna droga ilegal sin cannabis (definición de la EUDA)= hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.18.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Metanfetamina	0,6	0,8	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,2	0,6	1,0	0,2	0,8	1,3	0,3	0,8	1,0	0,6	0,5	0,8	0,3
Setas mágicas	0,5	0,7	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,8	0,2	0,4	0,7	0,1	0,5	1,0	0,1	0,5	0,9	0,1	0,5	0,7	0,2
Est. anabolizantes	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5	0,2	0,5	0,8	0,1	0,2	0,4	0,1	0,4	0,6	0,1	0,6	0,9	0,2	0,3	0,6	0,1
Nuevas sustancias	0,6	0,9	0,4	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	0,2	0,5	0,7	0,3	0,9	1,4	0,4	1,1	1,6	0,6	0,6	0,8	0,4
Alguna droga ilegal																					
EUDA ¹	18,9	19,4	18,4	10,7	9,7	11,6	15,4	15,2	15,6	20,2	21,0	19,3	24,2	25,4	23,0	30,4	31,9	28,8	18,0	18,4	17,7
Alguna droga ilegal sin																					
cannabis EUDA ²	5,6	5,3	5,9	3,9	3,4	4,4	4,8	4,2	5,5	5,9	5,5	6,3	6,6	6,7	6,5	8,9	9,2	8,6	5,4	5,1	5,7

T = total; H = hombres; M = mujeres.

1. Alguna droga ilegal EUDA (definición de la EUDA)= hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

2. Alguna droga ilegal sin cannabis (definición de la EUDA)= hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.19.

Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	7,5	6,9	8,1	2,1	1,6	2,6	4,3	3,6	5,0	8,2	7,9	8,5	11,8	10,7	12,9	16,6	15,0	18,3	6,8	6,2	7,4
Alcohol	1,5	2,2	0,9	1,0	1,2	0,7	1,4	1,9	0,9	1,6	2,4	0,8	1,8	2,7	0,9	2,4	3,6	1,1	1,5	2,1	0,8
Binge drinking	0,8	1,1	0,5	0,6	0,8	0,5	0,9	1,2	0,5	0,8	1,1	0,5	0,9	1,3	0,5	0,7	0,9	0,4	0,8	1,1	0,5
Hipnosedantes																					
con o sin receta	4,9	3,3	6,6	3,5	2,2	4,7	4,5	2,8	6,2	5,3	3,7	7,0	5,5	4,1	7,0	6,9	4,1	9,9	4,8	3,3	6,3
Hipnosedantes																					
sin receta	2,1	1,8	2,5	1,5	1,1	1,8	2,0	1,4	2,7	2,5	2,2	2,8	2,1	2,0	2,2	2,6	2,3	3,0	2,1	1,7	2,4
Cannabis	1,3	1,7	1,0	0,5	0,6	0,4	0,8	0,9	0,7	1,6	2,0	1,2	1,7	2,1	1,3	3,3	4,8	1,7	1,2	1,5	0,9

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.20.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2023.




* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. *** Cocaína polvo y/o base. ****Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.21.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2023.




* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. *** Cocaína polvo y/o base. ****Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.22.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2023.




* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. *** Cocaína polvo y/o base. ****Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.23.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2023.



* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.24.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7	38,2	44,3	35,1	41,5	30,0	36,8
Alcohol	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2	76,3	79,4	71,6	76,3	73,7	78,1
Hipnosedantes*	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5	15,1	21,5	15,3	24,1	13,3	26,1
Hipnosedantes**	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8	6,8	10,3	7,8	12,9	6,9	12,7
Cannabis	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9	34,5	31,5	29,3	28,0	27,6	26,2
Éxtasis	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9	3,1	2,1	3,4	2,8	3,6	2,5
Alucinógenos	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1	2,7	1,2	2,3	1,1	2,4	1,4
Anfetaminas	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2	2,0	1,1	1,9	1,0	2,3	1,2
Cocaína																								
polvo y/o base	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2	3,9	1,9	3,4	1,9	3,8	1,9
Heroína	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5	1,0	0,4	0,8	0,2	1,0	0,4
Inhalables volátiles	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9	1,9	1,5	1,9	1,7	3,1	2,5
GHB	-	-	-	-	-	-	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8	1,3	0,8	0,8	0,4	0,7	0,4	0,6	0,2	1,0	0,4
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,6	1,1	0,4	1,7	1,0	1,9	1,3	1,8	1,2	1,9	1,1
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,4	1,8	0,8	2,0	0,8	2,4	1,0	1,8	0,8	2,0	1,0
Est. anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,3	1,0	0,3	0,8	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2	1,0	0,2

H = Hombres, M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.25.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	-	-	-	-	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5	29,6	33,2	32,6	36,9	31,4	38,5	27,3	34,2	24,7	30,8
Alcohol	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9	74,1	77,5	67,8	73,3	71,2	76,1
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9	7,7	13,8	8,8	14,4	9,8	15,1	9,7	17,6	9,7	20,0
Hipnosedantes**	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7	4,7	7,4	5,1	9,4	5,3	9,5
Cannabis	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4	29,2	25,9	22,6	21,8	22,5	21,0
Éxtasis	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1	2,4	1,4	2,1	1,5	2,6	1,8
Alucinógenos	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6	2,0	0,8	1,4	0,6	1,8	0,8
Anfetaminas	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,2	0,6	1,8	0,8
Cocaína																								
polvo y/o base	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6	3,2	1,7	2,7	1,5	3,2	1,5
Heroína	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,5	0,2	0,8	0,2
Inhalables volátiles	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,8	1,2	0,9	2,4	1,8
GHB	-	-	-	-	-	-	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5	0,9	0,4	0,6	0,2	0,5	0,3	0,5	0,1	0,8	0,3
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,4	0,8	0,3	1,3	0,7	1,6	0,8	1,1	0,7	1,5	0,8
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	0,8	1,2	0,5	1,3	0,5	1,7	0,6	1,1	0,5	1,5	0,6
Est. anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,2	0,7	0,2	0,5	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,8	0,1

H = Hombres, M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.26.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0	23,9	29,3	21,2	26,7	18,9	23,3
Alcohol	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1	57,2	59,8	51,5	55,8	54,5	58,7
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5	4,2	8,1	4,4	7,3	5,1	7,7	5,0	10,0	5,4	11,0
Hipnosedantes**	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3	2,2	3,5	2,6	4,7	3,0	4,7
Cannabis	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9	21,5	17,3	15,7	14,1	16,7	14,5
Éxtasis	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,5
Alucinógenos	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,1	0,9	0,2
Anfetaminas	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,6	0,1	1,0	0,3
Cocaína																								
polvo y/o base	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5	1,3	0,6	0,9	0,3	1,5	0,5
Heroína	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,6	0,1
Inhalables volátiles	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4	0,6	0,3	1,2	0,8
GHB	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,5	0,1
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,2	0,8	0,3
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,6	0,1	0,7	0,2	0,4	0,1	0,7	0,2
Est. anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,6	0,1

H = Hombres, M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.27.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	19,3	27,0	17,2	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,4	10,3	8,8	9,2	6,9	8,1
Alcohol	-	-	-	-	-	-	3,0	1,0	3,8	2,0	7,8	4,3	3,3	2,0	2,2	1,3	1,9	1,3	1,3	0,7	1,3	1,0	2,2	0,9
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	2,3	3,0	2,5	3,4	2,6	4,7	3,3	6,6
Hipnosedantes**	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2	1,0	1,3	1,1	1,8	1,8	2,5
Cannabis	5,5	1,9	5,5	2,1	7,0	2,9	4,2	2,2	4,4	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3	3,3	1,4	2,1	1,1	1,7	1,0

H = Hombres, M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.28.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2023.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	17,2	27,6	37,0	43,4	32,1	50,2
Alcohol	58,0	70,1	81,2	86,7	75,0	88,2
Hipnosedantes*	15,9	17,5	19,9	22,2	19,0	27,4
Hipnosedantes**	7,6	8,2	10,2	11,3	9,5	13,5
Cannabis	12,8	20,5	29,1	37,2	25,6	45,8
Éxtasis	1,3	1,9	3,3	4,0	2,7	8,0
Alucinógenos	1,0	1,5	1,9	2,5	1,8	3,7
Anfetaminas/speed	1,1	1,2	1,8	2,0	1,6	4,0
Cocaína polvo y/o base	1,8	2,3	3,0	3,5	2,7	5,4
Cocaína polvo	1,5	2,0	2,6	3,2	2,4	5,2
Cocaína base	1,1	1,4	1,5	1,7	1,4	2,0
Heroína	0,6	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8
Analgésicos opioides***	1,1	1,4	1,9	2,2	1,7	3,2
Inhalables volátiles	1,4	2,0	2,9	3,9	2,6	5,6
GHB	0,5	0,7	0,7	0,8	0,7	0,9
Metanfetamina	0,9	1,1	1,6	1,8	1,4	3,1
Setas mágicas	0,8	1,3	1,7	1,6	1,4	3,0
Esteroides anabolizantes	0,5	0,7	0,5	0,6	0,6	0,8

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

***Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.29.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2023.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	13,8	23,3	30,8	36,2	26,7	40,8
Alcohol	55,0	67,7	79,3	84,7	72,7	86,5
Hipnosedantes*	11,9	13,5	14,9	16,6	14,3	20,7
Hipnosedantes**	5,6	6,4	8,0	8,4	7,2	10,3
Cannabis	9,8	16,6	23,9	30,3	20,7	35,6
Éxtasis	1,0	1,3	2,4	3,0	2,0	5,4
Alucinógenos	0,8	1,1	1,4	1,6	1,3	2,7
Anfetaminas/speed	0,9	0,8	1,3	1,6	1,2	2,7
Cocaína polvo y/o base	1,5	1,9	2,4	2,8	2,2	4,5
Cocaína polvo	1,3	1,6	2,1	2,5	1,9	4,1
Cocaína base	0,9	1,1	1,2	1,4	1,1	1,7
Heroína	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6
Analgésicos opioides***	0,9	1,1	1,4	1,5	1,3	2,3
Inhalables volátiles	0,8	1,3	2,3	3,0	1,9	4,9
GHB	0,4	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Metanfetamina	0,6	0,8	1,1	1,5	1,0	2,6
Setas mágicas	0,5	1,0	1,2	1,1	1,0	1,8
Esteroides anabolizantes	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,7

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

***Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.30.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2023.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	9,7	16,8	23,6	28,2	20,2	33,0
Alcohol	36,5	49,2	61,7	69,7	55,3	73,8
Hipnosedantes*	6,3	7,5	8,5	9,2	8,0	11,3
Hipnosedantes**	2,9	3,5	4,1	4,3	3,7	5,2
Cannabis	7,8	12,2	17,0	20,9	14,8	26,1
Éxtasis	0,6	0,6	1,0	1,1	0,9	1,6
Alucinógenos	0,4	0,5	0,5	0,7	0,5	0,8
Anfetaminas/speed	0,4	0,5	0,7	0,8	0,6	1,1
Cocaína polvo y/o base	0,7	0,9	0,9	1,1	0,9	2,1
Cocaína polvo	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,9
Cocaína base	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,7
Heroína	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
Analgésicos opioides***	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,8
Inhalables volátiles	0,5	0,6	1,1	1,3	0,9	2,5
GHB	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2
Metanfetamina	0,4	0,4	0,6	0,8	0,5	0,8
Setas mágicas	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Esteroides anabolizantes	0,3	0,5	0,2	0,4	0,3	0,6

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. ***Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.31.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2023.


	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	2,1	4,3	8,2	11,8	6,8	16,6
Alcohol	1,0	1,4	1,6	1,8	1,5	2,4
Hipnosedantes*	3,5	4,5	5,3	5,5	4,8	6,9
Hipnosedantes**	1,5	2,0	2,5	2,1	2,1	2,6
Cannabis	0,5	0,8	1,6	1,7	1,2	3,3

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.32.

Edad media (años) de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2023.



* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta. *** Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.33.

Edad media (años) de inicio en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0	14,0	14,0	13,9
Alcohol (consumo semanal)	14,9	15	15,1	14,9	15,6	14,8	15,1	15,0	15,1	15,2	15,2	15,0
Borracheras	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	14,8	14,7	14,5
Tabaco	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
Tabaco (consumo diario)	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6	14,7	14,7	14,6
Hipnosedantes**	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,4	14,6	14,2	14,0	14,0	14,1	14,4
Cannabis	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9
Cocaína polvo y/o base	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1	15,2	15,3	15,0
Heroína	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0	14,5	14,7	14,1
Éxtasis	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2	15,4	15,4	15,4
Alucinógenos	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2	15,2	15,6	15,1
Anfetaminas	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1	15,4	15,3	15,1
Sustancias volátiles	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8	14,5	14,9	15,3
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	14,3	13,9	13,7	14,3	14,4	14,1

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.34.

Edad media (años) de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2019-2023.

	2019			2021			2023		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	14,0	14,0	14,1	14,0	14,0	14,0	13,9	13,9	13,9
Tabaco	14,1	14,1	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Hipnosedantes*	14,0	13,6	14,2	14,1	13,8	14,2	14,1	13,8	14,2
Esteroides anabolizantes	14,5	14,5	14,6	14,4	14,2	14,9	14,1	14,1	14,4
Heroína	14,5	14,4	14,7	14,7	14,6	15,0	14,1	14,1	14,3
Hipnosedantes**	14,3	14,1	14,3	14,4	14,3	14,4	14,4	14,2	14,5
Cigarrillos electrónicos	-	-	-	-	-	-	14,4	14,4	14,4
Pipas de agua	-	-	-	-	-	-	14,5	14,5	14,5
Tabaco (consumo diario)	14,7	14,7	14,6	14,7	14,8	14,7	14,6	14,7	14,6
GHB	14,4	14,1	14,8	15,0	15,0	14,9	14,7	14,5	15,0
Cocaína base	15,1	15,1	15,1	14,9	14,7	15,3	14,7	14,7	14,8
Analgésicos opioides***	15,2	15,3	15,2	15,1	15,3	14,9	14,8	14,9	14,7
Cannabis	14,9	14,9	15,0	14,9	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
Metanfetamina	15,2	15,2	15,3	15,4	15,2	15,5	15,0	15,1	14,8
Cocaína polvo y/o base	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3	15,4	15,0	15,0	15,0
Alcohol (consumo semanal)	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,3	15,0	15,1	15,0
Setas mágicas	15,2	15,2	15,2	15,5	15,5	15,5	15,0	15,0	15,0
Cocaína en polvo	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,3	15,1	15,1	15,0
Anfetaminas	15,4	15,4	15,4	15,3	15,4	15,2	15,1	15,3	14,8
Alucinógenos	15,2	15,2	15,2	15,6	15,6	15,5	15,1	15,1	15,2
Inhalables volátiles	14,5	14,7	14,3	14,9	15,0	14,7	15,3	15,4	15,1
Éxtasis	15,4	15,6	15,3	15,4	15,5	15,3	15,4	15,5	15,3

T = Total; H = hombres; M = mujeres.

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

***Para colocarte

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.35.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma según sexo y edad (número de casos). España, 2023.

	Sexo			Edad				
	Total	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Andalucía	4.021	2.084	1.937	768	1.031	1.088	906	228
Aragón	2.251	1.200	1.051	430	586	578	526	131
Asturias	2.015	1.064	951	423	541	488	465	98
Baleares	2.207	1.087	1.120	438	577	546	482	164
Canarias	2.488	1.243	1.245	482	647	676	519	164
Cantabria	1.865	939	926	361	501	410	443	150
Castilla y León	2.574	1.267	1.307	545	683	605	585	156
Castilla-La Mancha	2.110	1.048	1.062	392	495	567	503	153
Cataluña	2.675	1.304	1.371	574	721	676	540	164
C. Valenciana	3.636	1.808	1.828	734	913	875	852	262
Extremadura	847	425	422	189	239	211	166	42
Galicia	2.185	1.127	1.058	437	552	531	524	141
Madrid	3.901	1.911	1.990	704	880	1.006	1.002	309
Murcia	2.100	1.061	1.039	390	566	525	497	122
Navarra	2.151	1.091	1.060	366	511	605	530	139
País Vasco	1.184	656	528	252	287	338	294	13
La Rioja	1.586	836	750	288	394	426	365	113
Ceuta	682	308	374	112	156	167	175	72
Melilla	1.730	788	942	358	451	441	375	105
Total	42.208	21.247	20.961	8.243	10.731	10.759	9.749	2.726

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.36.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	77,9	76,6	79,2	76,0	74,7	77,3	59,6	58,1	61,1
Aragón	2.251	80,7	79,1	82,3	78,7	77,4	80,4	62,1	60,1	64,1
Asturias	2.015	77,2	75,3	79,0	75,5	74,1	77,4	58,7	56,6	60,9
Baleares	2.207	75,9	74,1	77,7	72,9	71,5	74,8	52,1	50,0	54,1
Canarias	2.488	73,2	71,5	75,0	70,4	69,0	72,2	51,3	49,4	53,3
Cantabria	1.865	76,2	74,3	78,2	74,1	72,8	76,1	59,1	56,9	61,4
Castilla y León	2.574	80,9	79,4	82,4	79,1	77,8	80,7	61,5	59,6	63,3
Castilla - La Mancha	2.110	80,0	78,3	81,7	78,1	76,8	79,9	63,2	61,1	65,3
Cataluña	2.675	72,7	71,0	74,3	70,1	68,7	71,9	52,7	50,8	54,6
C. Valenciana	3.636	76,1	74,7	77,5	73,3	72,0	74,8	55,6	54,0	57,2
Extremadura	847	83,0	80,4	85,5	81,1	79,8	83,7	67,9	64,7	71,0
Galicia	2.185	75,4	73,6	77,2	73,7	72,3	75,5	58,8	56,7	60,8
Madrid	3.901	74,8	73,4	76,1	72,4	71,0	73,8	53,2	51,7	54,8
Murcia	2.100	72,5	70,6	74,4	69,8	68,3	71,7	52,4	50,3	54,5
Navarra	2.151	80,1	78,4	81,8	78,1	76,8	79,9	64,1	62,0	66,1
País Vasco	1.184	75,2	72,7	77,6	72,6	71,3	75,2	57,9	55,1	60,7
La Rioja	1.586	75,3	73,1	77,4	74,0	72,7	76,2	59,8	57,4	62,2
Ceuta	682	34,4	30,9	38,0	34,0	32,5	37,5	25,3	22,0	28,5
Melilla	1.730	41,2	38,9	43,5	39,5	37,9	41,8	28,6	26,5	30,7
Total	42.208	75,9	75,5	76,3	73,6	72,2	74,0	56,6	56,1	57,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.37.

Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Andalucía	74,4	81,7	72,4	79,9	56,6	62,9
Aragón	81,1	80,2	78,7	78,8	63,1	60,9
Asturias	73,4	81,5	71,4	80,2	56,0	61,9
Baleares	72,8	78,9	70,0	75,8	48,4	55,6
Canarias	70,7	75,8	67,7	73,1	49,0	53,7
Cantabria	73,4	79,1	71,8	76,4	56,2	62,2
Castilla y León	81,1	80,7	78,8	79,4	60,1	62,8
Castilla-La Mancha	78,0	82,1	75,8	80,5	60,8	65,7
Cataluña	70,5	74,8	67,8	72,3	51,3	54,1
C. Valenciana	74,4	77,8	71,0	75,6	53,4	57,8
Extremadura	81,6	84,4	79,7	82,6	68,1	67,6
Galicia	73,8	77,1	72,5	75,0	58,1	59,5
Madrid	72,6	76,8	70,1	74,5	50,0	56,3
Murcia	71,5	73,5	68,9	70,6	51,8	53,0
Navarra	77,6	82,6	75,5	80,8	60,8	67,5
País Vasco	71,5	80,0	67,7	79,1	54,8	61,9
La Rioja	74,7	76,0	73,1	75,2	58,6	61,3
Ceuta	35,7	33,4	35,7	32,6	27,2	23,7
Melilla	41,5	40,9	40,3	38,8	29,0	28,3
Total	73,7	78,1	71,2	76,1	54,5	58,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.38.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	49,5	47,9	51,0	44,1	42,5	45,6	21,5	20,3	22,8
Aragón	2.251	55,5	53,4	57,5	50,2	48,6	52,2	25,1	23,4	26,9
Asturias	2.015	47,7	45,5	49,9	44,0	42,4	46,1	22,4	20,6	24,2
Baleares	2.207	45,6	43,5	47,7	40,7	39,2	42,8	18,6	17,0	20,3
Canarias	2.488	39,7	37,7	41,6	33,6	32,2	35,5	14,4	13,0	15,8
Cantabria	1.865	47,6	45,3	49,9	42,4	40,9	44,7	22,9	21,0	24,8
Castilla y León	2.574	53,4	51,5	55,4	47,8	46,3	49,8	22,5	20,9	24,1
Castilla - La Mancha	2.110	53,2	51,1	55,4	46,9	45,3	49,0	23,8	22,0	25,6
Cataluña	2.675	43,7	41,8	45,5	38,2	36,7	40,0	18,8	17,3	20,2
C. Valenciana	3.636	48,3	46,7	49,9	42,8	41,3	44,4	19,4	18,1	20,7
Extremadura	847	53,6	50,3	57,0	48,0	46,5	51,4	29,6	26,5	32,6
Galicia	2.185	46,3	44,2	48,4	42,1	40,5	44,1	23,3	21,5	25,0
Madrid	3.901	47,6	46,0	49,1	42,0	40,5	43,6	20,0	18,7	21,2
Murcia	2.100	42,4	40,3	44,5	37,2	35,7	39,3	17,0	15,4	18,7
Navarra	2.151	58,7	56,6	60,7	52,5	50,9	54,6	29,4	27,5	31,3
País Vasco	1.184	45,0	42,1	47,8	41,3	39,8	44,1	24,7	22,2	27,1
La Rioja	1.586	50,0	47,5	52,5	46,0	44,5	48,5	23,8	21,7	25,9
Ceuta	682	15,1	12,4	17,8	13,3	12,3	15,9	5,6	3,9	7,3
Melilla	1.730	19,8	17,9	21,7	16,3	15,2	18,0	7,5	6,3	8,7
Total	42.208	47,5	47,0	48,0	42,1	40,6	42,6	20,8	20,4	21,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.39.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Andalucía	45,5	53,9	41,1	47,3	20,7	22,4
Aragón	55,2	55,7	51,2	49,0	25,9	24,3
Asturias	44,0	52,0	40,5	47,9	22,0	22,8
Baleares	40,3	50,7	36,4	44,9	15,7	21,5
Canarias	36,5	42,8	32,0	35,3	13,3	15,5
Cantabria	42,9	52,4	37,5	47,4	21,2	24,6
Castilla y León	51,9	54,9	46,9	48,7	22,6	22,4
Castilla - La Mancha	49,8	56,8	45,0	48,8	24,8	22,8
Cataluña	39,1	48,0	34,2	41,9	17,3	20,2
C. Valenciana	44,0	52,5	37,9	47,7	17,5	21,3
Extremadura	55,0	52,1	48,9	47,1	31,1	27,9
Galicia	45,2	47,4	41,5	42,7	22,8	23,7
Madrid	43,4	51,5	39,1	44,8	17,5	22,3
Murcia	39,0	45,8	35,1	39,3	16,7	17,4
Navarra	54,2	63,2	48,9	56,1	29,1	29,7
País Vasco	40,0	51,4	36,3	47,7	22,2	27,9
La Rioja	48,2	52,2	44,3	48,1	24,1	23,4
Ceuta	13,9	16,0	11,7	14,6	5,7	5,5
Melilla	18,0	21,3	15,5	16,9	8,3	6,8
Total	43,9	51,2	39,3	45,1	19,7	21,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.40.

Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	30,3	28,9	31,7
Aragón	2.251	34,4	32,4	36,3
Asturias	2.015	28,7	26,7	30,7
Baleares	2.207	26,0	24,2	27,9
Canarias	2.488	23,5	21,9	25,2
Cantabria	1.865	28,6	26,5	30,6
Castilla y León	2.574	31,3	29,5	33,0
Castilla-La Mancha	2.110	34,3	32,2	36,3
Cataluña	2.675	24,2	22,6	25,8
C. Valenciana	3.636	27,4	26,0	28,9
Extremadura	847	39,0	35,7	42,3
Galicia	2.185	29,4	27,5	31,3
Madrid	3.901	25,0	23,6	26,3
Murcia	2.100	25,7	23,9	27,6
Navarra	2.151	39,3	37,2	41,3
País Vasco	1.184	32,4	29,8	35,1
La Rioja	1.586	32,3	30,0	34,6
Ceuta	682	7,5	5,6	9,5
Melilla	1.730	7,2	6,0	8,5
Total	42.208	28,2	27,8	28,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.41.

Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Hombres	Mujeres
Andalucía	31,5	29,0
Aragón	36,4	32,0
Asturias	28,3	29,2
Baleares	25,0	27,0
Canarias	23,5	23,6
Cantabria	27,4	29,8
Castilla y León	32,7	29,8
Castilla-La Mancha	36,5	32,0
Cataluña	24,8	23,5
C. Valenciana	26,4	28,4
Extremadura	40,7	37,2
Galicia	30,7	28,0
Madrid	23,2	26,6
Murcia	26,8	24,6
Navarra	37,0	41,7
País Vasco	31,2	33,9
La Rioja	35,1	28,9
Ceuta	10,2	5,4
Melilla	8,6	6,1
Total	28,6	27,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.42.

Prevalencia de hacer botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Últimos 12 meses				Últimos 30 días		
	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	50,5	49,0	52,1	22,0	20,7	23,3
Aragón	2.251	51,3	49,2	53,4	19,2	18,0	20,8
Asturias	2.015	47,5	45,4	49,7	19,5	18,3	21,2
Baleares	2.207	38,5	36,5	40,5	13,8	12,7	15,2
Canarias	2.488	28,6	26,8	30,4	10,5	9,6	11,7
Cantabria	1.865	52,9	50,7	55,2	32,2	30,8	34,4
Castilla y León	2.574	52,6	50,6	54,5	18,0	16,8	19,5
Castilla-La Mancha	2.110	56,3	54,2	58,4	29,3	27,9	31,2
Cataluña	2.675	45,0	43,1	46,8	17,0	15,9	18,4
C. Valenciana	3.636	47,8	46,2	49,4	18,1	16,9	19,3
Extremadura	847	68,9	65,8	72,0	41,5	40,0	44,8
Galicia	2.185	46,5	44,4	48,6	22,4	21,1	24,1
Madrid	3.901	45,4	43,8	46,9	15,5	14,4	16,7
Murcia	2.100	44,9	42,8	47,0	18,0	16,8	19,7
Navarra	2.151	50,3	48,2	52,4	20,0	18,8	21,7
País Vasco	1.184	49,0	46,2	51,9	27,6	26,2	30,1
La Rioja	1.586	44,7	42,3	47,2	16,8	15,7	18,7
Ceuta	682	14,4	11,8	17,1	7,3	6,5	9,2
Melilla	1.730	20,5	18,6	22,4	7,0	6,2	8,2
Total	42.208	47,4	46,9	47,9	19,7	18,5	20,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.43.

Prevalencia de botellon entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Andalucía	47,5	53,9	22,2	21,8
Aragón	51,1	51,5	20,1	18,2
Asturias	43,3	52,4	18,4	20,7
Baleares	37,6	39,4	13,0	14,5
Canarias	27,0	30,1	9,6	11,5
Cantabria	47,4	58,6	28,3	36,2
Castilla y León	50,0	55,0	17,2	18,7
Castilla-La Mancha	55,2	57,4	28,0	30,6
Cataluña	42,1	47,7	16,2	17,8
C. Valenciana	44,7	50,8	15,5	20,6
Extremadura	67,6	70,2	43,3	39,6
Galicia	44,5	48,8	21,8	23,0
Madrid	42,6	48,0	13,5	17,4
Murcia	44,2	45,6	18,6	17,4
Navarra	48,2	52,5	21,4	18,6
País Vasco	43,6	56,1	23,8	32,5
La Rioja	43,7	46,0	17,5	16,0
Ceuta	14,9	14,0	8,2	6,6
Melilla	20,3	20,6	7,9	6,3
Total	44,8	50,0	18,9	20,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.44.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	19,5	18,4	20,8
Aragón	2.251	19,6	18,1	21,2
Asturias	2.015	22,6	20,7	24,4
Baleares	2.207	22,8	20,0	24,6
Canarias	2.488	17,5	16,3	19,0
Cantabria	1.865	21,9	20,0	23,7
Castilla y León	2.574	17,4	15,8	18,8
Castilla-La Mancha	2.110	18,1	16,4	19,8
Cataluña	2.675	22,5	20,8	24,0
C. Valenciana	3.636	20,4	19,0	21,7
Extremadura	847	18,3	15,8	20,9
Galicia	2.185	22,0	20,3	23,8
Madrid	3.901	14,8	13,7	15,9
Murcia	2.100	19,8	17,4	21,5
Navarra	2.151	17,1	14,2	18,6
País Vasco	1.184	21,8	19,5	24,2
La Rioja	1.586	21,8	18,2	23,8
Ceuta	682	15,0	10,3	17,7
Melilla	1.730	13,3	11,0	14,9
Total	42.208	19,5	19,1	19,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.45.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Total	Hombres	Mujeres
Andalucía	50,0	54,1	45,5
Aragón	46,2	55,0	35,9
Asturias	46,4	49,1	43,3
Illes Balears	50,7	54,9	46,6
Canarias	51,8	54,5	49,1
Cantabria	46,6	52,5	40,5
Castilla y León	43,2	52,8	33,9
Castilla-La Mancha	46,0	54,4	37,4
Cataluña	49,0	57,9	40,5
Comunidad Valenciana	45,8	53,4	38,3
Extremadura	47,5	60,2	33,5
Galicia	45,6	52,0	38,7
Madrid	46,4	52,8	40,5
Murcia	47,7	56,0	39,3
Navarra	42,8	54,8	30,3
País Vasco	46,2	52,8	37,9
La Rioja	46,0	53,6	36,5
Ceuta	55,3	58,4	52,8
Melilla	49,5	55,0	45,1
Total	47,7	54,4	40,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.46.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Hombres	Mujeres
Andalucía	21,0	17,9
Aragón	22,7	15,9
Asturias	21,9	23,5
Baleares	21,3	24,3
Canarias	18,2	16,8
Cantabria	23,7	20,0
Castilla y León	18,7	16,0
Castilla-La Mancha	18,5	17,7
Cataluña	24,2	20,8
C. Valenciana	21,1	19,8
Extremadura	21,1	15,1
Galicia	23,8	20,0
Madrid	15,0	14,5
Murcia	22,4	17,1
Navarra	19,4	14,7
País Vasco	24,3	18,8
La Rioja	22,5	20,9
Ceuta	17,5	13,0
Melilla	14,1	12,6
Total	20,8	18,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.47.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	33,7	32,2	35,2	28,1	26,7	29,5	21,1	19,9	22,4
Aragón	2.251	37,8	35,7	39,8	32,5	31,0	34,4	25,3	23,5	27,1
Asturias	2.015	33,1	31,0	35,1	28,5	27,1	30,5	21,6	19,8	23,4
Baleares	2.207	34,5	32,5	36,5	29,1	27,7	31,0	22,2	20,4	23,9
Canarias	2.488	28,8	27,0	30,6	22,7	21,4	24,3	16,5	15,0	18,0
Cantabria	1.865	34,8	32,7	37,0	29,3	27,9	31,3	21,8	19,9	23,7
Castilla y León	2.574	36,4	34,5	38,2	31,1	29,7	32,9	23,9	22,3	25,6
Castilla - La Mancha	2.110	35,8	33,7	37,8	28,9	27,5	30,9	22,2	20,5	24,0
Cataluña	2.675	31,8	30,0	33,5	26,5	25,1	28,2	19,9	18,4	21,4
C. Valenciana	3.636	33,1	31,6	34,6	27,1	25,7	28,5	19,7	18,4	20,9
Extremadura	847	38,4	35,2	41,7	32,9	31,5	36,1	25,9	23,0	28,9
Galicia	2.185	36,0	33,9	38,0	30,9	29,5	32,8	25,0	23,2	26,8
Madrid	3.901	33,1	31,6	34,6	27,1	25,7	28,5	21,2	20,0	22,5
Murcia	2.100	31,1	29,1	33,1	25,6	24,3	27,5	18,7	17,0	20,4
Navarra	2.151	35,7	33,7	37,7	30,2	28,8	32,1	22,5	20,7	24,2
País Vasco	1.184	33,1	30,4	35,8	27,1	25,7	29,6	20,5	18,2	22,8
La Rioja	1.586	31,2	28,9	33,5	26,0	24,6	28,1	20,6	18,7	22,6
Ceuta	682	13,5	10,9	16,0	9,0	8,1	11,2	7,5	5,6	9,5
Melilla	1.730	13,5	11,9	15,1	10,8	9,8	12,3	7,6	6,3	8,8
Total	42.208	33,4	32,9	33,8	27,7	26,3	28,1	21,0	20,6	21,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.48.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Andalucía	31,0	36,7	26,6	29,8	20,4	21,9
Aragón	36,0	39,8	31,0	34,2	24,3	26,6
Asturias	27,9	39,0	24,5	33,2	18,9	24,8
Baleares	31,5	37,5	26,4	31,7	19,8	24,5
Canarias	26,8	30,9	20,3	25,0	15,0	18,0
Cantabria	29,9	39,9	25,4	33,3	18,4	25,3
Castilla y León	34,4	38,2	29,3	32,9	22,7	25,1
Castilla - La Mancha	33,3	38,3	27,3	30,6	20,8	23,7
Cataluña	27,1	36,2	22,0	30,9	16,3	23,3
C. Valenciana	29,1	37,2	22,8	31,3	16,9	22,4
Extremadura	38,7	38,1	32,6	33,2	26,4	25,4
Galicia	35,0	37,1	29,2	32,8	23,9	26,2
Madrid	26,8	39,0	21,1	32,7	16,2	26,0
Murcia	29,1	33,1	23,1	28,2	17,2	20,2
Navarra	32,2	39,4	27,0	33,5	20,2	24,9
País Vasco	32,1	34,4	26,7	27,7	20,7	20,2
La Rioja	31,3	31,1	25,0	27,3	19,4	22,2
Ceuta	14,0	13,1	9,0	9,0	8,1	7,1
Melilla	14,5	12,7	12,4	9,5	9,1	6,3
Total	30,0	36,8	24,7	30,8	18,9	23,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.49.

Prevalencias de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	62,7	61,3	64,2	55,3	53,8	56,9	37,0	35,6	38,5
Aragón	2.251	51,2	49,1	53,2	40,8	39,3	42,8	16,4	14,9	17,9
Asturias	2.015	47,3	45,1	49,4	36,2	34,7	38,3	16,4	14,8	18,0
Baleares	2.207	53,9	51,8	55,9	45,4	43,8	47,5	27,4	25,6	29,3
Canarias	2.488	53,6	51,6	55,6	47,1	45,5	49,1	29,7	27,9	31,5
Cantabria	1.865	51,5	49,3	53,8	39,3	37,8	41,5	18,2	16,5	20,0
Castilla y León	2.574	53,1	51,1	55,0	42,3	40,8	44,2	19,6	18,1	21,1
Castilla-La Mancha	2.110	59,9	57,8	61,9	49,2	47,6	51,3	28,0	26,1	29,9
Cataluña	2.675	52,3	50,4	54,2	44,0	42,5	45,9	24,8	23,1	26,4
C. Valenciana	3.636	52,9	51,2	54,5	47,4	45,8	49,0	25,8	24,4	27,3
Extremadura	847	62,0	58,7	65,2	50,8	49,3	54,2	29,4	26,4	32,5
Galicia	2.185	49,9	47,8	52,0	41,6	40,1	43,7	20,8	19,1	22,5
Madrid	3.901	53,0	51,5	54,6	43,5	42,0	45,1	24,8	23,4	26,1
Murcia	2.100	57,2	55,1	59,3	49,8	48,3	51,9	29,8	27,9	31,8
Navarra	2.151	48,5	46,4	50,6	36,6	35,2	38,7	14,3	12,8	15,8
País Vasco	1.184	45,6	42,8	48,5	31,9	30,4	34,5	12,9	11,0	14,8
La Rioja	1.586	45,5	43,1	48,0	34,6	33,1	36,9	15,4	13,6	17,2
Ceuta	682	31,4	27,9	34,9	25,9	24,5	29,2	16,9	14,0	19,7
Melilla	1.730	34,0	31,8	36,2	26,9	25,5	29,0	15,7	14,0	17,4
Total	42.208	54,6	54,1	55,1	46,0	44,4	46,4	26,3	25,9	26,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.50.

Prevalencias de consumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Andalucía	59,7	66,1	52,9	58,0	34,6	39,6
Aragón	52,6	49,6	42,9	38,4	18,7	13,8
Asturias	42,9	52,3	30,4	42,7	12,9	20,2
Baleares	51,3	56,3	42,3	48,4	23,7	31,0
Canarias	50,1	57,1	44,1	50,0	27,8	31,6
Cantabria	48,0	55,2	36,6	41,9	17,3	19,2
Castilla y León	52,7	53,4	40,8	43,8	18,0	21,1
Castilla-La Mancha	58,0	61,7	46,8	51,5	26,8	29,2
Cataluña	50,9	53,7	43,1	44,9	23,9	25,6
C. Valenciana	49,9	55,8	44,5	50,1	24,6	27,0
Extremadura	62,5	61,4	51,7	49,8	30,7	28,1
Galicia	48,0	52,0	39,9	43,4	21,2	20,3
Madrid	49,3	56,6	38,9	47,7	20,8	28,5
Murcia	56,6	57,8	49,8	49,8	30,8	28,9
Navarra	49,5	47,5	36,6	36,7	14,4	14,1
País Vasco	45,6	45,6	30,6	33,5	12,0	14,0
La Rioja	46,1	44,8	32,7	36,9	14,9	16,0
Ceuta	31,7	31,1	26,9	25,0	17,1	16,7
Melilla	31,5	36,0	26,9	26,9	16,0	15,6
Total	52,5	56,8	43,8	48,1	24,7	27,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.51.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida				Últimos 12 meses		
	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	18,6	17,4	19,8	13,4	12,4	14,5
Aragón	2.251	19,4	17,8	21,1	15,5	14,4	17,0
Asturias	2.015	16,4	14,8	18,0	12,6	11,6	14,1
Baleares	2.207	20,8	19,1	22,5	15,8	14,7	17,3
Canarias	2.488	20,5	18,9	22,1	15,1	14,0	16,5
Cantabria	1.865	16,7	15,0	18,4	12,4	11,4	13,9
Castilla y León	2.574	15,8	14,4	17,2	11,9	10,9	13,1
Castilla-La Mancha	2.110	17,3	15,7	18,9	13,7	12,6	15,2
Cataluña	2.675	22,8	21,2	24,3	17,2	16,1	18,7
C. Valenciana	3.636	20,1	18,8	21,4	15,3	14,2	16,5
Extremadura	847	18,4	15,8	21,0	13,6	12,5	15,9
Galicia	2.185	21,8	20,0	23,5	17,2	16,0	18,7
Madrid	3.901	20,4	19,2	21,7	15,9	14,8	17,1
Murcia	2.100	20,3	18,6	22,0	14,9	13,8	16,5
Navarra	2.151	17,4	15,8	19,1	13,0	11,9	14,4
País Vasco	1.184	13,8	11,9	15,8	9,7	8,8	11,4
La Rioja	1.586	14,9	13,1	16,6	11,8	10,8	13,4
Ceuta	682	13,9	11,3	16,5	10,9	9,9	13,2
Melilla	1.730	15,8	14,1	17,6	11,3	10,4	12,8
Total	42.208	19,6	19,2	20,0	14,8	13,7	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.52.

Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Andalucía	12,1	25,6	8,7	18,5
Aragón	12,2	27,8	9,4	22,6
Asturias	10,4	23,2	7,7	18,3
Baleares	14,4	27,0	10,6	20,8
Canarias	14,0	27,1	9,3	21,0
Cantabria	11,2	22,2	8,2	16,7
Castilla y León	11,2	20,1	8,7	14,9
Castilla-La Mancha	11,5	23,1	8,4	19,1
Cataluña	15,8	29,4	11,8	22,4
C. Valenciana	14,0	26,2	10,4	20,3
Extremadura	12,5	24,9	9,4	18,2
Galicia	15,8	28,3	11,8	23,0
Madrid	12,8	27,6	9,3	22,1
Murcia	14,2	26,5	9,8	20,2
Navarra	13,4	21,7	9,7	16,5
País Vasco	11,1	17,4	7,3	13,0
La Rioja	11,7	18,8	8,5	15,8
Ceuta	8,6	18,0	5,8	15,0
Melilla	10,2	20,4	6,9	14,9
Total	13,3	26,1	9,7	20,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.53.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

Comunidad/Ciudad Autónoma	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	23,3	22,0	24,6	18,7	17,5	19,9	13,6	12,6	14,7
Aragón	2.251	28,8	27,0	30,7	23,6	22,3	25,4	16,9	15,3	18,4
Asturias	2.015	27,1	25,2	29,1	22,2	20,9	24,0	15,6	14,0	17,1
Baleares	2.207	31,4	29,4	33,3	26,5	25,2	28,4	19,0	17,4	20,7
Canarias	2.488	26,1	24,4	27,8	21,1	19,8	22,7	15,9	14,5	17,4
Cantabria	1.865	28,7	26,6	30,7	24,0	22,6	25,9	17,9	16,2	19,7
Castilla y León	2.574	27,5	25,7	29,2	22,0	20,7	23,6	14,8	13,4	16,2
Castilla-La Mancha	2.110	26,2	24,3	28,1	20,4	19,1	22,1	14,4	12,9	15,9
Cataluña	2.675	29,6	27,8	31,3	24,0	22,6	25,6	17,0	15,6	18,4
C. Valenciana	3.636	29,0	27,6	30,5	22,3	21,0	23,6	15,5	14,3	16,7
Extremadura	847	25,9	23,0	28,9	20,5	19,3	23,2	14,9	12,5	17,3
Galicia	2.185	28,6	26,7	30,5	24,7	23,4	26,5	18,5	16,9	20,2
Madrid	3.901	26,9	25,5	28,3	21,8	20,5	23,1	15,1	14,0	16,3
Murcia	2.100	22,0	20,2	23,8	17,6	16,4	19,2	12,4	11,0	13,8
Navarra	2.151	28,0	26,2	29,9	23,4	22,1	25,2	16,9	15,3	18,4
País Vasco	1.184	28,7	26,2	31,3	24,1	22,7	26,5	19,3	17,1	21,5
La Rioja	1.586	24,8	22,7	26,9	20,3	19,1	22,3	14,4	12,7	16,1
Ceuta	682	11,1	8,7	13,4	7,8	7,0	9,8	5,6	3,8	7,3
Melilla	1.730	10,8	9,3	12,3	8,3	7,4	9,6	6,1	4,9	7,2
Total	42.208	26,9	26,5	27,4	21,8	20,5	22,1	15,6	15,3	16,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.54.

Prevalencias de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Andalucía	24,7	21,8	20,0	17,2	15,2	11,9
Aragón	30,6	26,8	26,2	20,6	19,7	13,6
Asturias	26,9	27,5	22,1	22,3	16,6	14,4
Baleares	30,9	31,8	26,6	26,4	19,5	18,6
Canarias	26,9	25,3	21,8	20,3	17,4	14,5
Cantabria	29,4	28,0	23,8	24,1	19,8	16,1
Castilla y León	28,8	26,2	23,9	20,1	16,3	13,3
Castilla-La Mancha	26,8	25,6	20,9	19,8	14,9	13,9
Cataluña	29,3	29,8	24,0	23,9	17,7	16,3
C. Valenciana	29,2	28,9	22,5	22,1	16,0	15,0
Extremadura	28,9	22,6	22,7	18,1	17,8	11,7
Galicia	31,1	25,9	26,7	22,4	20,8	16,1
Madrid	26,1	27,6	20,7	22,8	14,0	16,2
Murcia	24,5	19,5	20,0	15,2	15,0	9,8
Navarra	28,5	27,6	24,3	22,5	18,3	15,4
País Vasco	30,8	26,1	26,1	21,5	21,3	16,8
La Rioja	27,2	21,8	22,1	18,2	16,8	11,4
Ceuta	10,6	11,4	8,5	7,3	7,3	4,2
Melilla	12,8	9,1	10,6	6,4	7,7	4,7
Total	27,6	26,2	22,5	21,0	16,7	14,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.55.

Edad media de inicio en el consumo (años) de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma. España, 2023.

	Tamaño de muestra	Edad media inicio en el consumo de tabaco	Edad media inicio en el consumo de tabaco diario	Edad media inicio en el consumo de alcohol	Edad media inicio en el consumo de cannabis
Andalucía	4.021	14,2	14,6	14,0	15,1
Aragón	2.251	14,0	14,4	13,6	14,9
Asturias	2.015	14,2	14,5	14,0	14,9
Baleares	2.207	14,1	14,7	14,0	14,9
Canarias	2.488	13,9	14,3	13,9	14,8
Cantabria	1.865	14,1	14,3	13,9	14,9
Castilla y León	2.574	14,1	14,7	13,8	15,0
Castilla-La Mancha	2.110	14,0	14,4	13,8	14,9
Cataluña	2.675	13,9	14,4	13,7	14,7
C. Valenciana	3.636	14,2	14,8	13,7	14,9
Extremadura	847	14,0	14,6	13,9	15,0
Galicia	2.185	14,2	14,8	14,2	15,0
Madrid	3.901	14,1	14,8	13,9	14,9
Murcia	2.100	14,0	14,6	13,7	14,9
Navarra	2.151	14,3	14,9	13,9	14,8
País Vasco	1.184	14,2	14,7	13,7	14,9
La Rioja	1.586	14,0	14,5	13,9	14,8
Ceuta	682	14,4	15,2	14,5	15,2
Melilla	1.730	14,5	14,4	14,0	15,2
Total	42.208	14,1	14,6	13,9	14,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.56.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2023.

	Información con respecto al tema de las drogas		
	Tamaño de muestra	Perfectamente informado	Mal informado
Andalucía	4.021	29,4	9,2
Aragón	2.251	30,0	6,7
Asturias	2.015	30,9	6,6
Baleares	2.207	29,9	6,2
Canarias	2.488	30,8	7,7
Cantabria	1.865	36,4	7,0
Castilla y León	2.574	32,1	5,4
Castilla-La Mancha	2.110	33,0	6,0
Cataluña	2.675	26,2	8,7
C. Valenciana	3.636	30,8	8,1
Extremadura	847	31,1	7,8
Galicia	2.185	32,1	7,1
Madrid	3.901	30,2	5,6
Murcia	2.100	33,7	8,0
Navarra	2.151	24,8	7,8
País Vasco	1.184	24,6	13,3
La Rioja	1.586	35,8	3,5
Ceuta	682	32,4	17,1
Melilla	1.730	27,0	15,2
Total	42.208	29,6	7,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.57.

Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Tamaño de muestra	Tabaco	Bebidas alcohólicas	Hipnosedantes	Cannabis	Cocaína en polvo	Cocaína base	Éxtasis	Anfetaminas o speed	Alucinógenos	Heroína	Metanfetamina
Andalucía	4.021	87,5	92,8	39,9	52,6	27,1	18,8	19,1	18,1	20,4	18,9	17,7
Aragón	2.251	91,7	94,3	41,5	60,4	29,0	18,7	21,7	25,1	20,8	17,7	17,8
Asturias	2.015	90,5	93,2	46,3	59,8	35,2	22,2	27,9	25,8	25,6	22,7	21,9
Baleares	2.207	87,8	91,7	42,2	58,0	24,4	16,4	20,4	18,7	21,1	18,2	17,4
Canarias	2.488	86,0	91,2	45,0	56,1	31,0	22,5	24,3	22,6	23,3	24,4	23,6
Cantabria	1.865	90,9	93,6	43,0	60,0	34,2	23,5	25,2	26,4	25,4	24,1	22,3
Castilla y León	2.574	89,9	94,7	43,9	60,4	30,6	21,5	24,5	25,9	23,4	21,6	20,5
Castilla-La Mancha	2.110	89,9	93,2	41,3	57,6	33,1	21,5	22,2	21,5	20,7	20,7	19,7
Cataluña	2.675	88,6	92,9	44,0	56,9	26,7	19,2	21,6	19,2	22,0	18,9	18,4
C. Valenciana	3.636	88,0	92,1	43,5	56,9	28,2	18,9	21,2	20,6	20,3	17,6	16,8
Extremadura	847	89,9	94,3	40,5	54,6	28,5	19,3	21,0	22,2	20,0	20,5	19,1
Galicia	2.185	91,1	93,6	46,6	59,8	34,5	24,0	27,8	26,6	28,8	25,0	23,9
Madrid	3.901	91,6	93,5	44,5	57,9	28,9	20,0	23,1	22,5	24,1	20,2	19,5
Murcia	2.100	88,9	91,1	40,0	52,8	27,8	19,5	19,0	18,8	19,4	18,6	16,2
Navarra	2.151	90,1	95,3	49,4	67,2	32,6	21,3	23,6	31,1	24,1	20,2	21,6
País Vasco	1.184	88,3	91,7	51,8	61,7	27,3	19,7	19,9	23,4	19,6	17,0	18,0
La Rioja	1.586	90,8	94,6	42,1	64,5	34,8	21,9	26,0	32,2	27,0	22,8	22,9
Ceuta	682	76,9	77,6	40,8	42,4	24,6	18,5	18,9	18,1	21,3	20,7	19,6
Melilla	1.730	84,4	85,0	41,7	41,9	22,5	17,6	17,2	18,0	18,9	17,7	16,1
Total	42.208	89,1	92,9	43,4	56,9	28,8	19,9	21,9	21,4	22,1	19,8	19,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.58.

Valoración de la importancia (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Campañas publicitarias	Educación en las escuelas	Tratamiento voluntario a consumidores	Tratamiento obligatorio a consumidores	Administración médica de metadona	Administración médica de heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas contra las drogas	Legalización de cannabis	Legalización de todas las drogas
Andalucía	89,7	96,3	95,3	92,6	90,8	85,9	94,3	90,2	48,0	34,8
Aragón	87,9	96,3	95,5	91,4	89,0	82,9	92,3	87,0	46,1	30,1
Asturias	86,5	95,7	95,1	89,6	87,1	81,7	92,4	85,9	44,3	26,0
Baleares	92,6	96,4	95,6	91,8	91,9	88,6	93,6	89,0	53,3	34,6
Canarias	89,0	96,9	95,9	89,8	90,4	85,4	93,2	87,6	51,9	33,0
Cantabria	88,0	95,8	94,5	90,0	88,9	84,0	91,6	88,7	48,5	34,2
Castilla y León	89,9	97,4	96,4	90,9	90,2	82,6	93,9	87,5	46,0	28,6
Castilla-La Mancha	88,9	96,1	95,1	91,5	90,0	84,6	93,1	88,5	46,7	31,5
Cataluña	90,3	96,2	94,7	92,7	90,5	86,6	93,3	90,2	59,7	43,0
C. Valenciana	89,8	96,4	95,1	89,7	89,7	81,6	93,0	88,5	51,5	31,7
Extremadura	89,0	95,9	95,3	91,4	87,9	83,9	93,1	87,8	48,6	36,8
Galicia	88,5	96,6	95,4	91,4	89,6	80,7	93,0	88,2	48,5	29,7
Madrid	89,0	96,4	96,0	91,2	92,1	86,4	93,6	88,2	47,8	29,2
Murcia	90,2	97,2	96,0	92,5	90,8	86,6	94,3	89,4	44,8	31,3
Navarra	85,0	92,9	91,9	86,8	86,2	82,2	88,0	83,3	50,6	34,6
País Vasco	80,8	86,3	84,5	79,3	80,8	76,5	81,3	78,8	55,0	37,9
La Rioja	89,8	97,1	96,4	90,2	91,9	85,5	92,8	87,8	47,3	27,9
Ceuta	85,0	92,7	91,9	89,3	84,6	81,4	89,4	87,5	44,1	35,1
Melilla	90,6	95,8	95,0	91,4	90,7	86,8	94,4	90,6	48,0	38,6
Total	89,1	95,9	94,9	91,0	90,0	84,6	92,9	88,4	50,5	33,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.59.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	59,6	58,1	61,1
Aragón	62,1	60,1	64,1
Asturias	58,7	56,6	60,9
Baleares	52,1	50,0	54,1
Canarias	51,3	49,4	53,3
Cantabria	59,1	56,9	61,4
Castilla y León	61,5	59,6	63,3
Castilla-La Mancha	63,2	61,1	65,3
Cataluña	52,7	50,8	54,6
C. Valenciana	55,6	54,0	57,2
Extremadura	67,9	64,7	71,0
Galicia	58,8	56,7	60,8
Madrid	53,2	51,7	54,8
Murcia	52,4	50,3	54,5
Navarra	64,1	62,0	66,1
País Vasco	57,9	55,1	60,7
La Rioja	59,8	57,4	62,2
Ceuta	25,3	22,0	28,5
Melilla	28,6	26,5	30,7
Total	56,6	56,1	57,0



CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 56,6%

- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.60.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	21,5	20,3	22,8
Aragón	25,1	23,4	26,9
Asturias	22,4	20,6	24,2
Baleares	18,6	17,0	20,3
Canarias	14,4	13,0	15,8
Cantabria	22,9	21,0	24,8
Castilla y León	22,5	20,9	24,1
Castilla-La Mancha	23,8	22,0	25,6
Cataluña	18,8	17,3	20,2
C. Valenciana	19,4	18,1	20,7
Extremadura	29,6	26,5	32,6
Galicia	23,3	21,5	25,0
Madrid	20,0	18,7	21,2
Murcia	17,0	15,4	18,7
Navarra	29,4	27,5	31,3
País Vasco	24,7	22,2	27,1
La Rioja	23,8	21,7	25,9
Ceuta	5,6	3,9	7,3
Melilla	7,5	6,3	8,7
Total	20,8	20,4	21,2



PREVALENCIA DE BORRACHERAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 20,8%

- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.61.

Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	30,3	28,9	31,7
Aragón	34,4	32,4	36,3
Asturias	28,7	26,7	30,7
Baleares	26,0	24,2	27,9
Canarias	23,5	21,9	25,2
Cantabria	28,6	26,5	30,6
Castilla y León	31,3	29,5	33,0
Castilla-La Mancha	34,3	32,2	36,3
Cataluña	24,2	22,6	25,8
C. Valenciana	27,4	26,0	28,9
Extremadura	39,0	35,7	42,3
Galicia	29,4	27,5	31,3
Madrid	25,0	23,6	26,3
Murcia	25,7	23,9	27,6
Navarra	39,3	37,2	41,3
País Vasco	32,4	29,8	35,1
La Rioja	32,3	30,0	34,6
Ceuta	7,5	5,6	9,5
Melilla	7,2	6,0	8,5
Total	28,2	27,8	28,6



PREVALENCIA DE BINGE DRINKING EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 28,2%


- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.62.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	50,5	49,0	52,1
Aragón	51,3	49,2	53,4
Asturias	47,5	45,4	49,7
Baleares	38,5	36,5	40,5
Canarias	28,6	26,8	30,4
Cantabria	52,9	50,7	55,2
Castilla y León	52,6	50,6	54,5
Castilla-La Mancha	56,3	54,2	58,4
Cataluña	45,0	43,1	46,8
C. Valenciana	47,8	46,2	49,4
Extremadura	68,9	65,8	72,0
Galicia	46,5	44,4	48,6
Madrid	45,4	43,8	46,9
Murcia	44,9	42,8	47,0
Navarra	50,3	48,2	52,4
País Vasco	49,0	46,2	51,9
La Rioja	44,7	42,3	47,2
Ceuta	14,4	11,8	17,1
Melilla	20,5	18,6	22,4
Total	47,4	46,9	47,9



PREVALENCIA DE BOTELLÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media nacional 47,4%


- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.63.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	21,1	19,9	22,4
Aragón	25,3	23,5	27,1
Asturias	21,6	19,8	23,4
Baleares	22,2	20,4	23,9
Canarias	16,5	15,0	18,0
Cantabria	21,8	19,9	23,7
Castilla y León	23,9	22,3	25,6
Castilla-La Mancha	22,2	20,5	24,0
Cataluña	19,9	18,4	21,4
C. Valenciana	19,7	18,4	20,9
Extremadura	25,9	23,0	28,9
Galicia	25,0	23,2	26,8
Madrid	21,2	20,0	22,5
Murcia	18,7	17,0	20,4
Navarra	22,5	20,7	24,2
País Vasco	20,5	18,2	22,8
La Rioja	20,6	18,7	22,6
Ceuta	7,5	5,6	9,5
Melilla	7,6	6,3	8,8
Total	21,0	20,6	21,4



CONSUMO DE TABACO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 21,0%

- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.64.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	55,3	53,8	56,9
Aragón	40,8	38,8	42,8
Asturias	36,2	34,1	38,3
Baleares	45,4	43,3	47,5
Canarias	47,1	45,1	49,1
Cantabria	39,3	37,1	41,5
Castilla y León	42,3	40,4	44,2
Castilla-La Mancha	49,2	47,1	51,3
Cataluña	44,0	42,1	45,9
C. Valenciana	47,4	45,7	49,0
Extremadura	50,8	47,5	54,2
Galicia	41,6	39,5	43,7
Madrid	43,5	42,0	45,1
Murcia	49,8	47,7	51,9
Navarra	36,6	34,6	38,7
País Vasco	31,9	29,2	34,5
La Rioja	34,6	32,2	36,9
Ceuta	25,9	22,6	29,2
Melilla	26,9	24,8	29,0
Total	46,0	45,5	46,4



PREVALENCIA DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media nacional 46,0%

- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.65.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	13,4	12,4	14,5
Aragón	15,5	14,0	17,0
Asturias	12,6	11,2	14,1
Baleares	15,8	14,3	17,3
Canarias	15,1	13,7	16,5
Cantabria	12,4	10,9	13,9
Castilla y León	11,9	10,6	13,1
Castilla-La Mancha	13,7	12,2	15,2
Cataluña	17,2	15,8	18,7
C. Valenciana	15,3	14,2	16,5
Extremadura	13,6	11,3	15,9
Galicia	17,2	15,6	18,7
Madrid	15,9	14,8	17,1
Murcia	14,9	13,4	16,5
Navarra	13,0	11,6	14,4
País Vasco	9,7	8,1	11,4
La Rioja	11,8	10,2	13,4
Ceuta	10,9	8,6	13,2
Melilla	11,3	9,8	12,8
Total	14,8	14,4	15,1



CONSUMO DE HIPNOSEDANTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media nacional 14,8%

- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.66.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	13,6	12,6	14,7
Aragón	16,9	15,3	18,4
Asturias	15,6	14,0	17,1
Baleares	19,0	17,4	20,7
Canarias	15,9	14,5	17,4
Cantabria	17,9	16,2	19,7
Castilla y León	14,8	13,4	16,2
Castilla-La Mancha	14,4	12,9	15,9
Cataluña	17,0	15,6	18,4
C. Valenciana	15,5	14,3	16,7
Extremadura	14,9	12,5	17,3
Galicia	18,5	16,9	20,2
Madrid	15,1	14,0	16,3
Murcia	12,4	11,0	13,8
Navarra	16,9	15,3	18,4
País Vasco	19,3	17,1	21,5
La Rioja	14,4	12,7	16,1
Ceuta	5,6	3,8	7,3
Melilla	6,1	4,9	7,2
Total	15,6	15,3	16,0



CONSUMO DE CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 15,6%

- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.67.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	48,0	46,5	49,6
Aragón	46,1	44,0	48,2
Asturias	44,3	42,2	46,5
Baleares	53,3	51,2	55,4
Canarias	51,9	49,9	53,8
Cantabria	48,5	46,2	50,8
Castilla y León	46,0	44,1	47,9
Castilla-La Mancha	46,7	44,6	48,9
Cataluña	59,7	57,9	61,6
C. Valenciana	51,5	49,9	53,1
Extremadura	48,6	45,2	51,9
Galicia	48,5	46,5	50,6
Madrid	47,8	46,3	49,4
Murcia	44,8	42,7	47,0
Navarra	50,6	48,5	52,7
País Vasco	55,0	52,2	57,8
La Rioja	47,3	44,8	49,7
Ceuta	44,1	40,4	47,8
Melilla	48,0	45,6	50,4
Total	50,5	50,0	51,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



VALORACIÓN COMO ALGO O MUY IMPORTANTE DE LA LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS

Media nacional 50,5%

- < media España
- = media España
- > media España

1.2.68.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	34,8	33,3	36,2
Aragón	30,1	28,2	32,0
Asturias	26,0	24,1	27,9
Baleares	34,6	32,6	36,6
Canarias	33,0	31,1	34,8
Cantabria	34,2	32,1	36,4
Castilla y León	28,6	26,9	30,4
Castilla-La Mancha	31,5	29,5	33,5
Cataluña	43,0	41,1	44,8
C. Valenciana	31,7	30,1	33,2
Extremadura	36,8	33,5	40,0
Galicia	29,7	27,8	31,6
Madrid	29,2	27,7	30,6
Murcia	31,3	29,3	33,3
Navarra	34,6	32,6	36,6
País Vasco	37,9	35,2	40,7
La Rioja	27,9	25,7	30,1
Ceuta	35,1	31,5	38,7
Melilla	38,6	36,3	40,9
Total	33,8	33,4	34,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



VALORACIÓN COMO ALGO O MUY IMPORTANTE DE LA LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS DROGAS

Media nacional 33,8%

- < media España
- = media España
- > media España

1.2.69.

Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine... por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (euros). España, 2023.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	15,1	14,0	16,2
Aragón	16,4	14,9	18,0
Asturias	16,9	15,3	18,6
Baleares	19,2	17,6	20,8
Canarias	18,8	17,2	20,3
Cantabria	15,1	13,4	16,7
Castilla y León	13,5	12,2	14,8
Castilla-La Mancha	14,2	12,7	15,7
Cataluña	17,1	15,6	18,5
C. Valenciana	15,9	14,7	17,1
Extremadura	13,3	11,0	15,6
Galicia	17,5	15,9	19,1
Madrid	14,0	12,9	15,1
Murcia	15,7	14,1	17,2
Navarra	14,8	13,3	16,3
País Vasco	13,7	11,7	15,6
La Rioja	14,4	12,7	16,1
Ceuta	18,7	15,8	21,6
Melilla	17,2	15,5	19,0
Total	15,6	15,2	15,9



DINERO GASTADO A LA SEMANA

Media nacional 15,6 euros

- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.70.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2000-2023.

		Alguna vez en la vida											
		2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total		78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9	75,9
Sexo	Hombres	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9	77,8	75,7	76,3	71,6	73,7
	Mujeres	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9	80,1	78,2	79,4	76,3	78,1
Edad	14 años	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9	60,1	57,1	58,3	53,5	58,0
	15 años	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7	73,7	75,4	72,5	68,3	70,1
	16 años	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2	84,1	83,1	84,3	78,8	81,2
	17 años	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8	90,6	89,9	88,5	86,0	86,7
	18 años	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6	92,4	91,9	89,0	87,9	88,2
		Últimos 12 meses											
		2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total		77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	70,5	73,6
Sexo	Hombres	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3	74,3	74,1	67,8	71,2
	Mujeres	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2	76,9	77,5	73,3	76,1
Edad	14 años	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1	57,4	55,3	56,1	50,6	55,0
	15 años	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3	71,2	73,9	70,2	64,5	67,7
	16 años	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2	82,2	82,1	82,5	75,3	79,3
	17 años	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2	88,7	88,7	86,7	82,6	84,7
	18 años	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3	90,7	90,6	86,9	85,2	86,5

1.2.70. (continuación)


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2000-2023.

		Últimos 30 días											
		2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total		60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6	56,6
Sexo	Hombres	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9	65,9	57,2	51,5	54,5
	Mujeres	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5	68,1	59,8	55,8	58,7
Edad	14 años	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2	48,4	46,1	36,0	34,1	36,5
	15 años	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0	61,3	64,6	49,9	45,9	49,2
	16 años	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6	74,0	73,1	65,3	57,1	61,7
	17 años	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4	80,8	81,2	72,9	66,9	69,7
	18 años	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4	84,8	84,5	74,7	72,8	73,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.71.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9	75,9
Últimos 12 meses	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	70,5	73,6
Últimos 30 días	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6	56,6
Borracheras últimos 30 días	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3	23,2	20,8
Binge drinking últimos 30 días	-	-	-	-	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7	32,3	27,9	28,2
Edad media de inicio consumo	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0	14,0	14,0	13,9
Edad media de consumo semanal	14,9	15,0	15,1	15,0	14,8	14,8	15,1	15,0	15,1	15,2	15,2	15,0
Edad primera borrachera	-	-	-	-	-	-	14,8	14,6	14,7	14,8	14,7	14,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.72.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.73.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Últimos 12 meses hombres	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3	74,3	74,1	67,8	71,2
Últimos 12 meses mujeres	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2	76,9	77,5	73,3	76,1
Últimos 30 días hombres	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9	65,9	57,2	51,5	54,5
Últimos 30 días mujeres	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5	68,1	59,8	55,8	58,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.74.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8	13,6	13,8	13,7	13,7	13,8	13,9	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1	14,0	14,0	13,9	13,9
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	15,1	15,0	15,1	14,9	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,3	15,1	15,0
Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida (%)	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2	76,3	79,4	71,6	76,3	73,7	78,1
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses (%)	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9	74,1	77,5	67,8	73,3	71,2	76,1
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días (%)	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1	57,2	59,8	51,5	55,8	54,5	58,7

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.75.

Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	75,9	73,7	78,1	58,0	53,7	62,2	70,1	66,4	73,9	81,2	79,6	83,0	86,7	85,7	87,8	88,2	88,0	88,4	75,0	72,6	77,4
Últimos 12 meses	73,6	71,2	76,1	55,0	49,9	59,8	67,7	63,6	71,7	79,3	77,5	81,3	84,7	84,0	85,5	86,5	86,2	86,8	72,7	70,1	75,3
Últimos 30 días	56,6	54,5	58,7	36,5	32,5	40,4	49,2	45,2	53,1	61,7	60,7	62,9	69,7	68,8	70,5	73,8	72,5	75,4	55,3	53,1	57,5
Diario en los últimos 30 días	1,5	2,2	0,9	1,0	1,2	0,7	1,4	1,9	0,9	1,6	2,4	0,8	1,8	2,7	0,9	2,4	3,6	1,1	1,5	2,1	0,8
Nunca	24,1	26,3	21,9	42,0	46,3	37,8	29,9	33,6	26,1	18,8	20,4	17,0	13,3	14,3	12,2	11,8	12,0	11,6	25,0	27,4	22,6

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.76.


Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.

	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Total	31,6	15,7	23,4	35,4	43,4	49,6	30,3
Hombres	31,5	14,5	21,8	35,5	44,2	51,0	30,0
Mujeres	31,7	16,9	25,1	35,3	42,6	48,0	30,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.77.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y según sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.78.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Combinados/ cubatas	22,4	21,9	23,0	10,2	8,5	11,8	16,6	15,4	17,8	26,2	25,3	27,1	30,7	31,2	30,2	34,1	34,8	33,4	21,6	20,9	22,2
Cerveza/ sidra	13,6	16,1	11,1	3,8	4,4	3,2	7,8	9,0	6,6	15,0	17,4	12,6	22,0	25,8	18,0	26,7	32,1	20,8	12,6	14,8	10,4
Licores fuertes	9,8	9,9	9,7	4,9	4,6	5,2	8,3	7,5	9,0	11,2	11,2	11,3	12,1	13,3	10,9	15,2	15,3	15,0	9,4	9,5	9,3
Licores de frutas	5,7	5,6	5,8	3,1	3,1	3,1	4,4	4,0	4,8	6,3	6,6	6,0	7,7	7,5	7,9	8,8	8,3	9,3	5,5	5,4	5,5
Vino/champán	5,8	5,9	5,6	2,8	3,1	2,4	3,4	3,4	3,4	5,9	6,3	5,5	8,7	8,3	9,1	11,5	11,7	11,2	5,3	5,5	5,2
Vermú/jerez/ fino	1,6	1,9	1,3	0,9	1,0	0,9	1,1	1,3	0,9	1,7	2,0	1,2	2,3	2,8	1,8	2,5	2,6	2,4	1,5	1,8	1,2
Cualquier bebida alcohólica	31,6	31,5	31,7	15,7	14,5	16,9	23,4	21,8	25,1	35,4	35,5	35,3	43,4	44,2	42,6	49,6	51,0	48,0	30,3	30,0	30,6

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.79.


Prevalencia de borracheras (últimos 30 días), de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.80.


Prevalencia de borracheras, binge drinking y botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años, según sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.81.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.82.

Prevalencia de borracheras (últimos 30 días), de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2008-2023.



		2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Borracheras últimos 30 días	Hombres	29,4	36,4	31,3	22,3	21,2	23,7	20,8	19,7
Borracheras últimos 30 días	Mujeres	28,7	34,8	30,3	22,1	22,3	25,0	25,6	21,9
Binge drinking últimos 30 días	Hombres	44,7	38,9	44,1	33,4	32,3	32,2	26,3	28,6
Binge drinking últimos 30 días	Mujeres	38,3	34,5	39,6	31,0	31,0	32,3	29,6	27,8
Botellón últimos 30 días	Hombres	-	-	-	24,6	23,3	22,1	18,4	18,9
Botellón últimos 30 días	Mujeres	-	-	-	26,4	25,0	23,0	20,5	20,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.83.


Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2010-2023.

	Alguna vez en la vida							Últimos 12 meses							Últimos 30 días						
	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	58,8	60,7	50,1	48,9	51,1	48,0	47,5	52,9	52,0	42,6	42,4	44,5	39,4	42,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3	23,2	20,8
Sexo																					
Hombres	58,0	59,9	48,7	46,4	48,5	43,8	43,9	52,2	51,7	41,5	40,1	42,3	35,4	39,3	36,4	31,3	22,3	21,2	23,7	20,8	19,7
Mujeres	59,5	61,5	51,4	51,4	53,4	52,4	51,2	53,5	52,3	43,7	44,8	46,5	43,6	45,1	34,8	30,3	22,1	22,3	25,0	25,6	21,9
Edad																					
14 años	27,8	31,5	23,2	23,1	25,8	24,7	22,5	24,6	26,1	19,0	18,8	22,2	20,8	19,5	16,0	12,7	7,6	7,9	9,7	11,7	8,1
15 años	52,2	47,4	39,8	42,4	40,9	36,9	38,3	47,3	40,2	33,6	36,1	35,6	30,8	33,9	32,0	21,3	14,9	15,8	17,5	16,9	15,2
16 años	66,2	62,3	56,5	55,9	57,4	53,4	54,1	59,8	53,4	48,8	49,3	50,6	44,5	48,5	38,8	30,9	26,4	25,6	27,7	25,9	24,3
17 años	76,8	73,1	69,1	69,7	68,6	64,7	63,8	69,1	62,6	59,0	61,5	59,9	51,9	57,0	46,6	38,8	33,1	33,9	35,6	31,9	29,8
18 años	77,8	80,4	74,1	74,7	70,9	71,5	68,5	69,8	70,5	63,4	65,4	60,3	58,0	59,8	52,8	46,5	37,5	40,4	37,6	35,5	32,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.84.


Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.85.


Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.86.

Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.87.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2023.

	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7	32,3	27,9	28,2
Sexo								
Hombres	44,7	38,9	44,1	33,4	32,3	32,2	26,3	28,6
Mujeres	38,3	34,5	39,6	31,0	31,0	32,3	29,6	27,8
Edad								
14 años	22,9	17,6	20,3	14,2	13,9	15,1	15,7	14,0
15 años	36,0	32,6	30,4	24,6	26,4	25,2	21,1	22,4
16 años	45,3	40,6	42,6	37,1	35,9	36,6	29,8	31,4
17 años	53,0	48,3	50,7	44,2	45,0	44,0	37,9	37,7
18 años	58,1	52,8	59,9	50,6	56,6	47,1	42,7	43,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.88.

Prevalencia de binge drinking o consumo de alcohol en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2008-2023.




	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
En los que han consumido alcohol en los últimos 30 días	64,4	66,5	56,8	47,3	47,6	55,5	52,6	50,4
En los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7	32,3	27,9	28,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.89.


Prevalencia de botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.90.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.91.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2023.

	2016		2019		2021		2023	
	Últimos 12 meses	Últimos 30 días						
Total	52,0	24,1	51,3	22,6	41,1	19,4	47,4	19,7
Sexo								
Hombres	50,3	23,3	48,6	22,1	38,7	18,4	44,8	18,9
Mujeres	53,8	25,0	53,8	23,0	43,5	20,5	50,0	20,5
Edad								
14 años	28,0	9,7	28,4	9,8	26,9	12,5	26,6	10,9
15 años	47,7	20,5	44,1	16,9	36,9	17,1	40,9	17,4
16 años	61,1	27,9	59,2	26,9	46,6	22,8	54,9	23,4
17 años	68,9	35,7	64,2	30,8	48,5	22,8	59,6	24,1
18 años	68,1	39,1	64,1	32,4	47,3	22,1	57,8	23,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.92.

Prevalencia de borracheras y de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho o no botellón en los últimos 30 días y según sexo (%). España, 2023.

	Total		Hombres		Mujeres	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Borracheras últimos 30 días	64,8	10,2	66,2	9,1	63,5	11,3
Binge drinking últimos 30 días	72,3	17,2	77,6	16,9	67,3	17,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.93.


Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2023.

	Total		Hombres		Mujeres	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Tabaco	47,8	9,2	44,9	7,8	50,5	10,9
Hipnosedantes con o sin receta	18,7	11,1	12,6	7,1	24,4	15,6
Cannabis	37,3	7,4	39,9	7,8	34,9	7,0
Cocaína polvo y/o base	3,8	0,8	5,4	1,1	2,4	0,5
Éxtasis	4,1	0,5	4,9	0,7	3,2	0,3
Anfetaminas	2,1	0,4	3,2	0,5	1,2	0,3
Alucinógenos	2,3	0,4	3,2	0,7	1,5	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.94.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2023.




* Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas. ** Internet o venta telefónica.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.95.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días que han conseguido bebidas alcohólicas por ellos mismos (%). España, 2016-2023.




* Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas. ** Internet o venta telefónica.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.96.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023.



* Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas. ** Internet o venta telefónica.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.97.


Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	Total	14-17 años	18 años									
Supermercados	58,0	56,2	73,7	54,0	52,4	71,4	56,3	53,8	76,4	54,1	52,3	70,6
Bares o pubs	54,1	52,2	70,5	54,0	52,5	70,4	48,2	45,8	67,5	54,9	52,9	72,7
Discotecas	43,1	40,6	65,6	43,6	42,0	61,0	12,8	12,0	19,3	46,3	44,2	66,4
Tiendas de barrio*	53,9	55,1	43,3	49,9	50,8	39,0	53,9	55,0	45,1	49,4	50,0	44,0
Hipermercados	27,2	25,5	41,9	21,9	21,0	32,6	21,2	19,7	33,2	22,0	21,2	29,8
Casa de otras personas	29,1	29,4	26,3	30,4	30,6	28,4	40,0	40,3	37,9	36,0	36,0	36,0
Casa donde vives	20,4	19,7	26,6	22,0	21,4	28,2	28,6	27,9	34,0	27,8	27,3	32,9
Internet	1,1	1,1	0,8	1,2	1,2	1,3	1,4	1,3	2,2	2,3	2,2	3,4
Venta ambulante	5,3	5,5	4,0	4,4	4,4	3,4	3,7	3,7	4,4	4,9	4,9	4,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.98.


Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.99.

Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.100.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2023.


Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tú directamente																				
60,0	62,8	57,4	39,2	38,9	39,4	48,4	50,2	47,1	58,2	60,3	56,1	66,1	68,8	63,5	91,5	91,8	91,1	56,6	59,3	54,2
A través de otras personas de 18 años o mayores																				
48,1	43,2	52,5	48,7	47,1	49,7	51,2	45,3	55,5	50,6	46,1	54,9	53,3	47,4	59,0	17,4	15,7	19,3	51,4	46,5	55,7
A través de otras personas menores de 18 años																				
17,4	15,5	19,1	25,1	21,3	27,6	25,5	21,1	28,7	19,8	18,1	21,4	11,5	11,8	11,3	4,2	5,5	2,8	18,8	16,7	20,7
De otra forma																				
8,9	9,5	8,4	16,5	18,6	15,2	11,2	12,3	10,4	9,1	10,0	8,2	6,2	6,7	5,8	4,1	4,7	3,5	9,4	10,1	8,9

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.101.


Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.102.


Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.103.


Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.104.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.105.

Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según la edad (%). España, 2023.

	Comprado/Conseguido			Consumido		
	Total	14-17 años	18 años	Total	14-17 años	18 años
Bares o pubs	54,9	52,9	72,7	52,8	50,8	72,0
Supermercados	54,1	52,3	70,6	-	-	-
Tiendas de barrio*	49,4	50,0	44,0	-	-	-
Discotecas	46,3	44,2	66,4	47,8	45,9	65,4
Casa de otras personas	36,0	36,0	36,0	45,3	45,1	47,0
Casa donde vives	27,8	27,3	32,9	28,2	27,4	36,0
Hipermercados	22,0	21,2	29,8	-	-	-
Venta ambulante	4,9	4,9	4,9	-	-	-
Internet	2,3	2,2	3,4	-	-	-
Espacios públicos abiertos**	-	-	-	47,5	48,2	40,9

* Chinos, quioscos, bodegas...

** Calles, plazas, parques, playas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.106.

Prevalencia de consumo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias según el consumo de alcohol que hayan realizado sus padres (%). España, 2023.

	Alcohol alguna vez en la vida	Alcohol últimos 12 meses	Borracheras últimos 12 meses	Botellón últimos 12 meses	Binge últimos 30 días
Padre					
No ha bebido ningún día	68,6	66,2	37,5	42,2	23,0
Ha bebido algún día aislado	79,0	77,0	45,4	51,4	29,9
Ha bebido solo los fines de semana	78,8	76,9	44,1	50,9	31,4
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	80,4	77,7	44,8	50,1	29,4
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	84,1	79,8	52,3	52,1	36,7
Madre					
No ha bebido ningún día	71,1	68,7	39,2	43,7	24,6
Ha bebido algún día aislado	79,8	77,6	46,1	51,7	30,4
Ha bebido solo los fines de semana	79,9	78,0	44,2	51,1	31,9
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	82,8	80,9	49,0	52,9	30,3
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	91,0	87,3	65,9	62,6	50,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.107.

Prevalencia del consumo de alcohol en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de alcohol que hayan realizado sus padres, según sexo (%). España, 2023.

	Alcohol alguna vez en la vida		Alcohol últimos 12 meses		Borracheras últimos 12 meses		Botellón últimos 12 meses		Binge últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Padre										
No ha bebido ningún día	67,2	69,9	64,6	67,7	35,6	39,3	41,0	43,2	23,6	22,4
Ha bebido algún día aislado	76,3	81,9	74,3	79,9	42,8	48,1	48,8	54,2	30,4	29,5
Ha bebido solo los fines de semana	75,6	82,1	73,2	80,8	40,3	48,0	47,6	54,2	30,6	32,2
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	79,3	81,7	76,5	78,9	42,8	47,0	47,6	52,7	31,1	27,4
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	79,7	87,9	75,0	84,0	49,3	54,8	47,4	56,1	40,1	33,8
Madre										
No ha bebido ningún día	69,5	72,5	67,1	70,2	37,5	40,8	42,4	45,0	25,6	23,7
Ha bebido algún día aislado	77,0	82,6	74,6	80,7	42,6	49,6	48,7	54,8	30,3	30,5
Ha bebido solo los fines de semana	77,0	82,7	74,8	81,0	40,6	47,5	47,9	54,1	32,1	31,6
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	79,5	86,2	77,6	84,3	45,8	52,3	50,1	55,7	30,4	30,2
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	91,4	90,6	86,4	88,4	70,3	60,7	64,9	60,0	56,4	44,1

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.108.

Motivos principales por los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años beben alcohol, según sexo (%). España, 2023.

	Total		Hombres		Mujeres	
	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Es saludable	96,5	3,5	94,8	5,2	98,0	2,0
Para encajar en un grupo o para no sentirte excluido	92,0	8,0	91,7	8,3	92,3	7,7
Para emborracharte	87,2	12,8	88,3	11,7	86,2	13,8
Para desinhibirte o ligar más	80,6	19,4	77,9	22,1	83,0	17,0
Te ayuda cuando te sientes deprimido	75,4	24,6	81,5	18,5	70,1	29,9
Te gusta cómo te sientes	62,2	37,8	62,3	37,7	62,2	37,8
Es divertido o anima las fiestas	31,7	68,3	32,3	67,7	31,2	68,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.109.


Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de alcohol (porcentaje de estudiantes que piensa que tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana, o tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2004-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.110.


Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.111.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2023.



H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.112.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.


	Total			14 años		15 años		16 años		17 años		14-17 años		18 años	
	T	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Bebidas energéticas	47,7	54,4	40,7	46,1	39,4	52,4	39,9	58,1	41,4	57,2	41,0	54,0	40,5	59,8	44,2
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	19,5	20,8	18,2	12,0	12,7	16,6	17,0	24,1	20,0	26,8	20,6	20,4	17,8	26,0	23,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.113.

Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido bebidas energéticas o bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2023.



* Últimos 12 meses.

** Con o sin receta médica.

*** Alguna droga ilegal sin cannabis: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

Se lee: Entre los que han consumido BE, han consumido alcohol en los U30D un X%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.114.


Características sociodemográficas de los estudiantes de 14-18 años y de los que consumen bebidas energéticas y bebidas energéticas + alcohol (%). España, 2023.

	En el total de estudiantes de 14-18 años	En los consumidores de bebidas energéticas	En los consumidores de bebidas energéticas + alcohol
Pellas	25,5	34,2	42,8
La nota media es suspenso	6,4	8,7	11,1
Repetidor	19,7	25,8	30,7
Dispone de dinero para salir	15,6	17,2	20,5
Regreso a las 3 de la madrugada o más tarde tras salir	32,5	39,7	55,4
Salida nocturna 2 o + noches a la semana	24,7	31,8	40,1
Extranjeros	8,6	9,3	8,8
Padre sin estudios	2,2	2,6	2,8
Madre sin estudios	2,7	3,4	3,6
Situación económica familiar por debajo de la media	4,6	5,4	5,2
Lee libros	61,3	41,8	14,8
Otros hobbies (toco un instrumento musical...)	57,8	43,8	16,34

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.115.

Prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3	38,2	33,4
Últimos 12 meses	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7	35,0	30,7	27,7
Últimos 30 días	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7	23,9	21,0
Diariamente últimos 30 días	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8	9,8	9,0	7,5
Edad media de inicio consumo	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
Edad media de inicio consumo diario	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6	14,7	14,7	14,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.116.

Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
14 años	45,8	43,8	42,1	28,4	28,4	22,7	27,1	22,3	21,3	24,4	21,6	17,2
15 años	58,5	55,5	54,7	41,5	40,6	34,4	35,4	31,3	36,7	35,1	30,9	27,6
16 años	62,7	63,0	62,3	50,7	47,5	44,8	43,0	43,0	40,6	46,1	41,2	37,0
17 años	68,6	67,2	70,0	55,1	54,2	51,1	50,9	48,8	50,6	51,7	50,0	43,4
18 años	78,6	73,2	77,3	61,8	60,4	52,9	59,1	56,5	62,7	55,4	55,9	50,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.117.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2023.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
14 años	19,1	23,0	17,5	20,6	18,6	19,8	21,2	18,4	13,8
15 años	30,6	34,5	27,7	28,6	25,5	33,8	30,0	25,1	23,3
16 años	37,6	40,7	36,9	34,7	35,3	36,7	39,5	33,3	30,8
17 años	41,3	47,1	41,8	40,9	39,7	44,5	43,1	39,0	36,2
18 años	47,4	52,1	43,8	48,6	45,3	55,6	45,4	43,7	40,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.118.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
14 años	17,2	13,4	14,0	13,8	18,2	12,3	15,6	15,0	14,6	14,4	13,0	9,7
15 años	28,1	23,6	24,3	24,1	28,8	21,4	23,3	20,5	26,1	21,9	18,2	16,8
16 años	32,2	32,0	29,0	30,6	34,1	29,7	29,1	29,4	28,3	30,7	26,6	23,6
17 años	38,8	37,6	40,4	35,5	40,7	35,6	34,6	32,7	35,8	33,6	31,4	28,2
18 años	51,6	46,4	48,2	42,1	48,3	40,1	43,2	39,1	48,0	38,0	36,9	33,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.119.

Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	66,7	64,7	64,1	49,8	47,0	43,8	46,1	40,3	40,7	44,3	41,5	36,8
Mujeres	57,1	54,6	56,6	42,0	42,2	35,6	41,6	36,5	36,3	38,2	35,1	30,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.120.


Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.121.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.122.

Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (nº cigarrillos). España, 2000-2023.

	Total	Hombres	Mujeres
2000	-	7,6	6,8
2002	-	7,8	7,3
2004	-	8,1	7,5
2006	-	5,8	5,3
2008	5,05	5,1	5,0
2010	5,20	5,7	4,8
2012	6,20	6,4	6,0
2014	5,60	5,8	5,4
2016	5,80	6,1	5,5
2019	5,95	6,5	5,5
2021	6,09	6,8	5,4
2023	6,69	7,5	6,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.123.


Prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.124.

Percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia de consumo diario de tabaco. España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.125.


Prevalencia de consumo diario de tabaco y riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.126.


Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente y prevalencia de consumo de tabaco diario en los estudiantes de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.127.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.128.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023		
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961	
Edad media de inicio del consumo (años)*	12,9	13,2	13,0	13,1	13,1	13,2	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Edad media de inicio del consumo diario (años)	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,3	14,4	14,3	14,6	14,5	14,6	14,5	14,7	14,6	14,7	14,6	14,8	14,7	14,7	14,7	14,6
Prevalencia alguna vez en la vida (%)	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	54,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7	38,2	44,3	35,1	41,5	30,0	36,8	
Prevalencia últimos 30 días (%)	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0	23,9	29,3	21,2	26,7	18,9	23,3	
Prevalencia de consumo diario (%)	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,4	10,3	8,8	9,2	6,9	8,1	
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (%)																									
1-5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0	56,1	58,3	65,0	68,5	54,7	57,0	60,6	66,1	56,6	63,5	56,6	67,0	55,1	63,4	49,6	59,1	
6-10	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2	28,0	30,1	23,3	23,9	32,4	32,9	30,7	26,5	32,9	28,3	30,9	25,5	30,7	28,6	32,5	30,5	
>10	20,8	15,8	21,8	17,5	22,7	20,0	15,3	9,8	15,9	11,6	11,7	7,6	12,9	10,1	8,7	7,4	10,5	8,1	12,5	7,5	14,2	8,0	17,9	10,4	
Media de cigarrillos al día (nº)	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3	5,1	5,0	5,7	4,8	6,4	6,0	5,8	5,4	6,1	5,5	6,5	5,5	6,8	5,4	7,5	6,0	

H = Hombres, M = Mujeres.

* En fumadores actuales y ex-fumadores (años).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.129.


Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Total	34,5	16,5	49,0
Hombres	33,5	15,3	51,1
Mujeres	35,3	17,4	47,3
14 años	38,6	13,2	48,1
15 años	36,6	12,9	50,5
16 años	35,2	15,7	49,1
17 años	31,4	19,0	49,7
18 años	35,1	19,8	45,1
14-17 años	34,4	16,1	49,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.130.

Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.131.

Prevalencia de consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado tabaco en los últimos 30 días y entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	Solo cajetilla	Solo liar	Ambos tipos	Solo cajetilla	Solo liar	Ambos tipos	Solo cajetilla	Solo liar	Ambos tipos	Solo cajetilla	Solo liar	Ambos tipos
Estudiantes de 14 a 18 años que han fumado tabaco en los últimos 30 días	45,6	10,2	44,2	36,9	14,1	49,0	28,2	22,5	49,2	34,5	16,5	49,0
Estudiantes de 14 a 18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días	36,1	10,8	53,1	28,4	14,7	56,8	19,9	21,6	58,5	28,4	16,0	55,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.132.

Porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro (%). España, 2014-2023.

	2014			2016			2019			2021			2023		
	Profesores	Estudiantes	Otras personas*	Profesores	Estudiantes	Otras personas del centro	Profesores	Estudiantes	Otras personas del centro	Profesores	Estudiantes	Otras personas del centro	Profesores	Estudiantes	Otras personas del centro
Total	54,3	73,9	58,4	42,7	65,8	35,7	43,5	64,7	36,2	39,8	60,0	32,9	44,2	63,1	37,5
Centros públicos	59,5	79,4	62,2	46,9	70,2	38,9	46,9	67,5	39,2	42,6	62,0	34,7	48,2	66,8	40,9
Centros privados	43,1	62,0	50,4	33,5	56,1	29,0	36,1	58,6	30,0	34,0	55,6	29,1	35,9	55,1	30,6

* En 2014 no se especificaba que las otras personas fueran del centro

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.133.

Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	40,2	37,7	42,5	40,6	38,3	42,5	41,4	40,4	42,1	41,5	39,1	43,4
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado	30,1	29,8	30,4	30,7	31,0	30,4	30,9	28,8	32,6	30,3	28,9	31,5
No se han planteado dejar de fumar	29,7	32,6	27,1	28,7	30,6	27,1	27,7	30,8	25,3	28,2	32,0	25,1

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.134.

Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la prevalencia de consumo de tabaco y según sexo (%). España, 2023.


	Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses			Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días			Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	41,5	39,1	43,4	39,3	37,3	41,0	37,8	35,0	40,2
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado	30,3	28,9	31,5	32,3	30,6	33,7	41,8	38,4	44,8
No se han planteado dejar de fumar	28,2	32,0	25,1	28,3	32,1	25,3	20,4	26,5	15,1

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.135.


Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan fumado tabaco o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.136.


Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.137.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2023.



	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	18,8	22,6	52,4	46,9	52,5
Mujeres	15,2	17,5	44,5	41,7	56,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.138.


Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos electrónicos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2019-2023.

		2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	Hombres	52,4	46,9	52,5
	Mujeres	44,5	41,7	56,8
	Total	48,4	44,3	54,6
Últimos 12 meses	Hombres	41,9	25,2	43,8
	Mujeres	33,9	20,4	48,1
	Total	37,8	22,8	46,0
Últimos 30 días	Hombres	17,6	9,4	24,7
	Mujeres	12,4	6,8	27,9
	Total	14,9	8,1	26,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.139.


Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el contenido del cigarrillo electrónico y según sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.140.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.141.


Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.142.


Prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.143.

Prevalencia del consumo de tabaco alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2023.



CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.144.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2023.

	2019			2021			2023		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar	4,4	5,0	3,8	3,5	4,0	2,9	13,5	12,3	14,7

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.145.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo (%). España, 2019-2023.

	2019			2021			2023		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar entre los que fuman cigarrillos electrónicos	9,7	10,2	9,1	8,5	9,3	7,6	26,3	25,1	27,4

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.146.

Prevalencia de consumo de pipas de agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	57,9	59,1	56,7	39,8	40,0	39,5	49,9	50,0	49,7	62,2	63,9	60,3	71,3	72,7	69,9	74,6	75,7	73,4
Últimos 12 meses	44,8	46,2	43,4	27,5	28,1	27,0	37,2	37,1	37,4	48,3	50,0	46,4	57,8	60,2	55,4	60,2	61,1	59,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.147.

Prevalencia de uso de pipas de agua (cachimbas shisahs hookah, narguile...) agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, edad de inicio, y número de días que las ha usado en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años, total, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	57,9	59,1	56,7	39,8	40,0	39,5	49,9	50,0	49,7	62,2	63,9	60,3	71,3	72,7	69,9	74,6	75,7	73,4
Últimos 12 meses	44,8	46,2	43,4	27,5	28,1	27,0	37,2	37,1	37,4	48,3	50,0	46,4	57,8	60,2	55,4	60,2	61,1	59,2
Edad media inicio	14,5	14,5	14,5	13,0	12,9	13,1	13,7	13,7	13,8	14,5	14,4	14,5	15,1	15,1	15,1	15,4	15,4	15,4
Número de días que las ha usado en los últimos 12 meses	15,1	20,2	9,3	12,1	15,1	9,5	14,3	17,3	11,2	15,6	21,0	9,0	15,6	21,2	8,9	16,4	23,9	7,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.148.

Prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua alguna vez en la vida en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021-2023.

	2021	2023
Total	40,5	57,9
Hombres	40,4	59,1
Mujeres	40,7	56,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.149.

Prevalencia de uso de cada tipo de sustancia en pipas de agua (cachimbas shisahs hookah, narguile...) en la población de estudiantes de 14-18 años que ha utilizado pipas de agua alguna vez en la vida, total, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hierbas, piedras, melazas, pastas, cremas, gelatinas o saborizantes sin incluir tabaco (nicotina) ni marihuana o hachís (cannabis)	34,1	33,2	35,0	40,0	40,5	39,5	34,0	33,7	34,2	31,6	32,0	31,2	34,9	32,5	37,6	33,0	32,5	33,6
Solo tabaco (nicotina) normal o de sabores	57,8	56,9	58,7	53,0	51,2	54,6	58,1	57,7	58,4	59,9	57,4	62,7	57,9	58,5	57,2	55,0	53,1	57,3
Solo marihuana o hachís (cannabis)	3,0	4,0	1,9	2,8	4,0	1,7	2,8	3,3	2,3	3,3	4,5	1,8	2,3	3,1	1,4	4,9	6,6	2,9
Tabaco (nicotina) normal o de sabores y marihuana o hachís (cannabis)	5,2	5,9	4,4	4,2	4,3	4,2	5,2	5,2	5,1	5,3	6,1	4,3	4,9	5,9	3,8	7,0	7,7	6,1

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.150.

Prevalencia de binge drinking, borracheras y consumo de cannabis en los últimos 30 días, consumo problemático de cannabis, consumo de cigarrillos electrónicos y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14 a 18 años y en la población que ha consumido tabaco o cannabis en pipas de agua alguna vez en la vida (%). España, 2023.

	Total población 14-18 años	Consumidores de tabaco (nicotina) en pipas de agua alguna vez en la vida*	Consumidores de cannabis (marihuana o hachís) en pipas de agua alguna vez en la vida**
Cigarrillos electrónicos últimos 12 meses	46,0	84,6	78,6
Binge drinking últimos 30 días	28,2	55,3	73,1
Borracheras últimos 30 días	20,8	42,9	57,2
Cannabis últimos 30 días	15,6	31,7	80,1
Consumo problemático cannabis (CAST≥4)	2,4	4,1	29,9
Policonsumo últimos 12 meses***	36,4	71,7	95,2

* Se incluye consumo sólo de tabaco (nicotina) y tabaco (nicotina) y marihuana/hachís.

** Se incluye sólo cannabis marihuana/hachís y cannabis marihuana/hachís y tabaco (nicotina).

*** Consumo de 2 o más sustancias legales e ilegales. Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.151.


Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.152.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.153.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	19,6	13,3	26,1	15,9	10,3	21,3	17,5	11,3	23,7	19,9	13,4	26,8	22,2	15,9	28,7	27,4	18,7	36,9	19,0	12,9	25,3
Último año	14,8	9,7	20,0	11,9	7,5	16,0	13,5	8,6	18,5	14,9	9,8	20,4	16,6	11,1	22,2	20,7	14,0	28,2	14,3	9,3	19,4
Último mes	8,2	5,4	11,0	6,3	4,0	8,5	7,5	4,9	10,1	8,5	5,6	11,5	9,2	6,3	12,2	11,3	7,3	15,8	8,0	5,3	10,7
Diariamente	4,9	3,3	6,6	3,5	2,2	4,7	4,5	2,8	6,2	5,3	3,7	7,0	5,5	4,1	7,0	6,9	4,1	9,9	4,8	3,3	6,3


T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.154.

Prevalencia del consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	9,3	13,6	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5	15,1	21,5	15,3	24,1	13,3	26,1



H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.155.


Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.156.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.




FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.157.

Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8	13,8	14,5	13,5	14,2	14,1	14,3	14,3	14,4	14,2	14,5
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8	6,8	10,3	7,8	12,9	6,9	12,7
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7	4,7	7,4	5,1	9,4	5,3	9,5
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3	2,2	3,5	2,6	4,7	3,0	4,7



H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.158.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad de inicio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2023.

	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Encuestados (nº)	27.503	37.486	35.369	38.010	22.321	42.208
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	14,6	14,2	14,0	14,3	14,4	14,4
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	8,9	7,8	8,0	8,6	10,3	9,7
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	5,8	5,3	5,4	6,1	7,2	7,4
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	3,4	3,0	2,6	2,9	3,6	3,8

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.159.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	9,7	6,9	12,7	7,6	4,8	10,3	8,2	5,4	11,1	10,2	7,3	13,4	11,3	8,5	14,3	13,5	10,6	16,7	9,5	6,6	12,4
Último año	7,4	5,3	9,5	5,6	3,7	7,3	6,4	4,2	8,6	8,0	5,8	10,4	8,4	6,3	10,5	10,3	7,8	13,0	7,2	5,1	9,3
Último mes	3,8	3,0	4,7	2,9	2,1	3,6	3,5	2,4	4,6	4,1	3,3	5,0	4,3	3,6	5,0	5,2	4,4	6,1	3,7	2,9	4,6
Diariamente	2,1	1,8	2,5	1,5	1,1	1,8	2,0	1,4	2,7	2,5	2,2	2,8	2,1	2,0	2,2	2,6	2,3	3,0	2,1	1,7	2,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.160.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 1994-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	3,5	3,2	4,0	3,7	4,6	4,4	4,4	3,8	4,1	4,7	5,1	5,3
Mujeres	6,6	5,7	5,5	5,8	6,8	6,7	7,3	6,8	6,7	7,4	9,4	9,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.161.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2019-2023.



	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	2,2	1,7	1,8
Últimos 12 meses	1,5	0,9	1,3
Últimos 30 días	0,5	0,3	0,6
Edad media de inicio consumo	15,2	15,1	14,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.162.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023.

	Total	Hombres	Mujeres
Alguna vez en la vida	1,8	2,2	1,4
Últimos 12 meses	1,3	1,7	0,9
Últimos 30 días	0,6	0,9	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.163.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2023.

		Total	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Total	1,8	1,1	1,4	1,9	2,2	3,2
	Hombres	2,2	1,1	1,7	2,4	2,7	3,8
	Mujeres	1,4	1,2	1,0	1,3	1,6	2,5
Últimos 12 meses	Total	1,3	0,9	1,1	1,4	1,5	2,3
Últimos 30 días	Total	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.164.


Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%) y edad media de inicio del consumo (años). España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.165.


Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.166.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.167.


Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.168.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	32,2	36,2	39,4	31,6	33,5	28,2	29,7	28,0	28,1	29,2	22,6	22,5
Mujeres	25,2	29,8	33,7	28,2	27,5	24,7	23,2	23,0	24,4	25,9	21,8	21,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.169.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	24,5	28,5	28,3	22,3	23,0	19,3	18,9	21,4	20,8	21,5	15,7	16,7
Mujeres	16,9	19,6	22,0	18,0	17,2	15,2	13,3	15,8	15,9	17,3	14,1	14,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.170.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2012-2023.



	2012	2014	2016	2019	2021	2023
14 años	5,6	7,7	8,1	8,7	6,2	7,8
15 años	11,4	14,4	16,7	15,4	10,2	12,2
16 años	15,9	21,6	20,2	22,1	16,9	17,0
17 años	20,6	26,1	25,6	26,3	21,3	20,9
18 años	24,5	27,5	32,0	27,9	25,2	26,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.171.

Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio de consumo (años)	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8	14,8	15,0	14,8	14,9	14,8	14,9	14,9	15,0	14,8	14,9	14,9	14,9
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9	34,5	31,5	29,2	27,9	27,6	26,2
Prevalencia (%) últimos 12 meses	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	26,8	23,3	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4	29,2	25,9	22,6	21,8	22,5	21,0
Prevalencia (%) últimos 30 días	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	18,6	14,6	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9	21,5	17,3	15,7	14,1	16,7	14,5
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0	74,7	82,5	80,3	84,7	81,1	86,7	83,1	87,9	84,2	88,2	82,3	86,6	87,6	89,1	89,1	90,5
1 a 2 días	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4	7,9	7,1	6,9	6,8	7,1	6,2	6,5	6,0	5,7	5,5	7,0	6,5	5,1	5,4	4,7	4,8
3 a 5 días	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8	5,0	4,6	3,9	3,7	3,9	3,0	3,9	2,8	3,6	2,7	3,8	3,1	2,6	2,2	2,4	2,1
6 a 9 días	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8	2,6	1,8	2,2	1,4	2,1	1,3	2,0	1,1	1,8	1,3	1,5	1,2	1,2	1,0	1,0	0,8
10 a 19 días	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8	3,6	2,0	2,5	1,6	2,0	1,3	1,9	1,2	1,9	1,1	2,1	1,2	1,3	1,2	1,2	0,8
20 a 29 días	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2	4,5	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3	3,3	1,4	2,1	1,1	1,7	1,0

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.172.

Número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (número de porros). España, 2016-2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2016	3,4	3,8	3,0	3,5	3,8	3,3	3,6	4,0	3,1	3,4	3,7	3,0	3,4	3,7	2,9	3,4	3,8	3,0	3,3	3,8	2,7
2019	3,4	3,8	2,9	3,1	3,8	2,5	3,5	4,1	2,7	3,6	4,1	3,0	3,5	3,6	3,2	3,5	3,9	3,0	2,9	3,2	2,3
2021	3,3	3,7	2,7	3,0	3,5	2,6	3,1	3,8	2,5	3,1	3,3	2,8	3,3	3,9	2,6	4,0	4,5	3,5	3,2	3,6	2,7
2023	3,4	4,0	2,8	3,5	4,5	2,8	3,4	3,7	3,0	3,5	4,0	2,9	3,5	4,1	2,7	3,5	4,0	2,8	3,2	3,8	2,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.173.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido una cantidad media de porros al día por término medio en los últimos 30 días y número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (% y número de porros). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
De 1 a 2 porros	58,0	54,2	63,0	62,6	57,1	69,2	62,4	56,6	69,1	61,5	56,1	67,6
De 3 a 4 porros	21,2	21,7	20,6	18,7	20,1	17,1	19,6	21,8	17,0	18,1	18,5	17,7
5 porros o más	20,8	24,2	16,4	18,7	22,8	13,7	18,0	21,6	13,9	20,4	25,3	14,8
Número medio de porros	3,4	3,8	3,0	3,4	3,8	2,9	3,3	3,7	2,7	3,4	4,0	2,8

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.174.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2016-2023.

	Total población estudiantes	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)
2016	8,8	1,0	29,7	35,4	67,4
2019	9,8	1,4	30,3	35,2	66,5
2021	9,0	1,4	31,8	38,2	65,7
2023	7,5	1,0	28,7	33,1	67,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.175.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2016-2023.

	2016	2019	2021	2023	SEXO		EDAD				
	Total	Total	Total	Total	H	M	14	15	16	17	18
Tipo de consumo de cannabis											
Principalmente marihuana (hierba)	51,1	43,8	49,8	35,2	32,2	38,7	34,6	37,7	33,2	35,9	35,2
Principalmente hachís (resina, chocolate)	12,2	19,3	16,7	30,2	31,7	28,4	28,0	27,9	32,5	30,0	29,6
De los 2 tipos	36,7	37,0	33,5	34,6	36,1	32,9	37,3	34,5	34,3	34,1	35,3
Mezcla de cannabis con tabaco											
Sí	82,4	87,1	87,7	75,7	74,4	77,2	63,6	67,5	77,9	79,9	81,5
No	17,6	12,9	12,3	24,3	25,6	22,8	36,4	32,5	22,1	20,1	18,5
Media de porros consumidos											
el día que se consume cannabis	3,4	3,4	3,3	3,4	4,0	2,8	3,5	3,4	3,5	3,5	3,2

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.176.

Modo de consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad. (%) España, 2016-2023.


	2016	2019	2021	2023	SEXO		EDAD				
	Total	Total	Total	Total	H	M	14	15	16	17	18
En forma de porro o canuto	97,7	98,9	91,4	96,7	96,8	96,7	94,1	96,3	96,6	97,4	97,6
Usando pipas de agua, bongos, cachimbas, shishas	17,0	11,9	10,3	10,1	12,7	7,0	12,1	12,2	9,5	9,8	7,4
Por vía oral: pasteles, galletas...	5,7	2,0	1,4	9,4	9,1	9,8	15,9	8,5	9,4	8,3	9,5
Usando cigarrillos electrónicos	1,8	5,4	5,3	4,5	5,8	2,9	9,3	5,9	3,6	3,3	4,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.177.

Orden de inicio en el consumo de cannabis y tabaco (%). España, 2002-2023.



	2002	2006	2010	2014	2016	2019	2021	2023
Se inician antes en el consumo de cannabis	4,6	3,8	3,8	7,4	9,4	6,7	7,5	6,9
inician en el mismo año las 2 sustancias	20,0	24,1	25,7	35,0	39,6	38,0	37,5	35,6
Se inician antes en el consumo de tabaco	75,4	72,1	70,4	57,6	51,0	55,3	55,0	57,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.178.


Porcentaje de estudiantes de 14-18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal, entre los estudiantes de 14-18 años que no lo han probado nunca y en función de si han consumido tabaco alguna vez en la vida (%). España 2016-2023.

	2016	2019	2021	2023
Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?				
Sí lo probaría	12,5	15,4	18,2	12,9
No lo probaría	87,5	84,6	81,8	87,1
2023 según consumo de tabaco				
	Ha consumido tabaco alguna vez en la vida		Nunca ha consumido tabaco	
Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?				
Sí lo probaría	27,1		10,2	
No lo probaría	72,9		89,8	

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.179.


Evolución del % de THC (tetrahidrocannabinol) presente en cannabis según el tipo de presentación analizada; THC contenido en la resina de cannabis y THC contenido en la hierba de cannabis o marihuana. España, 2002-2022.



FUENTE: CITCO.

1.2.180.

Categorización de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2006-2023.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.181.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥4) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España 2006-2023.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.182.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España 2006-2023.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.183.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad (%). España 2012-2023.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
2012	1,1	1,9	3,6	5,2	6,4
2014	0,6	1,8	3,1	3,6	4,9
2016	0,9	2,3	3,1	4,4	6,3
2019	0,9	2,5	3,9	4,9	6,0
2021	0,8	1,8	2,9	4,9	6,9
2023	0,8	1,5	3,0	3,2	4,6

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.184.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4), según sexo y edad. (%) España, 2016-2023.

	2016	2019	2021	2023	SEXO		EDAD				
	Total	Total	Total	Total	H	M	14	15	16	17	18
Tipo de consumo de cannabis											
Principalmente marihuana (hierba)	30,7	23,2	29,3	13,9	16,1	11,0	15,5	13,7	10,3	14,9	19,9
Principalmente hachís (resina, chocolate)	11,2	19,7	20,1	35,3	34,0	37,1	22,5	31,2	38,8	37,8	31,0
De los 2 tipos	52,9	57,1	50,6	50,8	50,0	51,8	62,0	55,1	50,9	47,3	49,0
Mezcla de cannabis con tabaco											
Sí	90,6	87,1	87,0	85,0	85,1	84,9	76,4	84,6	84,4	88,2	83,7
No	9,4	12,9	13,0	15,0	14,9	15,1	23,6	15,4	15,6	11,8	16,3
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis											
	5,4	5,8	5,1	6,4	7,5	5,1	5,7	6,0	6,7	6,5	6,3

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.185.

Modo de consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4), según sexo y edad. (%) España, 2016-2023.

	2016	2019	2021	2023	SEXO		EDAD				
	Total	Total	Total	Total	H	M	14	15	16	17	18
En forma de porro o canuto	93,8	92,2	99,2	86,0	86,5	85,4	75,7	83,4	86,1	89,0	86,8
Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas	25,4	21,2	17,4	18,2	23,0	11,6	21,9	26,4	18,4	14,9	14,5
Por vía oral: pasteles, galletas...	9,5	8,8	7,0	13,9	16,9	9,9	29,7	14,6	13,1	11,7	12,2
Usando cigarrillos electrónicos	4,1	3,5	2,2	7,9	10,7	4,1	18,7	12,0	6,3	7,4	3,3

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.186.

Características de la forma de consumo de cannabis entre los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) y entre la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2023.

	Consumidores de cannabis últimos 30 días			Consumidores problemáticos cannabis (CAST ≥ 4)		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Cannabis + tabaco*	75,7	74,4	77,2	85,0	85,1	84,9
De los 2 tipos	35,2	32,2	38,7	50,8	50,0	51,8
Marihuana	30,2	31,7	28,4	13,9	16,1	11,0
Hachís	34,6	36,1	32,9	35,3	34,0	37,1
Porro	79,4	96,8	96,7	86,0	86,5	85,4
Cachimbos	8,2	12,7	7,0	18,2	23,0	11,6
Vía oral	7,7	7,4	8,1	13,9	16,9	9,9
Cigarrillos electrónicos	3,7	4,8	2,4	7,9	10,7	4,1

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

* Cannabis mezclado con tabaco.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.187.

Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses y número de drogas consumidas entre la población de estudiantes de 14 a 18 años y entre los consumidores problemáticos de cannabis (CAST ≥ 4) (%). España, 2023.

	Total población estudiantes 14-18 años			Consumidores problemáticos de cannabis (CAST ≥ 4)		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Borracheras últimos 30 días	20,8	19,7	21,9	65,1	66,8	62,8
Binge drinking últimos 30 días	28,2	28,6	27,8	75,6	79,7	70,2
Botellón últimos 12 meses	47,4	44,8	50,0	88,1	87,6	88,8
2 drogas	18,3	16,2	20,4	0,9	0,8	1,1
3 drogas	9,9	8,6	11,2	20,5	23,9	16,2
4 drogas o más	15,4	14,2	16,5	78,3	75,0	82,7

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.188.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2023.

	Total población estudiantes 14-18 años	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)
Alcohol	73,6	66,0	96,0	95,0	98,4
Tabaco	27,7	11,8	77,8	78,7	94,0
Hipnosedantes*	14,8	10,9	27,2	29,3	50,5
Analgésicos opioides	1,3	0,1	5,6	7,1	20,9
Otras drogas ilegales**	4,2	0,5	16,6	20,6	55,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.


* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Otras drogas ilegales: Cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.189.

Categorización de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST, según sexo y edad (%). España, 2023.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.190.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9	2,7	2,9
Últimos 12 meses	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4	2,1	2,3
Últimos 30 días	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0	0,9	0,6	1,0
Edad media de inicio consumo	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1	15,2	15,3	15,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.191.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	8,4	9,0	11,3	6,8	6,3	4,8	4,8	4,2	4,1	3,9	3,4	3,8
Mujeres	4,5	6,4	6,8	4,7	3,8	3,0	2,5	2,9	2,2	1,9	1,9	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.192.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

		14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Hombres	2,1	2,9	3,9	4,8	7,6
	Mujeres	1,5	1,7	2,0	2,2	2,9
Últimos 12 meses	Hombres	1,7	2,4	3,3	4,0	6,0
	Mujeres	1,4	1,3	1,4	1,6	2,8
Últimos 30 días	Hombres	0,8	1,4	1,5	1,7	2,9
	Mujeres	0,7	0,4	0,3	0,4	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.193.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.194.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, riesgo percibido ante el consumo de cocaína en polvo habitual y disponibilidad de cocaína en polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.195.

Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.


	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	14,7	15,0	15,5	15,5	14,9	15,1	15,1	15,0	15,2	15,3	15,3	15,4	15,0	15,0
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2	3,9	1,9	3,4	1,9	3,8	1,9
Prevalencia de consumo los últimos 12 meses (%)	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6	3,2	1,7	2,7	1,5	3,2	1,5
Prevalencia de consumo últimos 30 días (%)	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5	1,3	0,6	0,9	0,3	1,5	0,5

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.196.


Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.197.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2023.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	5,1	4,3	3,2	2,9	2,3	2,6	2,6	2,3	2,5
Últimos 12 meses	3,6	3,1	2,0	2,0	1,8	2,1	2,1	1,9	2,0
Últimos 30 días	2,0	1,6	1,2	1,1	1,2	0,8	0,7	0,5	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.198.

Prevalencia de consumo de cocaína base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2023.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	2,6	2,4	2,0	2,2	2,7	1,7	1,2	1,2	1,5
Últimos 12 meses	1,9	1,8	1,3	1,6	2,1	1,2	1,0	0,8	1,2
Últimos 30 días	1,1	1,0	0,9	1,1	1,4	0,5	0,4	0,2	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.199.

Prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,6	3,1	3,1
Últimos 12 meses	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	1,8	2,2
Últimos 30 días	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7	0,6	0,9
Edad media de inicio consumo	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2	15,4	15,4	15,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.200.

Prevalencia del consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	7,6	7,0	6,0	4,2	3,5	3,2	3,9	1,6	2,7	3,1	3,4	3,6
Mujeres	4,8	5,8	3,9	2,5	2,0	1,9	2,0	0,8	1,9	2,1	2,8	2,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.201.

Prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	6,4	4,7	3,3	3,3	2,6	2,2	3,0	1,2	2,0	2,4	2,1	2,6
Mujeres	3,9	3,8	1,9	1,6	1,3	1,2	1,4	0,6	1,1	1,4	1,5	1,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.202.

Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.


	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,5	15,2	15,2	15,2	15,4	15,9	15,6	15,3	15,0	15,3	15,1	15,6	15,3	15,5	15,3	15,5	15,3
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9	3,1	2,1	3,4	2,8	3,6	2,5
Prevalencia de consumo los últimos 12 meses (%)	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2	1,7	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1	2,4	1,4	2,1	1,5	2,6	1,8
Prevalencia de consumo últimos 30 días (%)	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,5

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.203.


Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.204.

Prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
— Alguna vez en la vida	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7
— Últimos 12 meses	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	0,9	1,3
— Últimos 30 días	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7
— Edad media de inicio consumo	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1	15,4	15,3	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.205.

Prevalencia del consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
— Hombres	5,7	6,2	6,0	4,2	4,6	3,4	3,2	1,8	2,2	2,0	1,9	2,3
— Mujeres	3,3	4,9	3,6	2,7	2,8	1,8	1,5	0,9	1,2	1,1	1,0	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.206.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	4,6	4,8	4,3	3,3	3,2	2,2	2,4	1,3	1,6	1,5	1,2	1,8
Mujeres	2,4	3,4	2,3	2,0	1,8	1,0	1,1	0,6	0,7	0,8	0,6	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.207.

Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 2000-2023.


	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)	15,7	15,3	15,6	15,5	15,8	15,6	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,2	15,1	15,4	15,1	15,0	15,4	15,4	15,4	15,2	15,3	14,8
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,6	2,8	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2	2,0	1,1	1,9	1,0	2,3	1,2
Prevalencia de consumo los últimos 12 meses (%)	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,0	1,9	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,2	0,6	1,8	0,8
Prevalencia de consumo últimos 30 días (%)	2,5	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,7	0,7	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,6	0,1	1,0	0,3

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.208.


Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.209.

Prevalencia de consumo de metanfetamina (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2010-2023.



	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5	1,5
Últimos 12 meses	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2	0,9	1,1
Últimos 30 días	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6
Edad media de inicio consumo	-	-	-	15,1	15,2	15,4	15,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.210.


Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.211.


Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.212.

Prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9
Últimos 12 meses	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,4	1,0	1,3
Últimos 30 días	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5	0,3	0,5
Edad media de inicio consumo	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2	15,2	15,6	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.213.

Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.



	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	1,2	1,3	1,1	1,7	1,9	1,8	1,9
Mujeres	0,5	0,6	0,4	1,0	1,3	1,2	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.214.

Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 2000-2023.


	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)	15,6	15,3	15,6	15,4	15,8	15,7	15,5	15,5	15,4	15,2	15,3	15,4	15,5	15,2	14,1	13,8	15,0	15,4	15,2	15,2	15,6	15,5	15,1	15,2
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1	2,7	1,2	2,3	1,1	2,4	1,4
Prevalencia de consumo los últimos 12 meses (%)	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6	2,0	0,8	1,4	0,6	1,8	0,8
Prevalencia de consumo últimos 30 días (%)	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,1	0,9	0,2

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.215.

Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.216.


Prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%) y edad media (años) de inicio en el consumo. España, 2010-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.217.


Prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.218.

Prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7
Últimos 12 meses	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5
Últimos 30 días	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
Edad media de inicio consumo	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0	14,5	14,7	14,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.219.

Percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y percepción de disponibilidad de heroína (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir heroína si quisiera) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Riesgo percibido consumo habitual	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4	97,3	97,0	96,2
Disponibilidad	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2	20,2	16,3	19,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.220.

Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.


	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)	15,5	15,1	14,9	14,8	14,2	15,0	14,5	14,7	14,3	14,2	14,2	14,7	14,7	13,8	14,1	13,8	13,7	14,6	14,4	14,7	14,6	15,0	14,1	14,3
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5	1,0	0,4	0,8	0,2	1,0	0,4
Prevalencia de consumo los últimos 12 meses (%)	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,5	0,2	0,8	0,2
Prevalencia de consumo últimos 30 días (%)	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,9	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,6	0,1

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.221.


Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.222.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0	1,7	1,8	2,8
Últimos 12 meses	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	1,1	2,1
Últimos 30 días	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4	1,0
Edad media de inicio consumo	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8	14,5	14,9	15,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.223.

Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.


	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio de consumo (años)	14,0	13,7	14,3	14,2	13,9	14,1	13,8	13,4	13,6	14,2	13,1	13,2	13,8	12,6	13,9	14,0	13,9	13,7	14,7	14,3	15,0	14,7	15,4	15,1
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,2	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9	1,9	1,5	1,9	1,7	3,1	2,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,7	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,8	1,2	0,9	2,4	1,8
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4	0,6	0,3	1,2	0,8

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.224.


Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.225.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2012-2023.




	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6
Últimos 12 meses	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4
Edad media de inicio consumo	-	-	14,3	14,5	14,4	14,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.226.


Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.227.

Prevalencia de consumo de GHB (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2023.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
— Alguna vez en la vida	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6	0,4	0,7
— Últimos 12 meses	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3	0,5
— Últimos 30 días	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3
- - - Edad media de inicio consumo	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2	14,4	15,0	14,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.228.


Prevalencia de consumo de GHB alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 2006-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.229.


Prevalencia de consumo de GHB entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.230.

Prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, esteroides anabolizantes y heroína alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Éxtasis	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,6	3,1	3,1
Alucinógenos	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9
Inhalables volátiles	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0	1,7	1,8	2,8
Setas mágicas	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7	1,3	1,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5	1,5
Anfetaminas	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7
Heroína	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7
GHB	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6	0,4	0,7
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.231.

Prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, esteroides anabolizantes y heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Éxtasis	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	1,8	2,2
Alucinógenos	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,1	0,9	1,3
Inhalables volátiles	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	0,9	2,1
Setas mágicas	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9	1,2	1,1	1,1
Metanfetamina	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,5	1,0	1,4	1,0	1,1
Anfetaminas	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	0,8	1,3
Heroína	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5
GHB	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3	0,5
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.232.

Prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, esteroides anabolizantes y heroína en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Éxtasis	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7	0,6	0,9
Alucinógenos	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5
Inhalables volátiles	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3	0,3	0,2	1,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,4	0,3	0,5	0,2	0,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6
Anfetaminas	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7
Heroína	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4
GHB	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.233.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.234.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2019-2023.

	2019	2021	2023
Cocaína	1,1	0,9	1,1
Anfetaminas	0,7	0,7	0,8
Metilfenidato	0,9	0,8	0,7
Piracetam, Aniracetam	0,5	0,5	0,6
Elvanse, Adderall	0,4	0,4	0,4
Donepezilo	0,3	0,3	0,3
Modafinilo	0,2	0,3	0,3
Durvitan	0,3	0,3	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.235.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido estas sustancias alguna vez en la vida (%). España, 2019-2023.

	2019	2021	2023
Cocaína	25,0	22,2	23,4
Anfetaminas	16,6	17,8	18,9
Metilfenidato	20,7	17,2	15,3
Piracetam, Aniracetam	10,6	13,6	13,9
Elvanse, Adderall	9,5	8,1	8,7
Donepezilo	5,9	7,5	6,9
Modafinilo	5,5	6,2	6,7
Durvitan	6,2	7,3	6,2
Total Casos	100,0	100,0	100,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.236.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2019-2023.

	2019	2021	2023
A través de un familiar/amigo/conocido	2,1	2,2	2,4
En la farmacia sin receta médica	1,4	1,4	1,6
A través de un vendedor (camello)	1,2	1,2	1,3
A través de internet	0,3	0,2	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.237.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de 14 a 18 años que han consumido dichas sustancias (%). España, 2019-2023.

	2019	2021	2023
A través de un familiar/amigo/conocido	41,3	44,3	41,2
En la farmacia sin receta médica	27,1	27,6	28,7
A través de un vendedor (camello)	25,0	23,2	23,0
A través de internet	6,6	4,9	7,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.238.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales*, borracheras, tabaco y consumo problemático de cannabis en los últimos 12 meses y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida y entre el total de los estudiantes de 14 a 18 años (%). España, 2023.

	Sust. psicoactivas legales		Binge drinking		Sust. psicoactivas ilegales	
	últimos 12 meses	Borracheras últimos 12 meses	últimos 30 días	Tabaco últimos 12 meses	últimos 12 meses	Consumo problemático cannabis (CAST≥4)
Total estudiantes 14-18 años	74,3	41,5	28,2	27,7	28,6	2,4
Estudiantes que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio	92,1	65,3	54,5	60,2	66,0	14,7

* Sustancias psicoactivas legales: Alcohol y tabaco. Sustancias psicoactivas ilegales: Hipnosedantes sin receta, cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.239.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2023.


	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Nuevas sustancias	-	-	4,0	4,5	2,4	2,0	3,7
Ketamina	1,1	1,1	0,7	0,6	0,6	0,7	1,0
Spice	1,1	1,4	0,8	0,9	0,8	0,6	0,9
Mefedrona	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5
Salvia divinorum	-	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,5
Ayahuasca	-	-	-	-	0,4	0,4	0,6
Óxido nitroso	-	-	-	-	-	-	1,5
Cloretilo	-	-	-	-	-	-	1,2

Nuevas sustancias psicoactivas (NSP): Son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miao miao, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.240.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2014-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.241.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2023.



	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Ketamina	1,1	1,1	0,7	0,6	0,6	0,7	1,0
Spice (cannabinoides sintéticos)	1,1	1,4	0,8	0,9	0,6	0,6	0,9
Ayahuasca	-	-	-	-	0,4	0,4	0,6
Mefedrona (catinonas sintéticas)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,8	0,3	0,5
Salvia divinorum	-	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,5
Óxido nítrico	-	-	-	-	-	-	1,5
Cloretilo	-	-	-	-	-	-	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.242.

Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 2014-2023.

	2014			2016			2019			2021			2023		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
NUNCA han oído hablar de nuevas sustancias	53,7	55,8	51,8	46,3	46,9	45,8	54,4	53,6	55,0	53,7	54,1	53,3	44,1	47,0	41,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Nuevas sustancias psicoactivas (NSP): Son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miao miao, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.243.

Forma de obtención de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2023.

	2014	2016	2019	2021	2023
Me la ofreció un amigo	55,0	53,7	54,8	43,0	52,7
A través de un vendedor (camello)	45,0	34,5	46,7	44,6	44,1
Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar	23,1	27,3	29,4	23,3	32,7
A través de internet	6,2	5,3	12,1	11,9	12,4
Las compré en una tienda especializada (smart shop o head shop)	8,0	6,4	9,1	12,8	12,6
Otros sitios	15,9	5,8	5,9	6,7	11,4

Nuevas sustancias psicoactivas (NSP): Son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miao miao, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

Nota: Entre aquellos que han consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses y eliminando los casos que NS/NC.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.244.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (%). España, 2023.

Total	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
66,9	61,9	71,0	70,1	66,7	65,9	66,8	67,1	64,1

* Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente

Nuevas sustancias psicoactivas (NSP): Son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miao miao, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.245.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023.

	NSP alguna vez en la vida
Antes de las 12 de la noche	1,6
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	1,8
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	2,9
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	4,1
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	3,4
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	6,3
Después de las 8 de la mañana	15,3

Nuevas sustancias psicoactivas (NSP): Son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.246.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.

	NSP alguna vez en la vida
Nunca	0,7
Menos de una noche al mes	1,8
De 1 a 3 noches al mes	2,2
1 noche a la semana	3,0
2 noches a la semana	4,4
3-4 noches a la semana	7,9
Más de 4 noches a la semana	9,8

Nuevas sustancias psicoactivas (NSP): Son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.247.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas* entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2023.

	2016	2019	2021	2023
Ninguna sustancia	3,6	3,9	1,7	2,4
Una sola sustancia	8,5	5,0	3,7	6,0
Dos sustancias	8,5	5,4	6,7	6,8
Tres sustancias	32,6	22,4	18,2	17,7
Cuatro o más sustancias	46,9	63,4	69,7	67,1


* Alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína en polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

Nuevas sustancias psicoactivas (NSP): Son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.248.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales* alguna vez en la vida en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.249.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2014-2023.

	2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Ketamina alguna vez en la vida	0,9	0,5	0,7	0,4	0,9	0,4	0,9	0,4	1,3	0,6
Spice alguna vez en la vida	1,1	0,6	1,2	0,6	1,1	0,6	0,8	0,5	1,1	0,7
Ayahuasca alguna vez en la vida	-	-	-	-	0,6	0,2	0,6	0,1	0,8	0,3
Mefedrona alguna vez en la vida	0,7	0,2	0,6	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,7	0,3
Salvia alguna vez en la vida	1,0	0,4	0,6	0,5	0,6	0,2	0,4	0,1	0,7	0,2
Óxido nitroso alguna vez en la vida	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,1
Cloretilo alguna vez en la vida	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,9

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.250.


Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	Alguna vez vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0	21,6	26,3	41,6	19,9	23,3	38,9
Una sola sustancia	32,9	36,7	39,2	31,5	35,7	32,5	32,0	36,1	31,5	36,5	40,4	35,4
Dos sustancias	19,4	18,1	16,3	18,8	17,7	15,5	18,2	16,8	14,6	18,3	16,7	13,9
Tres sustancias	19,5	17,5	12,3	20,9	18,2	12,6	17,8	14,5	10,0	15,4	12,7	9,0
Cuatro o más sustancias	9,3	6,0	2,2	10,5	6,9	2,4	10,3	6,4	2,3	9,9	7,0	2,9

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
 FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.251.


Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2023.



* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
 FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.252.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2023.



* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.253.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Ninguna sustancia	22,5	17,4	26,1	20,4	41,9	35,8
Una sola sustancia	38,5	34,6	41,6	39,1	34,7	36,1
Dos sustancias	16,2	20,4	14,1	19,2	12,3	15,5
Tres sustancias	14,2	16,5	11,7	13,7	8,3	9,7
Cuatro o más sustancias	8,6	11,2	6,4	7,6	2,9	2,9

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.254.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2023.


	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Ninguna sustancia	40,9	28,5	18,0	13,1	10,8	24,2
Una sola sustancia	39,2	40,7	42,6	39,9	35,0	40,7
Dos sustancias	11,5	15,5	17,8	19,3	21,4	16,3
Tres sustancias	5,3	10,0	14,1	18,1	19,3	12,2
Cuatro o más sustancias	3,1	5,2	7,5	9,6	13,6	6,5

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.255.

Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad y sexo (%). España, 2023.




* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.256.

Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad y sexo (%). España, 2023.



* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.257.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* sin incluir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	Alguna	Últimos	Últimos									
	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días
Sólo alcohol	29,3	34,1	36,3	28,3	33,3	28,8	28,2	33,1	27,1	32,8	37,5	31,4
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0	21,6	26,2	41,6	19,9	23,2	38,8
Una sola sustancia	22,5	20,4	18,8	21,5	19,8	18,2	21,5	19,4	18,2	21,6	19,3	17,2
Dos sustancias	19,9	17,8	12,8	21,4	18,5	13,5	18,2	14,8	10,7	15,7	13,0	9,6
Tres sustancias	6,4	4,2	1,6	7,3	4,7	1,8	6,9	4,2	1,7	6,1	4,3	2,0
Cuatro sustancias o más	3,0	1,9	0,6	3,2	2,2	0,7	3,6	2,2	0,6	3,8	2,7	1,0

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.258.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* sin incluir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	Alguna	Últimos	Últimos									
	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días
Sólo tabaco	0,7	0,7	1,2	0,6	0,5	1,4	0,7	0,5	1,5	0,5	0,4	0,9
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0	21,6	26,2	41,5	19,9	23,2	38,8
Una sola sustancia	42,2	46,7	49,2	41,1	45,3	41,5	41,3	45,4	40,2	44,9	48,3	42,9
Dos sustancias	27,8	24,3	17,2	28,5	25,0	17,3	25,4	20,9	14,2	23,7	20,2	14,0
Tres sustancias	7,4	4,7	1,8	8,2	5,3	2,2	7,4	4,7	1,9	7,1	5,0	2,3
Cuatro sustancias o más	3,0	1,9	0,7	3,3	2,4	0,7	3,7	2,3	0,7	4,0	2,9	1,1

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.259.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* sin incluir ni alcohol ni tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	Alguna	Últimos	Últimos									
	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días
Sólo alcohol y/o tabaco	39,6	45,2	48,3	38,7	43,6	39,5	38,6	43,1	38,2	41,9	46,0	40,2
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0	21,6	26,2	41,5	19,9	23,2	38,8
Una sola sustancia	30,8	26,3	19,2	31,4	27,1	20,5	28,5	23,6	17,6	26,9	22,8	17,5
Dos sustancias	7,6	4,8	1,9	8,4	5,4	2,3	7,6	4,8	2,0	7,2	5,1	2,5
Tres sustancias	1,5	0,8	0,3	1,5	1,1	0,3	1,6	1,1	0,4	1,5	1,1	0,4
Cuatro sustancias o más	1,6	1,1	0,4	1,8	1,3	0,4	2,1	1,2	0,3	2,4	1,7	0,7

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.260.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	Alguna	Últimos	Últimos									
	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días	vez vida	12 meses	30 días
Ninguna sustancia	68,3	73,8	82,2	66,7	72,3	80,8	71,2	77,7	85,3	72,4	77,9	84,1
Una sola sustancia	27,4	23,2	16,8	28,6	24,2	18,0	24,2	19,3	13,8	22,2	18,0	13,7
Dos sustancias	2,2	1,4	0,4	2,6	1,8	0,6	2,2	1,5	0,5	2,5	2,0	1,2
Tres sustancias	0,8	0,6	0,3	0,9	0,7	0,2	1,0	0,7	0,2	1,1	0,8	0,3
Cuatro sustancias o más	1,3	1,0	0,3	1,3	0,9	0,3	1,4	0,8	0,2	1,8	1,3	0,6

* Drogas ilegales: hipnosedantes sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.261.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2023.

	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Ninguna sustancia	73,2	74,1	73,8	72,3	77,7	77,9
Una sola sustancia	22,7	22,9	23,2	24,2	19,3	18,0
Dos sustancias	1,6	1,5	1,4	1,8	1,5	2,0
Tres sustancias	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8
Cuatro o más sustancias	1,7	0,8	1,0	0,9	0,8	1,3

* Drogas ilegales: hipnosedantes sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.262.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Ninguna sustancia	71,7	73,1	77,1	78,7	83,1	85,2
Una sola sustancia	22,3	22,2	18,0	17,9	14,3	13,1
Dos sustancias	2,5	2,5	2,1	1,9	1,3	1,2
Tres sustancias	1,2	1,0	0,9	0,7	0,4	0,3
Cuatro o más sustancias	2,3	1,2	1,8	0,8	0,9	0,3

* Drogas ilegales: hipnosedantes sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.263.

Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos, cannabis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, éxtasis, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2023.

	Alcohol	Tabaco	Cigarrillos electrónicos	Cannabis	Hipnosedantes sin receta	Hipnosedantes con/sin receta	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Anfetaminas	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	36,8	58,2	28,4	8,9	17,3	2,7	1,6	3,1	1,7	1,8	3,0	0,7	2,8	0,7
Tabaco	97,7	100,0	84,4	61,3	14,3	25,8	6,2	3,5	7,0	4,1	4,3	7,2	1,6	6,4	1,6
Cigarrillos electrónicos	94,4	52,7	100,0	39,2	10,7	19,9	3,7	2,1	4,1	2,3	2,5	4,3	0,8	3,9	0,9
Cannabis	96,0	77,8	80,2	100,0	15,8	27,2	8,3	5,0	9,4	5,5	5,8	9,6	2,1	8,4	2,2
Hipnosedantes sin receta	88,2	53,4	65,2	46,3	100,0	100,0	11,7	8,4	13,3	8,7	8,8	12,7	4,1	10,2	4,5
Hipnosedantes con o sin receta	86,1	48,2	60,8	39,8	50,7	100,0	7,4	4,8	8,4	5,6	5,8	8,5	2,4	7,1	2,7
Cocaína en polvo	96,6	83,7	81,6	87,9	42,7	54,0	100,0	45,5	100,0	40,7	34,4	54,7	20,3	35,2	18,4
Cocaína base	96,6	81,3	81,8	90,5	52,9	61,5	78,4	100,0	100,0	48,5	44,8	57,1	29,8	40,0	27,1
Cocaína polvo y/o base	96,4	82,5	81,1	87,5	42,6	53,7	89,2	52,1	100,0	38,1	32,5	51,0	18,5	33,0	17,6
Anfetaminas/speed	96,0	88,5	81,5	93,6	51,2	65,2	63,9	44,9	67,5	100,0	49,6	72,1	27,1	44,1	27,1
Alucinógenos	97,8	87,4	83,4	92,5	49,3	64,0	51,2	38,2	54,7	46,7	100,0	62,5	24,1	42,9	23,1
Éxtasis	98,2	90,2	85,2	93,3	43,2	56,9	48,6	29,8	51,7	41,0	38,0	100,0	16,6	39,3	16,9
Heroína	95,0	81,4	73,8	87,6	59,6	70,1	78,5	66,4	80,7	66,5	63,6	71,4	100,0	52,5	50,6
Inhalables volátiles	97,4	83,1	81,4	85,1	35,6	49,2	33,2	21,9	35,5	26,4	27,7	41,5	13,1	100,0	16,2
GHB	95,2	81,8	78,9	88,5	63,6	74,9	71,8	62,3	77,2	65,8	61,4	73,2	51,4	65,6	100,0

Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.264.

Prevalencia de consumo de una, dos, tres o cuatro o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2023.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Alcohol	42,6	23,7	20,5	13,3
Tabaco	1,0	22,9	44,2	31,9
Cannabis	2,3	10,7	46,7	40,2
Hipnosedantes sin receta	8,6	26,0	17,3	48,1
Hipnosedantes con o sin receta	10,7	29,8	17,8	41,7
Cocaína en polvo	0,5	1,3	3,2	95,0
Cocaína base	0,8	1,1	2,1	96,0
Cocaína polvo y/o base	0,9	1,7	3,7	93,7
Éxtasis	0,0	1,1	1,0	97,9
Anfetaminas	0,1	1,2	2,5	96,2
Alucinógenos	0,0	0,8	2,0	97,1
Heroína	0,4	3,6	0,4	95,7
Inhalables volátiles	0,3	4,8	5,7	89,1
GHB	1,8	0,3	0,5	97,4

* Drogas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.265.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2023.

	Ha hecho binge drinking	No ha hecho binge drinking
Consumo de cannabis	35,9	7,3
Consumo de cocaína polvo y/o base	2,6	0,3
Consumo de éxtasis	2,5	0,2
Consumo de anfetaminas	1,8	0,1
Consumo de alucinógenos	1,4	0,2
Consumo de heroína	0,9	0,1
Consumo de inhalables volátiles	2,7	0,3
Consumo de GHB	0,9	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.266.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2023.

	Se ha emborrachado	No se ha emborrachado
Consumo de cannabis	40,2	9,0
Consumo de cocaína polvo y/o base	3,1	0,4
Consumo de éxtasis	3,3	0,2
Consumo de anfetaminas	2,3	0,2
Consumo de alucinógenos	1,7	0,2
Consumo de heroína	1,2	0,1
Consumo de inhalables volátiles	3,2	0,4
Consumo de GHB	1,0	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.267.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2023.

	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	24,9	22,9	19,6	17,3	15,2	17,5	13,7	11,6
Sexo								
Hombres	28,0	24,8	22,7	19,5	16,5	18,8	14,4	12,0
Mujeres	21,8	21,0	16,5	15,2	13,9	16,3	13,0	11,1
Edad								
14 años	11,4	9,1	6,8	6,3	5,0	6,5	4,4	4,1
15 años	21,0	17,3	12,9	12,5	12,4	13,8	9,3	7,9
16 años	27,3	26,2	19,6	20,7	17,1	20,1	16,1	12,9
17 años	33,2	33,4	25,8	25,5	24,1	24,7	20,1	17,4
18 años	38,1	35,9	29,7	25,8	27,9	25,9	23,4	20,3
14-17 años	-	-	-	-	14,3	17,0	12,9	10,9

* Consumo de alcohol y cannabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.268.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2023.

	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	4,1	3,0	1,6	1,2	1,2	1,2	0,9	1,1
Sexo								
Hombres	5,1	3,7	2,2	1,5	1,6	1,5	1,2	1,5
Mujeres	3,1	2,3	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7
Edad								
14 años	2,6	1,8	0,5	0,7	0,5	0,4	0,3	0,7
15 años	3,4	2,0	0,8	1,0	0,9	0,8	0,6	0,8
16 años	4,0	2,7	1,4	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
17 años	4,9	4,4	1,9	1,4	1,5	1,7	1,1	1,4
18 años	8,1	6,1	3,5	2,1	4,2	2,6	2,4	2,4
14-17 años	-	-	-	-	1,0	1,1	0,8	1,0

* Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.269.

Prevalencia de personas que refieren consumo de tabaco y consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2012-2023.

	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	20,9	19,7	21,5	22,5	18,1	16,7
Sexo						
Hombres	22,2	20,7	22,1	22,3	17,7	16,2
Mujeres	19,5	18,7	20,9	22,6	18,6	17,2
Edad						
14 años	8,1	8,5	8,8	10,4	7,6	6,7
15 años	15,4	14,9	19,1	18,2	13,3	12,6
16 años	20,6	23,1	23,8	25,8	20,5	18,7
17 años	26,5	27,4	30,7	30,2	25,1	23,8
14-17 años	-	-	20,2	21,9	17,2	15,9
18 años	30,7	29,9	39,1	31,7	29,9	27,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.270.


Prevalencia de personas que refieren consumo de tabaco diario y consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2012-2023.

	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	6,8	5,9	6,1	6,6	5,5	5,1
Sexo						
Hombres	7,1	6,3	6,5	6,7	5,5	5,0
Mujeres	6,4	5,4	5,7	6,5	5,5	5,2
Edad						
14 años	1,5	1,5	1,7	1,9	1,5	1,6
15 años	4,0	3,7	5,0	4,4	3,1	2,9
16 años	6,2	7,2	6,9	7,9	6,0	5,8
17 años	9,1	8,6	9,2	9,8	8,7	7,7
14-17 años	-	-	5,6	6,3	5,0	4,7
18 años	12,0	11,6	13,3	11,1	11,6	10,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.271.


Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2004-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.272.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2000-2023.




	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
— Heroína	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4	97,3	97,0	96,2
— Cocaína en polvo	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9	96,4	97,1	96,8	96,0
— Éxtasis	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9	96,2	96,9	96,7	95,9
— Tabaco (un paquete diario)	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8	93,8	93,9	93,4
— Hipnosedantes	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6	87,7	90,7	88,6	88,4
— Cannabis	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7	87,5	88,7	92,7
— Tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3	56,1	60,3	56,9	63,4
— Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8	52,9	57,6	57,7	63,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.273.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de cannabis y tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Cannabis habitualmente	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7	87,5	88,7	92,7
Tabaco (un paquete diario)	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8	93,8	93,9	93,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.274.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Fumar un paquete de tabaco diario	75,1	79,5	76,7	80,8	78,2	82,3	84,9	89,3	86,5	91,0	88,9	91,7	89,6	93,1	88,1	91,1	91,0	92,7	93,1	94,4	92,6	95,1	91,8	95,0
Tomarse 5 o 6 cañas/copasen fin de semana	41,5	48,3	41,1	48,1	36,8	45,7	48,7	53,6	45,1	49,2	44,2	49,5	44,7	50,3	52,6	57,7	55,7	56,5	59,4	61,1	57,3	56,4	62,7	64,1
Tomarse 1 o 2 cañas/copas a diario	39,4	48,4	38,7	47,9	36,8	45,7	52,3	61,9	52,7	62,9	56,7	62,6	55,1	64,1	53,3	62,0	48,7	56,9	53,7	61,0	54,6	60,8	59,6	67,4
Fumar cannabis habitualmente	79,4	86,1	77,5	85,4	81,1	86,2	85,7	91,7	84,5	91,8	85,5	91,6	84,3	91,7	85,4	91,9	88,0	93,2	83,7	90,9	85,4	91,9	90,3	95,1
Tomar hipnosedantes habitualmente	86,9	87,9	88,3	89,1	89,8	89,6	86,1	88,6	84,6	88,4	83,8	87,0	88,7	90,3	88,3	89,0	87,2	88,1	89,7	91,6	87,8	89,4	87,0	89,7
Consumir éxtasis habitualmente	95,0	95,9	96,4	97,1	97,1	97,3	95,8	98,0	94,1	97,8	94,6	97,1	95,2	97,8	95,9	97,8	95,5	97,0	95,8	97,9	95,5	97,8	94,6	97,2
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,3	97,5	96,9	97,8	97,5	98,1	95,6	97,9	94,0	97,8	95,0	97,3	95,4	97,9	96,0	97,7	95,7	97,1	96,3	97,8	95,9	97,7	94,8	97,2
Consumir heroína habitualmente	97,6	98,8	98,4	98,8	98,5	99,1	95,8	98,1	94,3	98,0	95,0	97,5	95,7	98,0	96,4	98,4	95,6	97,1	96,3	98,1	95,9	98,0	94,9	97,3

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.275.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Fumar un paquete de tabaco diario	93,4	91,8	95,0	92,4	93,2	93,6	94,4	92,8	93,5
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	79,0	77,3	80,7	80,6	79,8	78,5	78,8	75,7	79,3
Tomarse 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	63,4	62,7	64,1	69,9	66,0	61,3	59,1	60,8	63,6
Tomarse 1 o 2 cañas/copas cada día	63,6	59,6	67,4	62,9	64,1	64,1	62,9	64,2	63,6
Tomar hipnosedantes habitualmente	88,4	87,0	89,7	86,4	88,2	88,6	89,7	88,8	88,4
Fumar cannabis habitualmente	92,7	90,3	95,1	94,2	93,5	92,5	92,3	89,1	93,0
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,0	94,8	97,2	95,6	95,9	96,0	96,7	95,5	96,1
Consumir éxtasis habitualmente	95,9	94,6	97,2	95,2	95,9	96,1	96,5	95,1	96,0
Consumir heroína habitualmente	96,2	94,9	97,3	95,6	96,1	96,2	96,8	95,4	96,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.276.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal* (%). España, 2023.

	Han consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	No han consumido ninguna droga ilegal en los últimos 12 meses
Fumar un paquete de tabaco diario	90,6	94,3
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	66,3	82,9
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	53,4	66,4
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	58,4	65,2
Tomar hipnosedantes habitualmente	87,8	88,7
Fumar cannabis habitualmente	84,3	95,3
Consumir cocaína en polvo habitualmente	95,2	96,3
Consumir éxtasis habitualmente	95,1	96,2
Consumir heroína habitualmente	95,6	96,3

* Alguna droga ilegal: No incluye ni tabaco, ni alcohol. Incluye: hipnosedantes sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHBe e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.277.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de hipnosedantes* (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido hipnosedantes* con o sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2019-2023.

	2019		2021		2023	
	Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses		Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses		Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
Tomar hipnosedantes(con o sin receta) habitualmente puede causar problemas	82,0	92,0	79,4	90,3	81,1	89,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.278.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2023.

	Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días		Consumo de alcohol en los últimos 30 días	
	SÍ	NO	SÍ	NO
	Fumar un paquete de tabaco diario	86,4	94,1	-
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	44,5	82,0	-	-
Fumar cigarrillos electrónicos	34,7	39,1	-	-
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	-	-	47,9	64,5
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	-	-	45,5	64,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.279.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2006-2023.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Fumar cannabis alguna vez	70,2	54,8	50,4	52,6	54,9	54,1	51,9	52,2	64,0
Fumar cigarrillos electrónicos	–	–	–	–	–	34,2	18,3	22,4	38,8
Consumir cocaína en polvo alguna vez	90,8	81,4	79,6	81,4	86,1	78,1	81,3	79,2	82,0
Consumir cocaína base alguna vez	90,5	86,0	82,3	83,3	85,6	82,8	84,8	83,0	84,5
Consumir éxtasis alguna vez	91,3	85,0	82,6	84,9	87,1	80,3	83,7	81,0	83,0
Consumir anfetaminas alguna vez	91,0	85,1	82,6	84,9	87,3	80,4	84,7	82,4	84,1
Consumir alucinógenos alguna vez	90,3	84,8	80,5	82,6	86,5	80,3	82,1	79,4	83,1
Consumir heroína alguna vez	92,0	86,8	84,9	87,2	88,7	82,3	86,8	85,0	86,1
Inyectarse drogas alguna vez	92,9	88,9	87,7	90,7	94,0	88,7	89,6	88,5	89,1
Consumir GHB alguna vez	91,9	86,1	83,7	85,8	87,8	88,1	88,1	85,9	–
Consumir metanfetamina alguna vez	–	–	–	–	–	85,9	87,0	84,8	86,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.280.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Fumar cannabis alguna vez	64,0	62,6	65,4	72,3	67,5	62,0	59,0	56,1	64,6
Fumar cigarrillos electrónicos	38,8	40,1	37,5	39,6	38,9	37,5	38,9	40,6	38,6
Consumir cocaína en polvo alguna vez	82,0	81,5	82,4	80,3	81,9	81,5	84,2	81,2	82,1
Consumir cocaína base alguna vez	84,5	84,1	84,9	82,0	83,9	84,4	86,8	85,2	84,4
Consumir éxtasis alguna vez	83,0	82,0	84,0	81,4	83,1	82,8	84,6	82,6	83,1
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	84,1	83,2	84,9	82,1	83,9	84,1	85,7	84,1	84,1
Consumir alucinógenos alguna vez	83,1	81,9	84,2	82,2	83,2	83,3	83,5	82,6	83,1
Consumir heroína alguna vez	86,1	85,2	86,9	83,3	85,5	86,0	88,4	87,2	86,0
Inyectarse drogas alguna vez	89,1	88,2	90,1	87,2	88,6	88,9	91,1	90,2	89,1
Consumir metanfetamina alguna vez	86,2	85,2	87,1	83,6	85,6	86,2	88,2	87,3	86,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.281.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal* (%). España, 2023.

	Han consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	No han consumido ninguna droga ilegal en los últimos 12 meses
Fumar cannabis alguna vez	39,3	71,8
Fumar cigarrillos electrónicos	35,1	39,9
Consumir cocaína en polvo alguna vez	78,2	83,1
Consumir cocaína base alguna vez	83,0	84,9
Consumir éxtasis alguna vez	78,3	84,5
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	80,7	85,1
Consumir alucinógenos alguna vez	78,2	84,5
Consumir heroína alguna vez	85,4	86,3
Inyectarse drogas alguna vez	88,3	89,4
Consumir metanfetamina alguna vez	84,3	86,7

* Alguna droga ilegal: No incluye ni tabaco, ni alcohol. Incluye: hipnosedantes sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHBe e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.282.


Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.283.

Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4	93,0	94,9	93,9	92,9
Tabaco	-	-	-	91,7	90,9	93,6	92,8	90,8	91,4	93,1	91,6	89,1
Cannabis	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3	65,9	68,1	61,1	56,9
Hipnosedantes	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3	49,1	47,5	47,4	46,7	43,4
Cocaína polvo	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8	28,9	32,3	32,8	26,8	28,8
Cocaína base	-	-	-	36,1	31,8	37,0	33,4	29,5	22,9	21,8	17,4	19,9
Anfetaminas	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7	24,2	23,4	22,8	19,1	21,4
Alucinógenos	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9	26,2	22,8	24,1	19,9	22,1
Éxtasis	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2	21,8	21,8	21,0	19,6	21,9
Heroína	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2	20,2	16,3	19,8
GHB	-	-	-	-	25,5	22,4	25,8	22,3	18,7	14,2	12,6	10,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	18,5	15,9	19,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.284.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2023.

	2016					2019					2021					2023				
	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	13,8	1,3	0,5	0,6	1,0	15,8	1,4	0,6	0,7	1,2	13,3	1,3	0,6	1,0	0,9	10,9	1,3	0,6	1,0	0,8
A través de un vendedor (camello)	10,8	1,4	0,8	0,8	1,0	12,6	1,5	0,8	0,9	1,1	10,5	1,5	0,8	1,1	0,8	7,9	1,2	0,6	1,0	0,8
En una zona de ocio (festival, concierto...)	3,1	0,6	0,3	0,4	0,5	4,1	0,7	0,5	0,5	0,5	2,7	0,6	0,3	0,4	0,4	2,3	0,6	0,4	0,5	0,4
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9	0,2	0,2	0,2	0,4	1,7	0,2	0,1	0,2	0,2	1,7	0,3	0,2	0,2	0,3
A través de internet	0,6	0,2	0,3	0,2	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	0,2	0,3	0,2	0,3	0,7	0,3	0,3	0,2	0,4
A través de una plantación propia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-
A través de un club cannábico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.285.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2016-2023.

	2016					2019					2021					2023				
	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	74,4	54,8	41,1	41,5	51,6	47,0	33,9	20,3	21,2	39,0	45,1	30,5	22,9	25,2	44,0	38,9	31,3	22,4	26,7	32,6
A través de un vendedor (camello)	58,2	59,1	59,1	61,6	56,1	37,7	33,9	28,1	23,2	32,1	35,7	35,1	31,6	27,7	35,2	28,8	30,9	22,2	25,4	26,2
En una zona de ocio (festival, concierto...)	16,6	22,8	24,3	25,5	19,6	12,1	16,5	12,7	11,9	14,4	9,1	14,1	11,2	10,5	13,7	8,1	14,2	13,2	12,9	13,9
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	6,7	7,6	15,8	6,2	10,7	5,4	4,0	6,1	4,9	10,3	5,6	3,7	3,6	3,0	7,4	5,8	5,4	6,2	4,2	10,7
A través de internet	2,6	7,9	14,1	10,7	10,2	1,9	4,1	6,1	5,5	8,5	2,1	4,3	8,4	3,7	9,7	2,1	4,9	8,9	3,3	11,0
A través de una plantación propia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-
A través de un club cannábico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.286.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Bebidas alcohólicas	92,9	92,2	93,6	85,8	91,1	94,6	96,6	96,5	92,6
Tabaco	89,1	88,6	89,6	79,4	86,7	90,9	94,2	95,2	88,6
Cannabis	56,9	60,0	54,0	34,1	50,2	61,8	69,4	73,5	55,6
Hipnosedantes	43,4	43,6	43,2	32,4	37,2	45,6	51,9	55,7	42,5
Cocaína en polvo	28,8	31,6	26,2	17,9	24,1	30,9	35,5	43,4	27,7
Alucinógenos	22,1	25,6	18,9	14,3	18,7	23,5	26,7	33,9	21,2
Anfetaminas o speed	21,4	24,8	18,2	13,9	17,6	22,7	26,2	33,2	20,5
Cocaína base	19,9	23,4	16,7	13,1	16,8	21,9	23,7	29,1	19,2
Éxtasis	21,9	25,2	18,9	13,1	18,4	23,6	27,0	33,9	21,0
Heroína	19,8	22,5	17,3	14,7	18,3	21,6	21,3	26,6	19,2
Metanfetamina	19,0	22,2	15,9	12,9	16,9	20,6	21,8	26,8	18,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.287.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil*) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2014-2023.

	2014		2016		2019		2021		2023	
	Fácil/muy fácil	Ns/Nc								
Bebidas alcohólicas	79,3	13,3	74,6	19,8	81,6	13,9	79,8	15,0	77,7	16,3
Tabaco	78,3	13,7	72,0	21,3	79,0	15,1	76,5	16,5	73,3	17,7
Cannabis	46,0	30,6	40,6	38,3	47,0	31,0	41,5	32,1	39,8	30,2
Hipnosedantes	27,7	43,5	21,2	55,3	23,9	49,7	24,7	47,1	25,7	40,9
Cocaína en polvo	15,8	45,2	15,5	52,0	17,8	45,7	15,2	43,3	18,0	37,3
Cocaína base	16,6	43,8	10,2	55,7	10,8	50,5	9,2	47,0	11,9	40,2
Anfetaminas o speed	12,5	48,1	10,0	57,1	11,0	51,8	9,8	48,5	12,6	40,9
Alucinógenos	13,7	47,6	9,8	57,3	11,7	51,6	10,3	48,0	13,1	40,7
Éxtasis	11,3	48,2	9,4	56,7	10,2	51,5	10,3	47,6	13,0	40,4
Heroína	11,2	47,8	9,2	56,7	9,9	51,2	8,5	47,6	11,8	40,2
Metanfetamina	-	-	7,6	58,8	8,6	53,3	8,0	49,5	11,1	41,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.288.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y edad (%). España, 2023.

		Te sientes suficientemente informado con respecto al tema de las drogas			
		Sí, perfectamente	Sí, lo suficiente	Sólo a medias	No, estoy mal informado
	Total	29,6	41,4	21,1	7,9
	Hombres	33,0	39,9	17,8	9,2
	Mujeres	26,2	42,9	24,4	6,5
14 años	Total	27,5	41,3	22,4	8,7
	Hombres	28,7	39,1	20,5	11,7
	Mujeres	26,4	43,5	24,3	5,8
15 años	Total	30,1	41,0	20,5	8,5
	Hombres	33,3	39,5	17,0	10,2
	Mujeres	26,9	42,4	23,9	6,8
16 años	Total	30,0	41,8	20,3	8,0
	Hombres	32,9	40,2	17,4	9,6
	Mujeres	26,8	43,4	23,5	6,3
17 años	Total	30,0	41,5	21,9	6,6
	Hombres	35,2	40,5	17,9	6,4
	Mujeres	24,7	42,6	26,0	6,7
18 años	Total	31,6	41,1	19,5	7,7
	Hombres	36,7	39,9	15,4	8,0
	Mujeres	26,0	42,4	24,0	7,5
14-17 años	Total	29,5	41,4	21,2	7,9
	Hombres	32,7	39,9	18,0	9,3
	Mujeres	26,2	42,9	24,4	6,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.289.


Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo (%). España, 2016-2023.

	2016		2019		2021		2023	
	Perfectamente informado	Mal informado						
Total	31,3	7,5	26,0	7,1	22,5	9,3	29,6	7,9
Hombres	37,1	7,3	32,0	7,1	26,9	9,5	33,0	9,2
Mujeres	25,5	7,6	20,4	7,2	18,0	9,1	26,2	6,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.290.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* y según sexo (%). España, 2023.




* Alguna droga ilegal: No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.291.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga legal* y según sexo (%). España, 2023.



* Alguna droga legal: tabaco, alcohol.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.292.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según sexo (%). España, 2016-2023.

		Total	Hombres	Mujeres
2016	He recibido información en el centro educativo	84,9	83,7	86,0
	He recibido información en mi familia	68,4	67,1	69,6
2019	He recibido información en el centro educativo*	81,7	79,7	83,7
	He recibido información en mi familia	68,6	68,6	68,5
2021	He recibido información en el centro educativo*	74,2	66,3	95,4
	He recibido información en mi familia	66,9	66,1	67,6
2023	He recibido información en el centro educativo*	85,4	86,6	84,4
	He recibido información en mi familia	71,5	68,8	74,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.293.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones, según sexo (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Efectos y problemas asociados a drogas legales	71,1	69,8	72,4	76,9	74,7	79,0	70,3	67,3	73,4	72,3	67,7	77,0
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales	65,7	65,8	65,6	69,4	69,8	69,2	62,1	62,2	62,1	66,8	64,2	69,5
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías	68,9	66,5	71,4	74,8	71,6	78,0	73,3	68,2	78,7	74,0	68,3	80,0
Efectos y problemas asociados al juego online, apuestas	26,9	29,4	24,4	38,8	42,3	35,5	44,4	45,5	43,3	48,4	46,8	50,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.294.

Prevalencia de consumo de sustancias legales* e ilegales** alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	Total estudiantes 14-18 años	Consumo legales alguna vez en vida	Consumo ilegales alguna vez en vida	Total estudiantes 14-18 años	Consumo legales alguna vez en vida	Consumo ilegales alguna vez en vida	Total estudiantes 14-18 años	Consumo legales alguna vez en vida	Consumo ilegales alguna vez en vida	Total estudiantes 14-18 años	Consumo legales alguna vez en vida	Consumo ilegales alguna vez en vida
Efectos y problemas asociados a drogas legales	71,1	80,2	30,9	76,9	81,6	34,2	70,3	78,1	29,0	72,3	77,3	27,2
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales	65,7	80,7	31,2	69,4	81,9	34,9	62,1	78,9	30,4	66,8	77,0	27,6
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías	68,9	79,0	28,7	74,8	80,7	32,4	73,3	77,3	27,6	74,0	76,4	26,1
Efectos y problemas asociados al juego on line, apuestas	26,9	79,3	29,8	38,8	81,3	33,2	44,4	77,7	27,8	48,4	77,1	26,5

* Sustancias psicoactivas legales: Alcohol y tabaco.

** Sustancias psicoactivas ilegales: Hipnosedantes sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.295.

Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones (%). España, 2016-2023.

		Formación sobre efectos y problemas asociados a			
		Drogas legales	Drogas ilegales	Mal uso nuevas tecnologías	Juego online y apuestas
2016	Total estudiantes 14-18 años	71,1	65,7	68,9	26,9
	Binge drinking	31,3	31,5	29,3	31,4
	Borracheras	21,5	21,7	20,5	20,6
	Botellón	52,3	52,5	50,7	49,9
	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	11,6	11,5	11,0	11,2
2019	Total estudiantes 14-18 años	76,9	69,4	74,8	38,8
	Binge drinking	32,1	32,7	30,8	32,8
	Borracheras	45,6	45,7	44,1	43,9
	Botellón	52,6	52,7	51,3	51,0
	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	14,6	15,6	14,2	14,9
2021	Total estudiantes 14-18 años	70,3	62,1	73,3	44,4
	Binge drinking	27,8	28,4	26,6	27,5
	Borracheras	40,7	41,0	39,4	38,8
	Botellón	42,0	42,4	41,0	40,7
	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	16,4	17,1	16,0	17,5
2023	Total estudiantes 14-18 años	72,3	66,8	74,0	48,4
	Binge drinking	28,0	28,3	26,9	28,2
	Borracheras	43,1	43,0	42,1	41,8
	Botellón	49,2	49,0	47,8	48,3
	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	13,5	13,9	12,6	13,9

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.296.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2023.



* Algo importante o muy importante.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.297.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” distintas medidas para resolver el problema de las drogas, según sexo y edad (%). España, 2016-2023.

		2016	2019	2021	2023
Educación en las escuelas	Total	77,1	80,2	80,3	78,3
	Hombres	74,2	76,0	75,3	73,6
	Mujeres	79,9	83,9	85,1	82,5
	14 años	77,5	80,0	80,3	77,2
	15 años	75,3	78,6	79,0	77,3
	16 años	77,1	79,7	80,5	77,3
	17 años	78,2	82,1	81,5	80,3
	14-17 años	77,1	80,1	80,3	78,1
	18 años	77,9	82,0	80,5	80,9
	Tratamiento voluntario a consumidores	Total	71,9	72,4	71,9
Hombres		67,8	66,9	66,3	66,2
Mujeres		75,7	77,2	77,2	77,5
14 años		70,2	69,2	70,9	70,6
15 años		70,7	72,3	71,4	71,5
16 años		72,3	72,2	72,8	71,4
17 años		73,8	74,0	72,7	73,7
14-17 años		71,8	72,2	72,0	71,9
18 años		73,2	75,2	70,7	74,0
Control policial y aduanero	Total	71,3	71,6	69,0	71,2
	Hombres	70,0	69,5	69,2	69,2
	Mujeres	72,5	73,4	68,8	73,1
	14 años	76,5	75,4	72,8	73,5
	15 años	71,3	72,5	71,9	72,3
	16 años	70,0	70,2	67,6	70,0
	17 años	67,9	69,6	65,8	70,6
	14-17 años	71,5	71,6	69,2	71,4
	18 años	69,3	71,2	66,5	68,7
Campañas publicitarias	Total	51,3	50,8	49,4	46,7
	Hombres	49,7	48,6	46,6	44,0
	Mujeres	52,7	52,7	52,0	49,3
	14 años	53,4	52,3	50,7	47,3
	15 años	49,9	50,3	48,2	45,4
	16 años	50,8	49,4	48,9	45,8
	17 años	49,8	50,9	50,2	47,6
	14-17 años	51,1	50,6	49,4	46,5
	18 años	53,8	54,0	49,4	50,4

1.2.297. (continuación)

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” distintas medidas para resolver el problema de las drogas, según sexo y edad (%). España, 2016-2023.

		2016	2019	2021	2023
Administración médica de metadona	Total	61,4	61,9	60,7	63,1
	Hombres	57,4	57,8	56,1	58,0
	Mujeres	65,7	66,0	65,8	68,4
	14 años	63,4	65,4	61,9	67,8
	15 años	61,5	61,7	60,8	62,9
	16 años	60,9	61,3	61,0	61,6
	17 años	59,9	60,0	60,9	61,8
	14-17 años	61,5	61,8	61,1	63,3
	18 años	60,8	62,5	56,8	61,6
	Leyes estrictas contra las drogas	Total	64,5	63,2	61,3
Hombres		64,0	61,8	62,3	61,8
Mujeres		64,9	64,4	60,3	64,5
14 años		71,9	70,8	67,1	69,0
15 años		65,8	64,2	64,7	65,0
16 años		62,8	61,0	59,4	60,7
17 años		58,6	59,6	57,2	60,6
14-17 años		64,8	63,3	61,7	63,4
18 años		60,0	60,4	56,9	60,9
Administración médica de heroína	Total	57,2	56,9	55,7	59,5
	Hombres	52,9	53,0	51,4	54,5
	Mujeres	61,8	60,8	60,4	64,7
	14 años	59,7	61,6	57,8	64,1
	15 años	58,6	57,4	57,2	59,6
	16 años	56,2	56,3	55,5	57,3
	17 años	53,4	54,1	54,4	58,3
	14-17 años	57,0	57,0	56,1	59,5
	18 años	59,8	55,4	51,4	59,6
Tratamiento obligatorio a consumidores	Total	64,7	64,8	62,4	63,1
	Hombres	61,6	61,5	60,1	59,2
	Mujeres	67,6	67,8	64,6	66,9
	14 años	68,3	67,8	66,0	66,3
	15 años	65,0	65,4	63,5	63,8
	16 años	63,4	63,8	60,3	61,1
	17 años	63,0	63,1	61,0	62,6
	14-17 años	64,9	64,8	62,4	63,2
	18 años	61,5	65,3	61,9	62,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.298.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo (%). España 2012-2023.

		2012	2014	2016	2019	2021	2023
Legalización del cannabis							
Total		37,7	40,3	36,4	34,2	28,4	30,4
Sexo	Hombres	39,3	40,9	36,7	35,7	29,1	30,5
	Mujeres	35,9	39,8	36,1	32,8	27,6	30,3
Legalización de todas las drogas							
Total		27,0	29,6	26,8	20,8	17,3	22,7
Sexo	Hombres	25,7	27,5	25,3	20,4	17,3	22,0
	Mujeres	28,4	31,8	28,4	21,3	17,2	23,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.299.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2023.


	2014	2016	2019	2021	2023
No han consumido cannabis en el último año	22,6	19,5	18,0	22,7	26,6
Han consumido cannabis en el último año (CAST<4)	45,4	34,9	39,8	45,2	43,1
Han consumido cannabis en el último año (CAST ≥4 Consumo problemático)	58,2	48,2	51,8	63,2	53,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.300.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2023.



*Alguna droga ilegal: No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.301.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2006-2023.

		2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
MADRE	Permisiva frente al consumo de tabaco	19,7	19,4	16,8	17,0	12,1	10,8	10,5	10,7	9,8
	Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas	31,4	34,7	34,8	40,7	36,3	37,3	34,0	31,7	44,3
	Permisiva frente al consumo de cannabis	-	-	-	-	-	1,6	6,2	11,4	2,0
PADRE	Permisivo frente al consumo de tabaco	16,5	16,5	14,1	15,2	10,5	10,1	13,2	17,5	9,2
	Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas	30,9	34,3	33,6	40,1	35,3	36,5	31,8	28,7	42,7
	Permisivo frente al consumo de cannabis	-	-	-	-	-	1,8	2,0	2,1	1,8
2023 según sexo y edad		H	M	14	15	16	17	18	14-17	
MADRE	Permisiva frente al consumo de tabaco	9,3	10,2	3,7	5,6	9,9	15,2	22,0	8,9	
	Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas	41,5	47,2	20,8	32,5	48,7	63,4	68,6	42,5	
	Permisiva frente al consumo de cannabis	2,4	1,6	1,0	1,5	1,8	2,9	4,5	1,8	
PADRE	Permisivo frente al consumo de tabaco	9,1	9,4	4,1	5,7	8,9	14,2	20,7	8,4	
	Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas	41,3	44,1	20,6	30,9	47,4	61,2	65,8	41,1	
	Permisivo frente al consumo de cannabis	2,3	1,4	0,8	1,0	1,8	2,8	4,8	1,6	

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.302.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de tabaco según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan. España, 2023.

		Total alumnos	Tabaco últimos 12 meses		Tabaco últimos 30 días		Cigarrillos electrónicos últimos 12 meses	
			Sí	No	Sí	No	Sí	No
			MADRE	Permisiva frente al consumo de tabaco	9,8	24,3	4,2	29,5
PADRE	Permisivo frente al consumo de tabaco	9,2	20,9	4,9	24,9	5,2	14,0	5,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.303.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han fumado en los últimos 30 días según sean sus padres permisivos frente al consumo de tabaco o no. España, 2023.

		Tabaco últimos 30 días
MADRE	No permisiva frente al consumo de tabaco	16,4
	Permisiva frente al consumo de tabaco	63,1
PADRE	No permisivo frente al consumo de tabaco	17,1
	Permisivo frente al consumo de tabaco	55,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.304.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de alcohol según el consumo de alcohol que los estudiantes tengan. España, 2023.

		Total estudiantes 14-18 años	Bebidas alcohólicas últimos 30 días		Borracheras últimos 30 días		Botellón últimos 12 meses		Binge drinking últimos 30 días		Bebidas energéticas + alcohol últimos 30 días	
			Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
			MADRE	Permisiva frente al consumo de alcohol	44,3	59,9	24,4	69,5	37,6	61,3	28,9	67,8
PADRE	Permisivo frente al consumo de alcohol	42,7	57,3	24,2	65,8	36,6	58,6	28,4	64,5	34,3	57,2	39,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.305.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que beben alcohol según sean sus padres son permisivos frente al consumo de alcohol o no. España, 2023.

		Bebidas alcohólicas últimos 30 días	Borracheras últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Binge drinking últimos 30 días
MADRE	No permisiva frente al consumo de alcohol	40,7	11,4	33,2	16,2
	Permisiva frente al consumo de alcohol	76,0	32,8	66,0	43,0
PADRE	No permisivo frente al consumo de alcohol	42,0	12,3	34,4	17,3
	Permisivo frente al consumo de alcohol	75,2	31,9	65,2	42,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.306.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de cannabis según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan. España, 2023.

		Total alumnos	Cannabis últimos 12 meses	Cannabis últimos 30 días	Consumo problemático cannabis (CAST ≥ 4)
MADRE	Permisiva frente al consumo de cannabis	2,0	6,1	7,5	21,0
PADRE	Permisivo frente al consumo de cannabis	1,8	5,7	7,3	20,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.307.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sean sus padres son permisivos frente al consumo de cannabis o no. España, 2023.

		Cannabis últimos 30 días
MADRE	No permisiva frente al consumo de cannabis	13,6
	Permisiva frente al consumo de cannabis	56,1
PADRE	No permisivo frente al consumo de cannabis	13,1
	Permisivo frente al consumo de cannabis	58,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.308.

Frecuencia de actividades de ocio realizadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo (%). España, 2021-2023.

		2021			2023		
		Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Practicar algún deporte	Nunca	9,9	6,8	13,1	11,2	6,6	16,0
	Anualmente	5,2	3,3	7,1	5,0	2,9	7,2
	Mensualmente	15,6	11,8	19,5	11,6	8,1	15,3
	Semanalmente	69,3	78,1	60,3	72,2	82,5	61,5
Leer libros por diversión	Nunca	39,5	49,7	29,1	38,7	48,4	28,9
	Anualmente	20,5	20,9	20,2	19,3	20,2	18,4
	Mensualmente	19,2	17,2	21,3	19,4	16,9	21,9
	Semanalmente	20,7	12,2	29,5	22,6	14,5	30,8
Salir con amigos por las noches	Nunca	34,4	35,4	33,3	27,2	28,5	25,9
	Anualmente	15,2	13,6	16,9	17,0	16,8	17,3
	Mensualmente	27,5	27,8	27,3	37,0	35,0	39,0
	Semanalmente	22,9	23,2	22,5	18,8	19,7	17,9
Salir con amigos por las tardes	Nunca	4,6	5,8	3,3	4,0	4,8	3,2
	Anualmente	5,3	5,8	4,8	5,0	5,4	4,5
	Mensualmente	26,8	26,2	27,4	27,1	26,6	27,6
	Semanalmente	63,3	62,2	64,4	63,9	63,2	64,7
Tener otros hobbies	Nunca	38,3	43,7	32,8	42,2	45,7	38,5
	Anualmente	9,2	8,8	9,5	9,2	8,4	9,9
	Mensualmente	16,8	14,8	18,9	15,4	13,4	17,5
	Semanalmente	35,7	32,7	38,8	33,3	32,5	34,1
Usar internet por diversión	Nunca	0,6	0,7	0,5	-	-	-
	Anualmente	0,7	0,7	0,6	-	-	-
	Mensualmente	1,7	1,9	1,5	-	-	-
	Semanalmente	97,0	96,6	97,4	-	-	-
Visitar páginas para adultos en internet	Nunca	47,0	25,2	69,3	-	-	-
	Anualmente	8,6	6,4	10,8	-	-	-
	Mensualmente	15,0	18,0	12,0	-	-	-
	Semanalmente	29,4	50,4	7,9	-	-	-
Realizar compras a través de internet	Nunca	9,9	13,8	5,8	-	-	-
	Anualmente	23,3	25,0	21,5	-	-	-
	Mensualmente	56,1	52,4	59,9	-	-	-
	Semanalmente	10,7	8,7	12,7	-	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.309.

Prevalencia de consumo de sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas (%). España, 2021-2023.

	2021				2023			
	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína*	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína*
Ha practicado algún deporte	71,1	30,4	22,1	1,9	73,7	26,6	20,9	2,1
No ha practicado ningún deporte	66,4	34,7	23,9	4,0	74,2	36,0	27,5	2,9
Ha leído libros para divertirse	66,1	25,9	18,2	1,4	69,7	22,9	17,7	1,6
No ha leído libros para divertirse	77,5	38,2	28,6	3,1	80,1	34,8	27,6	3,1
Ha salido con amigos por las noches	83,3	39,6	29,7	2,9	85,7	35,0	27,2	2,8
No ha salido con amigos por las noches	46,6	13,8	8,4	0,7	42,0	7,9	6,5	0,8
Ha salido con amigos por las tardes	72,1	31,6	23,0	2,1	75,0	28,4	22,2	2,3
No ha salido con amigos por las tardes	41,1	13,2	7,5	2,3	47,5	13,2	11,2	2,4
Tiene otros hobbies	68,1	28,0	20,5	1,6	71,4	24,3	19,5	2,0
No tiene otros hobbies	74,6	35,1	25,2	2,9	76,9	32,0	24,5	2,6
Ha usado Internet para divertirse	70,7	30,8	22,3	2,1	-	-	-	-
No ha usado Internet para divertirse	61,5	29,4	24,8	9,4	-	-	-	-
Ha visitado paginas solo para adultos	77,5	36,3	29,0	3,0	-	-	-	-
No ha visitado páginas solo para adultos	62,7	24,5	14,9	1,1	-	-	-	-
Realiza compras en internet	73,2	32,3	23,4	2,1	-	-	-	-
No realiza compras en internet	47,6	16,6	12,0	1,7	-	-	-	-

* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.310.

Prevalencia de consumo de sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas, según sexo (%). España, 2021-2023.

	2021								2023							
	Alcohol		Tabaco		Cannabis		Cocaína*		Alcohol		Tabaco		Cannabis		Cocaína*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Ha practicado algún deporte	68,4	74,1	27,3	33,8	22,7	21,5	2,5	1,2	71,5	76,2	24,3	29,3	22,1	19,6	2,8	1,4
No ha practicado ningún deporte	61,4	69,1	29,4	37,6	23,4	24,2	4,8	3,5	68,8	76,5	30,1	38,5	26,4	27,9	6,3	1,5
Ha leído libros para divertirse	61,6	69,3	21,6	29,0	18,0	18,3	1,9	1,1	65,8	72,6	18,9	25,9	18,0	17,4	2,2	1,2
No ha leído libros para divertirse	74,3	83,1	33,2	46,7	27,6	30,2	3,4	2,6	77,2	84,9	30,5	42,3	26,6	29,2	3,8	1,9
Ha salido con amigos por las noches	81,6	85,0	36,1	43,1	31,1	28,3	3,7	2,1	83,9	87,4	31,9	38,1	28,6	26,0	3,9	1,7
No ha salido con amigos por las noches	43,3	50,1	11,4	16,4	7,8	9,0	0,9	0,5	40,0	44,2	6,6	9,4	6,8	6,2	0,9	0,6
Ha salido con amigos por las tardes	69,7	74,4	28,3	34,9	23,8	22,3	2,7	1,5	72,8	77,2	25,5	31,3	23,1	21,3	3,1	1,5
No ha salido con amigos por las tardes	40,3	42,5	11,4	16,3	7,2	8,0	1,9	3,0	46,7	48,7	10,8	16,9	10,6	12,0	2,7	2,1
Tiene otros hobbies	66,0	69,9	26,1	29,6	22,1	19,1	2,2	1,1	70,3	72,3	22,5	25,9	20,8	18,3	2,8	1,3
No tiene otros hobbies	70,4	80,4	28,9	43,5	23,6	27,3	3,1	2,6	72,6	82,0	27,1	37,9	24,1	25,0	3,3	1,7
Ha usado Internet para divertirse	68,1	73,5	27,3	34,2	22,8	21,8	2,6	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha usado Internet para divertirse	59,3	64,4	29,2	29,6	19,5	31,5	9,1	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Ha visitado paginas solo para adultos	75,3	83,0	32,1	46,4	27,3	33,1	3,2	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha visitado páginas solo para adultos	45,7	69,0	13,2	28,7	9,5	16,8	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Realiza compras en internet	71,5	74,7	29,2	35,1	24,5	22,4	2,8	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
No realiza compras en internet	45,7	52,1	15,5	19,2	11,9	12,3	1,5	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-

* Cocaína polvo y/o base. H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.311.

Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2021-2023.

	2021				2023			
	Notas saca habitualmente				Notas saca habitualmente			
	Sobresaliente Notable	Bien Aprobado	Suspense	Ha repetido curso alguna vez Sí	Sobresaliente Notable	Bien Aprobado	Suspense	Ha repetido curso alguna vez Sí
TOTAL ALUMNOS	50,1	43,3	6,6	20,9	49,8	43,9	6,4	19,7
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	45,8	46,3	7,9	25,0	44,7	47,4	7,9	24,0
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	55,0	39,9	5,1	15,8	56,4	39,2	4,4	14,2
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	45,3	46,2	8,5	25,1	42,8	48,1	9,1	26,3
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	52,1	42,1	5,8	18,9	51,8	42,6	5,6	17,8
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	42,7	48,5	8,8	27,5	39,5	50,9	9,5	28,7
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	53,1	41,2	5,7	18,1	54,0	40,9	5,1	16,0
Ha hecho botellón en el último año	47,2	45,0	7,7	21,4	46,7	46,1	7,2	21,7
No ha hecho botellón en el último año	52,3	42,1	5,7	20,2	52,9	41,7	5,4	17,5
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	28,4	56,7	14,9	45,7	29,2	55,4	15,4	46,0
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	52,4	41,9	5,7	18,3	51,4	42,9	5,6	17,6
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	35,2	53,5	11,3	33,8	33,9	53,4	12,7	34,4
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	52,9	41,3	5,7	18,3	52,9	42,0	5,2	16,9
Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	22,5	62,7	14,8	51,0	24,8	53,1	22,1	54,6
Consumo no problemático de cannabis (CAST $<$ 4)	50,9	42,8	6,3	19,9	50,4	43,6	6,0	18,9
Ha consumido cocaína en los últimos 30 días	24,7	57,5	17,8	52,8	34,8	50,4	14,7	46,3
No ha consumido cocaína en los últimos 30 días	50,5	43,1	6,4	20,3	50,2	43,7	6,2	19,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.312.

Prevalencia de experimentar ciertas situaciones entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2021-2023.

	2021			2023		
	Faltar a clase	Concentrarse	Expulsado	Faltar a clase	Concentrarse	Expulsado
TOTAL ALUMNOS	21,4	17,2	5,9	25,5	18,2	6,9
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	30,5	25,6	7,9	34,1	26,0	9,0
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	10,9	7,6	3,5	14,4	8,0	4,3
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	39,3	34,5	9,3	43,9	35,5	11,3
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	15,6	11,7	4,5	20,5	13,5	5,7
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	37,5	32,7	9,7	41,0	33,0	11,4
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	15,0	11,2	4,4	19,1	12,2	5,0
Ha hecho botellón en los últimos 30 días	38,4	35,4	10,5	41,2	33,7	11,3
No ha hecho botellón en los últimos 30 días	17,3	12,8	4,7	21,5	14,3	5,7
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	53,2	38,2	18,4	58,4	41,1	21,8
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	18,2	15,1	4,6	22,8	16,3	5,7
Ha consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	33,8	30,5	8,7	42,8	33,3	12,2
No han consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	20,3	16,1	5,6	23,8	16,7	6,4
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	46,7	36,0	15,0	49,5	35,1	16,4
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	16,9	13,9	4,3	21,0	15,1	5,2

Faltar a clase: En los últimos 30 días ha faltado a clase .

Concentrarse: En los últimos 12 meses no has podido concentrarte en el colegio al día siguiente de salir.

Expulsado: En los últimos 12 meses ha sido expulsado del centro educativo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.313.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo y edad (%). España, 2023.


	14-18 años			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Nunca	13,0	13,3	12,8	21,9	23,1	20,7	16,0	17,1	14,9	10,4	10,1	10,7	7,8	7,6	8,1	8,3	8,2	8,4
Menos de una noche al mes	18,9	18,9	18,8	21,2	21,0	21,4	20,0	20,9	19,1	17,7	18,0	17,4	18,1	17,2	19,0	15,8	16,0	15,5
1-3 noches al mes	28,9	27,4	30,5	24,0	22,2	25,7	27,1	25,7	28,5	30,3	28,3	32,5	32,3	31,1	33,5	30,9	28,9	33,2
1 noche a la semana	14,5	15,0	13,9	11,8	12,2	11,4	12,6	12,7	12,5	15,4	16,0	14,8	16,3	17,2	15,4	17,5	18,0	17,0
2 noches a la semana	16,8	16,8	16,8	14,4	14,1	14,6	16,6	16,0	17,2	17,6	17,7	17,5	17,5	18,1	16,9	17,9	17,9	17,9
3-4 noches a la semana	4,8	5,1	4,4	3,8	4,1	3,5	4,5	4,2	4,9	5,0	5,6	4,4	5,0	5,6	4,4	6,5	7,4	5,5
Más de 4 noches a la semana	3,2	3,6	2,7	3,0	3,2	2,8	3,1	3,5	2,8	3,5	4,2	2,8	3,0	3,2	2,7	3,1	3,7	2,6

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.314.


Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.315.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2023.




H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.316.

Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.317.

Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2023.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.318.

Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.


	Una	Dos	Tres	Cuatro o más
Nunca	30,4	7,0	2,2	0,8
Menos de una noche al mes	45,9	14,3	7,5	3,5
De 1 a 3 noches al mes	44,5	19,2	14,4	7,0
1 noche a la semana	41,9	20,7	16,7	8,4
2 noches a la semana	38,2	20,6	20,4	11,7
3-4 noches a la semana	32,4	20,2	22,0	18,0
Más de 4 noches a la semana	30,8	18,6	22,9	20,9

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.319.

Frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2023.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Nunca	11,8	10,7	11,8	7,2	8,7	8,7	10,1	25,3	13,0
Menos de una noche al mes	11,7	11,0	12,7	15,1	17,7	17,6	19,6	17,5	18,9
De 1 a 3 noches al mes	23,6	22,1	26,2	28,8	30,1	28,7	30,3	18,3	28,9
1 noche a la semana	18,5	17,3	18,4	17,9	17,0	17,2	16,1	11,5	14,5
2 noches a la semana	24,5	26,7	22,1	19,9	18,6	19,3	16,8	16,2	16,8
3-4 noches a la semana	5,9	6,8	4,7	4,8	4,7	5,2	4,2	6,5	4,8
Más de 4 noches a la semana	3,9	5,3	3,6	3,2	3,3	3,3	2,9	4,8	3,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.320.

Prevalencia de consumo de drogas ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.




* Sustancias psicoactivas ilegales: Hipnosedantes sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.321.


Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.322.


Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.323.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.324.


Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.325.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.326.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.327.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.328.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales* e ilegales** entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.



* Sustancias psicoactivas legales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con receta.

** Sustancias psicoactivas ilegales: Hipnosedantes sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.329.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y edad (%). España, 2023.

	14-18 años			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Antes de las 12 de la noche	23,2	21,9	24,4	22,1	23,0	21,2	16,7	17,9	15,6	12,1	12,2	12,1	9,2	8,9	9,5	10,7	11,4	10,1
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	16,9	16,9	16,8	35,3	34,8	35,7	27,6	27,5	27,7	16,3	14,5	18,2	10,5	9,9	11,2	8,0	7,5	8,4
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	11,5	12,3	10,6	17,8	17,8	17,7	18,3	18,3	18,3	14,8	15,2	14,4	11,9	12,1	11,7	10,3	11,0	9,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	10,9	11,2	10,5	9,2	9,6	8,8	11,3	11,3	11,2	10,5	12,0	9,0	10,8	12,1	9,5	8,7	10,2	7,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	11,5	10,5	12,5	6,0	5,5	6,6	9,0	9,1	9,0	11,1	12,2	9,9	12,2	13,0	11,4	11,4	11,3	11,5
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,4	20,1	20,8	4,8	4,4	5,2	7,8	7,0	8,6	13,6	12,8	14,5	13,6	12,2	15,0	13,4	12,3	14,6
Después de las 8 de la mañana	5,7	7,0	4,4	4,8	4,9	4,8	9,2	8,8	9,6	21,5	21,1	21,9	31,8	31,8	31,8	37,5	36,3	38,6

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.330.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana) en cada una de las franjas horarias señaladas (%). España, 2006-2023.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Antes de las 12 de la noche	16,1	14,5	16,5	14,6	17,1	20,2	19,3	54,2	23,2
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	15,1	15,7	16,4	14,0	17,1	18,0	16,5	12,7	16,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	13,9	13,8	13,8	11,3	12,7	12,5	11,3	7,1	11,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	13,8	14,6	13,0	11,4	12,3	12,0	11,1	5,9	10,9
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	15,3	15,3	15,6	14,9	14,0	12,7	13,5	5,4	11,5
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,6	20,3	19,6	25,2	21,0	19,0	22,2	7,3	20,4
Después de las 8 de la mañana	5,2	5,9	5,1	8,6	5,8	5,6	6,2	7,3	5,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.331.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
No ha salido	35,3	6,0	5,5	0,7
Antes de las 12 de la noche	55,8	13,3	9,3	0,8
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	74,8	19,8	14,3	1,2
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	80,9	27,1	20,0	2,2
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	87,2	33,5	25,4	2,2
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	91,4	37,4	28,8	2,0
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	95,9	49,9	40,7	3,8
Después de las 8 de la mañana	94,0	61,4	53,8	11,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.332.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según sexo (%). España, 2023.

	Alcohol		Tabaco		Cannabis		Cocaína polvo y/o base	
	H	M	H	M	H	M	H	M
No ha salido	32,6	38,1	4,0	8,1	4,8	6,2	0,9	0,5
Antes de las 12 de la noche	50,9	60,3	10,0	16,3	8,5	10,1	0,9	0,8
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	70,6	79,1	15,7	23,9	13,7	14,9	1,5	0,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	79,6	82,5	25,2	29,3	21,2	18,6	2,8	1,6
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	85,8	88,8	30,0	37,2	27,5	23,2	3,2	1,2
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	89,9	92,8	34,7	39,8	32,5	25,8	3,2	0,9
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	94,9	96,9	45,5	54,3	41,1	40,3	5,2	2,5
Después de las 8 de la mañana	93,0	95,7	57,3	68,1	54,7	52,3	13,2	8,8

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.333.

Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023.

	Total alumnos	Binge drinking últimos 30 días	Borracheras últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Consumo problemático cannabis (CAST ≥ 4)
Antes de las 12 de la noche	23,2	10,6	6,7	24,2	10,6
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	16,9	19,8	13,2	43,6	11,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	11,5	27,1	18,7	54,4	7,8
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	10,9	36,1	25,8	61,9	13,9
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	11,5	40,8	30,3	67,8	10,7
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,4	54,0	43,7	78,0	14,0
Después de las 8 de la mañana	5,7	62,1	49,8	77,1	28,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.334.

Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según sexo (%). España, 2023.

	Total alumnos		Binge drinking últimos 30 días		Borracheras últimos 30 días		Botellón últimos 12 meses		Consumo problemático cannabis (CAST ≥ 4)	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Antes de las 12 de la noche	21,9	24,4	8,4	12,5	4,6	8,5	20,0	28,1	0,6	0,7
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	16,9	16,8	17,8	21,9	11,0	15,4	38,7	48,6	1,3	0,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	12,3	10,6	27,5	26,6	17,2	20,4	52,0	57,2	1,3	1,0
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	11,2	10,5	37,4	34,7	24,7	26,9	60,3	63,5	2,7	2,5
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	10,5	12,5	43,8	38,3	29,6	30,8	66,2	69,1	3,1	1,6
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,1	20,8	56,9	51,2	42,4	45,0	75,9	80,1	4,8	4,1
Después de las 8 de la mañana	7,0	4,4	63,0	60,7	50,2	49,1	76,2	78,5	12,3	11,5

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.335.

Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023.


	Una	Dos	Tres	Cuatro o más
Antes de las 12 de la noche	40,8	12,4	5,3	2,3
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	49,2	15,9	8,6	4,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	46,3	18,9	12,4	5,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	45,4	21,2	15,2	7,4
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	44,5	20,9	18,6	8,7
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	35,7	22,4	24,5	14,0
Después de las 8 de la mañana	25,8	18,8	26,2	25,2

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.336.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023.



* Sustancias psicoactivas legales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con receta.

** Sustancias psicoactivas ilegales: Hipnosedantes sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.337.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa y según sexo (última salida en fin de semana) (%). España, 2023.

	Sustancias legales		Sustancias ilegales	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Antes de las 12 de la noche	40,8	12,4	5,3	2,3
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	49,2	15,9	8,6	4,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	46,3	18,9	12,4	5,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	45,4	21,2	15,2	7,4
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	44,5	20,9	18,6	8,7
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	35,7	22,4	24,5	14,0
Después de las 8 de la mañana	25,8	18,8	26,2	25,2

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.338.

Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad. España, 2014-2023.

	2014*		2016*		2019		2021		2023	
Euros/semana	15,1		18,0		14,2		13,7		15,6	
2023 según sexo y edad	H	M	14	15	16	17	18	14-17		
Euros/semana	16,3	14,9	12,6	13,7	16,1	17,5	21,7	15,1		

* Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.339.

Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2023.

	Total estudiantes 14-18 años	Total alumnos que no consumen nada	Alcohol últimos 12 meses	Borracheras últimos 12 meses	Binge drinking últimos 30 días	Tabaco últimos 12 meses	Tabaco diariamente últimos 30 días	Cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	Hipnosedantes últimos 12 meses	Drogas legales*	Drogas ilegales**	Bebidas energéticas últimos 30 días	Cannabis últimos 12 meses	Consumo problemático cannabis (CAST≥4)	Cocaína últimos 12 meses
Euros/semana	15,60	11,75	16,56	17,89	19,84	19,64	24,67	17,48	18,77	16,47	19,42	17,17	19,97	28,21	30,33

* Drogas legales: Alcohol y tabaco.

** Drogas ilegales: Hipnosedantes sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, inhalables volátiles y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.340.

Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, en función de tipo de estudios, titularidad del centro y notas que sacan habitualmente. España, 2023.

	Euros/semana
Total alumnos	15,60
Titularidad del centro	
Público	15,25
Privado	16,32
Tipo de estudios	
ESO	13,67
Bachillerato	15,98
FPB	22,37
FPGM	22,01
Notas que sacan	
Sobresaliente/notable	14,59
Bien/aprobado	16,23
Suspenso	19,44

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.341.

Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2023.

	Total alumnos	Faltar a clase (hacer pellas)		Repetir curso	
		Sí	No	Sí	No
Euros/semana	15,60	19,42	14,19	20,04	14,55

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.342.

Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, en función de los hobbies que practican. España, 2023.

		Euros/semana
Total alumnos		15,60
Practico algún deporte	Poco	17,16
	Mucho	15,27
Leo libros	Poco	16,47
	Mucho	14,13
Salgo con amigos por las noches	Poco	12,65
	Mucho	17,37
Salgo con amigos por las tardes	Poco	16,11
	Mucho	15,51
Otros hobbies (toco un instrumento...)	Poco	16,32
	Mucho	14,63

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.343.

Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses. España, 2023.

	Euros/semana
Nunca	11,7
Menos de una noche al mes	12,7
De 1 a 3 noches al mes	15,0
1 noche a la semana	16,7
2 noches a la semana	18,3
3-4 noches a la semana	20,5
Más de 4 noches a la semana	25,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.344.

Dinero (euros) gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). España, 2023.

	Euros/semana
Antes de las 12 de la noche	12,5
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	13,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	14,8
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	15,7
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	16,8
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	19,2
Después de las 8 de la mañana	23,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.345.

Situación económica de la familia entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2021-2023.

	2021		2023			
	Total estudiantes	Total estudiantes	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína*
Por encima de la media	12,7	13,2	14,2	14,8	15,7	18,2
Más o menos como la media	82,8	82,2	81,2	78,7	77,6	71,2
Por debajo de la media	4,5	4,6	4,5	6,5	6,7	10,6

* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.346.

Prevalencia de experimentar ciertas situaciones en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (%). España, 2023.

	Discusión	No recordar	No concentrarme	Expulsado	Resaca	Arrepentimiento de relaciones sexuales	Relaciones sexuales sin preservativo	Brote psicótico	Ansiedad	Bullying
TOTAL ALUMNOS	40,4	20,3	18,2	6,9	34,9	7,5	16,9	3,7	33,7	10,5
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	46,2	32,0	26,0	9,0	55,5	11,1	24,8	4,9	37,9	10,3
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	32,8	5,2	8,0	4,3	8,7	3,0	6,7	2,1	28,4	10,7
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	50,5	51,5	35,5	11,3	76,5	16,5	35,0	7,1	41,8	9,0
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	37,7	12,0	13,5	5,7	23,8	5,1	12,1	2,8	31,6	10,8
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	49,4	44,4	33,0	11,4	69,3	15,2	32,1	6,4	39,6	10,1
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	36,7	10,8	12,2	5,0	21,4	4,4	10,8	2,5	31,4	10,6
Ha hecho botellón en los últimos 30 días	49,9	45,7	33,7	11,3	69,8	15,3	31,1	6,7	39,5	9,0
No ha hecho botellón en los últimos 30 días	38,1	14,2	14,3	5,7	26,5	5,6	13,4	2,9	32,5	10,7
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	59,0	48,7	41,1	21,8	73,7	26,3	53,6	12,8	53,4	13,2
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	38,9	18,0	16,3	5,7	31,7	6,0	13,9	2,9	32,1	10,2
Ha consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	63,2	31,5	33,3	12,2	48,6	17,0	32,2	14,7	70,7	24,6
No han consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	38,3	19,4	16,7	6,4	33,7	6,7	15,6	2,7	30,4	9,1
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	53,8	44,1	35,1	16,4	65,5	20,3	41,0	10,4	43,5	12,0
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	38,0	16,1	15,1	5,2	29,4	5,2	12,6	2,4	32,0	10,2
Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	68,0	61,1	57,6	35,0	73,7	40,8	64,0	29,3	56,1	19,2
Consumo de cannabis (CAST<4) y no consumidores de cannabis	39,7	19,4	17,2	6,3	33,9	6,8	15,8	3,1	33,2	10,3
Ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	58,1	54,3	49,7	29,8	65,3	35,2	57,0	27,0	48,5	21,1
No ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	39,9	19,6	17,4	6,3	34,2	6,9	16,0	3,1	33,3	10,2

Discusión: Conflicto importante con padres o hermanos; No recordar: La incapacidad de recordar lo sucedido la noche anterior después de haber salido; No concentrarme: Tener dificultad para concentrarse en el colegio al día siguiente después de salir; Expulsado: Ser expulsado del centro educativo durante un día completo o más; Resaca: tener resaca; Arrepentimiento de relaciones sexuales: haber tenido relaciones sexuales de las que se han arrepentido al día siguiente; Relaciones sexuales sin preservativo: haber tenido relaciones sexuales sin preservativo; Brote psicótico: haber sufrido un brote psicótico (alucinaciones, delirios...); Ansiedad: haber sufrido un ataque de ansiedad; Bullying: Haber sufrido bullying (acoso) a través de internet o por otros medios (acoso directo o indirecto físico, verbal, psicológico, sexual o social).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.347.

Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2023.

	2016			2019			2021			2023		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	2,5	3,9	1,1	2,7	4,0	1,5	2,6	3,5	1,6	2,9	4,1	1,6
Cannabis	1,8	2,9	0,8	1,9	3,0	0,9	1,5	2,2	0,8	1,5	2,3	0,6
Cocaína	0,3	0,6	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1	0,4	0,6	0,1

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.348.

Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2023.


	2016			2019			2021			2023		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	17,2	16,4	17,9	18,9	17,2	20,5	15,0	13,7	16,3	17,1	16,0	18,2
Cannabis	9,1	9,4	8,8	9,4	9,8	9,0	6,9	7,4	6,4	6,8	6,9	6,7
Cocaína	1,8	2,1	1,4	1,9	2,1	1,7	1,6	1,8	1,4	1,9	2,1	1,6

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.349.

Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido alcohol o alguna droga ilegal, según sexo (%). España, 2016-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



Problemas relacionados con las drogas

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2022*

2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2022.




Total admisiones		Total admisiones	
1998	54.338	2011	50.281
1999	51.191	2012	49.678
2000	49.487	2013	51.946
2001	49.376	2014	48.926
2002	46.744	2015	47.308
2003	50.103	2016	45.637
2004	51.936	2017	46.799
2005	50.630	2018	47.972
2006	49.283	2019	50.035
2007	50.555	2020	38.544
2008	53.155	2021	44.347
2009	52.549	2022	45.853
2010	53.434		

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

* Existe información ampliada de la serie histórica para muchos gráficos y tablas de este capítulo (por lo general, se muestran a partir del año 1998); la serie completa se puede consultar <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales y por alcohol. España, 1998-2022.




	Drogas ilegales	Alcohol
1998	54.338	-
2002	46.744	-
2004	51.936	-
2005	50.630	18.950
2006	49.283	19.454
2007	50.555	19.224
2008	53.155	26.318
2009	52.549	27.958
2010	53.434	28.111
2011	50.281	29.014
2012	49.678	28.234
2013	51.946	28.652
2014	48.926	27.658
2015	47.308	27.469
2016	45.637	26.655
2017	46.799	25.753
2018	47.972	25.796
2019	50.035	27.209
2020	38.544	20.017
2021	44.347	25.140
2022	45.853	27.042

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales, total, con tratamiento previo y tratados por primera vez en la vida. España, 1998-2022.




	Total admisiones	Primeras admisiones	Con tratamiento previo
1998	54.338	-	-
2000	49.487	-	-
2002	46.744	22.064	-
2004	52.128	25.064	-
2005	50.630	24.553	23.714
2006	49.283	22.333	24.814
2007	50.555	23.034	25.392
2008	53.155	22.944	27.769
2009	52.549	24.605	25.098
2010	53.434	26.805	24.611
2011	50.281	24.999	23.232
2012	49.678	25.209	23.024
2013	51.946	28.239	22.577
2014	48.926	23.656	18.786
2015	47.308	23.777	19.519
2016	45.637	22.816	20.124
2017	46.799	23.738	21.353
2018	47.972	24.663	21.382
2019	50.035	27.492	20.689
2020	38.544	20.006	17.154
2021	44.347	23.482	18.359
2022	45.853	24.897	18.328

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2022.




	Heroína	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Anfetaminas	Extasis	Alucinógenos	Otras sustancias*
1998	43.598	6.154	2.879	346	347	154	62	798
1999	37.417	8.978	2.826	331	339	135	50	1.406
2000	34.563	8.272	2.895	381	288	240	64	2.784
2001	32.305	9.023	3.506	469	255	335	83	3.400
2002	26.213	11.904	4.772	592	342	452	68	2.401
2003	23.225	18.359	5.711	607	266	254	63	1.618
2004	20.532	21.646	6.500	693	330	236	44	1.955
2005	18.653	23.746	5.524	618	386	229	39	1.435
2006	18.803	22.242	5.304	717	426	165	37	1.589
2007	18.904	23.037	5.936	795	415	172	43	1.253
2008	17.456	24.680	7.419	845	400	155	43	2.157
2009	16.989	23.132	9.503	963	461	127	69	1.305
2010	17.325	22.087	11.192	944	501	93	66	1.226
2011	13.898	20.335	12.873	1.143	595	102	83	1.252
2012	12.238	19.497	14.869	1.083	512	134	107	1.238
2013	11.756	19.848	16.848	1.175	671	201	120	1.327
2014	10.911	17.864	16.478	1.192	635	133	82	1.631
2015	10.978	17.327	15.676	1.068	636	157	77	1.389
2016	10.807	17.889	13.304	1.105	699	89	82	1.662
2017	10.384	20.168	12.932	1.032	608	68	73	1.534
2018	10.086	20.981	13.459	1.050	662	72	76	1.586
2019	9.904	22.345	14.202	992	720	96	127	1.649
2020	7.652	17.490	10.587	824	580	72	112	1.227
2021	7.419	20.741	12.350	1.077	837	91	127	1.705
2022	7.585	21.818	12.574	1.079	951	122	131	1.593

* Otras sustancias incluye: metadona, otros opiáceos y otras sustancias sin especificar.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1998-2022.



	■ Primeros tratamientos	■ Con tratamiento previo	■ Total
1998	11.867	30.756	43.598
1999	10.473	26.031	37.417
2000	8.151	26.412	34.563
2001	7.461	24.844	32.305
2002	5.051	21.162	26.213
2003	4.337	17.867	23.225
2004	3.836	15.617	20.532
2005	3.604	14.005	18.653
2006	3.318	14.502	18.803
2007	3.672	14.331	18.904
2008	3.840	13.616	17.456
2009	3.412	12.750	16.989
2010	4.526	12.166	17.325
2011	2.951	10.391	13.898
2012	2.555	9.302	12.238
2013	2.572	8.940	11.756
2014*	2.356	8.555	10.911
2014	2.073	7.531	10.911
2015	2.202	7.713	10.978
2016	2.353	7.907	10.807
2017	2.259	7.775	10.384
2018	2.223	7.530	10.086
2019	2.384	7.177	9.904
2020	1.771	5.594	7.652
2021	1.820	5.083	7.419
2022	1.920	5.202	7.585


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1998-2022.



	■ Primeros tratamientos	■ Con tratamiento previo	■ Total
1998	4.174	1.838	6.012
1999	6.126	2.576	8.702
2000	5.499	2.773	8.272
2001	5.977	3.046	9.023
2002	7.125	3.893	11.904
2003	11.851	5.893	18.359
2004	14.126	6.747	21.646
2005	15.258	7.562	23.746
2006	13.463	8.036	22.242
2007	13.429	8.753	23.037
2008	12.847	10.786	24.680
2009	12.142	9.107	23.132
2010	12.130	9.095	22.087
2011	10.637	8.889	20.335
2012	10.142	8.855	19.497
2013	10.734	8.726	19.848
2014*	9.683	8.182	17.864
2015	8.445	7.248	17.327
2016	9.052	7.678	17.889
2017	10.393	9.025	20.168
2018	10.871	9.226	20.981
2019	12.491	8.989	22.345
2020	9.092	7.744	17.490
2021	10.647	9.004	20.741
2022	11.753	8.944	21.818


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1998-2022.




	■ Primeros tratamientos	■ Con tratamiento previo	■ Total
1998	2.412	407	-
1999	2.335	418	-
2000	2.487	408	-
2001	2.966	540	-
2002	3.972	665	4.772
2003	4.613	871	5.711
2004	5.319	928	6.500
2005	4.426	844	5.524
2006	4.125	941	5.304
2007	4.619	1.114	5.936
2008	5.058	2.055	7.419
2009	7.273	1.705	9.503
2010	8.639	2.101	11.192
2011	9.736	2.603	12.873
2012	10.982	3.402	14.869
2013	12.912	3.585	16.914
2014*	12.968	3.510	16.478
2015	11.185	3.448	15.676
2016	9.278	3.208	13.304
2017	9.122	3.314	12.932
2018	9.485	3.386	13.459
2019	10.372	3.306	14.202
2020	7.334	2.893	10.587
2021	8.529	3.160	12.350
2022	8.803	3.003	12.574

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1998-2022.



	■ Primeros tratamientos	■ Con tratamiento previo	■ Total
1998	2.412	407	-
1998	197	143	-
1999	165	147	-
2000	214	154	-
2001	299	170	-
2002	350	242	-
2003	382	225	-
2004	441	224	693
2005	383	209	618
2006	466	223	717
2007	503	261	795
2008	463	352	845
2009	598	312	963
2010	580	323	944
2011	709	386	1.143
2012	648	421	1.083
2013	787	374	1.175
2014*	871	321	1.192
2015	742	256	1.098
2016	772	282	1.105
2017	721	269	1.032
2018	744	261	1.050
2019	715	242	992
2020	595	201	824
2021	768	252	1.077
2022	775	246	1.079

* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de estimulantes distintos de la cocaína: anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis. España, 1998-2022.




	Anfetaminas	Metanfetaminas	Éxtasis
1998	347	–	154
1999	339	–	135
2000	288	–	240
2001	255	–	335
2002	342	–	452
2003	266	–	254
2004	330	–	236
2005	386	–	229
2006	426	–	165
2007	415	–	172
2008	400	–	155
2009	461	–	127
2010	501	–	93
2011	595	–	102
2012	512	–	134
2013	671	–	201
2014	635	20	133
2015	636	38	157
2016	699	55	89
2017	608	81	68
2018	662	93	72
2019	716	119	96
2020	580	129	72
2021	837	127	91
2022	951	131	122

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alucinógenos (ketamina u otros alucinógenos). España, 2005-2022.




	Alucinógenos*	Ketamina	Otros alucinógenos
2005	39	8	31
2006	37	10	27
2007	43	22	21
2008	43	20	23
2009	69	43	26
2010	66	46	20
2011	83	54	29
2012	107	66	41
2013	120	70	50
2014	82	49	33
2015	77	42	35
2016	82	54	28
2017	73	52	21
2018	76	53	23
2019	127	91	36
2020	112	83	29
2021	127	97	29
2022	131	112	19

* Alucinógenos incluye ketamina y otros alucinógenos.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2022.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950	2014*	15.240	12.418	27.658
2006	10.172	8.611	19.454	2015	13.457	11.254	27.469
2007	9.898	8.587	19.224	2016	13.319	11.323	26.655
2008	9.395	9.753	26.318	2017	13.060	11.556	25.753
2009	10.924	11.288	27.958	2018	13.243	11.224	25.796
2010	15.126	11.764	28.111	2019	14.907	11.215	27.209
2011	11.612	10.350	29.014	2020	10.501	8.705	20.017
2012	14.816	12.714	28.234	2021	13.575	10.234	25.140
2013	15.121	12.978	28.652	2022	15.561	10.160	27.042


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2022.




	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fentanilo	28	44	70	66	100	103	79	174	130
Mefedrona	0	8	0	35	38	74	102	219	318
Spice	2	3	5	1	5	14	25	31	15
Tramadol	27	24	28	24	33	37	31	39	59

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1998-2022.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014**	6.360	1.664
2015	5.904	2.413
2016	6.117	2.621
2017	5.946	2.691
2018	5.223	2.161
2019	4.877	1.977
2020	3.692	1.545
2021	3.161	1.119
2022	3.719	1.247


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1998-2022.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014**	1.065	261
2015	1.038	367
2016	1.141	416
2017	1.150	471
2018	1.039	392
2019	1.034	428
2020	752	335
2021	873	361
2022	958	439


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1998-2022.




	■ Edad media de admisión a tratamiento	■ Edad media primer consumo
1998	30,7	20,6
1999	31,3	20,8
2000	32,0	20,6
2001	32,0	20,8
2002	33,6	20,9
2003	33,9	20,7
2004	35,4	20,8
2005	35,6	20,6
2006	36,4	20,3
2007	36,8	21,0
2008	37,5	21,1
2009	37,9	20,9
2010	38,4	21,4
2011	39,3	20,8
2012	40,4	20,7
2013	40,8	20,9
2014	40,9	21,1
2015	41,3	21,5
2016	41,6	21,1
2017	42,6	21,5
2018	43,0	21,7
2019	43,2	22,0
2020	43,8	22,1
2021	45,1	22,2
2022	45,1	22,4

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1998-2022.




	■ Edad media de admisión a tratamiento	■ Edad media primer consumo
1998	29,9	21,2
1999	30,3	21,8
2000	30,9	22,1
2001	31,4	22,3
2002	31,8	22,6
2003	31,9	22,3
2004	33,0	22,8
2005	33,0	22,0
2006	33,0	21,5
2007	34,1	23,3
2008	35,0	22,9
2009	34,5	22,8
2010	35,0	23,5
2011	36,7	22,6
2012	38,1	22,4
2013	38,2	22,3
2014	37,9	23,5
2015	38,0	23,8
2016	38,2	23,5
2017	39,9	24,1
2018	40,1	24,6
2019	40,1	25,3
2020	40,1	25,5
2021	42,4	25,3
2022	41,7	25,5

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1998-2022.




	■ Edad media de admisión a tratamiento	■ Edad media primer consumo
1998	29,1	22,1
1999	28,6	21,7
2000	29,1	21,5
2001	29,8	21,6
2002	29,8	21,9
2003	29,8	21,3
2004	30,0	21,3
2005	30,5	21,0
2006	31,2	20,8
2007	31,7	21,2
2008	32,1	21,0
2009	32,5	20,7
2010	33,3	20,9
2011	33,9	20,7
2012	34,5	20,7
2013	35,0	20,6
2014	35,3	20,6
2015	36,0	20,7
2016	36,0	20,4
2017	36,6	20,6
2018	36,6	20,7
2019	36,9	20,9
2020	37,5	21,0
2021	38,4	21,0
2022	38,5	21,1

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1998-2022.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1998	28,4	22,2
1999	27,8	21,9
2000	28,2	21,6
2001	29,0	21,8
2002	28,8	21,7
2003	28,8	21,5
2004	29,1	21,4
2005	30,0	21,1
2006	30,4	20,9
2007	30,8	21,5
2008	31,2	21,1
2009	31,6	20,9
2010	32,4	21,2
2011	33,0	21,1
2012	33,4	21,1
2013	33,9	21,0
2014	34,1	20,8
2015	34,8	21,1
2016	34,8	21,1
2017	35,4	21,2
2018	35,3	21,4
2019	35,7	21,5
2020	36,3	21,8
2021	37,2	21,8
2022	37,2	21,9

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.19.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1998-2022.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1998	7884	2518	910
1999	7033	1969	968
2000	5917	1414	532
2001	5461	1276	471
2002	3540	894	399
2003	2805	748	386
2004	2690	648	358
2005	2487	544	350
2006	2320	486	303
2007	2842	470	327
2008	2891	455	285
2009	2719	386	256
2010	3589	465	258
2011	2211	365	201
2012	1870	276	159
2013	2047	283	175
2014	1670	154	125
2015	1831	167	145
2016	1982	186	146
2017	1870	209	147
2018	1892	141	128
2019	2039	147	150
2020	1524	104	99
2021	1568	90	101
2022	1664	94	114

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.20.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1998-2022.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1998	68,3	21,8	7,9
1999	69,3	19,4	9,5
2000	74,1	17,7	6,7
2001	74,9	17,5	6,5
2002	71,8	18,1	8,1
2003	69,3	18,5	9,5
2004	68,0	16,4	9,0
2005	69,0	15,1	9,7
2006	73,8	15,5	9,6
2007	77,4	12,8	8,9
2008	78,5	12,4	7,7
2009	79,7	11,3	7,5
2010	82,0	10,6	5,9
2011	77,7	12,8	7,1
2012	78,3	11,6	6,7
2013	79,6	11,0	6,8
2014	80,6	7,4	6,0
2015	83,7	7,6	6,6
2016	84,7	7,9	6,2
2017	83,0	9,3	6,5
2018	85,8	6,4	5,8
2019	86,1	6,2	6,3
2020	86,1	5,9	5,6
2021	87,1	5,0	5,6
2022	87,2	4,9	6,0

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general) , según la vía principal de administración de esta droga. España, 1998-2022.




	■ Esnifada	■ Pulmonar	■ Inyectada
1998	3.073	856	128
1999	4.777	1.048	128
2000	4.067	1.172	105
2001	4.413	1.284	91
2002	5.613	1.403	156
2003	9.228	1.242	485
2004	11.140	1.837	693
2005	12.298	1.755	793
2006	11.155	1.617	103
2007	11.393	1.295	130
2008	10.391	1.276	117
2009	10.272	1.139	136
2010	9.952	1.203	166
2011	8.787	1.205	97
2012	8.346	781	95
2013	8.995	1.320	129
2014	6.798	986	56
2015	7.005	1.078	30
2016	7.564	1.107	33
2017	8.730	1.304	36
2018	9.030	1.435	41
2019	10.464	1.482	35
2020	7.626	1.087	26
2021	9.006	1.226	39
2022	9.887	1.150	37

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1998-2022.




	■ Snifada	■ Pulmonar	■ Inyectada
1998	74,8	20,8	3,3
1999	79,5	17,4	2,1
2000	75,2	21,7	1,9
2001	75,2	21,9	1,6
2002	77,0	19,2	2,1
2003	83,0	11,2	4,4
2004	80,9	13,3	4,8
2005	80,6	11,5	5,2
2006	86,0	12,5	0,8
2007	88,0	10,0	1,0
2008	86,9	10,7	1,0
2009	87,7	9,7	1,2
2010	86,8	10,5	1,4
2011	85,5	11,7	0,9
2012	88,3	8,3	1,0
2013	83,8	12,3	1,2
2014	82,6	12,0	0,7
2015	83,5	12,9	0,4
2016	83,9	12,3	0,4
2017	84,3	12,6	0,3
2018	83,6	13,3	0,4
2019	84,2	11,9	0,3
2020	84,4	12,0	0,3
2021	85,1	11,6	0,4
2022	86,1	10,0	0,3

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.23.

Proporción de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA (%). España, 1995-2022.



2.1.24.

Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2022.



	Opioides	Cocaína	Estimulantes sin cocaína	Cannabis	Hipnosedantes
2005	5,7	57,4	5,9	42,7	8,9
2006	6,1	58,7	5,2	44,1	9,0
2007	6,4	58,0	4,6	43,3	8,5
2008	6,1	66,1	4,3	49,1	10,6
2009	5,9	61,5	3,9	50,9	9,8
2010	6,6	63,4	4,3	52,0	9,9
2011	6,5	63,7	4,9	51,6	9,3
2012	7,1	62,1	4,6	52,9	10,1
2013	6,7	60,8	4,8	53,5	9,1
2014	4,5	56,7	2,8	48,3	8,1
2015	5,3	60,3	4,4	51,4	8,2
2016	4,4	62,3	4,1	51,1	7,3
2017	4,5	64	4	49,5	8
2018	4,1	64,5	3,9	50	6,3
2019	3,8	65,5	4,6	48,8	6,2
2020	3,6	65,9	4,1	50,3	6,2
2021	3,6	64,9	4,5	50,4	6,4
2022	3,4	67,1	4,8	49,1	6,5

El 74,6% (n=18.742) de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 25,4% restante (n=6.398).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2015-2022.

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sólo alcohol	21.041	76,6	20.251	76,0	19.361	75,2	19.211	74,5	19.742	72,6	14.705	73,5	18.742	74,6	19.754	73,0
Alcohol y otras drogas	6.428	23,4	6.404	24,0	6.392	24,8	6.585	25,5	7.467	27,4	5.312	26,5	6.398	25,4	7.288	27,0
Una droga más	4.729	17,2	4.733	17,8	4.695	18,2	4.870	18,9	5.597	20,6	3.857	19,3	4.641	18,5	5.295	19,6
Dos drogas más	1.424	5,2	1.411	5,3	1.403	5,4	1.452	5,6	1.569	5,8	1.238	6,2	1.519	6,0	1.672	6,2
Tres o más drogas	275	1,0	260	0,9	294	1,1	263	1,0	301	1,1	217	1,0	238	0,9	321	1,2

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1998-2022.




	Hombre	Mujer	Total		Hombre	Mujer	Total
1998	32,4	39,7	33,6	2011	28,5	30,0	28,7
1999	31,9	40,2	33,0	2012	28,2	30,0	28,4
2000	32,7	37,9	33,5	2013	24,2	26,1	24,4
2001	32,7	40,2	33,7	2014	26,3	24,4	26,0
2002	30,9	38,9	32,0	2015	33,4	35,4	33,7
2003	31,5	39,3	32,6	2016	33,9	39,0	34,6
2004	27,7	38,3	29,3	2017	31,3	37,6	32,0
2005	31,5	39,5	32,7	2018	28,7	40,4	30,1
2006	32,7	37,4	33,4	2019	29,3	36,3	30,1
2007	30,0	36,2	30,9	2020	36,6	35,4	35,6
2008	26,7	33,3	27,6	2021	34,0	36,0	34,2
2009	26,0	32,2	26,9	2022	40,3	30,5	39,2
2010	29,8	31,7	30,2				

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Prevalencia (%) de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1998-2022.



	<25 años	25-34 años	>34 años
1998	15,1	33,4	45,8
1999	15,2	32	44
2000	13,1	30,5	45,5
2001	14	29,1	44,4
2002	12,1	26,7	42,8
2003	9,2	25,5	43,8
2004	7,1	20,9	39,4
2005	9,7	23,1	41,9
2006	7,2	21,4	42,2
2007	3,2	18,7	40,3
2008	3,2	16,9	35,6
2009	2,2	15,2	34,7
2010	8,1	14,8	38
2011	9,9	14,5	35,6
2012	8,6	11,7	35,4
2013	4,7	8,9	30,4
2014	5,9	12,0	31,2
2015	11,5	12,1	38,4
2016	3,1	16,0	39,3
2017	4,2	19,7	35,1
2018	0,0	19,7	31,3
2019	7,3	18,4	33,3
2020	16,0	23,1	38,9
2021	26,7	30,4	35,0
2022	28,6	36,4	40,2

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (%). España, 2019-2022.

	2019		2020		2021		2022	
	Nº de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Nº de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Nº de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Nº de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	22.345	28,9	17.490	29,9	20.741	29,8	21.818	29,9
Cocaína polvo	19.627	25,4	15.357	26,2	17.989	25,9	19.314	26,5
Cocaína base	2.710	3,5	2.122	3,6	2.719	3,9	2.429	3,3
Opioides	11.170	14,5	8.502	14,5	8.518	12,3	8.553	11,7
Heroína	9.904	12,8	7.652	13,1	7.419	10,7	7.585	10,4
Metadona (mal uso)	461	0,6	289	0,5	335	0,5	352	0,5
Otros opioides	805	1,0	560	1,0	764	1,1	616	0,8
Cannabis	14.202	18,4	10.587	18,1	12.350	17,8	12.574	17,2
Hipnosedantes	992	1,3	824	1,4	1.077	1,5	1.079	1,5
Estimulantes sin cocaína	1.086	1,4	950	1,6	1.368	2,0	1.470	2,0
Anfetaminas/metanfetamina	839	1,1	709	1,2	996	1,4	951	1,3
Éxtasis y derivados	96	0,1	72	0,1	91	0,1	122	0,2
Otros estimulantes	151	0,2	166	0,3	281	0,4	397	0,5
Alucinógenos	127	0,2	112	0,2	127	0,1	131	0,2
Inhalantes volátiles	35	0,0	20	0,0	68	0,1	19	0,0
Otras drogas ilegales	78	0,1	59	0,1	98	0,1	209	0,3
Alcohol	27.209	35,2	20.017	34,2	25.140	36,2	27.042	37,1
Total drogas ilegales	50.035	–	38.544	–	44.347		45.853	-
Total drogas ilegales y alcohol	77.244	–	58.561	–	69.487		72.895	-

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.29.


Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal por sexo (%). España, 2022.

	Hombres		Mujeres	
	Nº de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Nº de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	18.341	32,0	3.476	22,4
Cocaína polvo	16.264	28,4	3.027	19,5
Cocaína base	2.012	3,5	439	2,8
Opioides	7.234	12,6	1.319	8,5
Heroína	6.516	11,4	1.069	6,9
Metadona (mal uso)	282	0,5	70	0,5
Otros opioides	436	0,8	180	1,2
Cannabis	9.684	16,9	2.889	18,6
Hipnosedantes	645	1,1	434	2,8
Estimulantes	1.223	2,1	247	1,6
Anfetaminas/metanfetamina	752	1,3	199	1,3
Éxtasis y derivados	96	0,2	26	0,2
Otros estimulantes	375	0,7	22	0,1
Alucinógenos	102	0,2	29	0,2
Inhalantes volátiles	14	0,0	5	0,0
Otras drogas ilegales	147	0,3	62	0,4
Alcohol	19.957	34,8	7.083	45,6
Total drogas ilegales	37.390		8.461	
Total drogas ilegales y alcohol	57.347		15.544	

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2022.




* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.31.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2022.




* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.32.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2022.




* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.33.

Número de casos y tasas por 100.000 habitantes de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2022.



Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.34.

Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2022.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Total	45.853	19.328	24.897	37.390	8.461
Tratamiento previo					
Sí	42,4	100	0,0	44,1	34,9
No	57,6	0,0	100	55,9	65,1
Edad	37,0	40,6	34,3	37,1	36,4
Sexo					
Hombre	81,5	84,8	79,2		
Mujer	18,5	15,2	20,8		
Máximo nivel de estudios*					
Sin estudios	0,8	0,9	0,7	0,8	0,7
Primaria	51,5	55,2	49,0	52,9	45,3
Secundaria	41,5	38,8	43,1	40,5	45,8
Estudios superiores	6,3	5,2	7,1	5,8	8,3
Situación laboral					
Trabajo	39,2	35,8	42,0	41,3	29,9
Parado no trabajado antes	6,0	5,8	6,0	5,7	7,6
Parado habiendo trabajado antes	36,0	41,1	32,8	35,4	38,6
Otras	18,8	17,2	19,2	17,6	23,9
Fuente de referencia principal					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	4,7	8,4	1,9	4,6	5,1
Médico general, Atención Primaria de Salud	13,0	9,5	15,5	12,9	13,7
Hospitales u otros servicios de salud	8,0	6,1	9,3	7,1	12,3
Servicios Sociales	3,6	2,6	4,3	2,3	8,9
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	5,3	7,3	3,4	6,0	2,3
Servicios legales o policiales	5,9	5,0	6,8	6,3	4,1
Empresas o empleador	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0
Familiares y amigos	11,4	7,3	14,6	11,8	9,4
Iniciativa propia	44,4	51,2	39,9	45,6	39,1
Servicios de educación	0,5	0,3	0,7	0,4	0,8
Otra	3,2	2,3	3,5	2,9	4,4

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Convivencia					
Solo/a	16,9	19,5	15,2	17,2	15,5
Únicamente con pareja	11,9	11,9	11,8	11,2	14,7
Únicamente con hijos/as	2,4	2,2	2,7	1,1	8,5
Con la pareja e hijos/as	16,6	15,5	17,6	17,1	14,0
Con padres o familia de origen	36,8	33,8	39,1	37,7	32,5
Con amigos/as	3,9	4,1	3,7	3,8	4,2
Detenido (Ej. Centro penitenciario, centro de inserción social)	4,9	6,1	3,6	5,4	2,6
En instituciones no detenido (Ej. Albergue)	3,0	3,2	2,8	2,8	3,7
Otros	3,7	3,8	3,5	3,5	4,3
Lugar vive					
Casas, pisos, apartamentos	86,6	82,8	90,1	86,1	88,5
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	5,9	7,7	4,0	6,5	3,2
Otras instituciones	2,4	2,4	2,4	2,2	3,4
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,6	0,4	0,4	0,7
Alojamiento inestable/ precarios	3,0	4,3	1,9	3,1	2,7
Otros lugares	1,6	2,1	1,2	1,6	1,6
Español o extranjero					
Español	86,2	88,7	84,4	86,0	87,2
Extranjero	13,8	11,3	15,6	14,0	12,8
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	18,7	30,5	9,7	19,3	15,6
Heroína	16,5	28,4	7,7	17,4	12,6
Metadona	0,8	1,0	0,6	0,8	0,8
Otros opioides	1,3	1,2	1,5	1,2	2,1
Cocaína	47,6	48,8	47,2	49,1	41,1
CLH Cocaína	42,1	42,3	42,5	43,5	35,8
Cocaína base	5,3	6,3	4,6	5,3	5,1
Estimulantes sin cocaína	3,2	2,5	3,7	3,3	2,9
Anfetaminasy metanfetaminas	2,0	2,2	2,1	2,0	2,3
MDMA y derivados	0,9	0,3	1,3	1,0	0,3
Hipnosedantes	2,4	1,3	3,1	1,7	5,1
Alucinógenos	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Cannabis	27,4	16,4	35,4	25,9	35,4
Alcohol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras sustancias	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	20,4	19,9	20,7	20,1	22,0
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	46,0	42,1	48,5	45,2	49,6
4-6 días/semana	8,8	8,2	9,3	9,1	7,4
2-3 días/semana	14,9	13,5	16,0	15,4	13,0
1 día/semana	5,4	5,2	5,5	5,5	4,6
Menos de 1 día/semana	6,9	7,5	6,5	7,0	6,5
No consumió	18,0	23,5	14,1	17,8	18,9
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,6	5,2	7,4	5,7	10,4
Pulmonar	47,3	47,0	47,5	46,6	50,5
Intranasal	43,0	43,2	43,0	44,4	36,9
Parenteral	2,4	3,9	1,3	2,6	1,3
Otras	0,8	0,7	0,8	0,7	1,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	9,2	16,0	4,1	9,9	6,0
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	3,1	4,6	1,9	2,3	1,1
Prevalencia VIH mínima	3,0	4,5	2,1	3,2	2,4
Prevalencia VIH máxima	8,7	9,1	6,8	9,2	7,7
Prevalencia Hepatitis C mínima	3,9	7,5	1,5	4,1	3,1
Prevalencia Hepatitis C máxima	11,8	12,3	9,2	16,1	5,7
Prevalencia Hepatitis B mínima	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2
Prevalencia Hepatitis B máxima	1,5	1,6	1,0	1,8	1,2

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido).

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, mas no inmune).

Nota: Debido al redondeo algunos totales no suman.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.35.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2022.

	Total	Sexo*		Tratamiento previo*	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Total	27.042	19.957	7.083	10.160	15.561
Tratamiento previo (%)					
Si	39,5	40,1	37,7	100,0	0,0
No	60,5	59,9	62,3	0,0	100,0
Edad media (años)	47,1	46,9	47,5	48,5	46,2
Sexo					
Hombre	73,8	100,0	0,0	74,9	72,9
Mujer	26,2	0,0	100,0	25,1	27,1
Máximo nivel de estudios (%)					
Sin estudios	0,6	0,7	0,5	0,5	0,7
Primaria	41,9	44,7	33,8	43,9	40,9
Secundaria	45,6	44,8	47,8	45,0	45,7
Estudios superiores	11,9	9,8	17,9	10,5	12,8
Situación laboral (%)					
Trabajando	47,4	49,1	42,8	42,1	51,1
Parado no habiendo trabajado antes	2,7	2,4	3,4	2,7	2,7
Parado habiendo trabajado antes	30,5	29,6	33,0	34,4	27,9
Otras	19,4	19,0	20,8	20,7	18,4
Fuente de referencia principal (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	2,4	2,3	2,8	4,0	1,2
Médico general, Atención Primaria de Salud	26,3	26,5	25,9	21,3	29,4
Hospitales u otros servicios de salud	13,2	12,4	15,5	11,1	14,7
Servicios Sociales	4,0	3,3	6,0	4,1	4,0
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	1,6	2,1	0,3	1,5	1,5
Servicios legales o policiales	1,9	2,3	1,0	1,9	1,9
Empresas o empleador	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3
Familiares y amigos	11,0	11,7	8,8	9,0	12,4
Iniciativa propia	35,6	35,9	34,7	43,3	30,7
Servicios de educación	0,4	0,3	0,7	0,4	0,4
Otra	3,3	3,0	4,2	3,1	3,4

	Total	Sexo*		Tratamiento previo*	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	23,0	22,9	23,2	25,9	21,1
Únicamente con pareja	17,1	16,7	18,1	15,8	17,9
Únicamente con hijos/as	5,1	2,3	13,1	4,8	5,5
Con la pareja e hijos/as	22,6	23,8	19,3	19,5	24,7
Con padres o familia de origen	21,7	23,4	16,7	22,4	21,2
Con amigos/as	3,3	3,2	3,6	3,5	3,2
Detenido (Ej. centro penitenciario, centro de inserción social)	1,6	2,0	0,7	1,6	1,5
En instituciones no detenido (Ej. albergue)	2,5	2,5	2,2	3,2	2,0
Otros. Especificar	3,1	3,1	3,2	3,4	3,0
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,9	91,1	94,4	90,4	93,3
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	1,9	2,2	0,8	1,9	1,6
Otras instituciones	1,7	1,7	1,6	2,3	1,3
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,7	0,5	0,8	0,5
Alojamiento inestable/precario	2,4	2,7	1,5	3,0	1,9
Otros lugares	1,5	1,6	1,1	1,6	1,3
Español o extranjero (%)					
Extranjero	17,6	17,0	19,3	14,7	19,8
Español	82,4	83,0	80,7	85,3	80,2
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)					
Opioides	3,4	3,4	3,0	4,2	2,6
Cocaína	66,0	68,1	56,8	66,5	64,9
Estimulantes sin cocaína	4,8	4,7	5,0	4,8	4,7
Hipnosedantes	6,5	5,0	13,1	6,8	6,5
Alucinógenos	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4
Sustancias volátiles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cannabis	49,1	49,6	47,2	47,8	49,9
Otras sustancias psicoactivas	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1

	Total	Sexo*		Tratamiento previo*	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Edad de inicio droga principal (años)	18,2	17,4	20,7	17,9	18,4
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	56,9	58,1	53,4	54,3	58,6
4-6 días a la semana	7,4	7,0	8,6	6,8	7,7
2-3 días a la semana	12,2	11,7	13,5	10,6	13,2
1 día a la semana	3,9	3,7	4,3	3,5	4,2
Menos de 1 día a la semana	4,8	4,6	5,6	5,4	4,4
No consumió	14,9	15,0	14,6	19,5	11,9
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	99,6	99,6	99,7	99,6	99,6
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Intranasal o esnifada	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Inyectada o parenteral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inyección alguna vez en la vida (%)					
Sí	2,1	2,4	1,3	3,0	1,5
Inyección últimos 12 meses (%)					
Sí	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Inyección últimos 30 días (%)					
Sí	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1
Prevalencia mínima VIH (%)					
Positivo	0,9	1,1	0,6	1,1	0,9
Prevalencia de Hepatitis C mínima (%)					
Positivo	1,2	1,3	1,1	1,7	1,0
Prevalencia de Hepatitis B mínima (%)					
Portador crónico (HBs Ag positivo)	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.36.

Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2022.

	Alcohol	Cocaína polvo	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes	Otros opioides	Metadona
Total	27.042	19.314	12.574	7.585	2.429	1.079	1.470	616	352
Tratamiento previo (%)									
Sí	39,5	42,2	25,4	73,0	50,5	24,1	33,3	36,6	56,9
No	60,5	57,8	74,6	27,0	49,5	75,9	66,7	63,4	43,1
Sexo (%)									
Hombre	73,8	84,3	77,0	85,9	82,1	59,8	83,2	70,8	80,1
Mujer	26,2	15,7	23,0	14,1	17,9	40,2	16,8	29,2	19,9
Edad media (años)	47,1	38,4	28,4	45,1	39,2	41,4	36,6	46,9	46,9
Máximo nivel de estudios (%)									
Sin estudios	0,6	0,6	0,6	1,5	1,5	0,8	0,4	1,6	2,0
Primaria	41,9	47,7	50,2	67,2	59,9	44,7	27,3	42,9	71,6
Secundaria	45,6	45,2	43,8	28,3	35,3	40,3	48,9	44,1	20,8
Estudios superiores	11,9	6,5	5,4	3,1	3,4	14,2	23,4	11,4	5,6
Situación laboral (%)									
Trabajando	47,4	52,4	31,7	22,9	26,1	28,8	47,8	27,5	20,3
Parado no trabajado antes	2,7	3,3	8,7	7,7	8,4	8,8	3,8	4,5	14,4
Parado habiendo trabajado antes	30,5	33,6	29,9	49,2	47,7	35,8	34,8	30,1	43,3
Otras	19,4	10,6	29,7	20,2	17,7	26,5	13,6	38,0	22,0
Español o extranjero (%)									
Español	82,4	89,0	83,7	86,6	85,3	84,2	74,9	79,4	87,6
Extranjero	17,6	11,0	16,3	13,4	14,7	15,8	25,1	20,6	12,4
Fuente de referencia principal (%)									
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	2,4	3,5	2,0	11,7	5,6	2,1	5,9	5,3	15,7
Médico general, Atención Primaria de Salud	26,3	14,6	14,5	4,7	11,4	24,3	13,0	26,5	3,8
Hospitales u otros servicios de salud	13,2	6,4	10,5	2,5	5,6	18,8	12,8	16,8	3,2
Servicios Sociales	4,0	2,5	6,9	1,5	2,5	3,6	2,7	1,0	1,2
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	1,6	3,6	4,8	10,4	7,1	3,7	3,8	2,2	17,2
Servicios legales o policiales	1,9	4,7	10,8	2,1	5,2	1,9	6,3	0,8	1,7
Empresas o empleador	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Familiares y amigos	11,0	13,2	12,7	6,5	10,5	8,1	9,2	5,7	2,9
Iniciativa propia	35,6	48,6	30,9	58,1	48,6	31,6	38,1	37,8	51,9
Servicios de educación	0,4	0,3	1,1	0,1	0,4	0,6	0,3	0,5	0,0
Otra	3,3	2,6	5,7	2,3	3,1	5,1	7,5	3,3	2,3
Número de hijos	1,3	1,1	0,5	1,1	1,1	1,0	0,4	1,1	1,2

	Alcohol	Cocaína polvo	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes	Otros opioides	Metadona
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Solo/a	23,0	16,0	12,3	22,8	20,2	22,6	28,2	20,1	19,2
Únicamente con pareja	17,1	13,6	9,0	11,5	11,4	13,2	13,4	19,1	12,7
Únicamente con hijos/as	5,1	3,0	1,8	1,9	1,8	6,1	1,6	3,6	1,2
Con la pareja e hijos/as	22,7	23,2	11,8	11,6	12,7	13,8	5,9	21,7	11,2
Con padres o familia de origen	21,8	33,3	50,3	29,2	34,0	29,5	31,1	19,9	25,4
Con amigos/as	3,3	2,9	3,4	4,9	4,8	4,5	11,7	6,1	4,7
Detenido (ej. centro penitenciario, inserción social)	1,6	3,8	3,6	9,6	8,9	3,7	3,7	1,7	4,1
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,5	1,5	4,7	3,6	3,5	4,5	1,9	2,7	4,4
Otros	2,7	2,8	3,1	4,9	2,6	2,2	2,3	5,1	16,9
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Casas, pisos, apartamentos	91,9	91,5	88,5	73,5	78,0	86,4	89,0	89,6	70,3
Prisiones, centros reforma o internamiento menores	1,9	4,3	4,1	12,1	10,0	4,4	4,6	2,9	18,3
Otras instituciones	1,7	1,2	3,9	2,8	2,4	3,2	1,9	1,3	3,5
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,3	0,4	0,9	0,5	0,7	0,6	0,5	0,9
Alojamientos inestables/precarios	2,4	1,7	1,6	7,6	5,8	3,8	2,6	4,0	4,7
Otros lugares	1,5	1,0	1,5	3,1	3,4	1,5	1,3	1,7	2,3
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)									
Opioides	3,4	3,0	2,8	7,0	20,5	8,8	1,6	12,8	22,1
Cocaína	66,0	0,4	41,6	45,9	4,7	28,6	26,8	35,3	33,8
Estimulantes sin cocaína	4,8	5,4	10,9	1,9	3,7	11,0	16,8	4,3	3,4
Hipnosedantes	6,5	5,0	8,3	11,7	12,5	0,0	29,9	25,7	10,3
Alucinógenos	0,5	0,9	1,9	0,1	1,0	0,7	6,1	1,1	0,0
Sustancias volátiles	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,7	1,5	0,0	0,0
Cannabis	49,1	49,4	0,0	53,1	63,1	50,0	39,6	43,9	44,1
Alcohol	0,0	71,0	68,9	33,7	50,9	49,8	36,6	39,6	35,9
Otras sustancias psicoactivas	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	1,4	0,5	1,1	0,7
Edad de inicio droga principal	18,2	21,0	15,8	22,4	21,9	28,8	25,7	33,7	30,0
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Todos los días	56,9	24,8	69,6	56,2	42,8	83,8	24,3	77,7	89,4
4-6 días a la semana	7,4	13,1	4,6	5,0	12,5	2,9	9,1	2,2	2,9
2-3 días a la semana	12,2	24,4	6,1	6,4	15,9	3,8	21,5	5,1	,9
1 día a la semana	3,9	8,8	2,0	2,1	4,8	1,1	11,6	1,3	0,0
Menos de 1 día a la semana	4,8	10,6	3,3	3,3	7,6	2,0	14,2	1,9	,3
No consumió	14,9	18,3	14,3	26,9	16,3	6,4	19,3	11,8	6,6

	Alcohol	Cocaína polvo	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes	Otros opioides	Metadona
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Oral	99,6	3,2	1,5	1,0	,5	97,5	19,3	58,2	91,1
Pulmonar o fumada	0,3	0,7	97,7	83,0	94,4	1,6	15,7	21,4	7,4
Intranasal o esnifada	0,1	94,7	0,5	5,8	4,0	0,6	50,5	4,4	0,6
Parenteral o intravenosa	0,0	0,6	0,0	9,5	0,3	0,1	13,9	6,1	0,9
Otras	0,0	0,9	0,2	0,7	0,9	0,2	0,7	9,8	0,0
Se inyectó drogas (%)									
Alguna vez en la vida	2,1	2,4	1,5	35,4	9,3	4,8	25,0	19,0	39,1
Últimos 12 meses	0,3	0,8	0,2	10,3	1,9	1,7	20,8	7,4	5,5
Últimos 30 días	0,1	0,6	0,1	7,3	0,9	0,9	14,6	5,9	3,0
Prevalencia mínima VIH (%)	0,9	1,2	0,8	7,9	2,6	3,3	20,3	3,7	9,4
Prevalencia máxima de VIH (%)	2,8	3,4	3,3	15,8	6,5	9,9	38,4	10,5	22,4
Prevalencia mínima Hepatitis C (%)	1,2	1,1	0,8	15,2	3,7	2,9	7,6	4,4	15,9
Prevalencia máxima Hepatitis C (%)	3,8	3,5	3,6	31,0	9,8	9,1	16,8	12,7	37,3
Prevalencia mínima Hepatitis B (%)	0,4	0,2	0,2	0,8	0,2	0,6	0,5	0,2	1,4
Prevalencia máxima Hepatitis B (%)	1,7	1,0	1,3	2,6	1,0	2,4	1,8	0,8	5,0

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido)

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune).

Nota: Debido al redondeo algunos totales no suman.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.37.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento por sexo. España, 2022.

	Alcohol		Cocaína polvo		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Total	19.957	7.083	16.281	3.032	9.684	2.889	6.516	1.069	1.995	434	645	434	1.223	247
Tratamiento previo (%)														
Si	40,1	37,7	43,5	35,5	27,0	20,3	73,3	71,3	50,8	48,8	24,0	24,3	32,6	37,0
No	59,9	62,3	56,5	64,5	73,0	79,7	26,7	28,7	49,2	51,2	76,0	75,7	67,4	63,0
Edad media (años)	46,9	47,5	38,3	39,1	28,4	28,2	45,4	42,8	39,2	39,0	38,5	45,7	36,8	35,7
Máximo nivel de estudios (%)														
Sin estudios	0,7	0,5	0,5	0,9	0,7	0,3	1,5	1,3	1,5	1,4	1,1	0,2	0,5	0,0
Primaria	44,7	33,8	48,9	41,5	52,0	44,3	68,2	61,1	60,5	56,9	49,4	37,6	26,2	33,2
Secundaria	44,8	47,8	44,5	49,0	42,7	47,7	27,6	32,8	35,0	36,7	36,6	45,9	47,6	55,3
Estudios superiores	9,8	17,9	6,1	8,6	4,7	7,7	2,8	4,9	3,0	5,0	12,9	16,3	25,7	11,5

	Alcohol		Cocaína polvo		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Situación laboral (%)														
Trabajando	49,1	42,8	55,0	38,4	32,9	27,8	23,9	17,1	28,5	15,4	28,2	29,8	50,3	35,3
Parado, no habiendo														
trabajado antes	2,4	3,4	2,9	5,7	8,8	8,2	7,0	12,1	7,7	11,7	11,8	4,3	3,9	3,0
Parado, habiendo														
trabajado antes	29,6	33,0	32,2	41,3	29,7	30,6	48,8	51,5	47,4	49,2	35,9	35,6	33,6	40,9
Otras situaciones	19,0	20,8	9,9	14,6	28,6	33,5	20,4	19,3	16,4	23,8	24,1	30,3	12,2	20,9
Español o extranjero (%)														
Español	83,0	80,7	89,4	87,1	82,6	87,5	86,7	86,2	85,2	85,7	79,5	91,2	72,5	86,8
Extranjero	17,0	19,3	10,6	12,9	17,4	12,5	13,3	13,8	14,8	14,3	20,5	8,8	27,5	13,2
Fuente de referencia principal (%)														
Otro servicio de tratamiento de drogodependencias	2,3	2,8	3,4	4,0	2,0	2,0	11,0	16,2	5,5	6,3	2,2	1,9	5,6	7,1
Médico general o At. Primaria	26,5	25,9	14,6	14,5	14,6	14,2	4,8	4,0	11,7	9,8	23,9	25,1	12,6	14,6
Hospitales u otros serv. salud	12,4	15,5	5,7	9,9	9,5	14,0	2,3	3,4	5,4	6,6	16,4	22,5	11,9	17,5
Servicios Sociales	3,3	6,0	1,3	8,9	5,1	13,0	1,3	3,0	1,7	6,3	2,2	5,6	1,9	6,7
Centro penitenciario, de reforma o internamiento para menores	2,1	0,3	4,0	1,6	5,7	1,8	11,2	5,4	7,6	4,9	6,1	0,2	4,1	2,1
Servicios legales o policiales	2,3	1,0	5,0	2,9	11,9	7,1	2,3	1,3	5,6	3,3	2,7	0,7	6,3	6,7
Empresa o empleador	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0
Familiares o amigos/as	11,7	8,8	13,8	10,0	13,6	9,9	6,3	7,5	10,5	10,5	7,8	8,4	9,5	7,9
Iniciativa propia	35,9	34,7	49,5	43,6	31,3	29,5	58,5	55,8	48,8	47,8	32,3	30,4	40,1	28,3
Servicios de educación	0,3	0,7	0,2	0,5	1,0	1,5	0,1	0,2	0,5	0,2	0,8	0,2	0,2	0,8
Otra	2,4	3,1	2,3	4,1	5,3	7,1	2,1	3,3	2,9	4,2	5,8	4,2	7,4	8,3
Número de hijos	1,2	1,4	1,0	1,4	0,5	0,7	1,0	1,5	1,0	1,4	0,8	1,3	0,3	0,7
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Solo/a	22,9	23,2	16,2	14,7	12,2	12,2	23,0	21,6	20,1	17,6	22,7	21,1	28,5	24,2
Únicamente con pareja	16,7	18,1	13,3	14,8	8,3	10,8	10,1	20,2	9,4	19,3	10,3	16,8	13,3	12,7
Únicamente con hijos/as	2,3	13,1	1,4	11,7	0,6	6,1	1,1	6,8	1,1	4,6	1,9	12,2	0,7	6,4
Con la pareja e hijos/as	23,8	19,3	24,0	18,3	11,7	11,3	12,0	9,1	13,0	9,4	11,1	17,3	5,6	7,2
Con padres o familia de origen	23,4	16,7	34,2	28,4	51,2	45,5	30,6	19,9	34,9	25,1	32,9	22,8	30,3	32,2
Con amigos/as	3,2	3,6	2,7	3,9	3,3	3,4	4,7	5,8	4,3	6,3	4,9	3,6	12,5	6,8
Detenido (Ej. Centro penitenciario o inserción social)	2,0	0,7	4,1	2,1	4,1	1,5	10,2	6,1	9,1	7,0	5,5	0,7	3,7	3,4
En instituciones, no detenido (Ej. albergue)	2,5	2,2	1,3	2,5	4,7	4,3	3,4	4,9	2,9	6,0	5,6	2,4	1,9	1,7
Otros	3,1	3,2	2,6	3,6	3,8	4,8	4,8	5,7	5,3	4,8	5,2	3,1	3,6	5,5

	Alcohol		Cocaína polvo		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Casas, pisos, apartamentos	91,1	94,4	91,5	91,7	87,6	91,4	73,5	73,1	78,0	77,8	80,2	95,8	89,2	88,3
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	2,2	0,8	4,7	2,3	4,7	1,9	12,7	8,0	10,6	7,0	6,9	0,7	4,6	4,2
Otras instituciones	1,7	1,6	1,0	2,4	3,8	4,3	2,6	4,4	1,9	4,4	3,9	2,1	1,7	3,3
Pensiones, hoteles, hostales	0,7	0,5	0,2	0,8	0,4	0,4	0,9	1,2	0,5	0,2	0,9	0,2	0,6	0,8
Alojamiento inestable/ precarios	2,7	1,5	1,7	1,7	1,8	1,1	7,3	9,3	5,7	6,6	5,6	1,2	2,6	2,1
Otros lugares	1,6	1,1	0,9	1,2	1,7	0,9	2,9	4,1	3,3	4,0	2,5	0,0	1,3	1,3
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)														
Opioides	3,4	3,0	3,0	2,9	2,8	2,4	6,9	8,0	19,8	24,1	8,6	9,3	1,5	2,5
Cocaína	68,1	56,8	0,5	0,4	43,3	34,8	44,8	53,7	4,9	3,9	29,8	25,4	26,4	28,9
Estimulantes sin cocaína	4,7	5,0	5,2	6,3	10,5	12,7	1,7	3,0	3,5	4,3	13,2	5,1	18,6	6,6
Hipnosedantes	5,0	13,1	4,7	6,9	8,4	8,2	11,6	12,2	13,1	9,1	0,0	0,0	33,3	10,7
Alucinógenos	0,5	0,5	0,8	1,4	1,9	1,6	0,1	0,2	0,8	2,2	0,9	0,0	6,5	4,1
Sustancias Volátiles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	0,1	0,0	0,2	0,0	0,6	0,8	1,6	0,8
Cannabis	49,6	47,2	49,6	48,0	0,0	0,0	53,6	49,7	63,3	62,5	54,6	37,3	38,1	47,9
Alcohol	0,0	0,0	71,7	66,5	68,9	68,8	34,8	26,3	53,1	39,7	47,9	55,1	33,6	53,7
Otras sustancias psicoactivas	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,4	0,9	2,5	0,4	0,8
Edad de inicio droga principal	17,4	20,7	20,5	23,3	15,6	16,6	22,2	23,7	21,3	24,4	26,5	32,2	26,3	22,8
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Todos los días	58,1	53,4	25,0	24,1	70,0	68,4	56,7	53,5	42,6	44,1	81,6	87,0	22,9	31,7
4-6 días a la semana	7,0	8,6	13,3	11,8	4,6	4,6	5,3	3,5	12,7	11,7	3,7	1,7	8,6	11,7
2-3 días a la semana	11,7	13,5	24,6	23,2	6,2	5,9	6,2	7,4	16,3	14,1	4,5	2,8	22,4	17,1
1 día a la semana	3,7	4,3	8,9	8,5	2,0	2,1	2,1	1,8	4,5	6,1	1,1	1,2	12,8	5,8
Menos de 1 día a la semana	4,6	5,6	10,6	10,6	3,0	4,1	3,3	3,3	7,6	7,5	2,4	1,4	14,9	10,8
No consumió	15,0	14,6	17,6	21,9	14,1	15,0	26,3	30,5	16,2	16,4	6,7	5,9	18,6	22,9
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)														
Oral	99,6	99,7	3,1	3,6	1,6	1,4	1,0	0,8	0,5	0,5	97,3	97,9	17,6	27,7
Pulmonar o fumada	0,3	0,2	0,7	0,5	97,7	98,0	82,8	83,9	94,0	96,3	1,4	1,9	17,4	7,0
Intranasal o esnifada	0,1	0,1	94,8	94,0	0,6	0,4	5,6	7,1	4,4	2,1	0,8	0,2	47,8	63,6
Parenteral o intravenosa	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	9,9	7,0	0,3	0,5	0,2	0,0	16,6	0,4
Otras	0,0	0,0	0,9	1,2	0,2	0,2	0,6	1,2	1,0	0,7	0,3	0,0	0,6	1,2
Se inyectó drogas (%)														
Alguna vez en la vida	2,4	1,3	2,4	2,2	1,7	1,1	36,4	29,3	9,2	9,8	6,1	2,8	29,0	5,4
Últimos 12 meses	0,3	0,2	0,8	0,9	0,2	0,3	10,5	8,8	1,8	2,6	2,1	1,0	24,7	1,4
Últimos 30 días	0,1	0,0	0,6	0,5	0,1	0,1	7,5	5,7	1,0	0,8	1,4	0,3	17,4	0,5
Prevalencia mínima VIH (%)	1,1	0,6	1,1	1,5	0,9	0,4	7,5	9,9	2,3	4,1	4,5	1,6	24,0	2,4
Prevalencia máxima de VIH (%)	3,2	1,6	3,3	4,1	3,9	1,4	15,2	19,0	5,7	9,8	12,6	5,2	43,4	5,8
Prevalencia mínima Hepatitis C (%)	1,3	1,1	1,1	1,3	0,9	0,6	15,3	14,8	3,7	3,9	3,7	1,6	8,7	2,0
Prevalencia máxima Hepatitis C (%)	4,0	3,1	3,4	3,8	4,1	2,4	31,3	29,5	9,8	10,1	11,4	5,5	18,6	5,5
Prevalencia máxima Hepatitis B (%)	1,9	1,2	1,0	0,8	1,5	0,7	2,9	1,0	0,8	1,8	3,1	1,1	1,5	3,4
Prevalencia mínima Hepatitis B (%)	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,9	0,3	0,2	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8

* Estimulantes distintos de la cocaína.

Notas:

– Prevalencia mínima: positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocidos). En hepatitis B, portador crónico entre el total (incluye portador crónico, inmune, no inmune, pendiente de resultado y desconocidos).

– Prevalencia máxima: positivos entre los casos con información (incluye positivos y negativos); en hepatitis B, portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune.

– El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

– El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.38.

Edad media de inicio en el tratamiento actual, del primer uso y latencia primer uso hasta el tratamiento actual. España, 2022.

	Edad media de entrada a tratamiento	Edad media de primer uso	Latencia (inicio-entrada a tratamiento)
Opioides (total)	45,27	23,48	21,87
Heroína	45,06	22,41	22,73
Metadona	46,92	30,04	17,74
Buprenorfina	49,41	38,58	10,63
Fentanilo	51,82	44,20	7,75
Otros opioides	45,34	30,30	14,76
Cocaína (total)	38,51	21,05	17,47
Cocaína polvo	38,43	20,96	17,47
Cocaína base	39,18	21,87	17,36
Estimulantes distintos de cocaína	36,61	25,75	10,90
Anfetaminas	37,28	22,39	14,98
Metanfetamina	37,22	29,45	7,82
Extasis y derivados	28,38	21,47	6,86
Catinonas sintéticas	37,75	33,13	4,61
Otros estimulantes	36,16	24,40	11,47
Hipnosedantes	41,39	28,80	12,31
Alucinógenos	30,51	22,29	8,14
Inhalantes volátiles	32,05	26,11	5,95
Cannabis	28,35	15,83	12,48
Total	36,97	20,41	16,50

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.39.

Número de casos admitidos a tratamiento por grupos de edad en función de la droga principal. España, 2022.

	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	>=65	Desc.	Total)
Opioides (total)	1	31	172	359	659	1.116	1.482	1.659	1.609	978	353	134	0	8.553
Heroína	0	22	157	323	597	1.016	1.317	1.484	1.432	857	295	85	0	7.585
Metadona	0	1	1	3	23	39	68	76	78	40	16	7	0	352
Buprenorfina	0	0	0	0	2	1	5	7	6	5	3	0	0	29
Fentanilo	0	0	2	2	6	3	18	27	20	22	14	16	0	130
Otros opioides	1	8	12	31	31	57	74	65	73	54	25	26	0	457
Cocaína (total)	4	260	1.187	2.231	3.731	4.553	4.359	2.858	1.483	744	231	101	0	21.742
Cocaína CLH	3	229	1.044	1.991	3.332	4.118	3.869	2.551	1.265	635	194	82	0	19.313
Cocaína base	1	31	143	240	399	435	490	307	218	109	37	19	0	2.429
Estimulantes dif. cocaína	1	48	121	201	261	273	235	176	101	37	13	3	0	1.470
Anfetaminas	1	26	64	90	130	145	149	109	63	15	8	1	0	801
Metanfetaminas	0	0	7	25	37	27	19	20	8	5	2	0	0	150
Éxtasis	0	19	32	19	22	14	8	7	1	0	0	0	0	122
Catinonas sintéticas	0	0	13	60	61	81	52	33	27	16	3	0	0	346
Otros estimulantes	0	3	5	7	11	6	7	7	2	1	0	2	0	51
Hipnosedantes	2	75	102	90	97	109	130	144	115	102	54	59	0	1.079
Alucínógenos	1	7	27	33	31	13	9	4	5	0	1	0	0	131
Sustancias volátiles	0	2	2	1	8	3	2	0	0	1	0	0	0	19
Cannabis	209	3.189	2.301	1.841	1.706	1.269	887	534	314	188	98	38	0	12.574
Otras sustancias	0	14	21	23	26	31	28	23	18	16	3	6	0	209
Total	218	3.626	3.940	4.782	6.531	7.382	7.149	5.410	3.649	2.070	754	341	0	45.852

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.40.

Número de casos que entran a tratamiento en función de que presenten policonsumo* de sustancias, total y en función del tratamiento previo. España, 2022.

	Policonsumo Si	Policonsumo No	Total
Sin tratamiento previo	8.428	16.469	24.897
Con tratamiento previo	6.137	12.191	18.328
Desconocido	348	2.280	2.628
Total admisiones	14.913	30.940	45.853


Nota: Se utiliza el término "policonsumo" cuando el sujeto consume más de una sustancia y resulta "prácticamente imposible" identificar cuál es la droga principal. Es decir, cuál es la droga que el terapeuta considera que ha producido la dependencia o los problemas clínicos o sociales más importantes que han motivado la admisión a tratamiento.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2022*

2.2.1.

Evolución de las urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España*, 1998-2022.



* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.


Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

* Existe información ampliada de la serie histórica para muchos gráficos y tablas de este capítulo (por lo general, se muestran a partir del año 1998); la serie completa se puede consultar <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>

2.2.2.

Evolución del número de urgencias relacionadas con el uso de analgésicos opioides*. España, 2005-2022.




* Incluye morfina, fentanilos, peetidina, tramadol, buprenorfina, codeína, dextrometorfano, hidromorfona, oxycodona y tapentadol.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Proporción de urgencias por tipo de opiáceo notificado en el total de urgencias relacionadas con opiáceos. España*, 2005-2022.



* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** Otros opiáceos: opiáceos distintos de la heroína y de los analgésicos opioides. Incluye: metadona, opio y otros opiáceos sin especificar.

*** Analgésicos opioides: incluye morfina, fentanilos, peetidina, tramadol, buprenorfina, codeína, dextrometorfano, hidromorfona, oxycodona y tapentadol.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España*, 1998-2022.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnóticos y sedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y derivados	Alucinógenos	Inhalables volátiles
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4
2014	6.441	43,7	38,7	35,5	18,5	10,3	8,6	7,6	4,5	2,5	0,3
2015	5.238	43,5	39,8	42,2	18,2	11,2	8,0	7,4	3,7	1,6	0,3
2016	4.565	42,5	43,9	40,1	20,5	8,6	7,5	7,7	3,2	1,5	0,3
2017	4.293	50,2	37,1	50,3	16,9	9,0	8,7	10,3	2,8	1,5	0,5
2018	5.027	52,0	39,0	49,4	17,9	7,4	7,6	10,1	3,4	1,4	0,5
2019	5.352	50,7	40,3	50,6	19,5	7,0	7,8	9,9	3,8	1,8	0,5
2020	4.657	39,9	40,6	44,9	34,6	6,7	5,7	8,9	2,6	0,8	0,4
2021	6.209	40,3	41,4	44,5	35,9	5,0	7,3	8,1	2,8	1,3	0,2
2022	6.627	46,1	43,4	46,2	30,7	4,9	7,7	5,6	3,8	1,4	0,5

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5.

Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1998-2022.

	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nº episodios	2.099	2.328	2.673	5.828	7.042	6.431	5.626	5.999	6.441	5.238	4.565	4.293	5.027	5.352	4.657	6.209	6.627
Edad media (años)	29,1	30,3	29,8	31,0	31,6	32,4	32,6	32,8	33,2	34,1	34,3	34,6	34,8	34,1	36,5	36,1	35,8
Sexo (%)																	
Mujeres	23,1	27,4	27,4	28,0	26,1	22,7	26,3	26,1	24,5	22,6	22,6	22,7	25,3	25,7	29,3	30,6	32,2
Sustancias psicoactivas relacionadas (%)																	
Heroína	38,7	35,3	21,4	17,5	16,9	17,2	17,8	13,0	10,3	11,2	8,6	9,0	7,4	7,0	6,7	5,0	4,9
Otros opiodes	16,8	18,0	13,1	9,1	8,5	7,5	6,7	6,1	7,6	7,4	7,7	10,3	10,1	9,9	8,9	8,1	5,6
Cocaína	31,6	40,9	44,7	50,0	51,1	55,1	49,5	46,0	43,7	43,5	42,5	50,2	52,0	50,7	39,9	40,3	46,1
Anfetaminas	3,0	2,2	3,4	2,3	4,7	4,4	5,5	8,9	8,6	8,0	7,5	8,7	7,6	7,8	5,7	7,3	7,7
MDMA y derivados	2,2	4,5	5,3	3,2	6,4	4,2	2,9	4,6	4,5	3,7	3,2	2,8	3,4	3,8	2,6	2,8	3,8
Hipnosedantes	24,3	28,9	30,1	22,3	21,0	15,6	16,7	18,3	18,5	18,1	20,5	16,9	17,9	19,5	34,6	35,9	30,7
Cannabis	8,9	12,8	19,9	19,3	23,9	24,7	30,5	33,0	35,5	42,2	40,1	50,3	49,4	50,6	44,9	44,5	46,2
Alucinógenos	2,4	2,7	1,3	0,8	1,7	1,6	1,7	2,5	2,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,8	0,8	1,3	1,4
Inhalables volátiles	0,3	0,3	0,2	0,6	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,5
Alcohol	22,2	26,8	35,4	30,7	36,0	37,3	36,3	39,0	38,7	39,8	43,9	37,1	39,0	40,3	40,6	41,4	43,4
Resolución urgencia (%)																	
Alta médica	81,2	78,7	82,1	81,4	76,2	80,0	79,6	75,9	69,8	72,2	71,6	71,1	72,7	73,0	70,4	73,4	77,0
Alta voluntaria	8,8	8,5	7,4	5,3	8,6	8,5	7,0	8,2	9,9	8,2	8,2	8,3	8,4	8,8	7,9	7,5	6,3
Ingreso hospitalario	6,0	8,3	6,3	8,0	8,8	7,8	10,2	12,5	15,9	16,0	17,0	17,1	15,2	15,1	17,3	14,3	12,9
Muerte en urgencias	0,0	0,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Traslado a otro centro	3,9	3,7	4,0	5,3	6,3	3,7	3,2	3,3	4,2	3,6	3,1	3,5	3,7	3,1	4,3	4,7	3,8

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Notas: Incluye las sustancias para las que el médico expresa en la historia clínica una relación directa con la urgencia. El alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

En esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Evolución vía de administración (número y porcentaje) de los episodios de urgencias hospitalarias en consumidores de drogas, según tipo de droga. España*, 2012-2022.

Drogas y vía de administración		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Heroína	Oral	0,8	0,2	1,5	1,5	2,2	2,7	9,0	5,3	9,6	8,0	7,4
	Pulmonar o fumada	25,4	30,6	25,7	26,0	50,0	61,0	50,7	57,3	54,2	59,3	55,4
	Intranasal o esnifada	8,9	9,5	5,2	5,3	6,7	5,1	11,9	13,6	8,5	9,9	8,4
	Parenteral o inyectada	64,9	59,6	67,7	68,5	41,1	30,7	27,9	23,8	27,7	21,6	28,2
	Otra vía	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,2	0,5
Otros opioides	Oral	96,8	98,7	89,3	85,0	91,3	95,1	95,9	95,0	92,1	93,0	93,4
	Pulmonar o fumada	0,8	0,4	1,8	3,2	1,7	1,4	0,8	1,5	4,4	1,7	1,7
	Intranasal o esnifada	1,0	0,1	0,0	2,4	0,4	0,0	0,6	0,5	0,3	0,8	0,7
	Parenteral o inyectada	0,8	0,5	7,7	7,3	6,1	1,6	1,1	1,5	2,2	3,1	2,6
	Otra vía	0,6	0,2	1,2	2,0	0,4	1,9	1,6	1,5	1,0	1,4	1,7
Cocaína	Oral	1,0	0,5	2,3	2,0	3,3	2,5	1,6	2,1	5,0	1,7	2,0
	Pulmonar o fumada	18,2	18,5	10,4	18,4	17,9	11,1	11,8	14,1	13,4	9,8	12,2
	Intranasal o esnifada	57,5	61,2	72,7	71,6	73,5	85,6	85,1	81,9	78,5	85,4	82,9
	Parenteral o inyectada	23,1	19,6	14,4	10,0	8,6	3,3	1,5	1,7	2,5	3,2	2,9
	Otra vía	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0
Anfetaminas	Oral	78,0	69,9	71,9	68,2	65,9	72,3	75,0	73,2	73,5	70,5	74,4
	Pulmonar o fumada	5,9	10,6	4,5	7,1	4,8	9,9	2,4	3,0	2,4	4,4	3,9
	Intranasal o esnifada	16,1	18,7	21,9	24,7	27,8	17,7	22,6	23,4	23,5	23,5	18,9
	Parenteral o inyectada	0,0	0,4	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,4	0,6	1,6	2,8
	Otra vía	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA	Oral	97,4	98,6	95,3	92,1	98,1	100,0	96,2	96,2	93,7	88,9	93,9
	Pulmonar o fumada	1,1	0,0	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,1	1,8
	Intranasal o esnifada	1,6	0,0	2,4	4,8	1,9	0,0	3,8	3,8	3,8	6,1	4,4
	Parenteral o inyectada	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Otra vía	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes	Oral	99,3	99,5	98,8	99,3	99,5	98,5	99,1	99,1	99,5	99,3	99,7
	Pulmonar o fumada	0,2	0,2	0,8	0,2	0,3	0,7	0,6	0,6	0,2	0,4	0,1
	Intranasal o esnifada	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
	Parenteral o inyectada	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
	Otra vía	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cannabis	Oral	2,4	2,2	5,3	4,3	5,1	1,8	4,8	4,8	5,9	3,8	3,8
	Pulmonar o fumada	97,3	97,3	93,5	95,5	94,8	98,1	94,8	94,8	93,7	95,3	95,8
	Intranasal o esnifada	0,3	0,4	0,7	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,8	0,4
	Parenteral o inyectada	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Otra vía	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
Alucinógenos	Oral	73,3	54,8	37,1	76,1	82,8	77,8	86,6	86,6	96,0	75,7	80,6
	Pulmonar o fumada	2,7	11,3	2,2	13,0	3,4	0,0	6,7	6,7	4,0	0,0	2,8
	Intranasal o esnifada	14,7	17,7	16,9	2,2	13,8	22,2	6,7	6,7	0,0	13,5	16,7
	Parenteral o inyectada	6,7	16,1	43,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0
	Otra vía	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.7.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España*, 2022.



2.2.8.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes si están acompañados de otra sustancia). Total, según sexo y según droga. España*, 2022.

	Total	Según sexo		Según droga							
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Cannabis	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Número de episodios	6.627	4.487	2.135	2.857	2.862	305	475	347	238	85	30
Edad media (años)	35,8	36,5	34,5	38	32,2	41,4	34,3	42,5	29,8	30,8	30,9
Sexo (%) mujeres	32,2			24,2	25,6	22,3	27,6	32,2	28,7	23,5	33,3
Resolución de la urgencia (%)											
Alta médica	77,0	77,2	76,7	77,9	77,1	75,1	72,8	72,6	82,8	78,8	76,7
Alta voluntaria	6,3	6,6	5,6	7,4	5,6	8,6	5,3	9,1	5,6	5,9	0,0
Ingreso hospitalario	12,9	12,4	13,8	10,9	13,5	13,0	16,3	15,9	7,8	11,8	10,0
Muerte en urgencias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	3,8	3,7	3,9	3,7	3,8	3,3	5,5	2,4	3,9	3,5	13,3

* Comunidades autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.9.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancia única). Total, según sexo y según droga. España*, 2022.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Número de episodios	12.924	8.115	4.801	2.857	7.265	2.862	3.621	305	475	347	238	85	30
Edad media (años)	36,9	38,3	34,4	38,0	38,0	32,2	37,4	41,4	34,3	42,5	29,8	30,8	30,9
Sexo (%) mujeres	37,2			24,2	31,8	25,6	55,9	22,3	27,6	32,2	28,7	23,5	33,3
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	79,2	78,1	81,1	77,9	80,7	77,1	77,4	75,1	72,8	72,6	82,8	78,8	76,7
Alta voluntaria	7,1	8,0	5,6	7,4	8,4	5,6	5,5	8,6	5,3	9,1	5,6	5,9	0,0
Ingreso hospitalario	10,8	11,1	10,1	10,9	8,8	13,5	13,3	13,0	16,3	15,9	7,8	11,8	10,0
Muerte en urgencias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	2,9	2,8	3,1	3,7	2,1	3,8	3,8	3,3	5,5	2,4	3,9	3,5	13,3

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.10.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes si están acompañados de otra sustancia), según sexo. España*, 2022.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	46,1	50,8	35,8
Alcohol**	43,4	43,6	42,9
Cannabis	46,2	49,9	38,1
Hipnosedantes**	30,7	24,9	43,5
Otros opioides	4,9	5,6	3,5
Anfetaminas	7,7	8,0	6,8
Heroína	5,6	5,5	5,9
MDMA y derivados	3,8	4,0	3,5
Alucinógenos	1,4	1,5	1,0
Inhalables volátiles	0,5	0,5	0,5

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.11.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancia única), según sexo. España*, 2022.

	Total	Hombres	Mujeres
Alcohol	58,2	62,8	50,3
Hipnosedantes	29,0	20,2	44,0
Cannabis	22,9	27,0	16,0
Cocaína	22,9	27,4	15,0
Otros opioides	2,8	3,0	2,5
Heroína	2,4	3,0	1,5
Anfetaminas	3,8	4,3	2,9
MDMA y derivados	1,9	2,1	1,5
Alucinógenos	0,7	0,8	0,4
Inhalables volátiles	0,2	0,3	0,2

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.12.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas). España*, 2020-2022.

	2020	2021	2022
Número de episodios	9.239	12.476	12.924
Edad media (años)	38,2	36,8	36,9
Sexo (%)			
Mujeres	34,8	36,8	37,1
Sustancias psicoactivas relacionadas (%)			
Heroína	3,3%	2,4%	2,4%
Otros opioides	4,4%	3,9%	2,8%
Cocaína	20,0%	19,3%	22,9%
Anfetaminas	2,9%	3,5%	3,8%
MDMA y derivados	1,3%	1,3%	1,9%
Hipnosedantes	33,6%	33,5%	29,0%
Cannabis	22,5%	21,3%	22,9%
Alucinógenos	0,4%	0,6%	0,7%
Inhalables volátiles	0,2%	0,1%	0,2%
Alcohol	54,0%	55,5%	58,2%
Resolución urgencia(%)			
Alta médica	73,1%	75,6%	79,2%
Alta voluntaria	8,5%	8,7%	7,1%
Ingreso hospitalario	14,8%	12,1%	10,8%
Muerte en urgencias	0,1%	0,0%	0,0%
Traslado a otro centro	3,5%	3,6%	2,9%


* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Notas: Incluye las sustancias para las que el médico expresa en la historia clínica una relación directa con la urgencia. El alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.


2.2.13.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según sexo. España*, 2022.




2.2.14.

Sintomatología* que provoca la urgencia en función de las drogas que se relacionan (%). España**, 2022.



2.2.15.

Prevalencia de patología dual en los episodios de urgencias en los que se detecta únicamente una sustancia, en función de la sustancia detectada (%). España, 2021-2022.




** Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.16.

Tipo de consumo de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España*, 2022.



* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: El alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2022*

2.3.1.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2022.

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
Estimación nacional	266	440	453	516	741	1.067	1.440	1.440	1.833	1.760	1.399	1.067	1.051	
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	82	139	143	163	234	337	455	455	579	558	444	388	395	
Registro General de Mortalidad (INE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Estimación nacional	1.310	1.127	1.049	972	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	703	773	
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	-	-	-	-	444	496	496	493	468	455	428	475	424	
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	421	339	306	291	284	268	229	270	212	242	218	188	139	
Registro General de Mortalidad (INE)	-	-	-	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Estimación nacional	739	706	736	707	727	767	936	866	782	777	1.015	978	1.046	1.266
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	438	517	408	519	489	556	600	613	696	732	920	974	1.046	1.266
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210	212	259	305
Registro General de Mortalidad (INE)	442	393	361	383	403	455	390	483	437	450	546	774	820	929

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.


Registro General de Mortalidad (INE - Instituto Nacional de Estadística): Se incluyen los códigos CIE-10: F11, F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

* Existe información ampliada de la serie histórica para muchos gráficos y tablas de este capítulo (por lo general, se muestran a partir del año 1998); la serie completa se puede consultar <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>

2.3.2.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2022.



Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro General de Mortalidad (INE - Instituto Nacional de Estadística): Se incluyen los códigos CIE-10: F11, F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2004-2022.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nº de fallecidos	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732	920	974	1.046	1.266
Casos analizados	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632	657	819	872	910	1.037
Sexo (%)																			
Varones	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7	80,9	80,6	83,4	78,1	81,6	80,8	77,4	78,0	77,7
Mujeres	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3	19,1	19,4	16,6	21,9	18,4	19,2	22,6	22,0	22,3
Edad media (años)	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42,0	42,7	44,3	43,6	44,1	44,5	44,9	44,4	45,5	46,7	46,8
Grupo de edad (años)																			
15-19 años	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,5	0,0	0,3	0,8	0,9	1,2	0,9
20-24 años	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4	1,5	2,7	1,8	1,0	2,2	2,6	1,5	2,7	2,8
25-29 años	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6	4,7	4,7	5,4	5,5	4,4	4,1	4,7	4,5	4,0
30-34 años	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1	10,4	9,3	8,3	8,3	7,8	9,1	7,3	6,4	6,7
35-39 años	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7	13,8	18,3	14,0	15,9	13,0	12,7	11,5	10,4	10,0
40-44 años	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6	17,7	16,5	19,4	16,7	16,5	17,8	17,1	14,1	15,6
≥45 años	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3	51,2	47,7	50,6	52,6	55,8	52,9	56,9	60,7	59,8

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Estado civil (%)																				
Soltero	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3	59,3	64,8	64,2	63,3	62,9	62,0	59,6	61,6	59,9	
Casado	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9	14,5	17,8	17,8	20,9	17,2	20,1	19,1	17,2	20,0	
Separado**	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9	23,1	16,5	15,6	13,9	17,8	15,6	17,7	18,9	16,9	
Viudo	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,0	3,1	0,9	2,5	1,9	2,1	2,4	3,6	2,3	3,1	
Procedencia del cadáver (%)																				
Domicilio	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7	74,4	72,6	68,5	71,9	68,7	70,6	69,4	70,6	70,4	
Hotel-Pensión	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1	2,4	3,3	3,8	4,0	2,6	3,6	4,7	2,7	3,8	
Calle	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1	10,1	8,2	8,2	6,1	7,5	9,1	9,4	10	10,6	
Local público	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5	0,9	2,1	2,1	3,0	2,6	2,2	1,8	2,3	1,5	
Hospital	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6	5,5	5,9	8,4	7,7	6,6	6,0	5,8	6,9	6,0	
Cárcel	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1	1,5	3,1	3,3	2,7	5,6	3,1	3,2	2,3	3,0	
Otra	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0	5,1	4,7	5,6	4,6	6,5	5,4	5,7	5,3	4,8	
Evidencias de consumo reciente (%)																				
Sí	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8	81,8	84,9	82,0	88,1	80,4	85,4	83,8	75,0	79,4	
No	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2	18,2	15,1	18,0	11,9	19,6	14,6	16,2	25,0	20,6	
Evidencia de suicidio (%)																				
Sí	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1	20,3	26,4	20,6	22,9	18,4	23,2	26,1	26,9	18,5	
No	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9	79,7	73,6	79,4	77,1	81,6	76,8	73,9	73,1	81,5	
Signos recientes venopunción (%)																				
Sí	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2	12,5	13,5	13,0	13,3	11,3	12,8	8,7	8,2	5,6	
No	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8	87,5	86,5	87,0	86,7	88,7	87,2	91,3	91,8	94,4	
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)																				
Sí	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0	35,4	27,0	31,5	38,2	31,0	27,9	35,7	36	32,7	
No	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0	64,6	73,0	68,5	61,8	69,0	72,1	64,3	64	67,3	
Anticuerpos anti-VIH (%)																				
Positivo	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5	27,2	26,2	21,4	22,1	25,8	18,0	17,4	18,3	14,7	
Negativo	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5	72,8	73,8	78,6	77,9	74,2	82,0	82,6	81,7	85,3	

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

** Separado/divorciado

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.4.

Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en función del sexo. España*, 2022.


		Hombres	Mujeres
Sexo (N)	Hombre	982	–
	Mujer	–	282
Edad categorías (%)	Menor de 20 años	0,9	1,1
	Entre 20 y 24 años	2,9	2,9
	Entre 25 y 29 años	4,3	3,2
	Entre 30 y 34 años	6,5	7,5
	Entre 35 y 39 años	10,2	9,6
	Entre 40 y 44 años	17,1	11,1
	45 o más años	58,1	64,6
Estado civil (%)	Soltero	64,5	45,8
	Casado	18,0	26,4
	Separado legalmente/Divorciado	15,9	20,1
	Viudo	1,6	7,6
Procedencia del cadáver (%)	Domicilio	68,9	76,1
	Hotel/Pensión	3,7	4,1
	Calle	11,7	6,7
	Establecimiento público	1,8	0,4
	Hospital	5,3	8,6
	Cárcel	3,4	1,5
	Otro lugar	5,3	2,6
Evidencias de consumo reciente de sustancias psicoactivas (%)	Sí	78,0	84,0
	No	22,0	16,0
Signos de autopsia compatible con muerte RASUPSI (%)	Sí	83,8	85,3
	No	16,2	14,7
Diagnóstico forense de muerte (%)	Sí	85,0	87,4
	No	15,0	12,6
Evidencias de suicidio (%)	Sí	13,3	37,2
	No	86,7	62,8
Signos recientes de venopunciones (%)	Sí	5,6	5,1
	No	94,4	94,9
Muerte cuya causa es una patología previa (%)	Sí	34,5	26,4
	No	65,5	73,6
Anticuerpos del VIH (%)	Positivo	15,5	12,6
	Negativo	84,5	87,4

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.5.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1996-2022.



* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.6.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1996-2022.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Opioides	90,4	89,8	90,1	88,0	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7	72,8	77,7	
Cocaína	32,7	41,4	51,2	63,3	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0	67,0	60,2	
Hipnosedantes	47,7	58,6	47,4	48,8	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7	46,9	45,1	
Anfetaminas	4,0	8,6	2,8	4,5	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6	3,6	2,2	
Cannabis	6,5	12,2	11,3	14,3	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8	14,6	15,6	
MDMA	0,1	1,5	0,0	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7	1,1	1,4	
Alcohol**	27,7	28,6	26,2	30,5	35,5	35,3	42,5	39,0	35,8	33	34,3	27,8	25,9	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opioides	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	64,0	64,7	63,9	58,1	58,6	59,0	59,5	55,7	51,2
Cocaína	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	51,7	48,8	53,7	53,2	61,6	60,3	52,9	52,4	59,9
Hipnosedantes	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	65,8	68,0	67,3	68,0	63,2	66,8	63,3	66,3	66,0
Anfetaminas	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	7,9	4,4	6,2	5,9	5,8	6,8	6,5	9,3	5,2
Cannabis	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	16,5	23,4	23,4	20,7	24,8	25,5	22,4	22,9	22,1
Extasis	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	3,5	2,3	2,8	1,7	4,3	2,3	1,9	1,9	3,6
Alcohol**	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	40,8	39,8	42,9	44,0	47,5	39,7	30,5	36,4	36,8


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.7.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España*, 2022.



* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.8.


Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España*, 2005-2022.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo cocaína)	14,5	13,8	17,3	12,5	11,0	12,2	13,7	12,3	12,1	13,1	13,5	16,8	22,0	21,3	20,5	13,9	15,6	24,3
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye solo cocaína)	20,4	18,5	25,1	18,9	16,4	18,0	17,2	19,0	19,7	17,7	18,0	20,0	25,5	26,8	26,0	22,0	21,3	29,5
Sólo cocaína	5,9	4,7	7,8	6,4	5,4	5,8	3,4	6,7	7,6	4,6	4,4	3,2	3,5	5,5	5,5	8,1	5,7	5,2
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo opioides)	25,7	32,0	22,9	28,5	31,4	33,3	38,7	35,1	38,2	26,9	32,0	30,1	27,4	21,9	22,6	25,8	22,4	19,4
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides)	29,7	36,7	30,7	35,8	39,6	39,7	42,9	37,9	42,8	30,0	33,8	32,1	30,4	23,7	24,7	28,7	24,6	20,8
Sólo opioides	4,0	4,7	7,8	7,3	8,2	6,4	4,2	2,7	4,6	3,1	1,7	2,0	3,0	1,8	2,1	2,9	2,2	1,4
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides y cocaína)	48,8	40,0	40,8	40,3	41,5	39,5	35,0	39,5	34,3	34,0	30,9	33,7	27,7	34,9	34,3	30,8	31,1	30,4
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, sin sólo opioides y cocaína)	39,6	29,4	29,3	26,4	31,9	33,5	31,1	34,7	29,3	29,0	27,2	29,3	24,2	30,7	31,7	28,1	28,1	27,7
Solo opioides y cocaína	9,2	10,5	11,6	13,9	9,6	6,0	3,9	4,8	5,0	5,0	3,7	4,4	3,5	4,1	2,6	2,8	3,0	2,7
Número de defunciones con información toxicológica	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632	657	819	872	910	1.037
Número total de fallecidos	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732	920	974	1.046	1.266

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.9.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España*, 2003-2022.




	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Opioides	376	349	356	338	340	324	346	409	318	366
Cocaína	305	280	315	250	313	251	247	297	213	280
Benzodiazepinas	234	225	241	203	212	186	180	292	258	291
Anfetaminas	15	12	12	15	17	9	13	8	19	18
Cannabis	82	78	95	70	68	65	88	123	100	107
Alcohol	191	167	150	143	130	108	120	149	136	138
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408	478
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opioides	337	333	335	320	367	385	483	519	507	531
Cocaína	236	269	253	269	336	405	494	461	477	621
Benzodiazepinas	265	327	336	319	403	410	522	522	587	653
Anfetaminas	27	41	23	31	37	38	56	57	85	54
Cannabis	94	86	121	117	131	163	209	195	208	229
Alcohol	136	212	206	215	278	312	325	266	331	382
Casos analizados	437	520	518	501	632	657	819	872	910	1037

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.10.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opiode, aunque haya otras sustancias). España*, 2005-2022.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sólo metadona	0,6	2,8	4,2	2,4	2,6	2,7	2,2	1,1	2,1	1,5	0,6	1,0	0,9	0,8	1,3	1,6	0,9	0,6
Metadona	36,5	39,8	37,5	30,0	32,4	47,4	49,7	52,2	47,8	36,9	32,4	36,3	30,2	32,4	28,8	28,8	29,3	25,8
Metadona y no otro opiode	15,1	27,4	24,4	20,6	21,9	30,7	34,6	40,2	34,8	20,0	16,4	19,2	18,4	19,2	11,7	13,3	18,7	11,8

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.11.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína(cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España*, 2000-2022.



	2000	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cocaína y no opioides	6,1	11,3	16,4	20,4	18,5	25,1	18,9	16,4	18,0	17,2	19,0	19,7	17,7	18,0	20,0	25,5	26,8	26	22	21,3	29,5
Sólo cocaína	2,9	2,6	7,5	5,9	4,7	7,8	6,4	5,4	5,8	3,4	6,7	7,6	4,6	4,4	3,2	3,5	5,5	5,5	8,1	5,7	5,2
Sólo cocaína y alcohol				4,1	3,5	2,9	4	4,7	2,1	4,6	3,8	3,2	3,5	5,4	3,3	4,7	6,5	4,7	3,2	2,8	6,5

*Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador. Calculados sobre los casos con alguna sustancia

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.12.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos). España, 2005-2022.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<15 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1
15-19 años	6	4	3	8	3	2	5	2	1	4	2	3	0	1	7	9	12	11
20-24 años	27	18	20	26	28	13	20	15	7	8	16	11	7	16	24	16	28	36
25-29 años	49	55	45	45	35	41	24	35	37	26	28	33	38	32	38	46	46	51
30-34 años	88	77	82	69	76	64	49	60	64	57	56	51	58	57	83	73	67	85
35-39 años	127	102	112	94	83	132	80	82	77	76	110	86	111	95	115	113	107	127
40-44 años	91	91	103	84	109	128	86	116	96	97	99	119	116	120	162	168	145	198
45-49 años	34	47	61	53	70	83	79	114	96	133	115	122	146	162	183	167	187	200
50-54 años	13	19	27	29	26	35	42	62	68	86	89	97	110	121	148	145	188	220
55-59 años	3	5	5	11	6	12	11	20	27	45	49	59	76	81	99	118	132	175
60-64 años	1	2	7	3	2	6	5	9	9	17	29	30	34	40	49	39	75	99
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	43	54
Desconocido	16	8	10	2	0	1	51	4	7	7	4	0	0	6	12	53	16	9
Total	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732	920	974	1.046	1.266

Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.13.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en hombres). España, 2010-2022.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<15 años	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
15-19 años	1	1	2	1	2	0	3	0	0	4	9	10	9
20-24 años	11	16	12	4	8	11	10	4	12	21	12	25	28
25-29 años	34	21	31	29	22	27	30	28	28	32	34	41	42
30-34 años	58	40	54	55	43	47	44	46	49	72	63	60	64
35-39 años	114	70	70	60	64	92	72	94	84	101	94	82	99
40-44 años	109	70	99	82	70	84	103	94	94	124	139	123	167
45-49 años	66	60	94	76	104	95	102	118	132	146	127	141	158
50-54 años	29	32	54	55	64	65	76	88	102	112	111	143	168
55-59 años	7	7	15	19	33	34	48	48	59	85	81	100	145
60-64 años	3	2	7	7	10	22	21	23	29	35	23	53	65
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	24	30

Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.14.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en mujeres). España, 2010-2022.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<15 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
15-19 años	1	2	0	0	2	2	0	0	0	3	0	2	2
20-24 años	2	4	3	3	0	5	1	3	4	3	4	3	8
25-29 años	7	3	4	8	3	1	3	10	4	6	12	5	9
30-34 años	6	8	5	9	10	9	7	12	8	11	10	7	21
35-39 años	18	10	11	17	8	18	14	16	11	14	19	25	27
40-44 años	19	13	16	14	22	15	16	22	25	37	28	22	31
45-49 años	16	17	20	20	21	20	20	28	30	37	38	46	41
50-54 años	6	9	8	12	15	23	21	22	19	35	33	44	52
55-59 años	4	3	5	8	9	15	11	28	22	14	37	32	30
60-64 años	3	2	2	2	3	7	9	11	11	13	16	22	34
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	24

Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.15.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo. España, 2004-2022.




Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.16.

Evolución número de fallecidos por código CIE* en el Registro General de Mortalidad. España, 2010-2022.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F	47	27	33	22	23	24	25	13	39	24	33	42	42
X42	112	118	104	88	85	63	124	81	73	114	340	350	389
X44	230	211	239	289	338	285	329	330	332	388	380	390	461
X62	4	4	5	4	9	15	5	11	4	15	21	37	33
Y12	0	1	2	0	0	3	0	2	2	5	0	1	4

* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.17.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas según el Registro General de Mortalidad, según sexo. España, 1999-2022.




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hombres	657	610	558	564	552	568	539	417	462	470	366	330
Mujeres	95	81	92	88	81	91	97	72	57	70	76	63
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hombres	291	324	333	376	321	403	348	374	447	561	615	680
Mujeres	70	59	70	79	69	80	89	76	99	213	205	249
Total	361	383	403	455	390	483	437	450	546	774	820	929

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.18.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas en el Registro General de Mortalidad, según edad. España, 1999-2022.




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<35 años	505	429	391	349	310	285	262	200	192	193	141	108
≥35 años	247	262	259	303	323	374	374	289	327	347	301	285
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	752
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<35 años	101	104	93	76	80	99	87	74	111	115	135	140
≥35 años	260	279	310	379	310	384	350	376	435	659	685	789
Total	361	383	403	455	390	483	437	450	546	774	820	929

Notas: Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.19.

Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2022.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Con opioides*	182	170	136	104	140	143	148	152	141	105	94	105	102	86	105	108	122	106
Sin opioides*	55	48	52	35	41	39	33	43	51	60	65	53	70	91	87	74	100	112
Casos con información	237	218	188	139	181	182	181	195	192	165	159	158	172	177	192	182	222	218
Total	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210	212	259	305

* Independientemente de la aparición o no de otras sustancias.

Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.20.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad de las 6 ciudades españolas*. España, 2005-2022.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<15 años	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15-19 años	3	3	1	0	2	0	2	1	1	0	0	3	0	0	2	1	0	0
20-24 años	17	7	8	9	8	4	5	7	1	0	3	5	2	4	6	3	6	8
25-29 años	31	25	24	15	12	12	11	10	17	9	6	12	11	7	13	6	12	11
30-34 años	40	42	30	22	35	21	14	21	24	23	10	14	18	14	17	11	19	19
35-39 años	66	43	32	23	26	48	40	29	32	20	35	29	31	18	23	33	20	22
40-44 años	52	44	39	23	49	39	41	45	31	28	27	40	29	28	29	37	35	45
45-49 años	19	27	23	26	35	39	34	37	42	38	24	29	30	41	43	43	44	39
50-54 años	5	13	6	15	12	13	18	30	30	32	39	29	31	30	36	28	50	70
55-59 años	1	5	0	4	2	2	6	12	14	13	17	20	26	21	27	30	39	45
60-64 años	1	1	2	2	0	3	5	3	4	7	10	13	11	10	11	6	21	27
≥65 años	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10	16
Desconocida	2	0	23	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	3	3	0	3	2
Total fallecidos	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210	212	259	305

* Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.21.


Evolución del índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad-Registro Específico).
España, 2005-2022.

Año	Índice de infranotificación
2005	1,58
2006	1,68
2007	1,35
2008	1,43
2009	1,67
2010	1,80
2011	2,04
2012	1,85
2013	1,80
2014	1,69
2015	2,40
2016	1,79
2017	1,79
2018	1,76
2019	1,86
2020	1,26
2021	1,28
2022	1,36

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad y Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.22.

Estimación nacional del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2022.



Número de defunciones		Número de defunciones	
1983	266	2003	900
1984	440	2004	796
1985	453	2005	1.004
1986	516	2006	820
1987	741	2007	703
1988	1.067	2008	773
1989	1.440	2009	739
1990	1.440	2010	706
1991	1.833	2011	736
1992	1.760	2012	707
1993	1.399	2013	727
1994	1.067	2014	767
1995	1.051	2015	936
1996	1.310	2016	866
1997	1.127	2017	782
1998	1.049	2018	777
1999	972	2019	1.015
2000	1.012	2020	978
2001	923	2021	1.046
2002	1.079	2022	1.266

FUENTE: Estimación del Observatorio Español de la Droga y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y datos del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Información complementaria

Páginas web de interés

MINISTERIO DE SANIDAD

<http://www.sanidad.gob.es/>

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<https://pnsd.sanidad.gob.es/>

Encuesta Nacional de Salud

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/>

MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

MINISTERIO DE HACIENDA

<https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx>

Comisionado para el Mercado de Tabacos

<https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/CMTabacos/Paginas/hometabacos.aspx>

Informes Anuales de Recaudación Tributaria

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria.shtml

MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA

<https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx>

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030

<https://www.mdsocialesa2030.gob.es/>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

<https://www.ine.es/>

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

<https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx>

RED ESPAÑOLA DE ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES

<https://www.esarnet.es/>

OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE)

INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD (INCB)

<https://www.incb.org/>

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)

THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

ENCUESTA EUROPEA SOBRE DROGAS: PATRONES DE USO

EUROPEAN WEB SURVEY ON DRUGS: PATTERNS OF USE (EWS)

https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR

HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO

EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

<https://europa.eu/eurobarometer/screen/home>

RED EUROPEA DE EPIDEMIOLOGÍA BASADA EN ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES

<https://score-network.eu/>