

ESTADÍSTICAS 2023

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD)
Begoña BRIME. Luz LEÓN. Luisa M. LÓPEZ, Noelia LLORENS. Eva SÁNCHEZ.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Rosario BALLESTA
Ara MILLÁN
Mónica TENA
Lara FORNOVI
Antonio SUÁREZ

Aragón

Carmen BARANGUAN
Laura JOSÉ

Asturias

José Antonio GONZALEZ
Luisa María GONZÁLEZ

Baleares

Rut SUÁREZ
Elena TEJERA
Ana FERRER

Canarias

José Juan ALEMÁN
Nicolás PERDOMO
Ángel RODRÍGUEZ
María del Mar VELASCO
Amelia María HERNÁNDEZ

Cantabria

María del Carmen DIEGO
María Antonia RUEDA

Castilla-La Mancha

Carlos ALONSO
Carmen DE PEDRO

Castilla y León

Susana REDONDO
Mónica ELÍAS
Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier MAJO
Josep M. OLLÉ
Merche GOTSSENS

Extremadura

Mercedes CORTÉS
M^a Pilar MORCILLO
José Antonio SANTOS

Galicia

Silvia SUÁREZ
Sara CERDEIRA
Mercedes LIJO
María TAJES
Sergio VEIGA

Madrid

Piedad HERNANDO
M^a del Carmen ÁLVAREZ
Nelva MATA
Andrea TANJADA

Murcia

Mónica BALLESTA
M^a Dolores CHIRLAQUE
Isabel ROSA
Laura ESCUDERO
Daniel RODRÍGUEZ

Navarra

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Elena ALDASORO
Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA
Luis Javier ECHEVARRÍA

La Rioja

María FERNÁNDEZ
M^a Gemma CESTAFE

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU
Francesc J. VERDÚ
Noelia SELLES
Blanca NAVARRO

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA
Ana POSTIGO
Cleopatra R'KAINA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO
Juán Luis CABANILLAS

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las comunidades autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional y departamentos de Educación de las comunidades autónomas.
- Miembros de la Red ESAR-Net.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre el Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, responsables en las diferentes comunidades y ciudades autónomas y organizaciones no gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

CONTACTO

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid
Teléfono: 91 822 00 00
Correo electrónico: cendocupnd@sanidad.gob.es
Internet: <https://pnsd.sanidad.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 133-23-081-9

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE): <https://cpage.mpr.gob.es>

CITA SUGERIDA: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Estadísticas 2023. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Madrid: Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; 2023. 258 p.

Cada año, el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) hace público su informe. En él se compila sistemáticamente información de las diferentes fuentes y sistemas de obtención de datos sobre aspectos del consumo y sus consecuencias, de reducción de la demanda de drogas, y también sobre el control de su oferta. La continuidad de este informe anual, y el mantenimiento de las series y de su comparabilidad son uno de los mayores activos de esta Delegación del Gobierno. A lo largo de los años y de los cambios, todas las personas que la han dirigido han velado por preservarlo.

En esta edición se incluyen los resultados pormenorizados de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en Población General en España (EDADES) del año 2022, junto con el análisis de los indicadores de admisiones a tratamiento, urgencias, y mortalidad relacionada con las drogas, además de sus tendencias hasta 2021. Incluye también información sobre otros problemas, como las infecciones en consumidores o el consumo problemático, así como capítulos específicos dedicados al Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT) sobre nuevas sustancias psicoactivas, datos de estudios basados en el análisis de aguas residuales (que podría convertirse en el futuro en un componente del sistema de información), así como los indicadores relativos a la oferta de drogas y las medidas de control.

La solidez y trayectoria de los informes anuales elaborados por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, permite establecer de forma robusta un diagnóstico global del estado de situación de las drogas y las consecuencias de su consumo a nivel nacional. Este es un ejercicio de gran valor para que las políticas y actuaciones se basen en datos, y sirve de apoyo a la toma de decisiones. Pero además proporciona información a la ciudadanía y a todos los agentes sociales para un mejor conocimiento de esta realidad, proporcionando respuestas a la demanda social de transparencia.

Este informe no habría sido posible sin la colaboración de todas las personas e instituciones que, con su trabajo, contribuyen anualmente a su edición: quiero expresarles mi más sincero agradecimiento. En particular, deseo reconocer la profesionalidad y dedicación del equipo de profesionales del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: sin su labor y su esfuerzo, la sociedad no tendría este informe a su disposición.

Joan R. Villalbí

Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

ESTADÍSTICAS 2023

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

ÍNDICE

Presentación	3
Introducción	26
1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas	27
1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EADDES), 1995-2022	28
Metodología: tamaño muestra	
1.1.1 Evolución del tamaño de muestra válida de la encuesta EADDES en la población de 15 a 64 años (número de personas). España, 1995-2022	28
1.1.2 Distribución de la muestra válida de la encuesta EADDES por comunidad autónoma (número de personas). España, 2022	28
1.1.3. Distribución de la muestra de la población de 15-64 años de la encuesta EADDES según sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, nacionalidad y con quién vive (%). España, 2022	29
Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas 2013-2022: evolución temporal por sexo	
1.1.4. Evolución de la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2022	29
Prevalencia del consumo de drogas 1997-2022: evolución temporal. Edad y sexo	
1.1.5. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022	30
1.1.6. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1999-2022	31
1.1.7. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022	32
1.1.8. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022	33
1.1.9. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1999-2022	34
1.1.10. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022	35
1.1.11. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2022	36

1.1.12.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1999-2022	37
1.1.13.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022	38
1.1.14.	Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2022	39
1.1.15.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (%). España, 2022	39
1.1.16.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022	40
1.1.17.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022	41
1.1.18.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022	42
1.1.19.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022	43
1.1.20.	Edad media (años) de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años. España, 1995-2022	43
1.1.21.	Edad media (años) de inicio de consumo de diferentes sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años, según sexo. España, 2018-2022	44
1.1.22.	Edad media (años) de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años. España, 2022	45
1.1.23.	Edad media (años) de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2022	45

Prevalencia del consumo de drogas 2022: comunidad/ciudad autónoma

1.1.24.	Edad media (años) de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma. España, 2022	46
1.1.25.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	47
1.1.26.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años por CCAA según sexo. España, 2022	48
1.1.27.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	49
1.1.28.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	50
1.1.29.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	51
1.1.30.	Prevalencias de botellón entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	52
1.1.31.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	53
1.1.32.	Prevalencia de consumo de tabaco entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	54

1.1.33.	Prevalencia de consumo de tabaco en la población de 15-64 años por CCAA según sexo. España, 2022	55
1.1.34.	Prevalencia de consumo de tabaco diario entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	56
1.1.35.	Prevalencias de consumo de cigarrillos electrónicos entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	57
1.1.36.	Prevalencias de consumo de cigarrillos electrónicos entre la población de 15-64 años, por comunidad/ciudad autónoma, según sexo. España, 2022	58
1.1.37.	Prevalencias de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	59
1.1.38.	Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años por CCAA según sexo. España, 2022	60
1.1.39.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	61
1.1.40.	Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre la población de 15-64 años (%) por comunidad/ciudad autónoma. España, 2022	62
1.1.41.	Valoración de la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas ilegales entre la población de 15-64 años (%) por comunidad/ciudad autónoma. España, 2022	63
1.1.42.	Prevalencia de bebidas energéticas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022	64

Consumo por tipo de droga: bebidas alcohólicas

1.1.43.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas (%) y edad media en el inicio de consumo de bebidas alcohólicas (años) en la población de 15-64 años. España, 1997-2022	65
1.1.44.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022	65
1.1.45.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses y percepción del riesgo del consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2022	66
1.1.46.	Prevalencia de consumo diario de alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022	66
1.1.47.	Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días, en población de 15-24 años, según sexo (%). España, 2009-2022	67
1.1.48.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	67
1.1.49.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según nivel más alto de estudios que ha completado o aprobado y según sexo (%). España, 2022	68
1.1.50.	Prevalencia de consumo de alcohol (%) durante el embarazo y edad media de inicio en el consumo de alcohol (años) en las mujeres de 15-64 años (%). España, 2020-2022	68
1.1.51.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años, según de bebida alcohólica consumida y según sexo (%). España, 2022	68
1.1.52.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años que ha consumido bebidas alcohólicas en ese periodo, según tipo de bebida alcohólica consumida y según sexo (%). España, 2022	69

1.1.53.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en fines de semana y días laborables en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (%). España, 2022	69
1.1.54.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años, según tipo de bebida alcohólica consumida en fin de semana y días laborables (%). España, 2022	70
1.1.55.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking, borracheras y botellón en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (%). España, 1999-2022	70
1.1.56.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking, borracheras y botellón en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2003-2022	71
1.1.57.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2003-2022	71
1.1.58.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 1997-2022	72
1.1.59.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días, en población de 15-24 años, según sexo (%). España, 2013-2022	72
1.1.60.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	73
1.1.61.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	73
1.1.62.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022	74
1.1.63.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días en la población de 15 a 64 años que se ha emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2022	74
1.1.64.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según hayan tenido intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días o no (%). España, 2022	75
1.1.65.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2003-2022	75
1.1.66.	Evolución de la prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2011-2022	76
1.1.67.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días, en población de 15-24 años, según sexo (%). España, 2009-2022.	76
1.1.68.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	77
1.1.69.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022	77
1.1.70.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o no (%). España, 2022	78
1.1.71.	Prevalencia de borracheras (intoxicaciones etílicas agudas) en el último año y prevalencia de borracheras y binge drinking en el último mes en la población de 15-64 años, según nivel más alto de estudios que ha completado o aprobado y según sexo (%). España, 2022	78

1.1.72.	Prevalencia de borracheras (intoxicaciones etílicas agudas) en el último año y prevalencia de binge drinking en el último mes en la población de 15-64 años, según nivel más alto de estudios que ha completado o aprobado y según edad (%). España, 2022	79
1.1.73.	Evolución de la prevalencia de botellón en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2013-2022	79
1.1.74.	Prevalencia de botellón, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	79
1.1.75.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según hayan hecho botellón en los últimos 12 meses o no (%). España, 2022	80
1.1.76.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han hecho botellón en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022	80
1.1.77.	Razones por las que las personas de 15 a 64 años consumen alcohol, según su consumo de alcohol. España, 2022	81
1.1.78.	Razones para el consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2018-2022	81
1.1.79.	Actitudes ante las políticas en materia de alcohol entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2018-2022	81
1.1.80.	Actitudes ante las políticas en materia de alcohol de las personas de 15 a 64 años, según su consumo de alcohol. España, 2022	82
1.1.81.	Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8 en hombres y AUDIT ≥ 6 en mujeres) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2009-2022	82
1.1.82.	Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8 en hombres y AUDIT ≥ 6 en mujeres) en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2009-2022	83
1.1.83.	Prevalencia de consumos intensivos de alcohol en la población de 15 a 64 años, según hayan tenido consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8 en hombres y AUDIT ≥ 6 en mujeres) (%). España, 2022	83
1.1.84.	Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días e hipnosedantes en los últimos 12 meses entre aquellos que han realizado un consumo de riesgo de alcohol según la escala AUDIT (AUDIT ≥ 8 en hombres y AUDIT ≥ 6 en mujeres) y entre la población de 15 a 64 años (%). España, 2022	84
1.1.85.	Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses entre aquellos que han realizado un consumo de riesgo de alcohol según la escala AUDIT (AUDIT ≥ 8 en hombres y AUDIT ≥ 6 en mujeres) y entre la población de 15 a 64 años (%). España, 2022	84
1.1.86.	Características sociodemográficas de los consumidores de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8 en hombres y AUDIT ≥ 6 en mujeres) y de la población de 15-64 años de la encuesta EDADES (%). España, 2022	85
1.1.87.	Consumo de riesgo de alcohol en la población de 15-64 años según la escala AUDIT entre los que han contestado AUDIT y entre el total de la población, según sexo (%). España, 2020-2022	86
1.1.88.	Consumo de riesgo de alcohol en la población de 15-64 años según la escala AUDIT entre los que han contestado AUDIT y entre el total de la población, según edad y sexo (%). España, 2022	86

Consumo por tipo de droga: bebidas energéticas

1.1.89.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	86
1.1.90.	Prevalencia del consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que consumió bebidas energéticas en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2022	87

1.1.91.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2022	87
1.1.92.	Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según hayan consumido o no bebidas energéticas (%). España, 2022 .	88
1.1.93.	Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según hayan consumido bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2022	88

Consumo por tipo de droga: tabaco

1.1.94.	Prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años. España, 1997-2022	89
1.1.95.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022	90
1.1.96.	Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	90
1.1.97.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022	91
1.1.98.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022	91
1.1.99.	Prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 1997-2022	92
1.1.100.	Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España 2011-2022	92
1.1.101.	Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de cigarrillos que ha fumado, sexo y edad (%). España, 2022	93
1.1.102.	Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022	93
1.1.103.	Porcentaje de fumadores que fuman por término medio una cantidad de cigarrillos determinada (%), y número medio de cigarrillos fumados cada día que fuman (nº cigarrillos) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	94
1.1.104.	Evolución del número medio de cigarrillos fumados cada día que fuman en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (nº cigarrillos). España, 2013-2022	94
1.1.105.	Evolución del consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de cigarrillos fumados (%). España, 2015-2022	95
1.1.106.	Porcentaje de personas que se han planteado dejar de fumar entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	95
1.1.107.	Porcentaje de personas que se han planteado dejar de fumar entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días y han intentado dejarlo, en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	95
1.1.108.	Porcentaje de personas que se han planteado dejar de fumar entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2018-2022	96
1.1.109.	Porcentaje de personas que se han planteado de dejar de fumar y lo han intentado entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2018-2022	96

1.1.110. Prevalencia de consumo de pipas de agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022	96
1.1.111. Prevalencia de uso de pipas de agua (cachimbas, shisahs, hookah, narguile...) agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, edad de inicio (años) y número de días que las ha usado en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, total, según sexo y edad (%). España, 2022	97
1.1.112. Prevalencia de uso de cada tipo de sustancia en pipas de agua (cachimbas, shisahs, hookah, narguile...) en la población de 15-64 años que ha utilizado pipas de agua alguna vez en la vida, total, según sexo y edad (%). España, 2022	97
1.1.113. Prevalencia de binge drinking, borracheras y consumo de cannabis en los últimos 30 días, consumo problemático de cannabis, consumo de cigarrillos electrónicos y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población que ha consumido tabaco o cannabis en pipas de agua alguna vez en la vida (%). España, 2022	97
1.1.114. Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2020-2022	98

Consumo por tipo de droga: cigarrillos electrónicos

1.1.115. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%) y edad media de inicio en el consumo (años). España, 2015-2022	98
1.1.116. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2022	99
1.1.117. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2022	99
1.1.118. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según contengan o no nicotina y/o cannabis, y según sexo (%). España, 2018-2022	100
1.1.119. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos que contengan o no nicotina y/o cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2018-2022	100
1.1.120. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de 15-64 años según sexo y edad (%). España, 2022	100
1.1.121. Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2018-2022	101
1.1.122. Porcentaje de personas que dicen que utilizan los cigarrillos electrónicos como sustituto del tabaco, en la población de 15-64 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo y edad. España, 2022	101
1.1.123. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos o no alguna vez en la vida (%). España, 2018-2022	101
1.1.124. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos o no en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022	102
1.1.125. Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años que ha consumido tabaco o no alguna vez en la vida (%). España, 2018-2022	102
1.1.126. Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años que ha consumido tabaco o no en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022	103

1.1.127. Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida o no (%). España, 2020-2022	103
1.1.128. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos que contengan o no nicotina y/o cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2022	103

Consumo por tipo de droga: hipnosedantes

1.1.129. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años. España, 2005-2022	104
1.1.130. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	104
1.1.131. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	105
1.1.132. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	105
1.1.133. Modos en los que la población de 15-64 años toma hipnosedantes con o sin receta (%). España, 2022	106
1.1.134. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años (%) y edad media de inicio en el consumo (años). España, 2003-2022	106
1.1.135. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022	107
1.1.136. Prevalencias de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años según sexo y edad (%). España, 2022	107
1.1.137. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	108
1.1.138. Prevalencia de consumo de alcohol, drogas ilegales o alcohol y drogas ilegales junto con hipnosedantes sin receta o para uso no médico en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses según sexo (%). España, 2018- 2022	108
1.1.139. Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022	109
1.1.140. Prevalencia de trastornos o patologías en la población de 15-64 años y en los consumidores de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2022	109
1.1.141. Medios por los que consiguió los hipnosedantes, la última vez que tomó hipnosedantes sin receta considerando la población de 15-64 años que ha consumido este tipo de fármacos sin receta alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2018-2022	109
1.1.142. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2022.	110
1.1.143. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y disponibilidad percibida ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2022	110

Consumo por tipo de droga: analgésicos opioides

1.1.144.	Prevalencia de consumo de analgésicos opioides con o sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2018-2022	111
1.1.145.	Prevalencia de consumo de analgésicos opioides con o sin receta alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2018-2022	111
1.1.146.	Modo de consumo realizado entre la población de 15 a 64 años que ha consumido analgésicos opioides con o sin receta alguna vez en la vida (%). España, 2018-2022	112
1.1.147.	Prevalencia de consumo de analgésicos opioides alguna vez en la vida en la población de 15-64 años que ha consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2018-2022	112
1.1.148.	Razones por las que la población de 15-64 años que ha consumido analgésicos opioides empezó a tomar analgésicos opioides, según sexo (%). España, 2018-2022	113
1.1.149.	Prevalencia de consumo de analgésicos opioides sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2020-2022	113
1.1.150.	Prevalencia de consumo de drogas legales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de analgésicos opioides con o sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022	113
1.1.151.	Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de analgésicos opioides con o sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022	114

Consumo por tipo de droga: cannabis

1.1.152.	Prevalencia de consumo de cannabis (%) y edad media de inicio en el consumo de cannabis (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022	114
1.1.153.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022	115
1.1.154.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022	115
1.1.155.	Evolución de la prevalencia de uso de cannabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2022	116
1.1.156.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	116
1.1.157.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	117
1.1.158.	Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022	117
1.1.159.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, según edad. España, 2003-2022	118
1.1.160.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 2001-2022	118
1.1.161.	Frecuencia (días) de consumo de cannabis, marihuana o hachís en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que lo ha consumido en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2022	119

1.1.162. Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2015-2022	119
1.1.163. Frecuencia (días) de consumo de cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años que lo ha consumido en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2022	120
1.1.164. Evolución del número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2022	120
1.1.165. Prevalencia de consumo de cannabis mezclado con tabaco en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2022	120
1.1.166. Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días en función de que se haya consumido cannabis en los últimos 30 días o no y en la población general (%). España, 2022	121
1.1.167. Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días en función de que se haya consumido tabaco en los últimos 30 días o no y en la población general (%). España, 2022	121
1.1.168. Prevalencia de consumo de cannabis y tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2022	121
1.1.169. Prevalencia de consumo de cannabis y spice alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2022	122
1.1.170. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2015-2022	122
1.1.171. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha consumido tabaco en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2015-2022	122
1.1.172. Prevalencia de binge drinking, borracheras, tabaco en los últimos 30 días y consumo de riesgo de alcohol (AUDIT>8 en hombres y >6 en mujeres), consumo de cigarrillos electrónicos, pipas de agua, hipnosedantes sin receta, analgésicos opioides sin receta y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años, en aquellos que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y en aquellos que presentan un consumo problemático de cannabis (CAST≥4) (%). España, 2022	122
1.1.173. Prevalencia de consumo de dos o más sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años, en aquellos que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y en aquellos que presentan un consumo problemático de cannabis (CAST≥4) (%). España, 2022	123
1.1.174. Prevalencia de cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años, en aquellos que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y en aquellos que presentan un consumo problemático de cannabis (CAST≥4) (%). España, 2022	123
1.1.175. Prevalencia autodeclarada de distintas patologías e ideas de suicidio en la población general de 15-64 años, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses y en aquellos que presentan un consumo problemático de cannabis (CAST≥4) (%). España, 2022	123
1.1.176. Prevalencia de personas que afirman que si fuese legal el consumo de hachís o marihuana lo probarían. Respuesta entre los que no la han probado nunca en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2018-2022	124
1.1.177. Características del consumo de cannabis entre la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018-2022	124
1.1.178. Características del consumo de cannabis entre la población de 15-64 años que tiene un consumo problemático de cannabis (CAST≥4), según sexo (%). España, 2018-2022	124
1.1.179. Características del consumo de cannabis entre la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses (CAST<4), según sexo (%). España, 2018-2022	125

1.1.180.	Lugares donde en los últimos 30 días han obtenido cannabis las personas de 15 a 64 años que han consumido cannabis, según edad y sexo (%). España, 2022	125
1.1.181.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre el total de la población de 15 a 64 años y entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2013-2022	125
1.1.182.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre el total de la población de 15 a 64 años y entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses (%), según sexo. España, 2013-2022.	126
1.1.183.	Evolución del % de Tetrahidrocannabinol (THC). España, 2002-2021	126
1.1.184.	Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que tiene un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4), según sexo (%). España, 2015-2022	127
1.1.185.	Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de botellón y policonsumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población que presenta un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) (%). España, 2022	127
1.1.186.	Modo de consumo de cannabis en los consumidores de cannabis en los últimos 12 meses y en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) (%). España, 2022	128
1.1.187.	Prevalencia de consumo de cannabis en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) y en el total de la población (%). España, 2022	128

Consumo por tipo de droga: cocaína

1.1.188.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de 15-64 años (%). España, 2007-2022	129
1.1.189.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2007-2022	129
1.1.190.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses en la población de 15-34 años. España, 1997-2022	130
1.1.191.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, según sexo y edad (%). España, 2022	130
1.1.192.	Prevalencia de consumo de cocaína en polvo (%) y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022	131
1.1.193.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022	131
1.1.194.	Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (%). España, 2022	132
1.1.195.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según sexo (%). España, 1999-2022	132
1.1.196.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad. España, 1999-2022	133
1.1.197.	Frecuencia (días) de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que lo ha consumido en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2022	133
1.1.198.	Frecuencia (días) de consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años que lo ha consumido en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2022	134
1.1.199.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses y la disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil). España, 1997-2022	134

1.1.200.	Evolución de la prevalencia del uso de cocaína en polvo entre la población general de 15-64 años y de la cantidad de cocaína incautada. España, 1997-2022	135
1.1.201.	Prevalencia de consumo de cocaína base (%) y edad media de inicio en el consumo de cocaína base (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022	136
1.1.202.	Prevalencia de consumo de cocaína base alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022	136
1.1.203.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo. España 1999-2022	137
1.1.204.	Prevalencia de consumo de cocaína base alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según sexo (%). España, 2022	137
1.1.205.	Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo, base, polvo y/o base) en la población de 15-64 años (%). España, 2022.	138

Consumo por tipo de droga: éxtasis

1.1.206.	Prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio en el consumo de éxtasis (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022	138
1.1.207.	Prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022	139
1.1.208.	Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según sexo (%). España, 2022	139
1.1.209.	Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022	140
1.1.210.	Evolución de la prevalencia de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2022	140
1.1.211.	Evolución de la prevalencia de uso de éxtasis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante su consumo una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2022	141

Consumo por tipo de droga: GHB

1.1.212.	Prevalencia de consumo de GHB alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2022	141
1.1.213.	Evolución de la prevalencia de consumo de GHB (%) alguna vez en la vida y edad media de inicio (años) del consumo entre la población de 15 a 64 años. España, 2013-2022	142

Consumo por tipo de droga: anfetaminas

1.1.214.	Prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022	142
1.1.215.	Prevalencia del consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022	143
1.1.216.	Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	143
1.1.217.	Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022	144
1.1.218.	Evolución de la prevalencia de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2022	144

Consumo por tipo de droga: metanfetaminas

1.1.219. Prevalencia de consumo de metanfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas (años) en la población de 15-64 años. España, 2011-2022	145
1.1.220. Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	145
1.1.221. Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022	146

Consumo por tipo de droga: alucinógenos

1.1.222. Prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022	146
1.1.223. Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según sexo (%). España, 2022	147
1.1.224. Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022	147
1.1.225. Prevalencia del consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022	148
1.1.226. Evolución de la prevalencia de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2022	148

Consumo por tipo de droga: setas mágicas

1.1.227. Prevalencia de consumo de setas mágicas en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2022	149
1.1.228. Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2022	149
1.1.229. Prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	149

Consumo por tipo de droga: heroína

1.1.230. Prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo de heroína (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022	150
1.1.231. Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	150
1.1.232. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y riesgo percibido ante el consumo de cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años (%). España, 1997-2022	151
1.1.233. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y percepción de disponibilidad de heroína (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1997-2022	151

Consumo por tipo de droga: inhalables volátiles

1.1.234. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022	152
1.1.235. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	152

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

1.1.236.	Evolución de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (%). España, 2015-2022	153
1.1.237.	Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	153
1.1.238.	Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (%). España, 2022	153
1.1.239.	Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	154
1.1.240.	Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022	155
1.1.241.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (%). España, 2022	155
1.1.242.	Evolución de la prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (ilegales) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 2015-2022	156
1.1.243.	Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	156
1.1.244.	Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	156
1.1.245.	Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	157
1.1.246.	Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	157
1.1.247.	Prevalencia de consumo de dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2022.	158
1.1.248.	Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de diferentes sustancias psicoactivas (columna) según sustancia de consumo (fila) (%). España, 2022	159
1.1.249.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 que ha hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2022	159
1.1.250.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 que se ha emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2022	160
1.1.251.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 que ha realizado un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) o no en el mismo periodo (%). España, 2022	160

Nuevas sustancias psicoactivas

1.1.252.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2022	161
1.1.253.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	161
1.1.254.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y en la población de 15 a 64 años (%). España, 2022	162

1.1.255. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años que ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no (%). España, 2022	162
1.1.256. Evolución del porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013-2022	163
1.1.257. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles, metanfetaminas, GHB y setas mágicas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022	163
1.1.258. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles, metanfetaminas, GHB y setas mágicas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022	164

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.1.259. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2022	165
1.1.260. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2022	166
1.1.261. Riesgo percibido ante diversas conductas sobre adicciones (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta puede producir muchos o bastantes problemas), según edad. España, 2022	166
1.1.262. Riesgo percibido ante diversas conductas sobre adicciones (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta puede producir pocos problemas o ninguno). España, 2022	167
1.1.263. Percepción del riesgo de fumar un paquete de tabaco diario (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar muchos o bastantes problemas) y prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2022	168

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.1.264. Porcentaje de personas de 15-64 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna de las siguientes drogas, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo (%). España, 2020-2022	168
1.1.265. Percepción de disponibilidad de drogas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1995-2022	169
1.1.266. Percepción de disponibilidad de distintas sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022	169
1.1.267. Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en la población a la que le han ofrecido drogas alguna vez en los últimos 12 meses (%). España, 2022	170

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de la importancia del problema de consumo de drogas y visibilidad del problema

1.1.268. Importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (%). España, 1997-2022	170
1.1.269. Importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive, según edad y sexo (%). España, 2020-2022	170

1.1.270. Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas legales e ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2022	171
1.1.271. Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2022	171
1.1.272. Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas legales e ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive), según sexo. España, 2020-2022	172

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

1.1.273. Valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022	172
1.1.274. Valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2020-2022	173
1.1.275. Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad (%). España 2015-2022	173
1.1.276. Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo (%). España, 2015 -2022	174
1.1.277. Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en el último año (%). España, 2022	174
1.1.278. Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en el último año (%). España, 2022	175

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción sobre el estado de salud

1.1.279. Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022	175
1.1.280. Percepción del estado de salud como muy bueno o bueno de la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022	176

Consumo de drogas en población laboral 2022

1.1.281. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población laboral de 16-64 años (%). España, 2022	177
1.1.282. Prevalencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años y la población laboral de 16 a 64 años (%). España, 2022	178
1.1.283. Prevalencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años y la población laboral de 16 a 64 años, según sexo (%). España, 2022	179
1.1.284. Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas, en la población laboral, según situación laboral, sector de actividad, categoría ocupacional y jornada laboral (%). España, 2007-2022	180

Riesgo de suicidio

1.1.285. Prevalencia de riesgo de suicidio en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años (%). España, 2022	182
1.1.286. Prevalencia de riesgo de suicidio en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2022	182
1.1.287. Perfil general de la población de 15 a 64 años y de la población con riesgo de suicidio (%). España, 2022	183
1.1.288. Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de botellón y policonsumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población con riesgo de suicidio (%). España, 2022	183
1.1.289. Prevalencia de consumo de diferentes sustancias legales e ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en la población con riesgo de suicidio (%). España, 2022	184
1.1.290. Prevalencia autodeclarada de distintas patologías en la población general de 15 a 64 años y en la población con ideas de suicidio (%). España, 2022	184
1.1.291. Prevalencia de riesgo de suicidio en la población de 15 a 64 años según variables sociodemográficas y variables relacionadas con el ámbito laboral (% de fila). España, 2022	185
1.1.292. Prevalencia autodeclarada de distintas patologías en la población general de 15 a 64 años y en la población con riesgo de suicidio (%). España, 2022	185

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2023	186
---	------------

2. Problemas relacionados con las drogas 187

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2021 ..	188
---	------------

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2021

2.1.1. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2021	188
2.1.2. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales y por alcohol. España, 1998-2021	189
2.1.3. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales (total, con tratamiento previo y tratados por primera vez en la vida). España, 1998-2021	190
2.1.4. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1996-2021	191
2.1.5. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2021 ..	192
2.1.6. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2021	193
2.1.7. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2021	194
2.1.8. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2021	195
2.1.9. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de estimulantes distintos de la cocaína: anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis. España, 1996-2021	196

2.1.10.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alucinógenos (ketamina u otros alucinógenos). España, 2005-2021	197
2.1.11.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2021	198
2.1.12.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2021	198
2.1.13.	Número de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2021	199
2.1.14.	Número de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2021	200
2.1.15.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2021	201
2.1.16.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2021	202
2.1.17.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2021	203
2.1.18.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2021	204
2.1.19.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2021	205
2.1.20.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2021	206
2.1.21.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2021	207
2.1.22.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2021	208
2.1.23.	Proporción de tratados por primera vez por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA. España, 1991-2021	209
2.1.24.	Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2021	210
2.1.25.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2015-2021	211
2.1.26.	Número de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2021.	211
2.1.27.	Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2021	212
2.1.28.	Prevalencia de infección por VIH (por grupos de edad) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad (%). España, 1996-2021	213
2.1.29.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (%). España, 2019-2021	214

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2021

2.1.30.	Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal por sexo (%). España, 2021	215
2.1.31.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2021	216
2.1.32.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2021	216
2.1.33.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2021	217
2.1.34.	Número de casos y tasas por 100.000 habitantes de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2021	218
2.1.35.	Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2021	218
2.1.36.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2021	221
2.1.37.	Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2021	224
2.1.38.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento por sexo. España, 2021	226
2.1.39.	Edades medias de inicio del tratamiento, de inicio en el consumo y latencia entre primer uso e inicio de tratamiento. España, 2021	229
2.1.40.	Número de casos que entran a tratamiento en función de que presenten policonsumo de sustancias, total y en función del tratamiento previo. España, 2021	229
2.1.41.	Número de casos admitidos a tratamiento por grupos de edad en función de la droga principal. España, 2021	230

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2021 .. 231

Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2021

2.2.1.	Porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España, 1996-2021.	231
2.2.2.	Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España, 1996-2021.	232
2.2.3.	Número de urgencias relacionadas con el uso de analgésicos opioides. España, 2005-2021	233
2.2.4.	Proporción de urgencias por tipo de opiáceo notificado en el total de urgencias relacionadas con opiáceos. España, 2005-2021	233
2.2.5.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2021	234
2.2.6.	Vía de administración (número y porcentaje) de los episodios de urgencias hospitalarias en consumidores de drogas, según tipo de droga. España, 2011-2021	235

Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas. Datos 2021

2.2.7.	Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España, 2021	236
2.2.8.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España, 2021	236
2.2.9.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas, según sexo. España, 2021	237
2.2.10.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas). España, 2020-2021	237
2.2.11.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas), según sexo. España, 2021	238
2.2.12.	Sintomatología que provoca la urgencia en función de las drogas que se relacionan (%). España, 2021	239
2.2.13.	Prevalencia de patología dual en los episodios de urgencias en los que se detecta únicamente una sustancia, en función de la sustancia detectada (%). España, 2021	240
2.2.14.	Tipo de consumo de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2021	240

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2021 241

Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2019

2.3.1.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2021	241
2.3.2.	Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2021	242

Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y Registro General de Mortalidad

2.3.3.	Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2021	242
2.3.4.	Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en función del sexo. España, 2021	244
2.3.5.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1996-2021	245
2.3.6.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1996-2021	245
2.3.7.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España, 2021	246
2.3.8.	Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España, 2005-2021	247
2.3.9.	Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España, 2003-2021	248
2.3.10.	Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide, aunque haya otras sustancias). España, 2005-2021	249

2.3.11. Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 1985-2021	249
2.3.12. Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos). España, 2005-2021	250
2.3.13. Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en hombres). España, 2010-2021	250
2.3.14. Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en mujeres). España, 2010-2021	251
2.3.15. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo. España, 2004-2021	251
2.3.16. Número de fallecidos por códigos CIE en el Registro General de Mortalidad. España, 2010-2021	252
2.3.17. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas en el Registro General de Mortalidad, según sexo. España, 1999-2021	252
2.3.18. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas en el Registro General de Mortalidad, según edad. España, 1999-2021	253
2.3.19. Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2021	253
2.3.20. Número de fallecidos por grupos de edad en 6 ciudades españolas. España, 2005-2021	254
2.3.21. Índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad-Registro Específico). España, 2005-2021	254
2.3.22. Estimación nacional del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2021	255

Información complementaria	256
-----------------------------------	------------

Páginas web de interés	257
----------------------------------	-----

INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, analgésicos opioides, drogas ilegales y nuevas sustancias), otros trastornos comportamentales y los problemas asociados, en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

El presente informe, denominado *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2023*, se estructura en cinco capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población ante las drogas desde 1995 hasta 2022. La fuente de información es la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) en sus sucesivas ediciones. EDADES se realiza de forma bienal y se promueve y financia directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando con la estrecha colaboración de las comunidades y ciudades autónomas.

En el presente documento no se incluye información de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), ya que los últimos datos disponibles, al cierre de este informe, corresponden al año 2021 y ya han sido publicados en el *Informe y Estadísticas 2022 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España*.


En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2021. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”, así como información relacionada con las infecciones en consumidores de drogas e información relativa al consumo problemático de drogas.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las comunidades y ciudades autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información. Los indicadores sobre infecciones y consumo problemático proceden de varias fuentes, pero fundamentalmente de la DGPNSD y de otras áreas del Ministerio de Sanidad.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998:

<https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/CinformesOED.htm>

Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES), 1995-2022

Metodología: tamaño muestra

1.1.1.

Evolución del tamaño de muestra válida de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años (número de personas). España, 1995-2022.

1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
8.888	12.304	12.234	14.113	12.033	27.934	23.715	20.109	22.128	23.136	22.541	21.249	17.899	26.344

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.2.

Distribución de la muestra válida de la encuesta EDADES por comunidad autónoma (número de personas). España, 2022.

CCAA	DGPNSD	Ampliación	Válidas	Error muestral (±)
Andalucía	2.229	–	2.229	2,08%
Aragón	858	–	858	3,35%
Asturias	748	548	1.296	2,72%
Islas Baleares	840	–	840	3,38%
Canarias	1.159	539	1.698	2,38%
Cantabria	557	438	995	3,11%
Castilla y León	1.125	659	1.784	2,32%
Castilla La Mancha	1.089	507	1.596	2,45%
Cataluña	2.117	–	2.117	2,13%
Comunidad Valenciana	1.709	540	2.249	2,07%
Extremadura	779	–	779	3,51%
Galicia	1.216	529	1.745	2,35%
Comunidad de Madrid	1.990	510	2.500	1,96%
Murcia	948	550	1.498	2,53%
Navarra	617	589	1.206	2,82%
País Vasco	1.108	–	1.108	2,94%
La Rioja	429	570	999	3,10%
Ceuta	220	398	618	3,94%
Melilla	229	–	229	6,48%
Total	19.967	6.377	26.344	0,71%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.3.

Distribución de la muestra de la población de 15-64 años de la encuesta EDADES según sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, nacionalidad y con quién vive (%). España, 2022.

		Total	Hombres	Mujeres
Sexo	Hombre	50,2	100,0	0,0
	Mujer	49,8	0,0	100,0
Edad	15 a 24 años	15,1	15,5	14,8
	25 a 34 años	17,3	17,3	17,2
	35 a 44 años	22,3	22,0	22,6
	45 a 54 años	24,1	24,2	23,9
	55 a 64 años	21,2	21,0	21,5
Estado civil	Soltero/a	41,3	45,3	37,2
	Casado/a	48,2	46,4	49,9
	Separado/a - Divorciado/a	8,6	7,2	9,9
	Viudo/a	2,0	1,0	3,0
Nivel de estudios	Sin estudios / estudios primarios	9,9	10,1	9,7
	Estudios secundarios	68,2	69,5	66,9
	Estudios universitarios	21,9	20,5	23,4
Nacionalidad	Española	86,2	87,6	84,9
	Extranjera	13,8	12,4	15,1
Con quién vive	Solo	12,5	15,3	9,8
	Familia propia	62,5	57,6	67,5
	Familia de origen	24,0	25,7	22,2
	Otros	0,9	1,4	0,5

FUENTE: OEDA Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES)

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas 2013-2022: evolución temporal por sexo

1.1.4.

Evolución de la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2022.

	2013			2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	1,6	2,1	1,3	2,8	3,3	2,4	4,0	4,8	3,4	3,5	4,4	2,9	2,9	3,5	2,4
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	2,1	1,3	3,0	2,5	1,8	3,3	2,6	1,9	3,4	2,9	2,2	3,7
Cannabis	0,8	0,8	0,7	0,7	1,0	0,5	1,1	1,6	0,7	1,2	1,5	1,0	1,5	1,9	1,1
Cocaína polvo y/o base	-	-	-	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,3
Cocaína polvo	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,3
Cocaína base	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombre; M = mujer.

Incidencia es el número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses. El denominador incluye aquellas personas que no tomaban la sustancia hace más de un año (los que no han consumido este año y los que han empezado este año).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Prevalencia del consumo de drogas 1997-2022: evolución temporal. Edad y sexo

1.1.5.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Tabaco	-	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1	72,5	69,7	70,0	69,6
Alcohol	-	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1	93,5	91,2	93,0	93,2
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7	20,8	22,5	23,5
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,1	3,0	3,1	3,6
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	15,2	15,8
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,5
Cannabis	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5	35,2	37,5	40,9
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3	3,6	3,6	5,0	5,1
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8	3,8	4,5	5,5	5,4
Anfetaminas	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3	3,8	3,6	4,0	4,3	4,6
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	8,3	10,2	8,8	10,3	9,1	10,3	11,2	12,0
Cocaína en polvo	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2	8,9	10,0	10,9	11,7
Cocaína base	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9	1,0	0,8	1,3	1,4	1,7
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	1,9	2,0	2,4	3,5	3,3
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	0,6	1,2	1,2	1,3
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,5	0,9	0,7
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.6.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1999-2022.

	1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2018		2020		2022	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	65,2	64,7	69,4	67,6	69,2	68,7	67,9	70,7	66,6	69,8	70,1	78,3	67,8	74,2	68,5	75,6	65,4	76,2	62,3	73,4	63,9	72,9	62,4	73,1
Alcohol	87,4	87,2	89,3	88,8	88,9	88,3	93,2	94,1	87,7	88,3	92,2	95,5	89,5	91,7	92,2	93,7	91,2	94,7	88,8	92,4	91,5	93,6	90,3	94,6
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	24,1	13,4	27,0	10,8	22,8	12,4	25,0	13,1	27,0	13,7	28,2
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,5	2,3	2,8	2,6	4,8	2,5	3,2	2,8	3,2	2,9	3,9
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	18,1	8,8	19,2
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,8	1,4	1,6
Cannabis	28,1	12,3	34,3	15,3	39,0	21,0	39,4	20,4	37,5	20,2	42,4	25,2	36,9	21,6	40,2	25,0	38,8	27,8	42,0	31,8	45,0	34,0	47,2	37,9
Éxtasis	4,4	0,7	7,7	1,0	8,3	1,6	7,6	1,9	7,2	2,2	8,4	2,6	5,7	2,3	6,2	3,2	4,7	3,0	4,1	3,3	5,4	4,8	6,3	4,6
Alucinógenos	2,9	1,0	4,6	1,3	4,7	1,6	5,4	1,9	5,9	2,3	5,7	2,4	4,4	2,0	5,0	3,1	4,5	3,4	4,7	4,3	6,0	5,3	5,8	5,2
Anfetaminas	3,1	1,3	4,6	1,5	4,7	1,9	5,2	2,0	5,6	2,6	5,7	2,4	4,6	2,4	4,9	3,2	4,3	3,3	4,1	3,9	4,2	4,3	4,2	4,8
Cocaína en polvo	4,7	1,8	7,7	2,4	8,9	3,6	10,4	4,4	11,4	5,5	13,5	7,9	11,0	7,4	11,6	9,4	9,3	8,8	9,9	10,0	10,5	11,1	10,4	12,3
Cocaína base	0,6	0,2	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,6	2,3	1,5	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,6	1,0	1,0	1,4	1,1	1,6	1,3	1,9
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	1,2	3,2	1,1	3,0	1,6	3,1	2,1	4,4	3,1	3,9	3,0
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,5	0,7	0,4	0,9	0,5	1,5	1,0	1,3	1,1	1,7	1,1
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,4	0,8	1,0	0,8	0,6
Heroína	0,6	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3	0,9	0,2	0,9	0,2	0,7	0,2	1,0	0,1	0,9
Inhalables volátiles	0,9	0,4	1,5	0,2	1,7	0,5	1,2	0,5	1,7	0,8	1,1	0,4	1,1	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,9	0,7	1,2	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.7.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022.

	2011		2013		2015		2018		2020		2022	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	77,6	65,7	77,5	68,6	77,1	67,9	74,8	64,5	74,9	65,1	74,4	64,8
Cigarrillos electrónicos	-	-	-	-	7,3	6,3	9,6	8,1	12,0	8,9	13,6	10,7
Alcohol	94,0	87,7	95,0	91,3	95,3	91,7	93,6	88,8	95,5	90,4	94,9	91,4
Hipnosedantes con o sin receta	13,7	25,4	16,8	27,6	13,6	23,9	15,9	25,6	18,3	26,8	19,0	28,0
Hipnosedantes sin receta	2,1	2,6	2,6	2,8	3,3	4,9	2,8	3,2	3,0	3,1	3,6	3,6
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	13,1	16,0	14,1	16,2	14,7	16,9
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,5	1,7	1,3
Cannabis	35,4	19,2	37,9	22,7	40,1	22,8	43,6	26,8	46,3	28,7	48,8	32,9
Éxtasis	5,1	2,0	6,3	2,2	5,3	1,8	5,3	1,9	7,5	2,4	7,4	2,9
Alucinógenos	4,4	1,4	5,8	1,8	5,7	1,8	6,6	2,3	8,2	2,8	7,7	3,1
Anfetaminas	4,8	1,7	5,7	1,8	5,4	1,9	5,8	2,1	6,5	2,0	6,9	2,3
Cocaína polvo y/o base	12,8	4,7	15,0	5,4	13,4	4,7	14,6	5,9	16,4	5,9	17,4	6,6
Cocaína en polvo	12,7	4,7	14,9	5,4	13,3	4,6	14,3	5,7	16,1	5,7	17,1	6,3
Cocaína base	1,5	0,3	1,7	0,3	1,4	0,3	1,8	0,7	2,1	0,8	2,5	0,9
Setas mágicas	3,5	1,2	2,9	0,8	3,0	1,0	3,8	1,1	5,3	1,7	4,6	1,9
Metanfetaminas	1,2	0,3	0,8	0,1	1,0	0,2	1,9	0,5	1,8	0,5	2,0	0,6
GHB	-	-	0,9	0,2	1,0	0,2	0,7	0,2	1,5	0,3	1,1	0,3
Heroína	0,9	0,2	1,2	0,2	1,0	0,3	0,8	0,3	1,2	0,3	1,1	0,2
Inhalables volátiles	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2	0,9	0,3	1,2	0,3	1,4	0,4

H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.8.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Tabaco	-	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2	40,9	39,4	39,0
Alcohol	68,5	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6	75,2	77,2	76,4
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0	11,1	12,0	13,1
Hipnosedantes sin receta	12,3	2,3	2,3	2,8	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3	1,3	1,3	1,3
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,1	6,8
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6
Cannabis	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5	11,0	10,5	10,6
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,1	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,9	0,8
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6	0,4	0,6	0,6
Anfetaminas	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6
Cocaína polvo y/o base	-	-	-	-	-	-	3,1	2,7	2,3	2,2	2,0	2,2	2,5	2,4
Cocaína en polvo	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1	1,9	2,0	2,5	2,3
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.9.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1999-2022.

	1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2018		2020		2022		
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	
Tabaco	49,5	40,6	52,0	41,2	52,8	43,8	47,3	38,8	46,2	38,8	45,3	41,1	43,8	37,9	43,4	39,2	40,8	39,9	41,5	40,6	41,9	38,1	39,5	38,8	
Alcohol	79,0	71,8	81,5	75,2	79,5	74,2	79,4	74,7	76,9	71,1	80,1	77,7	79,1	75,1	81,3	76,7	79,2	76,7	77,2	74,3	79,3	76,2	78,9	75,3	
Hipnosedantes																									
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	14,5	6,4	15,5	6,3	15,0	6,5	13,4	6,7	14,6	7,2	16,0	
Hipnosedantes																									
sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,1	1,3	1,4	2,7	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4	
Analgésicos opioides																									
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	8,5	3,6	8,3
Analgésicos opioides																									
sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	0,5	0,6
Cannabis	12,6	2,2	16,7	3,3	20,1	4,2	19,8	4,7	18,9	3,9	19,4	4,6	17,0	5,1	17,0	4,8	17,1	5,5	18,3	7,4	19,1	6,4	19,1	6,6	
Éxtasis	1,6	0,1	3,7	0,2	2,9	0,1	2,4	0,4	2,4	0,4	1,8	0,2	1,4	0,2	1,5	0,2	1,3	0,2	1,2	0,4	1,6	0,6	1,8	0,3	
Alucinógenos	1,2	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,5	0,1	1,4	0,1	1,1	0,1	0,9	0,1	0,8	0,1	1,1	0,3	0,9	0,2	1,1	0,3	1,1	0,3	
Anfetaminas	1,3	0,2	2,2	0,2	1,6	0,2	1,9	0,3	1,7	0,2	1,4	0,1	1,1	0,3	1,2	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	1,1	0,5	1,1	0,3	
Cocaína en polvo	2,8	0,5	4,5	0,9	4,8	0,9	5,2	1,3	5,3	1,3	4,3	1,5	3,5	1,4	3,2	1,5	3,0	1,3	2,7	1,7	3,1	2,2	3,1	2,0	
Cocaína base	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	
Setas mágicas-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,1	0,5	0,1	0,7	0,2	0,5	0,1	0,7	0,2	0,7	0,2	
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,2	
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	
Heroína	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,5	0,1	

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.10.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022.

	2011		2013		2015		2018		2020		2022	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	44,2	36,0	44,2	37,2	44,4	36,0	46,0	35,8	44,4	34,2	44,0	34,0
Alcohol	83,2	69,9	83,2	73,4	82,9	72,1	81,3	69,2	82,7	71,6	82,1	70,8
Hipnosedantes con o sin receta	7,6	15,3	8,5	16,0	8,3	15,8	8,1	14,1	9,4	14,7	10,3	16,0
Hipnosedantes sin receta	1,1	1,2	1,1	1,3	1,6	2,9	1,2	1,4	1,3	1,2	1,4	1,3
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	5,9	7,4	6,2	8,1	5,8	7,9
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,7	0,5
Cannabis	13,6	5,5	12,9	5,4	13,3	5,6	15,4	6,6	14,6	6,3	14,4	6,8
Éxtasis	1,0	0,4	1,0	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,4	0,4	1,0	0,5
Alucinógenos	0,6	0,2	0,5	0,1	0,8	0,3	0,7	0,2	1,0	0,2	0,7	0,4
Anfetaminas	0,9	0,3	0,8	0,4	0,8	0,3	0,8	0,2	0,9	0,4	0,8	0,3
Cocaína (polvo y/o base)	3,6	0,9	3,3	1,0	3,1	0,9	3,4	1,0	4,1	1,0	3,6	1,1
Cocaína en polvo	3,6	0,9	3,3	0,9	2,9	0,9	3,2	0,8	4,0	0,9	3,5	1,0
Cocaína base	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1
Setas mágicas	0,6	0,2	0,3	0,1	0,5	0,2	0,4	0,1	0,6	0,1	0,5	0,3
Metanfetaminas	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2
GHB	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Heroína	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1

H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.11.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2022.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Tabaco	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5	38,8	36,8	37,2
Alcohol	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4	62,1	62,7	63,0	64,5
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1	7,5	8,6	9,7
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,9	0,7	0,5	0,6
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,6	4,0
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3
Cannabis	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6	7,3	9,1	8,0	8,6
Éxtasis	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Alucinógenos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
Anfetaminas	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Cocaína polvo y/o base	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	1,0	0,9	1,1	1,2	1,4
Cocaína en polvo	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	0,9	1,1	1,1	1,3
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.12.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1999-2022.

	1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2018		2020		2022		
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	
Tabaco	43,7	36,9	46,3	37,5	47,2	39,5	42,3	35,5	42,2	36,3	40,9	38,4	40,4	35,9	40,2	37,2	38,4	38,6	38,5	39,0	38,1	36,2	36,8	37,5	
Alcohol	64,4	59,4	65,7	62,1	65,8	62,7	66,3	63,4	61,7	59,4	63,1	63,3	63,7	61,5	65,4	63,9	61,6	62,4	62,7	62,8	63,4	62,8	65,6	63,9	
Hipnosedantes																									
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	11,3	3,4	12,0	3,3	10,6	3,4	9,6	3,6	10,9	4,2	12,3	
Hipnosedantes																									
sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	0,4	0,6	0,7	1,0	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	
Analgésicos opioides																									
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	4,6	1,6	5,1
Analgésicos opioides																									
sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3
Cannabis	7,9	1,5	11,5	2,3	13,4	2,9	15,4	3,6	13,5	2,8	14,1	3,2	12,5	3,7	12,2	3,5	12,9	4,4	14,6	6,3	14,2	5,1	15,1	5,5	
Éxtasis	0,5	0,0	1,5	0,2	0,7	0,0	1,1	0,2	0,8	0,2	0,8	0,1	0,6	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	
Alucinógenos	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	
Anfetaminas	0,5	0,1	1,1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,4	0,1	
Cocaína en polvo	1,5	0,3	2,4	0,5	1,9	0,4	2,8	0,7	2,9	0,7	2,0	0,7	1,7	0,8	1,2	0,9	1,3	0,6	1,3	1,0	1,2	1,1	1,7	1,1	
Cocaína base	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.13.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022.

	2011		2013		2015		2018		2020		2022	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	41,4	33,7	41,7	34,8	42,6	34,3	43,8	33,8	41,5	32,0	42,2	32,3
Alcohol	73,2	51,2	73,4	55,3	71,3	52,8	71,5	54,0	72,0	53,9	73,1	55,7
Hipnosedantes con o sin receta	5,2	11,4	5,8	12,1	5,4	10,8	5,4	9,7	6,5	10,7	7,3	12,1
Hipnosedantes sin receta	0,6	0,8	0,6	0,5	0,8	1,1	0,5	0,8	0,6	0,4	0,5	0,6
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	2,3	3,4	3,0	4,3	3,1	4,8
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,2
Cannabis	10,2	3,8	9,8	3,4	10,7	3,9	12,9	5,3	11,4	4,7	12,0	5,2
Éxtasis	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,6	0,1	0,3	0,1
Alucinógenos	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
Anfetaminas	0,4	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	0,3	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	1,8	0,5	1,7	0,4	1,5	0,3	1,8	0,4	2,0	0,3	2,1	0,6
Cocaína en polvo	1,8	0,5	1,7	0,4	1,4	0,3	1,8	0,4	1,9	0,3	2,0	0,6
Cocaína base	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
Setas mágicas	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Metanfetaminas	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
GHB	-	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1

H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.14.

Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2022.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8	34,0	32,3	33,1
Alcohol	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8	9,3	7,4	8,8	9,0
Cannabis	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,6	2,0	1,7	1,9	2,1	2,1	2,9	2,8
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	3,1	2,7	4,6	6,8	6,0	5,9	6,4	7,2
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.15.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	69,6	39,0	37,2	33,1
Pipas de agua	17,4	5,5	-	-
Cigarrillos electrónicos	12,1	4,1	2,2	1,0
Alcohol	93,2	76,4	64,5	9,0
Borracheras	69,3	16,7	6,4	0,2
Hipnosedantes sin receta	3,6	1,3	0,6	0,2
Analgésicos opioides sin receta	1,5	0,6	0,3	0,1
Cannabis	40,9	10,6	8,6	2,8
Éxtasis	5,1	0,8	0,2	-
Alucinógenos	5,4	0,6	0,2	-
Anfetaminas	4,6	0,6	0,2	-
Cocaína polvo y/o base	12,0	2,4	1,4	-
Cocaína en polvo	11,7	2,3	1,3	-
Cocaína base	1,7	0,2	0,1	-
Setas mágicas	3,3	0,4	0,1	-
Metanfetaminas	1,3	0,3	0,1	-
GHB	0,7	0,1	0,0	-
Heroína	0,6	0,1	0,0	-
Inhalables volátiles	0,9	0,2	0,1	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.16.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	93,2	94,9	91,4	90,3	91,4	89,2	94,6	96,7	92,5
Borracheras	69,3	79,9	58,6	69,8	75,4	64,1	69,0	82,0	56,0
Tabaco	69,6	74,4	64,8	62,4	65,3	59,4	73,1	78,9	67,3
Pipas de agua (cachimbas shishas, hookah narguile...)	17,4	19,4	15,3	31,2	33,2	29,2	10,8	12,7	8,8
Pipas de agua con hierbas, piedras, melazas, pastas, cremas, gelatinas o saborizantes sin incluir tabaco (nicotina) ni marihuana o hachís (cannabis)	9,4	10,2	8,6	17,3	17,9	16,6	5,6	6,5	4,8
Pipas de agua con tabaco (nicotina) normal o de sabores	7,0	8,2	5,9	12,9	14,5	11,3	4,2	5,1	3,3
Pipas de agua con marihuana o hachís (cannabis)	2,2	3,1	1,3	3,8	4,9	2,6	1,4	2,2	0,6
Cigarrillos electrónicos	12,1	13,6	10,7	17,7	19,8	15,6	9,5	10,5	8,4
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	8,6	9,8	7,4	12,1	13,6	10,6	6,9	8,0	5,8
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con cannabis	0,4	0,5	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,4	0,1
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina y sin cannabis	3,3	3,4	3,1	5,2	5,5	4,9	2,3	2,4	2,3
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar	5,2	5,6	4,8	4,7	5,3	4,2	5,5	5,8	5,1
Hipnosedantes sin receta	3,6	3,6	3,6	2,9	2,7	3,0	3,9	4,0	3,9
Analgésicos opioides sin receta	1,5	1,7	1,3	1,4	1,2	1,5	1,6	1,9	1,2
Cannabis	40,9	48,8	32,9	47,2	53,4	40,8	37,9	46,5	29,2
Cocaína en polvo	11,7	17,1	6,3	10,4	14,5	6,1	12,3	18,3	6,3
Cocaína base	1,7	2,5	0,9	1,3	1,7	0,9	1,9	3,0	0,9
Cocaína polvo y/o base	12,0	17,4	6,6	10,7	14,7	6,5	12,7	18,7	6,7
Éxtasis	5,1	7,4	2,9	6,3	8,1	4,4	4,6	7,0	2,2
Anfetaminas	4,6	6,9	2,3	4,2	5,6	2,9	4,8	7,6	2,0
Alucinógenos	5,4	7,7	3,1	5,8	7,4	4,2	5,2	7,8	2,6
Heroína	0,6	1,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,9	1,5	0,3
Inhalables volátiles	0,9	1,4	0,4	1,2	1,6	0,7	0,8	1,3	0,3
GHB	0,7	1,1	0,3	0,8	1,0	0,6	0,6	1,1	0,2
Metanfetamina	1,3	2,0	0,6	1,7	2,2	1,1	1,1	1,9	0,4
Setas mágicas	3,3	4,6	1,9	3,9	4,7	3,0	3,0	4,6	1,4
Nuevas sustancias	1,9	2,7	1,1	2,8	3,9	1,7	1,5	2,2	0,8
Ketamina	0,9	1,5	0,4	1,4	2,0	0,7	0,7	1,2	0,3
Spice	0,5	0,8	0,3	0,8	1,2	0,5	0,4	0,6	0,2
Mefedrona	0,2	0,3	0,1	0,4	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Ayahuasca	0,3	0,5	0,2	0,5	0,8	0,3	0,2	0,3	0,1
Cocaína rosa	0,5	0,7	0,3	0,6	0,9	0,4	0,4	0,6	0,2
Flakka (Alfa-PVP)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Óxido nitroso	0,2	0,4	0,1	0,5	0,8	0,2	0,1	0,2	0,1
Alguna droga ilegal EMCDDA*	42,2	50,3	34,0	48,3	54,6	41,7	39,3	48,2	30,4
Alguna droga ilegal excepto cannabis EMCDDA**	14,5	20,2	8,8	14,7	18,8	10,4	14,5	20,9	8,1

T = total; H = hombre; M = mujer.

* Alguna droga ilegal EMCDDA: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos

** Alguna droga ilegal sin cannabis EMCDDA: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.17.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	76,4	82,1	70,8	78,9	82,1	75,5	75,3	82,0	68,5
Consumo riesgo alcohol (AUDIT ≥8)	4,8	7,2	2,3	6,7	8,7	4,7	3,8	6,5	1,1
Consumo riesgo alcohol (AUDIT ≥8 en hombres y AUDIT ≥6 en mujeres)	6,0	7,2	4,8	9,1	8,7	9,5	4,6	6,5	2,7
Borracheras	16,7	21,5	11,9	29,8	35,4	24,1	10,4	14,7	6,1
Botellón	7,4	8,4	6,5	20,0	21,6	18,3	1,4	1,9	0,9
Tabaco	39,0	44,0	34,0	39,5	43,4	35,5	38,8	44,4	33,3
Pipas de agua (cachimbas shishas, hookah narguile...)	5,5	6,1	5,0	13,2	14,0	12,5	1,8	2,2	1,4
Cigarrillos electrónicos	4,1	4,3	3,9	7,2	7,5	7,0	2,6	2,8	2,5
Hipnosedantes sin receta	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,3
Hipnos sin receta + alcohol	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2
Hipnos sin receta + drogas ilegales	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1
Hipnos sin receta + alcohol y drogas ilegales	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1
Analgésicos opioides sin receta	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,4
Cannabis	10,6	14,4	6,8	19,1	24,0	13,9	6,6	9,7	3,5
Consumo problemático cannabis CAST ≥4	1,9	3,0	0,8	3,4	4,9	1,9	1,2	2,0	0,3
Consumo problemático cannabis CAST ≥2	4,2	6,3	2,0	7,4	10,4	4,4	2,6	4,3	0,9
Tratamiento por cannabis	2,1	2,3	1,6	2,2	2,9	1,1	1,8	1,5	2,7
Cocaína en polvo	2,3	3,5	1,0	3,1	4,3	1,9	1,9	3,2	0,7
Cocaína en polvo 30 días o más en últimos 12 meses	2,3	3,5	1,0	3,1	4,3	1,8	1,9	3,1	0,6
Cocaína base	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1
Cocaína polvo y/o base	2,4	3,6	1,1	3,1	4,3	1,9	2,0	3,3	0,7
Éxtasis	0,8	1,0	0,5	1,8	2,0	1,5	0,3	0,5	0,1
Anfetaminas	0,6	0,8	0,3	1,1	1,4	0,7	0,3	0,6	0,1
Alucinógenos	0,6	0,7	0,4	1,1	1,4	0,9	0,3	0,4	0,2
Heroína	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
Inhalables volátiles	0,2	0,3	0,1	0,5	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0
GHB	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0
Metanfetamina	0,3	0,3	0,2	0,5	0,5	0,4	0,2	0,3	0,1
Setas mágicas	0,4	0,5	0,3	0,7	0,9	0,6	0,2	0,3	0,1
Heroína o inyección drogas ilegales	5,2	6,2	4,2	5,3	6,1	4,5	5,2	6,3	4,0
Ideas suicidas (pensar en suicidio)	1,9	1,6	2,2	2,3	1,7	2,8	1,7	1,5	1,9
Planeamiento de suicidio	1,0	0,8	1,1	1,4	0,9	1,9	0,8	0,8	0,8
Intento de suicidio	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,8	0,3	0,3	0,3
Alguna droga ilegal EMCDDA*	11,5	15,5	7,5	20,2	25,3	14,9	7,4	10,8	4,1
Alguna droga ilegal excepto cannabis EMCDDA**	3,1	4,5	1,7	4,6	6,0	3,2	2,3	3,7	1,0

T = total; H = hombre; M = mujer.

* Alguna droga ilegal EMCDDA: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos

** Alguna droga ilegal sin cannabis EMCDDA: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.18.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	64,5	73,1	55,7	65,6	70,8	60,3	63,9	74,2	53,6
Borracheras	6,4	8,5	4,2	12,3	14,9	9,5	3,6	5,4	1,7
Binge drinking	15,4	20,3	10,4	22,2	26,2	18,0	12,1	17,4	6,8
Bebidas energéticas	14,2	17,1	11,2	29,2	34,0	24,2	6,9	8,8	5,1
Bebidas energéticas + alcohol	3,6	4,7	2,5	8,5	10,3	6,7	1,3	2,0	0,6
Tabaco	37,2	42,2	32,3	36,8	40,8	32,7	37,5	42,9	32,1
Cigarrillos de cajetilla	26,2	29,0	23,4	21,2	22,7	19,7	28,5	32,0	25,1
Tabaco de liar	6,8	8,0	5,7	9,0	10,1	7,9	5,8	6,9	4,7
De los 2 tipos	3,2	4,1	2,3	5,0	6,2	3,8	2,3	3,1	1,6
Cigarrillos electrónicos	2,2	2,3	2,1	3,6	3,7	3,5	1,5	1,5	1,4
Hipnosedantes sin receta	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6
Analgésicos opioides sin receta	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3	0,4	0,2
Cannabis (algún día)	8,6	12,0	5,2	15,1	19,7	10,4	5,5	8,3	2,8
Cannabis (20 días o más)	5,5	7,6	3,4	10,6	13,6	7,5	3,1	4,7	1,4
Marihuana	3,8	5,2	2,3	6,9	8,7	5,0	2,3	3,6	1,0
Hachís	1,7	2,4	1,0	2,8	3,6	2,1	1,1	1,8	0,5
De los 2 tipos	2,2	3,3	1,1	4,3	6,2	2,4	1,2	1,9	0,5
Marihuana + de los 2 tipos	6,0	8,6	3,4	11,2	14,9	7,3	3,5	5,5	1,5
Hachís + de los 2 tipos	3,9	5,7	2,1	7,2	9,8	4,4	2,4	3,7	1,0
En forma de porro	7,5	10,7	4,3	13,8	18,3	9,2	4,5	7,0	1,9
Usando cachimbos	0,4	0,5	0,3	0,9	1,1	0,7	0,2	0,3	0,1
Usando cigarrillos electrónicos	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Por vía oral	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Cannabis + tabaco	6,8	9,8	3,8	12,5	16,6	8,3	4,1	6,5	1,7
Cocaína en polvo	1,3	2,0	0,6	1,7	2,4	1,1	1,1	1,8	0,4
Cocaína base	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
Cocaína polvo y/o base	1,4	2,1	0,6	1,8	2,4	1,1	1,2	1,9	0,4
Éxtasis	0,2	0,3	0,1	0,5	0,7	0,3	0,1	0,2	0,0
Anfetaminas	0,2	0,3	0,1	0,4	0,5	0,3	0,1	0,2	0,0
Alucinógenos	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0
GHB	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0
Setas mágicas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Alguna droga ilegal EMCDDA*	9,2	12,8	5,5	15,8	20,6	10,8	6,0	9,0	3,0
Alguna droga ilegal excepto cannabis EMCDDA**	1,6	2,4	0,8	2,2	2,9	1,4	1,3	2,2	0,5

T = total; H = hombre; M = mujer.

* Alguna droga ilegal EMCDDA: No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos

** Alguna droga ilegal sin cannabis EMCDDA: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.19.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	9,0	14,6	3,5	3,1	4,8	1,3	11,9	19,3	4,5
Borracheras	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,5	0,1
Tabaco	33,1	37,8	28,3	30,5	34,5	26,4	34,3	39,5	29,1
Cigarrillos electrónicos	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5	1,3	0,9	0,7	1,0
Hipnosedantes sin receta	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2
Analgésicos opioides sin receta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0
Cannabis	2,8	4,3	1,4	4,8	6,9	2,7	1,9	3,0	0,7

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.20.

Edad media (años) de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años. España, 1995-2022.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Tabaco	15,9	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,6	16,6	16,6
Alcohol	-	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,7	16,5
Cannabis	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7	18,6	18,3	18,4	18,5	18,3
Inhalables volátiles	17,7	19,0	18,1	17,5	17,5	17,8	19,7	19,2	19,7	19,4	20,5	20,1	21,5	19,8
Anfetaminas	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2	20,8	20,2	20,4	20,6	20,1
Alucinógenos	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5	20,9	20,3	20,9	21,2	21,0
Cocaína en polvo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0	21,3	20,9	21,1	21,1	21,1
Éxtasis	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8	21,1	20,7	21,1	20,7	20,5
Cocaína polvo y/o base	-	-	-	-	-	-	-	20,9	21,0	21,3	20,8	21,1	21,1	21,1
Heroína	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5	22,2	22,7	22,6	21,2
Cocaína base	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	21,4	23,1	22,4	23,2	20,7	23,2	21,8	21,0
Hipnosedantes sin receta	35,2	28,7	29,2	29,5	30,0	-	29,1	29,5	27,8	31,3	32,5	31,6	30,6	30,8
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	33,8	34,5	34,5	35,2	35,6	34,4	34,4	35,0
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	35,3
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	25,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.21.

Edad media (años) de inicio de consumo de diferentes sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años, según sexo. España, 2018-2022.


	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	16,6	15,9	17,3	16,7	16,2	17,2	16,5	16,0	17,0
Borracheras	-	-	-	17,5	17,2	17,8	17,4	17,1	17,9
Tabaco	16,6	16,3	16,8	16,6	16,3	16,8	16,6	16,4	16,7
Tabaco (consumo diario)	18,6	18,4	18,8	18,3	18,1	18,5	18,4	18,3	18,5
Pipas de agua	-	-	-	-	-	-	21,8	21,3	22,4
Cigarrillos electrónicos	33,0	31,9	34,4	30,4	29,8	31,4	31,0	30,6	31,4
Hipnosedantes sin receta	31,6	30,1	33,0	30,6	30,2	31,0	30,8	30,0	31,6
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	27,7	28,5	26,5	25,6	26,3	24,5
Cannabis	18,4	18,0	19,1	18,5	18,1	19,1	18,3	18,0	18,8
Cocaína en polvo	21,1	20,8	21,7	21,1	21,0	21,5	21,1	21,0	21,7
Cocaína base	23,2	22,6	25,4	21,8	21,9	21,4	21,0	21,2	20,2
Cocaína polvo y/o base	21,1	20,9	21,8	21,1	21,0	21,5	21,1	20,9	21,7
Éxtasis	21,1	21,0	21,4	20,7	20,7	20,9	20,5	20,5	20,7
Anfetaminas	20,4	20,4	20,4	20,6	20,5	20,7	20,1	20,3	19,7
Alucinógenos	20,9	20,4	22,1	21,2	21,1	21,5	21,0	20,9	21,0
Heroína	22,7	22,7	22,4	22,6	22,0	25,0	21,2	20,8	23,2
Inhalables volátiles	20,1	20,2	19,8	21,5	21,4	21,5	19,8	19,4	21,2
GHB	22,4	22,8	20,7	23,7	23,4	24,7	22,8	23,5	20,1
Metanfetamina	23,1	23,0	23,5	23,3	23,1	23,7	22,2	22,3	21,9
Setas mágicas	22,1	21,7	23,3	22,2	22,4	21,3	22,2	22,2	22,1

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.22.

Edad media (años) de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años. España, 2022.



1.1.23.

Edad media (años) de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2022.

	Hombre	Mujer
Tabaco	16,4	16,7
Alcohol	16,0	17,0
Cannabis	18,0	18,8
Inhalables volátiles	19,4	21,2
Anfetaminas	20,3	19,7
Alucinógenos	20,9	21,0
Cocaína en polvo	21,0	21,7
Éxtasis	20,5	20,7
Cocaína polvo y/o base	20,9	21,7
Setas mágicas	22,2	22,1
GHB	23,5	20,1
Heroína	20,8	23,2
Metanfetaminas	22,3	21,9
Cocaína base	21,2	20,2
Hipnosedantes sin receta	30,0	31,6
Hipnosedantes con o sin receta	34,7	35,2
Analgésicos opioides con o sin receta	34,8	35,7
Analgésicos opioides sin receta	26,3	24,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

Prevalencia del consumo de drogas 2022: comunidad/ciudad autónoma

1.1.24.

Edad media (años) de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma. España, 2022.

	Tamaño muestra	Edad media inicio consumo tabaco	Edad media inicio consumo tabaco diario	Edad media inicio consumo bebidas alcohólicas	Edad media inicio consumo cannabis
Andalucía	2.229	16,7	18,2	16,8	18,8
Aragón	858	16,8	18,6	16,7	17,9
Asturias	1.296	16,3	18,2	16,3	18,3
Baleares	840	16,8	18,3	16,6	18,3
Canarias	1.698	16,8	17,9	17,1	18,0
Cantabria	995	16,2	18,2	16,1	18,4
Castilla y León	1.784	16,1	17,9	16,2	18,5
Castilla-La Mancha	1.596	16,2	17,5	16,2	17,5
Cataluña	2.117	16,9	18,8	16,8	18,2
C. Valenciana	2.249	16,1	18,9	15,9	18,7
Extremadura	779	16,4	18,3	16,6	18,7
Galicia	1.745	16,4	18,3	16,3	18,3
Madrid	2.500	16,6	18,4	16,7	18,2
Murcia	1.498	16,5	18,2	16,1	18,0
Navarra	1.206	16,1	18,4	15,9	17,5
País Vasco	1.108	16,7	18,0	16,3	18,3
La Rioja	999	16,6	18,0	16,1	18,6
Ceuta	618	17,1	19,1	17,3	18,3
Melilla	229	16,8	19,0	17,3	19,2
Media España	26.344	16,6	18,4	16,5	18,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.25.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	93,2	92,1	94,2	74,8	73,0	76,6	59,5	57,4	61,5
Aragón	93,9	92,2	95,5	82,5	80,0	85,1	71,7	68,7	74,7
Asturias	95,9	94,8	96,9	79,8	77,6	82,0	71,9	69,5	74,4
Baleares	91,8	89,9	93,7	67,9	64,7	71,1	54,8	51,5	58,2
Canarias	91,7	90,4	93,1	75,5	73,4	77,5	60,4	58,1	62,8
Cantabria	94,9	93,6	96,3	78,4	75,9	81,0	63,8	60,9	66,8
Castilla y León	95,5	94,5	96,4	79,5	77,6	81,4	68,4	66,2	70,5
Castilla-La Mancha	91,9	90,6	93,2	69,9	67,6	72,1	63,8	61,4	66,2
Cataluña	91,3	90,1	92,5	74,3	72,4	76,1	61,7	59,6	63,7
C. Valenciana	96,9	96,1	97,6	88,0	86,7	89,3	73,3	71,4	75,1
Extremadura	90,4	88,4	92,5	67,8	64,6	71,1	58,4	54,9	61,8
Galicia	94,7	93,7	95,8	75,2	73,2	77,3	65,0	62,7	67,2
Madrid	92,8	91,8	93,8	73,1	71,3	74,8	64,5	62,6	66,4
Murcia	92,2	90,8	93,5	81,1	79,1	83,1	69,4	67,1	71,7
Navarra	94,7	93,4	95,9	81,0	78,7	83,2	71,1	68,6	73,7
País Vasco	95,0	93,7	96,3	81,1	78,8	83,4	71,0	68,3	73,7
La Rioja	93,3	91,8	94,9	77,7	75,1	80,2	68,4	65,5	71,3
Ceuta	65,7	62,0	69,5	53,2	49,3	57,1	44,7	40,8	48,6
Melilla	37,6	31,3	43,9	31,1	25,1	37,1	25,6	19,9	31,2
Media España	93,2	92,9	93,5	76,4	75,9	76,9	64,5	63,9	65,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.26.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años por CCAA según sexo. España, 2022.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
Andalucía	95,4	90,9	82,8	66,8	71,1	47,8
Aragón	95,3	92,3	84,9	80,1	79,0	64,1
Asturias	96,7	95,0	84,7	74,9	79,3	64,7
Baleares	92,9	90,6	75,4	60,2	64,3	45,1
Canarias	94,9	88,6	81,9	69,0	68,9	51,9
Cantabria	96,2	93,6	85,2	71,7	72,8	54,9
Castilla y León	97,5	93,3	85,1	73,7	76,9	59,5
Castilla-La Mancha	95,4	88,3	78,2	61,1	74,4	52,6
Cataluña	91,9	90,7	77,0	71,4	68,4	54,8
C. Valenciana	97,1	96,7	90,1	85,8	79,7	66,8
Extremadura	95,9	84,8	82,9	52,3	74,6	41,6
Galicia	96,1	93,3	83,2	67,4	75,2	54,9
Madrid	95,6	90,1	79,3	67,1	72,7	56,7
Murcia	94,3	89,9	84,9	77,1	75,8	62,6
Navarra	95,3	94,0	85,4	76,4	78,8	63,3
País Vasco	95,3	94,7	85,8	76,3	77,8	64,2
La Rioja	94,7	92,0	81,0	74,3	74,7	62,0
Ceuta	72,9	58,2	60,3	45,7	52,6	36,3
Melilla	45,7	29,0	36,0	26,0	28,5	22,4
Media España	94,9	91,4	82,1	70,8	73,1	55,7

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.27.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

	Últimos 30 días
Andalucía	59,5
Aragón	71,7
Asturias	71,9
Baleares	54,8
Canarias	60,4
Cantabria	63,8
Castilla y León	68,4
Castilla-La Mancha	63,8
Cataluña	61,7
C. Valenciana	73,3
Extremadura	58,4
Galicia	65,0
Madrid	64,5
Murcia	69,4
Navarra	71,1
País Vasco	71,0
La Rioja	68,4
Ceuta	44,7
Melilla	25,6
Media España	64,5

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ÚLTIMOS 30 DIAS

Media nacional 64,5%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.28.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida				Últimos 12 meses		
	Tamaño muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.229	62,8	60,8	64,8	16,1	14,6	17,6
Aragón	858	70,8	67,7	73,8	15,6	13,1	18,0
Asturias	1.296	69,8	67,3	72,3	14,5	12,6	16,4
Baleares	840	73,6	70,6	76,6	18,8	16,2	21,5
Canarias	1.698	68,4	66,2	70,6	25,6	23,5	27,7
Cantabria	995	77,5	74,9	80,1	16,0	13,7	18,3
Castilla y León	1.784	77,4	75,4	79,3	16,9	15,2	18,7
Castilla-La Mancha	1.596	68,0	65,7	70,3	17,4	15,6	19,3
Cataluña	2.117	66,5	64,5	68,5	15,2	13,7	16,8
C. Valenciana	2.249	77,7	76,0	79,4	12,3	11,0	13,7
Extremadura	779	63,4	60,1	66,8	21,7	18,8	24,6
Galicia	1.745	73,7	71,6	75,7	20,0	18,1	21,8
Madrid	2.500	65,3	63,4	67,2	13,3	11,9	14,6
Murcia	1.498	69,7	67,4	72,0	23,7	21,6	25,9
Navarra	1.206	84,6	82,5	86,6	27,5	25,0	30,0
País Vasco	1.108	79,8	77,4	82,2	20,4	18,0	22,8
Rioja	999	77,4	74,8	80,0	24,3	21,6	27,0
Ceuta	618	48,0	44,1	52,0	10,8	8,3	13,2
Melilla	229	27,8	22,0	33,6	12,0	7,8	16,2
Total	26.344	69,3	68,7	69,8	16,7	16,2	17,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.29.


Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	16,1	14,6	17,6
Aragón	15,6	13,1	18,0
Asturias	14,5	12,6	16,4
Baleares	18,8	16,2	21,5
Canarias	25,6	23,5	27,7
Cantabria	16,0	13,7	18,3
Castilla y León	16,9	15,2	18,7
Castilla-La Mancha	17,4	15,6	19,3
Cataluña	15,2	13,7	16,8
C. Valenciana	12,3	11,0	13,7
Extremadura	21,7	18,8	24,6
Galicia	20,0	18,1	21,8
Madrid	13,3	11,9	14,6
Murcia	23,7	21,6	25,9
Navarra	27,5	25,0	30,0
País Vasco	20,4	18,0	22,8
La Rioja	24,3	21,6	27,0
Ceuta	10,8	8,3	13,2
Melilla	12,0	7,8	16,2
Media España	16,7	16,2	17,1

PREVALENCIA DE BORRACHERAS ÚLTIMOS 12 MESES

Media nacional 16,7%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.30.

Prevalencias de botellón entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

Últimos 12 meses				
	Tamaño muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.229	7,2	6,2	8,3
Aragón	858	7,1	5,3	8,8
Asturias	1.296	2,6	1,7	3,4
Baleares	840	8,0	6,2	9,8
Canarias	1.698	7,5	6,3	8,8
Cantabria	995	7,0	5,4	8,6
Castilla y León	1.784	6,6	5,4	7,7
Castilla-La Mancha	1.596	11,2	9,6	12,7
Cataluña	2.117	7,6	6,4	8,7
C. Valenciana	2.249	7,4	6,3	8,4
Extremadura	779	8,2	6,3	10,1
Galicia	1.745	5,8	4,7	6,9
Madrid	2.500	6,6	5,6	7,5
Murcia	1.498	12,2	10,5	13,9
Navarra	1.206	9,9	8,2	11,6
País Vasco	1.108	7,8	6,2	9,4
Rioja	999	7,5	5,9	9,1
Ceuta	618	8,2	6,0	10,4
Melilla	229	8,8	5,1	12,4
Total	26.344	7,4	7,1	7,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.31.


Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

	Últimos 30 días
Andalucía	16.6
Aragón	11.6
Asturias	16.3
Baleares	12.2
Canarias	22.7
Cantabria	12.2
Castilla y León	15.9
Castilla-La Mancha	18.7
Cataluña	9.6
C. Valenciana	14.0
Extremadura	20.3
Galicia	22.6
Madrid	13.1
Murcia	24.6
Navarra	16.6
País Vasco	17.0
La Rioja	22.9
Ceuta	12.2
Melilla	8.6
Media España	15,4

PREVALENCIA DE BINGE DRINKING ÚLTIMOS 30 DIAS

Media nacional 15,4%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.32.

Prevalencia de consumo de tabaco entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			A diario últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	59,9	57,8	61,9	35,6	33,6	37,6	34,0	32,0	35,9	29,6	27,7	31,5
Aragón	79,5	76,8	82,2	41,8	38,5	45,1	39,9	36,7	43,2	34,6	31,4	37,8
Asturias	74,8	72,4	77,2	37,3	34,7	40,0	35,5	32,9	38,2	33,2	30,6	35,7
Baleares	62,9	59,6	66,1	33,7	30,5	36,9	32,5	29,3	35,6	27,5	24,5	30,5
Canarias	64,0	61,7	66,3	41,5	39,1	43,8	40,0	37,7	42,4	35,7	33,4	37,9
Cantabria	68,7	65,8	71,6	35,8	32,8	38,8	34,4	31,5	37,4	31,5	28,6	34,4
Castilla y León	71,1	69,0	73,2	36,0	33,8	38,3	34,5	32,3	36,7	30,1	28,0	32,2
Castilla-La Mancha	63,4	61,0	65,8	41,5	39,0	43,9	39,9	37,5	42,3	36,8	34,5	39,2
Cataluña	74,5	72,6	76,3	41,0	38,9	43,1	38,8	36,8	40,9	34,0	32,0	36,0
C. Valenciana	85,6	84,1	87,0	48,5	46,4	50,5	46,5	44,4	48,5	42,3	40,3	44,3
Extremadura	67,3	64,0	70,6	44,7	41,2	48,2	44,2	40,8	47,7	43,3	39,8	46,8
Galicia	70,6	68,5	72,8	38,3	36,1	40,6	36,6	34,4	38,9	32,7	30,5	34,9
Madrid	66,5	64,7	68,4	34,5	32,7	36,4	32,7	30,9	34,6	29,4	27,6	31,2
Murcia	73,9	71,7	76,1	44,8	42,3	47,3	42,7	40,2	45,2	36,6	34,1	39,0
Navarra	70,6	68,0	73,2	38,4	35,6	41,1	36,5	33,8	39,2	32,3	29,6	34,9
País Vasco	69,0	66,3	71,7	34,5	31,7	37,3	32,5	29,8	35,3	28,1	25,5	30,8
La Rioja	69,0	66,1	71,9	36,4	33,4	39,4	33,0	30,0	35,9	25,9	23,2	28,6
Ceuta	55,6	51,7	59,5	37,6	33,8	41,4	36,3	32,5	40,1	32,7	29,0	36,4
Melilla	26,3	20,6	32,0	20,3	15,1	25,5	19,4	14,3	24,5	12,8	8,5	17,1
Media España	69,6	69,1	70,2	39,0	38,4	39,6	37,2	36,7	37,8	33,1	32,5	33,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.33.

Prevalencia de consumo de tabaco en la población de 15-64 años por CCAA según sexo. España, 2022.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días		A diario en los últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M	H	M
Andalucía	64,9	54,9	39,0	32,2	37,2	30,7	32,9	26,2
Aragón	81,9	76,9	43,2	40,3	41,4	38,4	36,3	32,8
Asturias	75,6	74,0	39,5	35,2	38,1	33,0	35,0	31,4
Baleares	69,3	56,2	40,1	27,2	39,1	25,6	34,3	20,5
Canarias	69,4	58,5	48,8	34,2	47,8	32,2	42,4	28,9
Cantabria	71,1	66,3	39,4	32,1	37,9	30,9	34,0	28,9
Castilla y León	74,6	67,5	40,3	31,7	39,2	29,7	34,3	25,9
Castilla-La Mancha	68,2	58,3	47,8	34,7	46,6	32,9	44,2	29,0
Cataluña	80,1	68,7	47,4	34,5	44,6	32,9	39,5	28,5
C. Valenciana	87,9	83,2	55,8	40,9	53,8	38,9	49,9	34,6
Extremadura	76,6	57,8	53,2	36,0	52,5	35,7	51,5	34,8
Galicia	76,2	65,1	44,5	32,3	43,1	30,3	39,5	26,0
Madrid	72,4	60,9	38,2	31,0	36,3	29,4	32,8	26,1
Murcia	79,3	68,2	50,3	39,0	48,1	37,0	41,1	31,9
Navarra	75,6	65,4	41,6	35,0	40,0	32,8	35,0	29,4
Pais Vasco	71,1	66,9	35,5	33,5	34,0	31,1	28,4	27,9
La Rioja	76,2	61,6	43,1	29,6	40,1	25,8	31,2	20,7
Ceuta	66,4	44,3	45,8	28,9	43,5	28,6	41,1	23,7
Melilla	36,4	15,6	26,9	13,4	26,2	12,2	18,8	6,2
Media España	74,4	64,8	44,0	34,0	42,2	32,3	37,8	28,3

H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.34.


Prevalencia de consumo de tabaco diario entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

	Últimos 30 días
Andalucía	29,6
Aragón	34,6
Asturias	33,2
Baleares	27,5
Canarias	35,7
Cantabria	31,5
Castilla y León	30,1
Castilla-La Mancha	36,8
Cataluña	34,0
C. Valenciana	42,3
Extremadura	43,3
Galicia	32,7
Madrid	29,4
Murcia	36,6
Navarra	32,3
País Vasco	28,1
La Rioja	25,9
Ceuta	32,7
Melilla	12,8
Media España	33,1

PREVALENCIA DE TABACO DIARIO

Media nacional 33,1%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.35.

Prevalencias de consumo de cigarrillos electrónicos entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

Alguna vez en la vida				
	Tamaño muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.229	13,7	12,3	15,1
Aragón	858	13,6	11,3	15,9
Asturias	1.296	9,0	7,5	10,6
Baleares	840	16,4	13,9	18,9
Canarias	1.698	18,0	16,2	19,8
Cantabria	995	8,6	6,9	10,3
Castilla y León	1.784	11,3	9,9	12,8
Castilla-La Mancha	1.596	6,1	4,9	7,3
Cataluña	2.117	11,7	10,3	13,0
C. Valenciana	2.249	18,5	16,9	20,1
Extremadura	779	6,8	5,0	8,5
Galicia	1.745	9,7	8,3	11,1
Madrid	2.500	7,5	6,5	8,5
Murcia	1.498	16,1	14,3	18,0
Navarra	1.206	12,5	10,6	14,3
País Vasco	1.108	9,8	8,0	11,5
Rioja	999	11,9	9,9	13,9
Ceuta	618	10,4	8,0	12,8
Melilla	229	4,7	1,9	7,4
Total	26.344	12,1	11,7	12,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.36.

Prevalencias de consumo de cigarrillos electrónicos entre la población de 15-64 años, por comunidad/ciudad autónoma, según sexo. España, 2022.

	Alguna vez en la vida	
	Hombre	Mujer
Andalucía	14,2	13,2
Aragón	15,9	11,2
Asturias	8,7	9,3
Baleares	18,1	14,6
Canarias	17,5	18,5
Cantabria	8,7	8,5
Castilla y León	13,3	9,3
Castilla-La Mancha	6,5	5,7
Cataluña	13,8	9,5
C. Valenciana	21,4	15,6
Extremadura	10,0	3,4
Galicia	10,6	8,9
Madrid	8,3	6,8
Murcia	18,9	13,2
Navarra	14,9	9,9
País Vasco	11,2	8,3
Rioja*	13,7	10,1
Ceuta*	13,8	6,8
Melilla*	8,4	0,7
Total	13,6	10,7

* Los valores de estas CCAA/CA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.37.

Prevalencias de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida				Últimos 12 meses		
	Tamaño muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.229	25,6	23,7	27,4	8,7	7,5	9,9
Aragón	858	42,9	39,6	46,2	9,9	7,9	11,9
Asturias	1.296	46,0	43,3	48,8	6,2	4,9	7,6
Baleares	840	50,9	47,5	54,3	12,8	10,5	15,0
Canarias	1.698	39,1	36,8	41,4	14,0	12,3	15,6
Cantabria	995	44,0	40,9	47,0	7,9	6,2	9,6
Castilla y León	1.784	38,1	35,9	40,4	7,2	6,0	8,4
Castilla-La Mancha	1.596	30,0	27,8	32,3	8,9	7,5	10,3
Cataluña	2.117	49,6	47,5	51,7	13,2	11,7	14,6
C. Valenciana	2.249	56,6	54,6	58,7	13,3	11,9	14,7
Extremadura	779	31,5	28,2	34,7	7,8	5,9	9,7
Galicia	1.745	41,5	39,2	43,8	12,2	10,6	13,7
Madrid	2.500	37,4	35,5	39,3	8,3	7,3	9,4
Murcia	1.498	44,5	42,0	47,1	16,1	14,3	18,0
Navarra	1.206	53,9	51,1	56,8	10,9	9,1	12,6
País Vasco	1.108	48,6	45,7	51,6	9,9	8,1	11,6
Rioja	999	41,8	38,7	44,9	11,2	9,3	13,2
Ceuta	618	25,9	22,4	29,3	8,0	5,8	10,1
Melilla	229	14,9	10,3	19,5	5,6	2,6	8,6
Total	26.344	40,9	40,3	41,5	10,6	10,3	11,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.38.

Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años por CCAA según sexo. España, 2022.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	32,9	18,1	11,9	5,5
Aragón	55,4	29,9	11,9	7,9
Asturias	52,3	40,0	8,2	4,3
Baleares	60,0	41,6	19,7	5,7
Canarias	46,8	31,3	19,2	8,7
Cantabria	49,1	38,8	9,7	6,1
Castilla y León	46,6	29,3	9,7	4,7
Castilla-La Mancha	38,7	20,9	12,8	4,8
Cataluña	59,2	39,9	17,7	8,6
C. Valenciana	63,9	49,2	17,7	8,7
Extremadura	39,4	23,3	11,5	4,0
Galicia	49,9	33,2	15,7	8,7
Madrid	43,1	32,1	11,3	5,6
Murcia	53,7	34,9	22,1	9,9
Navarra	60,6	47,1	15,7	5,9
País Vasco	56,0	41,2	13,3	6,4
La Rioja	49,2	34,3	12,8	9,6
Ceuta	39,0	12,0	12,2	3,5
Melilla	22,0	7,4	9,9	1,0
Media España	48,8	32,9	14,4	6,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.39.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.

	Últimos 12 meses
Andalucía	8,7
Aragón	9,9
Asturias	6,2
Baleares	12,8
Canarias	14,0
Cantabria	7,9
Castilla y León	7,2
Castilla-La Mancha	8,9
Cataluña	13,2
C. Valenciana	13,3
Extremadura	7,8
Galicia	12,2
Madrid	8,3
Murcia	16,1
Navarra	10,9
País Vasco	9,9
La Rioja	11,2
Ceuta	8,0
Melilla	5,6
Media España	10,6

CONSUMO DE CANNABIS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 10,6%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.40.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre la población de 15-64 años (%)* por comunidad/ciudad autónoma. España, 2022.


	Campañas publicitarias	Educación en las escuelas	Tratamiento voluntario a consumidores	Tratamiento obligatorio a consumidores	Administración médica de metadona	Administración médica de heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas contra las drogas	Legalización de cannabis	Legalización de todas las drogas
Andalucía	97,7	99,3	96,2	76,5	88,5	82,7	95,6	92,7	53,6	32,5
Aragón	97,1	99,5	99,5	68,1	98,1	92,4	97,9	93,2	64,0	11,2
Asturias	86,7	96,9	95	57,3	73,7	50,7	97,5	97,2	47,7	20,4
Baleares	97,8	99	98,8	56,0	87,1	66,9	96,9	94,6	59,9	23,4
Canarias	96,1	99,1	97	83,9	96,3	90,0	97,7	94,0	61,2	26,0
Cantabria	95,2	96,1	94,0	61,0	72,9	59,0	97,2	94,0	37,8	7,5
Castilla y León	95,4	98,8	98,9	83,4	95,2	86,4	97,4	95,7	42,0	10,4
Castilla-La Mancha	97,3	99,0	98	84,4	93,8	84,7	96,2	94,1	50,6	31,2
Cataluña	95,5	95,2	95,4	76,0	91,4	81,6	94,2	91,8	64,9	47,7
C. Valenciana	95,5	98,0	96,1	80,2	91,7	73,3	94,8	93,7	47,6	25,2
Extremadura	98,9	99,3	99,5	93,3	96,6	92,8	99,2	99,0	24,5	7,1
Galicia	94,1	99,1	98,1	71,6	93,9	69,0	96,8	92,4	59,8	27,3
Madrid	97,4	97,9	97,7	90,9	95,5	91,5	96,4	93,1	71,2	54,5
Murcia	96,7	99,6	97,9	84,5	94,7	91,4	97,1	95,2	59,2	30,4
Navarra	93,2	97,0	98	62,4	84,1	64,5	89,7	89,2	47,2	17,0
País Vasco	95,8	99,4	99,7	80,7	96,3	87,7	95,2	92,3	60,1	26,3
Rioja	98,3	99,2	98,9	81,4	95,2	78,4	96,1	94,2	41,1	18,3
Ceuta	91,7	99,4	97,8	92,7	73,3	60,6	99,0	97,0	46,0	15,5
Melilla	88,5	96	90,7	91,1	90,7	81,5	94,2	92,0	33,5	16,4
Total	96,2	98,1	97,0	79,2	92,0	82,2	95,9	93,3	57,1	32,8

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.41.

Valoración de la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas ilegales entre la población de 15-64 años (%)* por comunidad/ciudad autónoma. España, 2022.




Andalucía	53,6
Aragón	64,0
Asturias	47,7
Baleares	59,9
Canarias	61,2
Cantabria	37,8
Castilla y León	42,0
Castilla-La Mancha	50,6
Cataluña	64,9
C. Valenciana	47,6
Extremadura	24,5
Galicia	59,8
Madrid	71,2
Murcia	59,2
Navarra	47,2
País Vasco	60,1
Rioja	41,1
Ceuta	46,0
Melilla	33,5
Total	57,1

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.42.

Prevalencia de bebidas energéticas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2022.



Andalucía	18,6
Aragón	13,1
Asturias	5,3
Baleares	17,4
Canarias	28,9
Cantabria	18,2
Castilla y León	9,7
Castilla-La Mancha	13,7
Cataluña	12,2
C. Valenciana	14,5
Extremadura	12,6
Galicia	10,6
Madrid	11,1
Murcia	16,2
Navarra	11,6
País Vasco	6,2
Rioja	11,6
Ceuta	29,2
Melilla	42,8
Total	14,2

% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

Consumo por tipo de droga: bebidas alcohólicas

1.1.43.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas (%) y edad media en el inicio de consumo de bebidas alcohólicas (años) en la población de 15-64 años. España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.44.


Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida														
Hombre	-	-	-	-	-	-	-	-	94,0	95,0	95,3	93,6	95,5	94,9
Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	87,7	91,3	91,7	88,8	90,4	91,4
Últimos 12 meses														
Hombre	79,3	86,4	83,2	85,2	84,5	84,0	80,4	84,4	83,2	83,2	82,9	81,3	82,7	82,1
Mujer	58,0	70,5	67,2	70,9	68,4	69,2	66,4	72,7	69,9	73,4	72,1	69,2	71,6	70,8
Últimos 30 días														
Hombre	-	75,8	74,4	76,4	75,8	76,0	71,4	74,0	73,2	73,4	71,3	71,5	72,0	73,1
Mujer	-	52,1	49,1	50,9	52,1	52,9	49,0	52,2	51,2	55,3	52,8	54,0	53,9	55,7
Diariamente en los últimos 30 días														
Hombre	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	15,0	14,5	11,5	14,2	14,6
Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	4,5	4,1	3,3	3,4	3,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.45.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses y percepción del riesgo del consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.46.


Prevalencia de consumo diario de alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.47.

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días, en población de 15-24 años, según sexo (%). España, 2009-2022.



	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombres 15-17 años	43,6	40,1	42,5	30,7	38,3	44,0	38,2
Mujeres 15-17 años	37,9	41,8	40,0	36,0	34,3	30,9	37,8
Hombres 15-24 años	65,2	67,3	68,0	63,8	64,4	68,0	65,2
Mujeres 15-24 años	55,1	56,3	60,8	54,9	54,8	55,1	60,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.48.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	93,2	94,9	91,4	85,3	85,7	84,9	94,7	96,5	92,8	94,2	95,9	92,6	94,9	96,7	93,2	94,5	97,5	91,6
Últimos 12 meses	76,4	82,1	70,8	76,2	77,3	75,1	81,1	86,4	75,8	77,0	84,0	70,1	76,5	82,5	70,4	72,0	79,5	64,7
Últimos 30 días	64,5	73,1	55,7	62,7	65,2	60,0	68,2	75,8	60,5	65,1	75,6	54,7	64,8	74,3	55,2	61,6	72,8	50,7
Diariamente en los últimos 30 días	9,0	14,6	3,5	1,3	1,9	0,7	4,7	7,4	1,9	8,1	12,8	3,5	11,1	18,1	4,0	16,8	27,6	6,1
Nunca	6,8	5,1	8,6	14,7	14,3	15,1	5,3	3,5	7,2	5,8	4,1	7,4	5,1	3,3	6,8	5,5	2,5	8,4

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.49.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según nivel más alto de estudios que ha completado o aprobado y según sexo (%). España, 2022.

	Total			Hombre			Mujer		
	Sin estudios/ Est. primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios	Sin estudios/ Est. primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios	Sin estudios/ Est. primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios
Consumo de alcohol alguna vez en la vida	83,6	93,3	97,2	88,9	95,0	97,8	77,9	91,5	96,6
Consumo de alcohol en los últimos 12 meses	61,4	76,2	84,0	69,5	82,2	87,8	53,0	69,9	80,6
Consumo de alcohol en los últimos 30 días	47,5	63,9	73,6	59,6	72,9	80,2	34,8	54,6	67,8
Consumo diario de alcohol en los últimos 30 días	12,2	9,2	6,9	20,2	14,9	10,	3,9	3,3	3,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.50.

Prevalencia de consumo de alcohol (%) durante el embarazo y edad media de inicio en el consumo de alcohol (años) en las mujeres de 15-64 años (%). España, 2020-2022.

	2020	2022
Consumo en el embarazo*	1,2	1,6
Edad media de inicio en el consumo**	15,7	16,1


* Porcentaje calculado tras excluir las mujeres que han respondido que no han estado embarazadas nunca.

** Edad media de inicio en aquellas mujeres que han consumido alcohol en algún embarazo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.51.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años, según tipo de bebida alcohólica consumida y según sexo (%). España, 2022.



	Vino	Cerveza	Combinados	Vermú	Licores de frutas	Licores fuertes solos
Hombre	23,0	51,1	17,8	3,2	2,7	3,1
Mujer	18,2	29,4	10,2	2,3	1,5	0,8
Total	20,6	40,3	14,0	2,8	2,1	2,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.52.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años que ha consumido bebidas alcohólicas en ese periodo, según tipo de bebida alcohólica consumida y según sexo (%). España, 2022.

	Total	Hombre	Mujer
Vino	38,7	36,7	41,6
Cerveza	75,7	81,5	67,2
Combinados	26,3	28,4	23,2
Vermú	5,2	5,2	5,3
Licores de frutas	4,0	4,3	3,5
Licores fuertes solos	3,7	4,9	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.53.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en fines de semana y días laborables en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (%). España, 2022.




T = total; H = hombres; M = mujeres.

Fines de semana: viernes, sábado y domingo. Días laborables: de lunes a jueves.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.54.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años, según tipo de bebida alcohólica consumida en fin de semana y días laborables (%). España, 2022.




Fines de semana: viernes, sábado y domingo. Días laborables: de lunes a jueves.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.55.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking, borracheras y botellón en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (%). España, 1999-2022.



	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Binge drinking últimos 30 días	-	-	15,5	11,6	12,6	14,9	15,2	15,5	17,9	15,1	15,4	15,4
Borracheras últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,5	7,1	6,8	6,4
Borracheras últimos 12 meses	19,3	18,4	21,2	19,8	19,2	23,2	19,3	19,1	16,8	18,6	19,4	16,7
Botellón últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	-	12,6	9,4	9,4	9,9	7,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.56.

Prevalencia de consumo de alcohol en atracción o binge drinking, borracheras y botellón en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2003-2022.


	2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2018		2020		2022	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Binge drinking últimos 30 días	23,3	7,5	17,9	5,4	18,3	6,7	21,0	8,7	20,7	9,2	20,8	10,0	23,5	12,3	20,4	9,7	20,9	9,9	20,3	10,4
Borracheras últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	4,5	8,8	4,3	9,6	4,5	9,3	4,2	8,5	4,2
Borracheras últimos 12 meses	29,6	12,7	27,2	12,3	25,8	12,5	30,5	15,5	25,9	12,6	25,4	12,6	22,3	11,2	24,1	13,1	25,7	13,1	21,5	11,9
Botellón últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	6,5

H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.57.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2003-2022.



	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Total	21,2	19,8	19,2	23,2	19,3	19,1	16,8	18,6	19,4	16,7
Hombre	29,6	27,2	25,8	30,5	25,9	25,4	22,3	24,1	25,7	21,5
Mujer	12,7	12,3	12,5	15,5	12,6	12,6	11,2	13,1	13,1	11,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.58.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.59.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días, en población de 15-24 años, según sexo (%). España, 2013-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.60.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.61.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Intoxicaciones etílicas en los últimos 30 días	6,4	8,5	4,2	15,5	17,5	13,5	9,4	12,6	6,2	5,2	7,6	2,9	3,4	5,3	1,5	1,9	3,3	0,6

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.62.


Prevalencia de intoxicaciones éticas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.63.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días en la población de 15 a 64 años que se ha emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.64.


Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según hayan tenido intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días o no (%). España, 2022.

	Borracheras en los últimos 30 días	
	Sí	No
Cannabis	36,0	6,7
Cocaína polvo y/o base	9,6	0,8
Éxtasis	2,9	0,0
Anfetaminas	2,0	0,1
Alucinógenos	1,8	0,1
Heroína	0,2	0,0
Inhalables volátiles	1,2	0,0
GHB	0,4	0,0
Metanfetamina	0,8	0,0
Setas mágicas	0,6	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.65.


Prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2003-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.66.

Evolución de la prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2011-2022.




	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombres 15 a 34 años	28,0	29,4	30,3	25,3	28,1	26,2
Mujeres 15 a 34 años	16,2	16,1	18,4	14,8	15,7	17,4
Hombres 35 a 64 años	15,8	16,0	20,0	17,9	17,4	18,0
Mujeres 35 a 64 años	5,8	6,6	9,1	7,2	7,1	6,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.67.

Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días, en población de 15-24 años, según sexo (%). España, 2009-2022.




	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombres 15-17 años	13,3	12,4	13,2	10,0	10,1	14,5	11,7
Mujeres 15-17 años	10,8	10,1	13,5	10,5	9,3	9,5	13,0
Hombres 15-24 años	28,4	29,2	29,6	30,6	24,7	30,1	27,1
Mujeres 15-24 años	17,9	18,6	20,2	22,8	17,0	18,1	22,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.68.


Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.69.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.70.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o no (%). España, 2022.

	Binge drinking en los últimos 30 días	
	Sí	No
Cannabis	24,8	5,7
Cocaína polvo y/o base	6,2	0,5
Éxtasis	1,2	0,1
Anfetaminas	1,1	0,1
Alucinógenos	0,8	0,0
Heroína	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,6	0,0
GHB	0,2	0,0
Metanfetamina	0,5	0,0
Setas mágicas	0,2	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.71.

Prevalencia de borracheras (intoxicaciones etílicas agudas) en el último año y prevalencia de borracheras y binge drinking en el último mes en la población de 15-64 años, según nivel más alto de estudios que ha completado o aprobado y según sexo (%). España, 2022.

	Total			Hombre			Mujer		
	Sin estudios/ Est. primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios	Sin estudios/ Est. primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios	Sin estudios/ Est. primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios
Borracheras últimos 30 días	6,2	6,4	6,3	10,0	8,5	8,1	2,2	4,3	4,8
Borracheras últimos 12 meses	14,1	17,1	16,7	20,8	22,0	20,2	6,9	11,9	13,6
Binge drinking últimos 30 días	12,7	15,7	15,4	20,5	20,6	19,4	4,8	10,7	11,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.72.


Prevalencia de borracheras (intoxicaciones etílicas agudas) en el último año y prevalencia de binge drinking en el último mes en la población de 15-64 años, según nivel más alto de estudios que ha completado o aprobado y según edad (%). España, 2022.

	SIN ESTUDIOS/PRIMARIOS				ESTUDIOS SECUNDARIOS				ESTUDIOS UNIVERSITARIOS			
	15-34 años		35-64 años		15-34 años		35-64 años		15-34 años		35-64 años	
	Recuento	%	Recuento	%	Recuento	%	Recuento	%	Recuento	%	Recuento	%
Borracheras en los últimos 12 meses	163	24,5	201	10,5	1852	30,5	1192	10,1	514	29,3	445	11,2
Binge drinking en los últimos 30 días	106	16,4	212	11,4	1323	22,6	1386	12,2	383	22,8	455	12,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.73.

Evolución de la prevalencia de botellón en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2013-2022.



	2013*	2015	2018	2020	2022
Hombres 15 a 34 años	35,1	29,2	28,1	29,7	21,6
Mujeres 15 a 34 años	26,8	21,1	20,7	22,7	18,3
Hombres 35 a 64 años	2,0	1,5	2,2	2,4	1,9
Mujeres 35 a 64 años	1,1	1,0	1,5	1,7	0,9

* En el año 2013 la pregunta del botellón se formulaba de diferente manera.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.74.

Prevalencia de botellón, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Botellón últimos 12 meses	7,4	8,4	6,5	32,2	34,0	30,3	9,3	10,6	7,9	2,5	3,4	1,5	1,1	1,6	0,7	0,7	0,8	0,5	32,2	32,1	32,3

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.75.


Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según hayan hecho botellón en los últimos 12 meses o no (%). España, 2022.

	Botellón en los últimos 12 meses	
	Sí	No
Cannabis	33,5	6,6
Cocaína polvo y/o base	5,6	1,0
Éxtasis	2,1	0,1
Anfetaminas	1,4	0,1
Alucinógenos	1,2	0,1
Heroína	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,9	0,1
GHB	0,2	0,0
Metanfetamina	0,7	0,0
Setas mágicas	0,4	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.76.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han hecho botellón en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022.



	Vino	Cerveza	Combinados
15 - 24 años	7,6	48,2	56,9
25 - 34 años	20,8	69,8	56,8
35 - 44 años	36,4	70,7	44,2
45 - 54 años	31,8	68,4	31,3
55 - 64 años	44,9	84,4	36,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.77.

Razones por las que las personas de 15 a 64 años consumen alcohol, según su consumo de alcohol. España, 2022.

	Población de 15-64 años	Población que se ha emborrachado en los últimos 30 días	Población que ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Población que ha hecho botellón en los últimos 12 meses	Población que ha consumido al menos 20 días en los últimos 30 días	Población con un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT≥8)
Le gusta	37,3	46,3	45,9	40,8	48,7	54,4
Es divertido	51,2	70,0	63,0	74,9	38,3	64,3
Para emborracharse	1,7	8,9	5,2	7,3	2,9	10,6
Encajar en un grupo	13,1	14,9	14,5	21,3	8,9	20,5
Evitar depresión	4,8	10,2	7,8	6,7	6,9	13,7
Es saludable	18,3	6,7	12,4	4,6	37,9	12,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.78.

Razones para el consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Le gusta cómo se siente después de beber	44,0	48,5	38,6	32,7	37,0	27,7	37,3	41,4	32,6
Es divertido y anima las fiestas	56,1	58,4	53,2	56,2	55,6	56,8	51,2	49,9	52,7
Sólo por emborracharse	12,0	14,4	9,1	2,0	2,5	1,4	1,7	2,1	1,3
Por encajar en un grupo o no sentirse excluido	19,6	21,1	17,8	17,4	16,9	18,1	13,1	12,6	13,7
Le ayuda a olvidarse de todo	12,6	14,3	10,5	3,3	3,8	2,8	4,8	4,9	4,6
Cree que es saludable o forma parte de una alimentación equilibrada	17,2	18,6	15,4	14,8	16,1	13,3	18,3	19,7	16,8

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.79.

Actitudes ante las políticas en materia de alcohol entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prohibir la publicidad	59,9	54,7	65,0	71,5	68,2	74,7	57,7	53,3	62,2
Envases con advertencias sobre daños	78,4	75,2	81,7	82,7	80,6	84,8	73,3	69,4	77,2
Patrocinio de deportistas prohibido	64,9	60,4	69,4	74,8	71,5	78,1	64,0	59,1	68,9

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.80.

Actitudes ante las políticas en materia de alcohol de las personas de 15 a 64 años, según su consumo de alcohol. España, 2022.

	Población de 15-64 años	Población que se ha emborrachado en los últimos 30 días	Población que ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Población que ha hecho botellón en los últimos 12 meses	Población que ha consumido al menos 20 días en los últimos 30 días	Población con un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT≥8)
Prohibir la publicidad	57,7	44,5	49,2	48,1	50,0	40,5
Envases con advertencias sobre daños	73,3	65,9	66,0	66,1	64,2	58,7
Patrocinio de deportistas prohibido	64,0	52,2	54,9	53,3	54,8	47,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.81.

Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8 en hombres y AUDIT ≥6 en mujeres) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2009-2022.




AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.82.

Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8 en hombres y AUDIT \geq 6 en mujeres) en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2009-2022.



	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
2009	10,9	8,3	3,6	3,7	2,6
2013	11,9	7,4	4,7	4,5	3,4
2018	9,7	7,7	5,9	5,2	3,4
2020	9,5	6,4	4,8	3,8	3,3
2022	10,8	7,5	5,6	4,8	3,3

AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.83.

Prevalencia de consumos intensivos de alcohol en la población de 15 a 64 años, según hayan tenido consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8 en hombres y AUDIT \geq 6 en mujeres) (%). España, 2022.


	Total nacional	Consumidores de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8 en hombres y AUDIT \geq 6 en mujeres)
Borracheras últimos 30 días	6,4	40,7
Binge drinking últimos 30 días	15,4	77,1
Botellón últimos 12 meses	7,4	32,4

AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.84.

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días e hipnosedantes en los últimos 12 meses entre aquellos que han realizado un consumo de riesgo de alcohol según la escala AUDIT (AUDIT \geq 8 en hombres y AUDIT \geq 6 en mujeres) y entre la población de 15 a 64 años (%). España, 2022.




	Alcohol últimos 30 días	Alcohol diario	Hipnosedantes sin receta
■ Total población 15-64 años	64,5	9,0	3,6
■ Población 15-64 años con AUDIT positivo	98,7	27,9	10,2

AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.85.

Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses entre aquellos que han realizado un consumo de riesgo de alcohol según la escala AUDIT (AUDIT \geq 8 en hombres y AUDIT \geq 6 en mujeres) y entre la población de 15 a 64 años (%). España, 2022.



	Drogas ilegales	Drogas ilegales excepto cannabis	Cannabis
■ Total población 15-64 años	11,5	3,1	10,6
■ Población 15-64 años con AUDIT positivo	43,7	18,3	41,2

AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.86.

Características sociodemográficas de los consumidores de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8 en hombres y AUDIT \geq 6 en mujeres) y de la población de 15-64 años de la encuesta EDADES (%). España, 2022.

	Total población 15-64 años	Población 15-64 años con AUDIT positivo
Estado civil		
Soltero/a	41,3	61,7
Casado/a	48,2	27,2
Separado/divorciado/viudo/a	10,5	11,1
Extranjero		
	13,8	11,1
Convivencia		
Solo	12,5	18,7
Con familia propia*	62,5	41,1
Con familia de origen**	24,0	37,4
Nivel de estudios más alto que ha completado o aprobado		
Sin estudios/estudios primarios	9,9	10,4
Estudios secundarios	68,2	69,9
Estudios universitarios	21,9	19,6

* Convive con familia propia (cónyuge/pareja y/o hijos propios o de la pareja).

** Convivencia con familia de origen (padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, suegros...).

AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.87.

Consumo de riesgo de alcohol en la población de 15-64 años según la escala AUDIT entre los que han contestado AUDIT y entre el total de la población, según sexo (%). España, 2020-2022.

	2020			2022		
	T	H	M	T	H	M
AUDIT (entre el total de la población)						
Hombre AUDIT ≥8 // Mujer AUDIT ≥6	5,2	6,7	3,7	6,0	7,2	4,8
Hombre AUDIT <8 // Mujer AUDIT <6	94,8	93,3	96,3	94,0	92,8	95,2
AUDIT (entre los que han contestado AUDIT)						
Hombre AUDIT ≥8 // Mujer AUDIT ≥6	6,9	8,2	5,4	8,3	9,2	7,2
Hombre AUDIT <8 // Mujer AUDIT <6	93,1	91,8	94,6	91,7	90,8	92,8

T = total; H = hombre; M = mujer.

AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.88.

Consumo de riesgo de alcohol en la población de 15-64 años según la escala AUDIT entre los que han contestado AUDIT y entre el total de la población, según edad y sexo (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
AUDIT (entre el total de la población)									
Hombre AUDIT ≥8 // Mujer AUDIT ≥6	6,0	7,2	4,8	12,0	11,0	13,2	6,4	8,3	4,1
Hombre AUDIT <8 // Mujer AUDIT <6	94,0	92,8	95,2	88,0	89,0	86,8	93,6	91,7	95,9
AUDIT (entre los que han contestado AUDIT)									
Hombre AUDIT ≥8 // Mujer AUDIT ≥6	8,3	9,2	7,2						
Hombre AUDIT <8 // Mujer AUDIT <6	91,7	90,8	92,8						

T = total; H = hombre; M = mujer.

AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: bebidas energéticas

1.1.89.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bebidas energéticas	14,2	17,1	11,2	37,6	42,8	32,1	21,9	26,3	17,5	10,9	13,7	8,2	6,3	8,0	4,5	3,5	4,7	2,4

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.90.

Prevalencia del consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que consumió bebidas energéticas en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bebidas energéticas																		
con alcohol	25,8	27,8	22,8	32,3	33,0	31,2	24,7	26,6	21,8	17,9	23,0	9,5	20,6	24,0	14,6	18,9	20,0	16,9

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.91.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2022.



	2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bebidas energéticas	10,9	13,4	8,5	11,6	14,7	8,4	12,3	15,3	9,1	14,2	17,1	11,2
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	2,8	3,5	2,0	2,5	3,4	1,6	3,0	3,9	2,1	3,6	4,7	2,5

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.92.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales*) en la población de 15-64 años, según hayan consumido o no bebidas energéticas (%). España, 2022.

	Población 15-64 años	Población 15-64 años que ha consumido bebidas energéticas	Población 15-64 años que ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol
Ninguna sustancia	4,5	4,5	0,0
Una sola sustancia	19,6	19,3	12,5
Dos sustancias	29,5	22,1	18,0
Tres o más sustancias	46,4	54,1	69,5

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.93.

Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según hayan consumido bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2022.

	Borracheras	Binge drinking	Tabaco	Cannabis	Cocaína*	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos
Población 15-64 años	6,4	15,4	37,2	8,6	1,3	0,2	0,2	0,2
Población 15-64 años que ha consumido bebidas energéticas	14,9	28,8	49,0	22,6	3,5	0,8	0,6	0,5
Población 15-64 años que ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol	34,8	55,8	67,0	41,4	7,2	2,3	1,5	1,3


* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: tabaco

1.1.94.

Prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años. España, 1997-2022.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1	72,5	69,7	70,0	69,6
Últimos 12 meses	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2	40,9	39,4	39,0
Últimos 30 días	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5	38,8	36,8	37,2
Diariamente últimos 30 días	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8	34,0	32,3	33,1
Edad media inicio consumo	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,6	16,6	16,6
Edad media de inicio en el consumo diario	-	-	-	-	-	-	19,3	18,5	18,6	18,6	18,6	18,3	18,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.95.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombre	55,0	50,3	51,5	53,0	47,2	46,0	48,4	44,2	44,2	44,4	46,0	44,4	44,0
Mujer	38,7	39,2	40,5	42,6	37,5	37,6	37,0	36,0	37,2	36,0	35,8	34,2	34,0
Total	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2	40,9	39,4	39,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.96.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	33,1	27,3	33,3	35,1	36,8	30,5
Hombre	37,8	30,2	38,3	40,4	42,0	35,6
Mujer	28,3	24,3	28,2	30,0	31,6	25,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.97.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombre	51,4	45,0	46,5	47,9	43,1	42,6	44,7	41,4	41,7	42,6	43,8	41,5	42,2
Mujer	34,4	35,2	36,3	37,9	33,6	34,7	34,0	33,7	34,8	34,3	33,8	32,0	32,3
Total	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5	38,8	36,8	37,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.98.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombre	42,8	38,0	40,9	42,0	37,0	32,9	36,2	34,1	33,6	34,2	38,3	36,8	37,8
Mujer	27,1	29,3	30,5	31,3	28,6	26,6	27,2	26,7	28,0	27,3	29,6	27,8	28,3
Total	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8	34,0	32,3	33,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.99.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 1997-2022.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombres 15-34 años	41,4	36,3	39,8	40,0	37,1	31,5	35,9	33,9	33,0	32,9	36,6	36,2	34,5
Hombres 35-64 años	44,0	39,5	41,8	43,7	36,9	33,9	36,4	34,2	33,9	35,0	39,1	37,1	39,5
Mujeres 15-34 años	36,5	34,2	36,4	36,8	33,0	29,7	28,0	28,5	28,4	26,5	27,9	26,5	26,4
Mujeres 35-64 años	19,1	25,1	25,9	27,0	25,3	24,4	26,7	25,6	27,8	27,8	30,5	28,4	29,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.100.

Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España 2011-2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2011	30,4	34,1	26,7	26,8	28,7	24,8	34,2	37,3	31,0	33,7	38,1	29,0	32,3	35,3	29,4	21,9	27,5	16,3
2013	30,8	33,6	28,0	25,8	25,9	25,6	34,2	37,9	30,3	31,8	34,5	28,9	35,2	37,5	33,1	23,9	28,6	19,1
2015	30,8	34,2	27,3	23,9	25,3	22,4	34,1	38,7	29,4	32,8	36,1	29,2	34,8	37,5	32,4	25,3	30,5	19,7
2018	34,0	38,3	29,6	25,9	28,5	23,2	37,2	43,1	31,5	34,9	39,2	30,5	38,9	41,9	36,0	29,4	35,5	23,5
2020	32,3	36,8	27,8	26,5	30,3	22,5	35,5	41,2	29,8	34,8	40,0	29,4	34,0	37,3	30,8	28,9	33,4	24,4
2022	33,1	37,8	28,3	27,3	30,2	24,3	33,3	38,3	28,2	35,1	40,4	30,0	36,8	42,0	31,6	30,5	35,6	25,5

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.101.

Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de cigarrillos que ha fumado, sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos de cajetilla	72,3	70,6	74,5	54,1	52,5	56,2	64,6	62,3	67,6	73,4	71,0	76,4	78,5	76,8	80,8	82,3	81,2	83,8
Tabaco de liar	18,9	19,4	18,2	29,1	28,7	29,4	23,1	23,8	22,1	19,6	20,9	17,9	14,9	15,3	14,3	12,5	12,8	12,2
Los 2 tipos	8,8	10,0	7,2	16,8	18,8	14,4	12,3	13,9	10,2	7,1	8,1	5,8	6,6	7,8	4,9	5,1	6,0	4,0

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.102.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.103.

Porcentaje de fumadores que fuman por término medio una cantidad de cigarrillos determinada (%), y número medio de cigarrillos fumados cada día que fuman (nº cigarrillos) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.

	Total	Hombre	Mujer
1-5 cigarrillos	23,1	20,2	26,9
6-10 cigarrillos	35,2	32,4	38,8
>10 cigarrillos	41,7	47,4	34,2
Nº medio cigarrillos fumados cada día que fumaba en los últimos 30 días	11,9	12,8	10,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.104.


Evolución del número medio de cigarrillos fumados cada día que fuman en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (nº cigarrillos). España, 2013-2022.

	Total	Hombre	Mujer
2013	12,6	13,4	11,7
2015	12,4	13,4	11,3
2018	12,5	13,5	11,2
2020	11,9	12,7	10,9
2022	11,9	12,8	10,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.105.

Evolución del consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de cigarrillos fumados (%). España, 2015-2022.



	2015	2018	2020	2022
■ Cigarrillos de cajetilla	78,4	77,0	73,9	72,3
■ Tabaco de liar	14,7	15,4	17,0	18,9
■ Los 2 tipos	6,9	7,6	9,1	8,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.106.

Porcentaje de personas que se han planteado dejar de fumar entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Se ha planteado dejar de fumar	64,2	62,7	66,1	51,6	50,8	52,7	69,7	67,9	72,1

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.107.

Porcentaje de personas que se han planteado dejar de fumar entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días y han intentado dejarlo, en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	41,9	40,2	44,1	29,9	28,9	31,2	47,2	45,1	49,8

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.108.

Porcentaje de personas que se han planteado dejar de fumar entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2018-2022.

2018			2020			2022		
Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
66,6	64,8	68,9	61,1	59,5	63,2	64,2	62,7	66,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.109.


Porcentaje de personas que se han planteado de dejar de fumar y lo han intentado entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2018-2022.

2018			2020			2022		
Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
45,4	43,7	47,5	38,2	36,9	39,9	41,9	40,2	44,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.110.

Prevalencia de consumo de pipas de agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.111.

Prevalencia de uso de pipas de agua (cachimbas, shisahs, hookah, narguile...) agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, edad de inicio (años) y número de días que las ha usado en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, total, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	17,2	19,1	15,2	31,0	33,0	29,0	10,5	12,4	8,7
Últimos 12 meses	5,5	6,1	5,0	13,2	14,0	12,5	1,8	2,2	1,4
Edad media inicio en el uso (años)	21,8	21,3	22,4	18,5	18,5	18,5	26,7	25,0	29,0
Número de días que las ha usado en los últimos 12 meses	14,0	17,0	10,3	14,2	16,9	11,0	13,4	17,4	7,4

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.112.

Prevalencia de uso de cada tipo de sustancia en pipas de agua (cachimbas, shisahs, hookah, narguile...) en la población de 15-64 años que ha utilizado pipas de agua alguna vez en la vida, total, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hierbas, piedras, melazas, pastas, cremas, gelatinas o saborizantes sin incluir tabaco (nicotina) ni marihuana o hachís (cannabis)	53,9	52,5	55,7	55,9	52,9	59,4	54,9	54,9	54,9	54,8	55,8	53,4	52,8	49,1	58,1	39,2	38,1	41,1	55,4	53,9	57,2	51,8	50,7	53,5
Tabaco (nicotina) normal o de sabores	40,5	42,3	38,4	40,5	44,5	35,9	42,4	42,8	41,9	40,0	39,5	40,8	37,8	41,4	32,7	40,5	41,6	38,7	41,4	43,6	38,8	39,3	40,5	37,6
Marihuana o hachís (cannabis)	12,6	16,1	8,1	11,8	13,9	9,4	12,7	16,0	8,6	15,1	19,4	9,3	10,3	14,3	4,7	12,9	19,3	1,9	12,2	15,0	9,0	13,1	17,6	6,7,9

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES 2015).

1.1.113.

Prevalencia de binge drinking, borracheras y consumo de cannabis en los últimos 30 días, consumo problemático de cannabis, consumo de cigarrillos electrónicos y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población que ha consumido tabaco o cannabis en pipas de agua alguna vez en la vida (%). España, 2022.

	Población 15-64 años	Consumidores de tabaco (nicotina) en pipas de agua alguna vez en la vida	Consumidores de cannabis (marihuana o hachís) en pipas de agua alguna vez en la vida
Cigarrillos electrónicos últimos 12 meses	4,1	17,2	14,8
Binge drinking últimos 30 días	15,4	36,2	48,4
Borracheras últimos 30 días	6,4	19,3	27,9
Cannabis últimos 30 días	8,6	26,2	57,5
Consumo problemático cannabis (CAST≥4)	1,9	6,7	17,4
Policonsumo últimos 12 meses	12,8	34,6	63,1

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.114.

Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2020-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: cigarrillos electrónicos

1.1.115.


Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%) y edad media de inicio en el consumo (años). España, 2015-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.116.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2022.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario últimos 30 días
Hombre	13,6	4,3	2,3	1,0
Mujer	10,7	3,9	2,1	1,1

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.117.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2022.



	2015	2018	2020	2022
Total	6,8	8,8	10,5	12,1
Hombre	7,3	9,6	12,0	13,6
Mujer	6,3	8,1	8,9	10,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.118.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según contengan o no nicotina y/o cannabis, y según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	5,0	5,3	4,6	7,4	8,8	6,0	8,6	9,8	7,4
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con cannabis	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,3
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina y sin cannabis*	2,3	2,4	2,2	5,2	6,1	4,2	3,3	3,4	3,1

T = total; H = hombre; M = mujer.

* En 2018 y 2020 incluye solo sin nicotina.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.119.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos que contengan o no nicotina y/o cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	58,6	58,0	59,3	48,9	47,9	50,3	75,5	77,3	73,3
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con cannabis	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	2,6
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina y sin cannabis*	26,8	25,9	28,0	26,7	24,4	30,0	28,5	26,6	30,9

T = total; H = hombre; M = mujer.

* En 2018 y 2020 incluye solo sin nicotina.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.120.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de 15-64 años según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar	5,2	5,6	4,8	3,9	4,5	3,4	5,4	6,0	4,8	6,0	6,5	5,4	6,6	7,2	6,0	3,6	3,5	3,7

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.121.

Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar	4,8	4,9	4,7	4,9	5,4	4,3	5,2	5,6	4,8

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.122.

Porcentaje de personas que dicen que utilizan los cigarrillos electrónicos como sustituto del tabaco, en la población de 15-64 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo y edad. España, 2022.

15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
44,9	43,5	46,8	21,7	22,2	21,2	33,9	33,8	34,1	53,5	52,1	55,2	65,3	62,4	69,2	63,3	58,3	68,8

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.123.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos o no alguna vez en la vida (%). España, 2018-2022.

		Consumo de CE alguna vez en la vida	
		Sí	No
2018	Consumo de tabaco alguna vez en la vida SI	97,0	67,1
	Consumo de tabaco alguna vez en la vida NO	3,0	32,9
2020	Consumo de tabaco alguna vez en la vida SI	96,0	67,0
	Consumo de tabaco alguna vez en la vida NO	4,0	33,0
2022	Consumo de tabaco alguna vez en la vida SI	95,5	66,1
	Consumo de tabaco alguna vez en la vida NO	4,5	33,9

CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.124.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos o no en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022.

		Consumo de CE últimos 12 meses	
		Sí	No
2018	Consumo de tabaco últimos 12 meses SI	85,4	39,4
	Consumo de tabaco últimos 12 meses NO	14,6	60,6
2020	Consumo de tabaco últimos 12 meses SI	83,6	37,4
	Consumo de tabaco últimos 12 meses NO	16,4	62,6
2022	Consumo de tabaco últimos 12 meses SI	78,4	37,3
	Consumo de tabaco últimos 12 meses NO	21,6	62,7

CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.125.

Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años que ha consumido tabaco o no alguna vez en la vida (%). España, 2018-2022.

		Consumo de tabaco alguna vez en la vida	
		Sí	No
2018	Consumo de CE alguna vez en la vida SI	12,3	0,9
	Consumo de CE alguna vez en la vida NO	87,7	99,1
2020	Consumo de CE alguna vez en la vida SI	14,4	1,4
	Consumo de CE alguna vez en la vida NO	85,6	98,6
2022	Consumo de CE alguna vez en la vida SI	16,6	1,8
	Consumo de CE alguna vez en la vida NO	83,4	98,2

CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.126.

Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años que ha consumido tabaco o no en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022.

		Consumo de tabaco últimos 12 meses	
		Sí	No
2018	Consumo de CE últimos 12 meses SI	6,3	0,7
	Consumo de CE últimos 12 meses NO	93,7	99,3
2020	Consumo de CE últimos 12 meses SI	8,8	1,1
	Consumo de CE últimos 12 meses NO	91,2	98,9
2022	Consumo de CE últimos 12 meses SI	8,3	1,5
	Consumo de CE últimos 12 meses NO	91,7	98,5

CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.127.

Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida o no (%). España, 2020-2022.


	2020		2022	
	Población 15-64 años	Consumidores de CE alguna vez en la vida	Población 15-64 años	Consumidores de CE alguna vez en la vida
Problemas de salud o de otro tipo que puede significar fumar cigarrillos electrónicos				
Muchos/bastantes problemas	73,9	62,3	72,9	61,4

CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.128.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos que contengan o no nicotina y/o cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2022.




FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: hipnosedantes

1.1.129.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años. España, 2005-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.130.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.


	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	23,5	19,0	28,0	13,7	11,0	16,5	28,2	22,9	33,4
Último año	13,1	10,3	16,0	7,2	5,5	8,9	16,0	12,6	19,4
Último mes	9,7	7,3	12,1	4,2	3,2	5,3	12,3	9,4	15,3
A diario	7,2	5,2	9,2	2,5	1,8	3,3	9,4	6,8	11,9

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.131.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombre	10,3	4,3	6,6	9,1	13,5	15,4
Mujer	16,0	7,3	10,3	14,5	19,3	24,5
Total	13,1	5,8	8,4	11,8	16,4	20,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.132.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	9,7	3,2	5,1	7,9	12,5	16,9
Hombre	7,3	2,1	4,1	5,7	10,2	12,2
Mujer	12,1	4,3	6,1	10,0	14,7	21,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.133.


Modos en los que la población de 15-64 años toma hipnosedantes con o sin receta (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.134.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años (%) y edad media de inicio en el consumo (años). España, 2003-2022.



	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida	-	-	-	-	-	2,7	4,1	3,0	3,1	3,6
Últimos 12 meses	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3	1,3	1,3	1,3
Últimos 30 días	-	-	-	-	0,7	0,6	0,9	0,7	0,5	0,6
Edad media inicio consumo	-	-	-	-	-	31,3	32,5	31,6	30,6	30,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.135.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2022.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida													
Hombre	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,6	3,3	2,8	3,0	3,6
Mujer	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,8	4,9	3,2	3,1	3,6
Últimos 12 meses													
Hombre	2,3	2,3	2,5	2,9	1,1	1,2	1,9	1,1	1,1	1,6	1,2	1,3	1,4
Mujer	2,4	2,4	3,1	3,3	1,3	1,4	1,9	1,2	1,3	2,9	1,4	1,2	1,3
Últimos 30 días													
Hombre	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,8	0,5	0,6	0,5
Mujer	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	1,1	0,8	0,4	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.136.

Prevalencias de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años según sexo y edad (%). España, 2022.


	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	3,6	3,6	3,6	2,9	2,7	3,0	3,9	4,0	3,9
Último año	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,3
Último mes	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6
A diario	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.137.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombre	1,4	1,3	1,2	1,6	1,6	1,1
Mujer	1,3	1,0	1,5	1,4	1,4	0,9
Total	1,3	1,1	1,4	1,5	1,5	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.138.

Prevalencia de consumo de alcohol, drogas ilegales o alcohol y drogas ilegales junto con hipnosedantes sin receta o para uso no médico en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses según sexo (%). España, 2018- 2022.



	2018	2020	2022
Consumo de alcohol e hipnosedantes sin receta	20,2	23,2	26,9
Consumo de drogas ilegales e hipnosedantes sin receta	14,5	16,2	20,4
Consumo de alcohol y drogas ilegales e hipnosedantes sin receta	14,9	13,4	17,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.139.

Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022.

	2018		2020		2022	
	Población 15-64 años	Consumidores últimos 12 meses	Población 15-64 años	Consumidores últimos 12 meses	Población 15-64 años	Consumidores últimos 12 meses
Cannabis	11,0	33,8	10,5	42,7	10,6	40,9
Cocaína polvo y/o base	2,2	22,1	2,5	26,2	2,4	24,1
Éxtasis	0,6	6,9	0,9	11,3	0,8	8,3
Anfetaminas	0,5	5,7	0,7	11,4	0,6	7,9
Alucinógenos	0,4	4,7	0,6	9,5	0,6	7,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.140.

Prevalencia de trastornos o patologías en la población de 15-64 años y en los consumidores de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2022.

	Población 15-64 años	Hipnosedantes sin receta últimos 12 meses
Ludopatía	0,4	2,2
Ansiedad	13,7	42,5
Depresión	8,7	30,4
Insomnio	6,7	18,6
Trastorno consumo drogas	0,6	7,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.141.

Medios por los que consiguió los hipnosedantes, la última vez que tomó hipnosedantes sin receta considerando la población de 15-64 años que ha consumido este tipo de fármacos sin receta alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
A través de un traficante o a una persona desconocida	3,1	6,0	0,5	0,8	1,5	0,0	1,5	2,6	0,3
A través de internet	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1
Lo compré en una farmacia sin receta	8,3	7,6	8,9	5,9	5,7	6,1	9,5	7,6	11,7
Lo conseguí de otra manera	3,9	4,4	3,4	10,0	9,3	10,7	7,8	6,0	9,7
A través de una receta médica que no me recetaron a mí*	35,8	28,1	42,9	11,0	10,9	11,1	5,0	6,1	4,0
A través de un amigo o familiar	48,8	53,6	44,3	72,2	72,3	72,2	75,9	77,4	74,3


T = total; H = hombre; M = mujer.

* En 2018 la pregunta fue: A través de una receta médica que me recetaron a mí. A partir de 2020 la pregunta fue: A través de una receta médica que no me recetaron a mí.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.142.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2022.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
■ Hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3	1,3	1,3	1,3
■ Riesgo percibido por consumo hipnosedantes una vez o menos al mes	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0	62,1	65,3	60,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.143.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y disponibilidad percibida ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2022.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
■ Hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3	1,3	1,3	1,3
■ Disponibilidad percibida	-	-	-	-	-	31,9	32,8	28,6	27,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: analgésicos opioides

1.1.144.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides con o sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	14,5	13,1	16,0	15,2	14,1	16,2	15,8	14,7	16,9
Últimos 12 meses	6,7	5,9	7,4	7,1	6,2	8,1	6,8	5,8	7,9
Últimos 30 días	2,9	2,3	3,4	3,6	3,0	4,3	4,0	3,1	4,8
A diario en últimos 30 días	–	–	–	2,1	1,6	2,7	1,9	1,6	2,3
Edad media de inicio en el consumo	–	–	–	33	32	33	35	35	36

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.145.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides con o sin receta alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tramadol	5,2	4,5	5,8	7,2	6,3	8,2	9,4	8,6	10,3
Codeína	10,0	9,1	11,0	7,9	7,4	8,5	7,2	6,8	7,7
Morfina	2,1	2,0	2,3	2,1	2,3	1,9	2,3	2,5	2,1
Fentanilo	0,3	0,3	0,2	0,5	0,6	0,5	1,1	1,1	1,1
Otros*	0,9	0,8	1,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,3


T = total; H = hombre; M = mujer.

* En 2018 otros analgésicos opioides fueron: oxicodona, hidromorfona, petidina, tapentadol, metadona y buprenorfina.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.146.

Modo de consumo realizado entre la población de 15 a 64 años que ha consumido analgésicos opioides con o sin receta alguna vez en la vida (%). España, 2018-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.147.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides alguna vez en la vida en la población de 15-64 años que ha consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tramadol	35,5	34,8	36,2	50,0	47,3	52,3	46,0	46,5	45,6
Codeína	69,2	69,9	68,7	54,6	54,4	54,9	59,9	58,8	60,9
Morfina	14,7	15,2	14,3	13,9	16,0	11,9	6,9	7,5	6,4
Fentanilo	1,9	2,5	1,4	3,6	4,4	2,9	14,0	14,7	13,4
Otros*	6,1	6,2	6,1	14,2	14,9	13,6	14,4	17,0	12,2

T = total; H = hombre; M = mujer.

* En 2018 otros analgésicos opioides fueron: oxicodona, hidromorfona, petidina, tapentadol, metadona y buprenorfina.

FUENTE: OEDA Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.148.

Razones por las que la población de 15-64 años que ha consumido analgésicos opioides empezó a tomar analgésicos opioides, según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Dolor agudo	61,4	62,7	60,4	57,4	55,4	59,1	56,5	56,1	56,8
Dolor crónico	16,1	13,5	18,1	27,5	29,7	25,5	25,0	21,6	28,0
Después de una operación	16,9	19,9	14,5	20,5	18,6	22,2	23,7	27,8	20,1
Otras razones	1,6	2,6	0,8	10,3	12,5	8,4	11,4	12,2	10,7

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.149.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2020-2022.

	2020			2022		
	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	1,7	1,8	1,5	1,5	1,7	1,3
Últimos 12 meses	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5
Últimos 30 días	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
A diario en últimos 30 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Edad media de inicio en el consumo	27,7	28,5	26,5	25,5	26,2	24,5

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.150.

Prevalencia de consumo de drogas legales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de analgésicos opioides con o sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022.

2018*		2020			2022		
Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses	Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses	Analg. opioides sin receta últimos 12 meses	Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses	Analg. opioides sin receta últimos 12 meses
Alcohol	75,2	77,2	80,2	91,6	76,4	77,8	93,4
Consumo de riesgo de alcohol (AUDIT≥8)	5,1	4,2	7,2	18,6	4,8	7,3	35,5
Borracheras	18,6	19,4	22,8	48,7	16,7	16,1	34,0
Hipnosedantes	11,1	12,0	38,9	44,9	13,1	43,2	55,4

* En 2018 sólo se dispone de datos de analgésicos opioides (en conjunto).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.151.

Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de analgésicos opioides con o sin receta en los últimos 12 meses (%). España, 2018-2022.

2018*		2020			2022			
Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses	Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses	Analg. opioides sin receta últimos 12 meses	Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses	Analg. opioides sin receta últimos 12 meses	
Cannabis	11,0	14,6	10,5	14,7	36,8	10,6	13,0	40,9
Cocaína polvo y/o base	2,2	4,2	2,5	6,4	22,8	2,4	4,6	22,8
Éxtasis	0,6	1,8	0,9	3,0	17,4	0,8	1,9	14,2
Anfetaminas	0,5	1,4	0,7	2,3	13,1	0,6	1,5	8,3
Alucinógenos	0,4	1,0	0,6	2,1	14,0	0,6	1,2	8,0


* En 2018 sólo se dispone de datos de analgésicos opioides (en conjunto).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: cannabis

1.1.152.

Prevalencia de consumo de cannabis (%) y edad media de inicio en el consumo de cannabis (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5	35,2	37,5	40,9
Últimos 12 meses	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5	11,0	10,5	10,6
Últimos 30 días	-	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6	7,3	9,1	8,0	8,6
Diariamente en los últimos 30 días	-	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,7	2,0	1,7	1,9	2,1	2,1	2,9	2,8
Edad media de inicio en el consumo	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7	18,6	18,3	18,4	18,5	18,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.153.


Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida														
Hombre	-	-	-	-	-	-	-	-	35,4	37,9	40,1	43,6	46,3	48,8
Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	22,7	22,8	26,8	28,7	32,9
Últimos 12 meses														
Hombre	10,7	10,7	9,6	13,0	16,2	15,7	13,6	14,8	13,6	12,9	13,3	15,4	14,6	14,4
Mujer	4,4	4,7	4,3	5,5	6,3	6,6	6,6	6,2	5,5	5,4	5,6	6,6	6,3	6,8
Últimos 30 días														
Hombre	-	6,7	6,2	9,4	11,3	12,5	10,0	11,0	10,2	9,8	10,7	12,9	11,4	12,0
Mujer	-	2,5	2,8	3,4	3,9	4,7	4,2	4,0	3,8	3,4	3,9	5,3	4,7	5,2
Diariamente en los últimos 30 días														
Hombre	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	3,0	3,4	3,4	4,5	4,3
Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	0,9	0,8	1,4	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.154.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombre	10,7	10,7	9,6	13,0	16,2	15,7	13,6	14,8	13,6	12,9	13,3	15,4	14,6	14,4
Mujer	4,4	4,7	4,3	5,5	6,3	6,6	6,6	6,2	5,5	5,4	5,6	6,6	6,3	6,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.155.


Evolución de la prevalencia de uso de cannabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.156.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.157.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.158.

Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.159.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, según edad. España, 2003-2022.

	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
2003	14,7	11,2	5,2	1,0	0,2
2005	18,6	11,6	5,8	1,9	0,6
2007	17,0	11,1	4,7	2,2	0,4
2009	17,2	12,0	5,1	3,1	0,5
2011	14,7	11,0	6,3	2,7	1,1
2013	14,7	10,5	5,4	3,3	1,2
2015	14,9	11,5	6,9	4,0	1,8
2018	15,7	13,8	8,7	6,5	2,9
2020	15,9	12,7	8,0	4,6	2,2
2022	17,1	13,4	8,4	5,3	2,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.160.


Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 2001-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.161.

Frecuencia (días) de consumo de cannabis, marihuana o hachís en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que lo ha consumido en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2022.



	Total	Hombre	Mujer
1-3 días	16,6	14,1	22,4
4-9 días	12,9	11,9	15,3
10-19 días	11,5	11,1	12,2
20-29 días	10,0	9,9	10,4
30-150 días	18,5	19,7	15,7
Más de 150 días	30,4	33,3	24,0
Número medio de días	99,2	107,5	80,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.162.

Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2015-2022.


	2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo de cannabis últimos 30 días												
Principalmente marihuana	52,7	50,5	59,3	48,3	47,7	50,0	48,7	48,9	48,0	49,0	47,9	51,9
Principalmente hachís	17,0	17,7	15,1	21,9	20,5	25,9	20,6	19,2	24,5	21,9	21,8	22,3
De los dos tipos	30,3	31,9	25,7	29,8	31,8	24,2	30,8	31,9	27,5	29,1	30,4	25,8
Consumo de cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días												
Sí	89,5	90,1	87,7	92,9	92,9	92,9	86,9	87,4	85,6	88,1	88,7	86,8
No	10,5	9,9	12,3	7,1	7,1	7,1	13,1	12,6	14,4	11,9	11,3	13,2
Media de porros consumidos al día	2,5	2,6	2,1	2,7	2,7	2,6	2,9	2,9	2,8	2,7	2,8	2,5

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.163.

Frecuencia (días) de consumo de cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años que lo ha consumido en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2022.



	Total	Hombre	Mujer
1-3 días	29,9	27,3	36,5
4-9 días	17,4	17,3	17,8
10-19 días	14,7	15,0	13,7
20-29 días	8,2	8,6	7,3
30 días	29,8	31,8	24,7
Número medio de días	14,5	15,2	12,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.164.

Evolución del número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2022.

	2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Número medio de porros	2,5	2,6	2,1	2,7	2,7	2,6	2,9	2,9	2,8	2,7	2,8	2,5

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.165.

Prevalencia de consumo de cannabis mezclado con tabaco en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2022.


	2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de cannabis mezclado con tabaco	6,4	9,5	3,2	7,9	11,4	4,4	6,2	9,1	3,3	6,8	9,8	3,8

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.166.


Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días en función de que se haya consumido cannabis en los últimos 30 días o no y en la población general (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.167.

Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días en función de que se haya consumido tabaco en los últimos 30 días o no y en la población general (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.168.

Prevalencia de consumo de cannabis y tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2022.

	2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de cannabis												
mezclado con tabaco	7,7	10,9	4,6	10,0	14,1	5,8	9,1	12,9	5,2	9,1	12,6	5,6

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.169.

Prevalencia de consumo de cannabis y spice alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2022.

	2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de cannabis y spice	0,8	1,1	0,4	0,4	0,7	0,1	0,6	0,9	0,3	0,5	0,7	0,3

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.170.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2015-2022.

	2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de tabaco en los consumidores de cannabis	82,2	82,4	81,9	90,6	91,9	87,5	86,7	88,2	83,0	85,8	87,6	81,8

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.171.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha consumido tabaco en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2015-2022.

	2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de consumo de cannabis en los consumidores de tabaco	19,8	25,2	13,0	24,4	30,7	16,2	23,2	29,1	15,3	23,4	28,7	16,5

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.172.

Prevalencia de binge drinking, borracheras, tabaco en los últimos 30 días y consumo de riesgo de alcohol (AUDIT>8 en hombres y >6 en mujeres), consumo de cigarrillos electrónicos, pipas de agua, hipnosedantes sin receta, analgésicos opioides sin receta y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años, en aquellos que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y en aquellos que presentan un consumo problemático de cannabis (CAST≥4) (%). España, 2022.


	Población 15-64 años	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)
Cigarrillos electrónicos últimos 12 meses	4,1	12,5	15,6
Pipas de agua últimos 12 meses	5,5	20,6	27,0
Tabaco últimos 30 días	37,2	83,3	97,3
Binge drinking últimos 30 días	24,4	50,3	66,4
Borracheras últimos 30 días	6,4	25,6	38,4
Consumo de riesgo de alcohol	4,8	19,9	37,5
Hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	1,3	5,1	15,2
Analgésicos opioides sin receta últimos 12 meses	6,8	8,3	15,3
Policonsumo últimos 12 meses	15,1	84,5	94,7

AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test. CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.173.

Prevalencia de consumo de dos o más sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años, en aquellos que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y en aquellos que presentan un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) (%). España, 2022.



* Drogas ilegales (cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles).

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.174.

Prevalencia de cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años, en aquellos que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y en aquellos que presentan un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) (%). España, 2022.

	Población 15-64 años	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)
Cocaína polvo y/o base	2,4	16,5	31,2
Éxtasis	0,8	6,4	14,5
Anfetaminas	0,6	4,4	11,8
Alucinógenos	0,6	4,3	9,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.FUENTE: OEDA.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.175.

Prevalencia autodeclarada de distintas patologías e ideas de suicidio en la población general de 15-64 años, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses y en aquellos que presentan un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) (%). España, 2022.

	Población 15-64 años	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)
Ludopatía	0,4	1,1	1,8
Ansiedad	13,6	19,1	29,0
Depresión	8,7	12,1	18,1
Insomnio	6,7	8,8	15,0
Ideas de suicidio (pensar en suicidio)	1,9	5,7	11,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.176.

Prevalencia de personas que afirman que si fuese legal el consumo de hachís o marihuana lo probarían. Respuesta entre los que no la han probado nunca en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2018-2022.

		Si fuese legal lo probaría		
		2018	2020	2022
15-64 años	Total	2,4	1,2	1,3
	Hombres	2,9	1,1	1,1
	Mujeres	2,1	1,2	1,5
15-24 años		6,0	2,7	2,8
25-34 años		2,7	0,9	1,2
35-44 años		1,8	0,7	0,9
45-54 años		1,7	0,8	0,9
55-64 años		1,6	1,3	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.177.

Características del consumo de cannabis entre la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
En forma de porro o canuto	97,9	98,6	96,2	97,9	97,8	98,2	98,2	98,2	98,1
Usando pipas de agua	4,4	4,3	4,8	4,4	4,9	2,7	5,3	4,9	6,1
Por vía oral: pasteles, galletas...	2,6	2,1	3,9	1,8	2,0	1,2	1,6	1,4	2,1
Usando cigarrillos electrónicos	0,5	0,5	0,5	2,0	2,1	1,7	0,5	0,5	0,5

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.178.

Características del consumo de cannabis entre la población de 15-64 años que tiene un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4), según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
En forma de porro o canuto	95,0	94,7	96,4	96,6	96,7	96,5	95,7	94,9	98,4
Usando pipas de agua	5,3	6,0	2,7	4,2	4,8	2,0	7,1	6,7	8,4
Por vía oral: pasteles, galletas...	2,9	2,9	3,0	2,5	3,2	0,5	2,2	2,1	2,5
Usando cigarrillos electrónicos	0,0	0,0	0,0	4,3	4,5	3,5	1,1	0,9	1,9

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.179.

Características del consumo de cannabis entre la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses (CAST<4), según sexo (%). España, 2018-2022.

	2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
En forma de porro o canuto	74,1	76,6	68,0	74,1	76,1	68,9	77,3	80,2	71,6
Usando pipas de agua	2,8	2,6	3,2	3,1	3,7	1,7	3,4	3,0	4,1
Por vía oral: pasteles, galletas...	1,4	1,2	2,0	0,6	0,5	0,9	1,1	0,9	1,4
Usando cigarrillos electrónicos	0,5	0,5	0,3	0,6	0,5	0,8	0,2	0,2	0,1

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.180.

Lugares donde en los últimos 30 días han obtenido cannabis las personas de 15 a 64 años que han consumido cannabis, según edad y sexo (%). España, 2022.

	2020 (15-64 años)			2022 (15-64 años)			2022	
	T	H	M	T	H	M	15-34 años	35-64 años
Internet	2,8	2,8	2,8	1,8	1,8	1,8	1,4	2,3
Tienda de cannabis	3,0	3,2	2,5	4,1	4,2	3,8	4,2	3,9
Plantación propia	8,7	9,8	5,9	11,2	12,2	8,5	9,0	14,2
Club cannábico	12,8	13,0	12,1	12,8	13,0	12,2	12,0	13,9
Traficante o camello	42,6	45,3	35,4	39,3	41,7	33,4	39,7	38,9
Amigo	52,6	49,2	61,7	56,3	54,0	61,9	58,8	52,7

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.181.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre el total de la población de 15 a 64 años y entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2013-2022.




CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.182.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre el total de la población de 15 a 64 años y entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses (%), según sexo. España, 2013-2022.



H = hombre; M = mujer. CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.183.

Evolución del % de Tetrahidrocannabinol (THC). España, 2002-2021.

	%THC resina	%THC hierba
2002	12,4	4,5
2003	11,9	5,3
2004	13,1	7,9
2005	11,8	7,3
2006	9,8	7,9
2007	11,3	7,9
2008	11,1	7,8
2009	12,8	7,7
2010	14,1	9,4
2011	15,3	11,2
2012	14,9	11,0
2013	14,5	10,8
2014*	14,8	10,7
2015	17,1	11,6
2016	17,7	10,2
2017	17,8	10,1
2018	22,4	10,7
2019	26,4	13,6
2020	28,9	12,0
2021	29,9	13,6

FUENTE: CITCO.

1.1.184.

Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que tiene un consumo problemático de cannabis (CAST ≥4), según sexo (%). España, 2015-2022.

	2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo de cannabis últimos 30 días												
Principalmente marihuana	45,3	45,0	46,2	39,7	40,2	38,2	43,5	43,9	42,0	38,3	39,4	34,3
Principalmente hachís	18,1	18,0	18,6	26,0	21,1	43,1	20,2	19,3	23,1	24,8	23,7	28,6
De los dos tipos	36,6	36,9	35,2	34,3	38,7	18,8	36,3	36,7	34,9	36,9	36,8	37,1
Consumo de cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días												
Sí	94,5	94,1	96,5	90,2	89,5	92,8	90,1	89,1	93,2	90,1	89,4	92,8
No	5,5	5,9	3,5	9,8	10,5	7,2	9,9	10,9	6,8	9,9	10,6	7,2
Media de porros consumidos al día	3,3	3,4	2,8	3,6	3,7	3,2	3,5	3,7	3,0	3,6	3,8	2,8


T = total; H = hombre; M = mujer.

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.185.

Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de botellón y policonsumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población que presenta un consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) (%). España, 2022.



CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.186.

Modo de consumo de cannabis en los consumidores de cannabis en los últimos 12 meses y en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST≥4) (%). España, 2022.

	Consumidores cannabis últimos 12 meses	Consumidores problemáticos cannabis (CAST ≥ 4)
Cannabis + tabaco	72,4	95,3
De los 2 tipos	23,0	35,8
Marihuana	61,7	73,0
Hachís	40,3	59,9
Porro	77,5	95,7
Cachimbos	4,2	7,1
Vía oral	1,3	2,2
Cigarrillos electrónicos	0,4	1,1


CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

Casos con información (eliminando los no contesta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.187.

Prevalencia de consumo de cannabis en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST≥4) y en el total de la población (%). España, 2022.




CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: cocaína

1.1.188.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de 15-64 años (%). España, 2007-2022.



	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida	8,3	10,2	8,8	10,3	9,1	10,3	11,2	12,0
Últimos 12 meses	3,1	2,7	2,3	2,2	2,0	2,2	2,5	2,4
Últimos 30 días	-	1,3	1,1	1,0	0,9	1,1	1,2	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.189.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2007-2022.

	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida								
Hombre	-	-	12,8	15,0	13,4	14,6	16,4	17,4
Mujer	-	-	4,7	5,4	4,7	5,9	5,9	6,6
Últimos 12 meses								
Hombre	4,7	4,2	3,6	3,3	3,1	3,4	4,1	3,6
Mujer	1,6	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1
Últimos 30 días								
Hombre	2,5	2,0	1,8	1,7	1,5	1,8	2,0	2,1
Mujer	0,8	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.190.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses en la población de 15-34 años. España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.191.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, según sexo y edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.192.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo (%) y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.193.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida														
Hombre	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	14,9	13,3	14,3	16,1	17,1
Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,4	4,6	5,7	5,7	6,3
Últimos 12 meses														
Hombre	2,7	2,6	2,3	3,8	4,1	4,6	4,4	4,2	3,6	3,3	2,9	3,2	4,0	3,5
Mujer	1,0	0,6	0,8	1,3	1,2	1,3	1,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0
Últimos 30 días														
Hombre	-	1,5	1,3	2,2	1,6	2,5	2,5	2,0	1,8	1,7	1,4	1,8	1,9	2,0
Mujer	-	0,2	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.194.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.195.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según sexo (%). España, 1999-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.196.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad. España, 1999-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.197.

Frecuencia (días) de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que lo ha consumido en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2022.

	Total	Hombre	Mujer
1-3 días	34,6	34,8	34,1
4-9 días	17,8	17,6	18,9
10-19 días	19,6	17,9	25,5
20-29 días	13,0	13,7	10,4
30-150 días	10,7	11,5	8,0
Más de 150 días	4,3	4,6	3,1
Número medio de días	27,9	29,3	22,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.198.


Frecuencia (días) de consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años que lo ha consumido en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2022.

	Total	Hombre	Mujer
1-3 días	59,5	55,8	71,1
4-9 días	23,4	26,3	14,1
10-19 días	10,8	10,8	11,1
20-29 días	3,3	3,9	1,2
30 días	3,0	3,2	2,5
Número medio de días	5,5	5,8	4,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.199.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses y la disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil). España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.200.

Evolución de la prevalencia del uso de cocaína en polvo entre la población general de 15-64 años y de la cantidad de cocaína incautada. España, 1997-2022.

	Incautaciones (Kg)	Prevalencia último año
1997	–	1,6
1998	11.687	–
1999	18.111	1,6
2000	6.165	–
2001	33.680	2,5
2002	17.617	–
2003	49.279	2,7
2004	33.135	–
2005	48.429	3,0
2006	49.650	–
2007	37.784	3,0
2008	27.981	–
2009	25.349	2,6
2010	25.241	–
2011	16.609	2,2
2012	20.754	–
2013	26.701	2,1
2014	21.685	–
2015	21.621	1,9
2016	15.629	–
2017	40.960	2,0
2018	48.453	–
2019	37.867	2,5
2020*	36.948	–
2021*	49.159	–
2022	–	2,3

* Polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.201.

Prevalencia de consumo de cocaína base (%) y edad media de inicio en el consumo de cocaína base (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.202.

Prevalencia de consumo de cocaína base alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.203.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo. España 1999-2022.




	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombre	0,4	0,2	0,2	0,3	0,7	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3
Mujer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Total	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.204.

Prevalencia de consumo de cocaína base alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según sexo (%). España, 2022.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 mees
Hombre	2,5	0,3
Mujer	0,9	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.205.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo, base, polvo y/o base) en la población de 15-64 años (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: éxtasis

1.1.206.

Prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio en el consumo de éxtasis (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.207.


Prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.208.


Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según sexo (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.209.

Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.210.

Evolución de la prevalencia de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.211.

Evolución de la prevalencia de uso de éxtasis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante su consumo una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: GHB

1.1.212.

Prevalencia de consumo de GHB alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2022.


	2013			2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	0,6	0,9	0,2	0,6	1,0	0,2	0,5	0,7	0,2	0,9	1,5	0,3	0,7	1,1	0,3
Últimos 12 meses	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Últimos 30 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.213.

Evolución de la prevalencia de consumo de GHB (%) alguna vez en la vida y edad media de inicio (años) del consumo entre la población de 15 a 64 años. España, 2013-2022.




	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida	0,6	0,6	0,5	0,9	0,7
Edad media de inicio del consumo	-	-	22,4	23,7	22,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: anfetaminas

1.1.214.

Prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,7	3,7	3,3	3,8	3,6	4,0	4,3	4,6
Últimos 12 meses	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6
Últimos 30 días	-	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Edad media de inicio en el consumo	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2	20,8	20,2	20,4	20,6	20,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.215.


Prevalencia del consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.216.


Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.217.


Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.218.

Evolución de la prevalencia de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2022.




FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: metanfetaminas

1.1.219.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas (años) en la población de 15-64 años. España, 2011-2022.



	2011	2013	2015	2018	2020	2022
■ Alguna vez en la vida	0,8	0,5	0,6	1,2	1,2	1,3
■ Últimos 12 meses	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
■ Últimos 30 días	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
■ Edad media de inicio del consumo	-	-	-	23,1	23,3	22,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.220.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	1,3	2,0	0,6	1,0	1,2	0,8	2,2	3,2	1,3	1,8	2,9	0,8	1,1	1,8	0,3	0,4	0,8	0,1

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.221.

Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: alucinógenos

1.1.222.


Prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.223.


Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según sexo (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.224.


Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.225.

Prevalencia del consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2022.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Hombre	1,1	1,4	0,8	1,2	0,9	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,8	0,7	1,0	0,7
Mujer	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.226.

Evolución de la prevalencia de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2022.




1,8	1,2	1,3	1,1	1,5	1,4	1,1	0,9	0,8	1,1	0,9	1,1	1,1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: setas mágicas

1.1.227.

Prevalencia de consumo de setas mágicas en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2022.



	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida	2,1	1,9	2,0	2,4	3,5	3,3
Últimos 12 meses	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4
Últimos 30 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Edad media de inicio del consumo	-	-	-	22,1	22,2	22,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.228.

Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2022.

		2013	2015	2018	2020	2022
Alguna vez en la vida	Hombre	2,9	3,0	3,8	5,3	4,6
	Mujer	0,8	1,0	1,1	1,7	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.229.

Prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	3,3	4,6	1,9	2,5	3,0	2,0	5,1	6,3	3,9	4,6	6,8	2,5	3,1	4,9	1,3	1,0	1,7	0,3

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: heroína

1.1.230.


Prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo de heroína (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.231.

Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.232.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y riesgo percibido ante el consumo de cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años (%). España, 1997-2022.



* A partir de 2020 el riesgo percibido es de cocaína u otras drogas ilegales.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.233.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y percepción de disponibilidad de heroína (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Consumo por tipo de droga: inhalables volátiles

1.1.234.


Prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.235.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

1.1.236.

Evolución de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (%). España, 2015-2022.

	Alguna vez en la vida				Últimos 12 meses				Últimos 30 días			
	2015	2018	2020	2022	2015	2018	2020	2022	2015	2018	2020	2022
Ninguna sustancia	4,4	6,0	4,2	4,5	14,2	16,5	14,9	15,5	24,7	25,2	24,5	23,8
Una sola sustancia	19,3	19,8	19,8	19,6	44,0	42,3	44,7	43,6	42,1	41,0	43,7	42,5
Dos sustancias	38,1	33,3	32,8	29,5	30,2	28,3	28,1	28,1	25,7	24,5	23,5	24,5
Tres sustancias	24,4	25,0	25,6	27,0	9,0	10,1	9,1	9,5	6,4	8,0	6,7	7,5
Cuatro o más sustancias	13,9	15,9	17,5	19,4	2,5	2,8	3,2	3,2	1,1	1,2	1,5	1,7

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.237.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales*) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ningún consumo	4,5	3,6	5,5	15,5	11,8	19,1	23,8	17,9	29,6
Una sola sustancia	19,6	16,9	22,3	43,6	42,5	44,8	42,5	42,7	42,4
Dos sustancias	29,5	27,8	31,1	28,1	29,9	26,3	24,5	27,2	21,8
Tres sustancias	27,0	27,6	26,4	9,5	11,3	7,8	7,5	9,8	5,3
Cuatro o más sustancias	19,4	24,0	14,6	3,2	4,5	2,0	1,7	2,4	0,9


* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.238.

Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en la población de 15-64 años (%). España, 2022.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.239.

Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.




		Ninguna sustancia	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
15-24 años	Hombre	19,5	37,6	18,6	18,4	5,8
	Mujer	21,4	40,2	21,9	11,8	4,7
25-34 años	Hombre	9,0	43,1	27,8	13,9	6,2
	Mujer	17,4	45,7	25,1	8,7	3,2
35-44 años	Hombre	10,5	42,7	30,8	10,7	5,2
	Mujer	20,2	44,2	27,0	7,0	1,6
45-54 años	Hombre	10,0	42,3	34,3	9,3	4,1
	Mujer	17,3	45,1	30,2	6,4	1,0
55-64 años	Hombre	11,9	45,9	34,0	6,6	1,6
	Mujer	19,9	47,4	25,3	6,9	0,5

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.240.

Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2022.



	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
■ Ninguna droga	20,4	13,2	15,4	13,6	15,9
■ 1 droga	38,9	44,4	43,4	43,7	46,7
■ 2 drogas	20,2	26,5	28,9	32,2	29,6
■ 3 drogas	15,2	11,3	8,8	7,9	6,7
■ 4 y más	5,3	4,7	3,4	2,6	1,0

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.241.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas*, según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (%). España, 2022.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Alcohol	85,4	94,4	98,0	98,9
Tabaco	9,1	79,7	97,5	97,9
Cannabis	0,4	5,1	61,4	93,6
Éxtasis	0,0	0,1	0,4	22,3
Hipnosedantes con o sin receta	4,9	19,9	38,4	52,7
Hipnosedantes sin receta	0,2	1,3	3,5	17,1
Opioides con o sin receta	5,0	8,6	11,6	17,2
Opioides sin receta	0,2	0,6	1,1	5,8
Cocaína en polvo	0,0	0,6	3,3	54,3
Cocaína base	0,0	0,1	0,1	6,3
Anfetaminas/speed	0,0	0,0	0,3	16,5
Alucinógenos	0,0	0,1	0,3	15,6
Heroína	0,0	0,0	0,1	1,7
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,2	5,2

* Sustancias psicoactivas: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.242.

Evolución de la prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (ilegales*) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 2015-2022.

	2015	2018	2020	2022
Ningún consumo	90,0	88,3	88,8	88,7
Una sola sustancia	8,1	9,9	8,9	9,0
Dos sustancias	1,2	1,2	1,3	1,5
Tres sustancias	0,4	0,4	0,5	0,4
Cuatro o más sustancias	0,3	0,3	0,4	0,4

* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.243.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (ilegales*) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ningún consumo	57,9	49,8	66,1	88,7	84,8	92,6	91,1	87,6	94,6
Una sola sustancia	28,6	31,2	26,0	9,0	11,7	6,3	7,8	10,7	4,8
Dos sustancias	6,6	8,9	4,4	1,5	2,4	0,7	0,9	1,4	0,4
Tres sustancias	2,8	3,9	1,8	0,4	0,6	0,2	0,1	0,2	0,1
Cuatro o más sustancias	4,0	6,3	1,8	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1

* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.244.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
SÓLO ALCOHOL	17,9	15,9	20,0	37,3	37,9	36,6	33,1	35,8	30,4
Ningún consumo	4,5	3,6	5,5	15,5	11,8	19,1	23,8	17,9	29,6
Una sola sustancia	30,7	28,6	32,8	32,9	33,2	32,6	31,6	32,1	31,2
Dos sustancias	27,4	27,9	26,9	10,9	12,3	9,6	9,7	11,5	7,8
Tres sustancias	10,5	11,6	9,3	2,2	2,9	1,4	1,4	1,9	0,8
Cuatro o más sustancias	9,0	12,5	5,5	1,2	1,8	0,6	0,5	0,7	0,2

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.245.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
SÓLO TABACO	0,8	0,7	1,0	4,0	3,3	4,6	6,5	5,3	7,6
Ningún consumo	4,5	3,6	5,5	15,5	11,8	19,1	23,7	17,9	29,6
Una sola sustancia	42,4	39,6	45,2	62,1	64,4	59,9	57,5	61,9	53,1
Dos sustancias	32,0	31,3	32,8	15,0	15,6	14,3	10,5	12,3	8,7
Tres sustancias	11,1	12,1	10,0	2,2	2,9	1,5	1,3	1,8	0,8
Cuatro o más sustancias	9,1	12,7	5,6	1,3	1,9	0,6	0,5	0,7	0,2

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.246.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
SÓLO ALCOHOL Y/O TABACO	41,9	39,6	44,2	62,2	65,2	59,2	58,8	63,8	53,8
Ningún consumo	4,5	3,6	5,5	15,4	11,8	19,1	23,7	17,9	29,6
Una sola sustancia	33,2	31,9	34,5	18,7	17,9	19,4	15,5	15,5	15,5
Dos sustancias	11,2	12,2	10,2	2,4	3,2	1,6	1,5	2,0	0,9
Tres sustancias	3,8	4,9	2,8	0,8	1,2	0,4	0,3	0,5	0,2
Cuatro o más sustancias	5,3	7,8	2,8	0,5	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.247.

Prevalencia de consumo de dos o más sustancias psicoactivas* según sustancia consumida en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2022.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Alcohol	48,8	34,8	12,2	4,2
Tabaco	10,2	57,7	23,9	8,1
Cannabis	1,7	13,7	55,8	28,7
Éxtasis	0,0	2,2	4,8	92,9
Hipnosedantes con o sin receta	16,5	42,7	27,9	12,9
Hipnosedantes sin receta	5,1	27,2	25,4	42,2
Analgésicos opioides con o sin receta	34,7	38,8	17,7	8,8
Analgésicos opioides sin receta	19,1	29,0	19,0	32,9
Cocaína en polvo	1,0	7,2	14,0	77,8
Cocaína base	0,0	9,9	3,1	87,0
Anfetaminas	0,2	1,4	5,4	93,0
Alucinógenos	2,1	5,5	5,7	86,6
Heroína	0,0	0,0	11,9	88,1
Inhalables volátiles	0,0	2,9	9,7	87,4

* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADDES).

1.1.248.

Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de diferentes sustancias psicoactivas (columna) según sustancia de consumo (fila) (%). España, 2022.

	Alcohol	Tabaco	Hipnosedantes*	Hipnosedantes**	Analgésicos opioides*	Analgésicos opioides**	Cannabis	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles
Alcohol	100,0	85,3	73,2	89,9	77,8	93,4	92,3	96,2	94,2	95,8	98,2	96,5	95,8	68,3	99,1
Tabaco	43,6	100,0	48,2	69,3	47,9	57,5	85,8	86,5	88,8	85,8	91,0	96,7	85,9	100,0	88,1
Hipnosedantes*	12,6	16,3	100,0	100,0	43,2	55,4	18,1	29,9	52,0	30,6	29,1	32,1	28,0	50,8	27,6
Hipnosedantes**	1,6	2,4	10,2	100,0	5,1	25,1	5,1	13,4	29,7	13,6	13,9	18,5	16,4	10,2	12,9
Analgésicos opioides*	6,9	8,4	22,4	26,0	100,0	100,0	8,3	13,2	41,9	13,3	16,4	17,6	13,6	36,2	19,1
Analgésicos opioides**	0,7	0,9	2,5	11,0	8,7	100,0	2,2	5,8	24,7	5,7	10,6	8,6	8,1	16,7	7,9
Cannabis	12,9	23,4	14,6	40,9	13,0	40,9	100,0	75,4	68,3	74,1	86,0	82,8	78,5	75,0	75,8
Cocaína en polvo	2,9	5,1	5,2	23,3	4,4	22,6	16,3	100,0	77,4	97,7	58,4	66,1	49,8	53,5	36,6
Cocaína base	0,3	0,5	0,9	5,2	1,4	9,9	1,5	7,9	100,0	10,1	10,4	16,6	12,3	66,6	4,9
Cocaína polvo y/o base	3,0	5,2	5,5	24,1	4,6	22,8	16,5	100,0	100,0	100,0	59,3	66,2	50,0	66,6	36,6
Éxtasis	1,0	1,9	1,8	8,3	1,9	14,2	6,4	20,2	34,8	20,0	100,0	47,0	46,8	26,5	53,0
Anfetaminas	0,7	1,4	1,4	7,9	1,5	8,3	4,4	16,4	40,0	16,1	34,0	100,0	33,5	32,2	39,0
Alucinógenos	0,7	1,3	1,2	7,3	1,2	8,0	4,3	12,7	30,6	12,5	35,5	34,3	100,0	32,7	36,1
Heroína	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3	1,8	0,4	1,5	17,6	1,8	2,1	3,5	3,5	100,0	1,9
Inhalables volátiles	0,3	0,5	0,4	2,0	0,6	2,7	1,5	3,3	4,3	3,2	13,3	13,8	12,3	6,2	100,0

* Con o sin receta. ** Sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.249.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 que ha hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2022.

	Sí binge drinking últimos 30 días	No binge drinking últimos 30 días
Hipnosedantes sin receta	1,7	0,3
Analgésicos opioides sin receta	1,0	0,2
Cannabis	24,8	5,7
Cocaína polvo y/o base	6,2	0,5
Éxtasis	1,2	0,1
Anfetaminas	1,1	0,1
Alucinógenos	0,8	0,0
Heroína	0,1	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.250.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 que se ha emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2022.

	Sí borracheras últimos 12 meses	No borracheras últimos 12 meses
Hipnosedantes sin receta	3,2	1,0
Analgésicos opioides sin receta	1,2	0,5
Cannabis	33,0	6,2
Cocaína polvo y/o base	9,1	1,0
Éxtasis	3,9	0,2
Anfetaminas	2,6	0,2
Alucinógenos	2,4	0,2
Heroína	0,2	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.251.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 que ha realizado un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) o no en el mismo periodo (%). España, 2022.

	Sí consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	No consumo problemático de cannabis (CAST<4)
Hipnosedantes sin receta	15,2	3,1
Analgésicos opioides sin receta	8,1	0,6
Cannabis	100,0	100,0
Cocaína polvo y/o base	31,2	14,2
Éxtasis	14,5	5,3
Anfetaminas	11,8	3,1
Alucinógenos	9,4	3,6
Heroína	1,1	0,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Nuevas sustancias psicoactivas

1.1.252.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.253.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.

	Total	Hombre	Mujer
Nuevas sustancias	1,9	2,7	1,1
Ketamina	0,9	1,5	0,4
Spice	0,5	0,8	0,3
Mefedrona	0,2	0,3	0,1
Ayahuasca	0,3	0,5	0,2
Cocaína rosa	0,5	0,7	0,3
Flakka	0,1	0,1	0,0
Óxido Nitroso	0,2	0,4	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.254.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* alguna vez en la vida entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y en la población de 15 a 64 años (%). España, 2022.




	Población 15-64 años	Consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida
Una sola sustancia	19,6	3,0
Dos sustancias	29,5	4,1
Tres sustancias	27,3	8,6
Cuatro o más sustancias	19,0	83,5

* Alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína en polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.255.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años que ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no (%). España, 2022.



	Ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida	No ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida
Ninguna sustancia legal e ilegal**	0,8	4,6
Sustancias ilegales*	92,3	41,1
Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	99,2	94,4

* Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína.

** Alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.256.

Evolución del porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013-2022.


	2013			2015			2018			2020			2022		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
NUNCA han oído hablar															
de nuevas sustancias	74,1	70,9	77,3	71,1	68,4	73,9	73,8	70,5	77,1	81,1	77,5	84,8	73,1	68,9	77,3

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.257.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles, metanfetaminas, GHB y setas mágicas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8	3,8	4,5	5,5	5,4
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3	3,6	3,6	5,0	5,1
Anfetaminas	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3	3,8	3,6	4,0	4,3	4,6
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9	2,0	2,4	3,5	3,3
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	0,6	1,2	1,2	1,3
I. volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8	0,9
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,5	0,9	0,7
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.258.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles, metanfetaminas, GHB y setas mágicas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,9	0,8
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6	0,4	0,6	0,6
Anfetaminas	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
I. volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.1.259.


Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2022.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95	95,8	94,6	94,5	93,8	94,6	97,0	93,4	93,3
Consumir hipnosedantes													
una vez por semana o más	81,4	86,8	84,8	85,4	81,8	79,7	79,7	79,9	78,5	78,8	79,6	83,5	80,4
Consumir hipnosedantes													
una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0	62,1	65,3	60,0
Consumir analgésicos opioides													
una vez o menos al mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,6	66,8
Consumir analgésicos opioides													
una vez por semana o más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7	84,2
Consumir cannabis													
una vez por semana o más	84	87,6	83,1	79,2	80,8	83,0	81,6	85,5	82,4	79,8	81,5	85,3	83,9
Consumir cannabis													
una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5	66,1	66,3	63,7
Consumir 1-2 cañas/copas cada día	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	50,4
Consumir 5-6 cañas/copas													
el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45	49,3	43,5	45,8	49,1	50,2	50,4
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	91,6	93,0	92,2	92,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.260.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2022.




* Otras drogas ilegales incluido en 2020.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.261.

Riesgo percibido ante diversas conductas sobre adicciones (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta puede producir muchos o bastantes problemas), según edad. España, 2022.



* Otras drogas ilegales incluido en 2020. ** Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales. *** O apuestas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.262.

Riesgo percibido ante diversas conductas sobre adicciones (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta puede producir pocos problemas o ninguno). España, 2022.



Conducta	Porcentaje (%)
Consumir cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes*	6,7
Fumar paquete tabaco diario	7,9
Consumir analgésicos opioides una vez por semana o más	15,8
Consumir cannabis una vez por semana o más	16,1
Consumir hipnosedantes una vez por semana o más	19,6
Fumar cigarrillos electrónicos	27,1
Consumir analgésicos opioides una vez o menos al mes	33,2
Jugar a juegos con dinero al menos semanalmente***	35,6
Consumir cannabis una vez o menos al mes	36,3
Más de 3 horas diarias en internet **	39,0
Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	40,0
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	49,6
Tomarse más de 1 o 2 cañas/copas cada día	49,6

* Otras drogas ilegales incluido en 2020.

** Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales.

*** O apuestas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.263.

Percepción del riesgo de fumar un paquete de tabaco diario (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar muchos o bastantes problemas) y prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.1.264.

Porcentaje de personas de 15-64 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna de las siguientes drogas, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo (%). España, 2020-2022.


	2020			2022		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Cannabis	20,5	26,5	14,5	18,7	23,8	13,5
Cocaína polvo y/o base	10,1	14,0	6,2	9,0	12,6	5,3
Cocaína en polvo	8,1	11,5	4,6	6,7	9,4	4,0
Éxtasis	4,4	6,2	2,6	3,5	4,8	2,2
Anfetaminas o speed	3,0	4,1	1,9	3,1	4,4	1,9
Alucinógenos	3,8	5,4	2,2	2,3	3,1	1,4
Cocaína base	2,6	3,8	1,4	1,8	2,5	1,0
Metanfetamina	2,2	3,1	1,3	1,6	2,1	1,2
Heroína	1,7	2,4	1,0	1,0	1,3	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.265.

Percepción de disponibilidad de drogas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1995-2022.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Cannabis	50,3	52,1	51,8	59,5	59,2	66,2	59,8	69,6	67,0	64,6	64,3	63,3	59,4	56,9
Éxtasis	41,1	40,9	39,9	48,2	46,1	49,7	43,8	51,9	45,6	32,7	28,5	30,6	26,7	24,9
Cocaína polvo y/o base	39,5	39,2	39,9	46,7	46,5	53,3	43,8	56,7	54,4	46,9	42,0	42,3	-	-
Cocaína en polvo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,1	40,3
Cocaína base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,8	22,8
Heroína	37,0	36,2	37,2	41,2	39,2	43,4	39,5	44,7	44,9	31,6	27,4	30,3	20,5	18,7
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	25,7	26,0
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	32,8	28,6	27,9



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.266.

Percepción de disponibilidad de distintas sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2022.

	Hombre	Mujer
Cannabis	62,5	51,0
Éxtasis	28,1	21,6
Cocaína polvo	45,3	35,1
Cocaína base	25,5	20,1
Heroína	21,1	16,3
Hipnosedantes sin receta	30,1	25,7
Analgésicos opioides sin receta	27,9	24,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.267.

Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en la población a la que le han ofrecido drogas alguna vez en los últimos 12 meses* (%). España, 2022.

	Población 15-64 años	Población a la que le han ofrecido drogas
Cannabis	10,6	36,3
Cocaína polvo y/o base	2,4	15,7
Éxtasis	0,8	13,0
Anfetaminas	0,6	11,3
Alucinógenos	0,6	10,0

* Les han ofrecido o no la sustancia concreta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de la importancia del problema de consumo de drogas y visibilidad del problema

1.1.268.

Importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (%). España, 1997-2022.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Nada importante	19,6	22,3	19,1	20,9	14,8	20,5	20,4	27,5	23,0	26,0	24,9	20,4	19,0
Algo importante	28,1	32,1	34,3	34,3	27,9	29,7	30,7	32,5	37,8	37,7	40,0	33,5	38,2
Muy importante	46,4	37,3	39,3	36,3	52,0	49,8	48,9	40,0	39,2	36,3	35,1	46,1	42,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.269.


Importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive, según edad y sexo (%). España, 2020-2022.

		Algo o muy importante	
		2020	2022
Hombre	15-34 años	80,8	81,5
	35-64 años	78,3	80,3
Mujer	15-34 años	80,2	81,9
	35-64 años	80,0	81,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.270.

Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas legales e ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.271.

Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2022.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Jeringuillas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2	3,8	2,9	2,0	1,1	1,7	2,6	2,1
Personas inyectándose drogas	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8	2,9	2,1	1,3	0,8	1,2	2,3	1,9
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio (fumando chinos)	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6	4,4	3,3	2,4	1,6	2,1	4,1	1,9
Personas drogadas caídas en el suelo	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6	6,2	5,2	3,8	2,6	3,1	5,0	4,0
Vendedores que ofrecen drogas	11,4	10	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2	13,5	10,7	9,4	7,3	10,1	12,1	13,1
Personas esnifando drogas por la nariz	-	-	-	-	-	-	11,6	10,4	8,6	7,9	6,1	7,5	11,3	9,5
Personas fumando porros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9	45,1	51,2	56,7	55,9
Personas haciendo botellón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4	34,9	38,3	45,3	44,1
Personas borrachas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	38,1	45,9	44,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.272.

Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas legales e ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive), según sexo. España, 2020-2022.


	2020		2022	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Personas fumando porros	57,8	54,3	57,1	54,7
Personas haciendo botellón	46,2	43,4	45,0	43,2
Personas borrachas	46,3	44,5	45,2	43,0
Vendedores que ofrecen drogas	13,0	10,6	14,3	12,0
Personas esnifando drogas por la nariz	12,7	9,3	10,7	8,3
Personas drogadas caídas en el suelo	4,9	4,9	4,0	4,1
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio (fumando chinos)	4,4	3,7	3,2	2,8
Jeringuillas en el suelo	2,3	2,7	2,2	2,0
Personas inyectándose drogas	2,3	2,3	1,8	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

1.1.273.

Valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (%). España, 1995-2022.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022
Legalización de todas las drogas	19,8	21,5	24,6	27,1	23,5	21,4	16,6	15,6	20,9	19,6	21,0	18,1	24,8	19,7
Legalización de cannabis	27,3	30,2	33,3	38,5	37,1	35,2	23,4	29,6	32,7	33,1	37,4	33,8	36,5	33,8
Tto. obligatorio a consumidores	56,2	57,2	57,9	62,8	59,7	58,2	56,3	57,2	65,7	59,9	59,4	59,8	58,1	54,6
Administración médica heroína	43,3	47,5	53,9	58,2	59,3	59,9	52,8	48,9	60,2	59,1	58,1	57,3	55,2	56,9
Administración médica metadona	63,8	62,9	67,5	66,6	67,1	68,4	66,8	65,8	72,4	69,3	69,3	69,1	65,7	67,6
Leyes estrictas contra las drogas	79,3	77	76,9	75,5	73,2	75,3	77,9	80,6	80,3	76,6	74,9	79,1	78,5	73,5
Control policial y aduanero	85,8	83,7	82,1	80,5	78,8	79,8	83,3	84,7	84,2	81,2	80,4	83,1	82,6	78,9
Campanas publicitarias	84,5	81,5	79,8	77,6	75,6	77,7	79,1	77,7	81	78,7	80,7	83,6	81,5	79,6
Tto. voluntario a consumidores	86,3	87,1	84,8	81,6	82,7	82,4	83,2	85,1	84,9	83,2	83,8	82,3	80,1	81,6
Educación en las escuelas	94,3	93,1	91,8	89,4	89,5	88,8	90,6	90,4	91,8	90,4	90,8	90,0	89,2	88,3

Tto. = tratamiento

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.274.

Valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2020-2022.

	2020		2022	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Legalización de todas las drogas	24,8	24,9	20,5	18,9
Legalización de cannabis	38,9	33,9	36,9	30,7
Tratamiento obligatorio a consumidores	55,8	60,5	52,5	56,7
Administración médica de heroína	53,0	57,3	55,4	58,5
Administración médica de metadona	64,2	67,2	66,1	69,2
Leyes estrictas contra las drogas	75,3	81,7	71,0	76,1
Control policial y aduanero	80,2	84,9	76,6	81,3
Campañas publicitarias	79,5	83,6	77,3	81,9
Tratamiento voluntario a consumidores	78,9	81,2	80,2	82,9
Educación en las escuelas	88,0	90,5	87,3	89,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.275.


Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad (%). España, 2015-2022.

		2015	2018	2020	2022
Legalización del cannabis	15-24 años	36,1	34,6	36,2	35,5
	25-34 años	38,9	34,8	37,0	38,2
	35-44 años	39,8	36,0	37,5	33,8
	45-54 años	37,0	34,5	36,2	33,5
	55-64 años	33,9	28,4	35,1	29,4
Legalización de todas las drogas	15-24 años	18,7	17,6	24,6	20,1
	25-34 años	20,5	17,3	22,7	20,1
	35-44 años	21,7	19,1	25,6	19,5
	45-54 años	21,6	19,1	25,8	19,6
	55-64 años	21,4	16,9	24,9	19,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.276.

Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo (%). España, 2015-2022.



	Legalización del cannabis		Legalización de todas las drogas	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
2015	40,0	34,7	20,8	21,1
2018	36,5	31,1	18,3	17,9
2020	38,9	33,9	24,8	24,9
2022	36,9	30,7	20,5	18,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.277.

Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en el último año (%). España, 2022.

	Nada importante	Algo importante	Muy importante	Ns/Nc
Han consumido cannabis en el último año				
(CAST \geq 4 Consumo problemático*)	14,8	15,1	65,6	4,4
Han consumido cannabis en el último año (CAST<4)	18,9	19,5	55,1	6,4
No han consumido cannabis en el último año	40,8	21,3	27,5	10,4

* Consumo problemático: CAST (Cannabis Abuse Screening Test) \geq 4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.278.

Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* en el último año (%). España, 2022.

	Nada importante	Algo importante	Muy importante	Ns/Nc
No han consumido alguna droga ilegal en el último año	61,6	11,3	17,4	9,7
Han consumido alguna droga ilegal en el último año	52,7	14,5	23,2	9,5


* Alguna droga ilegal: No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción sobre el estado de salud

1.1.279.

Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2022.




		Muy bueno / bueno	Regular	Malo / muy malo
■ Hombre	15-24 años	96,3	3,5	0,2
	25-34 años	95,2	4,3	0,4
	35-44 años	90,6	8,3	1,1
	45-54 años	79,8	18,0	2,2
	55-64 años	64,9	31,6	3,6
■ Mujer	15-24 años	94,5	5,1	0,5
	25-34 años	92,5	6,7	0,7
	35-44 años	87,3	11,1	1,6
	45-54 años	81,2	16,7	2,1
	55-64 años	64,5	31,3	4,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.280.

Percepción del estado de salud como muy bueno o bueno de la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2022.



	Hombres	Mujeres
15-19 años	96,7	94,8
20-24 años	95,9	94,2
25-29 años	95,2	92,6
30-34 años	95,2	92,5
35-39 años	92,1	89,8
40-44 años	89,1	85,1
45-49 años	82,2	84,6
50-54 años	76,5	77,0
55-59 años	70,1	68,9
60-64 años	60,8	61,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

Consumo de drogas en población laboral 2022

1.1.281.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población laboral de 16-64 años (%). España, 2022.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario últimos 30 días
Alguna droga ilegal	46,2	11,7	9,4	–
Tabaco	73,7	41,8	40,1	35,9
Cigarrillos electrónicos	12,8	4,1	2,2	1,1
Alcohol	95,6	80,8	69,3	9,8
Consumo de alcohol de riesgo	–	4,8	–	–
Binge drinking	–	–	16,3	–
Borracheras	74,5	16,4	6,1	0,3
Hipnosedantes con o sin receta	23,3	12,2	8,4	5,8
Hipnosedantes sin receta	3,9	1,4	0,5	0,2
Analgésicos opioides	15,9	6,5	3,5	1,6
Analgésicos opioides sin receta	1,7	0,7	0,3	0,1
Cannabis	44,8	10,6	8,8	3,4
Consumo problemático de cannabis	–	22,0	–	–
Éxtasis	6,1	0,8	0,2	–
Alucinógenos	6,3	0,6	0,2	–
Anfetaminas	5,5	0,6	0,2	–
Cocaína en polvo	13,8	2,7	1,5	–
Cocaína base	1,8	0,2	0,1	–
Cocaína polvo y/o base	14	2,7	1,6	–
Heroína	0,6	0,1	0,0	–
Inhalables volátiles	1,1	0,2	0,1	–
GHB	0,9	0,1	0,0	–
Metanfetaminas	1,6	0,3	0,1	–
Setas mágicas	3,9	0,4	0,1	–
Nuevas sustancias	2,1	–	–	–

Alguna droga ilegal: Incluye: cannabis, cocaína, heroína, anfetaminas, éxtasis y alucinógenos.

Consumo de alcohol de riesgo: Según el test de screening AUDIT de la OMS AUDIT \geq 8.

Binge drinking: Beber 5 o más bebidas alcohólicas en hombres y 4 o más en mujeres en un intervalo de 2 horas.

Consumo problemático de cannabis: En la escala CAST obtener una puntuación igual o superior a 4 puntos.

Nuevas sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias (keta, spice, cannabinoides sintéticos, marihuana sintética, miao miao, flakka, superman, catinonas, mefedrona, derivados de los fentanilos, metoxetamina, NBOMe, ayahuasca, kratom...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.282.

Prevalencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años y la población laboral de 16 a 64 años (%). España, 2022.

	Población general	Población laboral
Tabaco	39,0	41,8
Cigarrillos electrónicos	4,1	4,1
Alcohol	76,4	80,8
Hipnosedantes con o sin receta	13,1	12,2
Hipnosedantes sin receta	1,3	1,4
Analgésicos opioides con o sin receta	6,8	6,5
Analgésicos opioides sin receta	0,6	0,7
Cannabis	10,6	10,6
Éxtasis	0,8	0,8
Alucinógenos	0,6	0,6
Anfetaminas/speed	0,6	0,6
Cocaína polvo y/o base	2,3	2,7
Cocaína en polvo	0,2	0,2
Cocaína base	2,4	2,7
Setas mágicas	0,4	0,4
Metanfetaminas	0,3	0,3
GHB	0,1	0,1
Heroína	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,2	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.283.

Prevalencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años y la población laboral de 16 a 64 años, según sexo (%). España, 2022.

	Población general		Población laboral	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Tabaco	44,0	34,0	46,2	36,7
Cigarrillos electrónicos	4,3	3,9	4,2	3,9
Alcohol	82,1	70,8	84,8	76,2
Hipnosedantes con o sin receta	10,3	16,0	9,4	15,4
Hipnosedantes sin receta	1,4	1,3	1,4	1,4
Analgésicos opioides con o sin receta	5,8	7,9	5,5	7,7
Analgésicos opioides sin receta	0,7	0,5	0,8	0,5
Cannabis	14,4	6,8	14,2	6,6
Éxtasis	1,0	0,5	1,0	0,6
Alucinógenos	0,7	0,4	0,7	0,5
Anfetaminas/speed	0,8	0,3	0,9	0,3
Cocaína polvo y/o base	3,6	1,1	4,0	1,3
Cocaína en polvo	3,5	1,0	3,9	1,3
Cocaína base	0,3	0,1	0,3	0,1
Setas mágicas	0,5	0,3	0,4	0,3
Metanfetaminas	0,3	0,2	0,4	0,3
GHB	0,2	0,0	0,2	0,1
Heroína	0,1	0,0	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,3	0,1	0,2	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.284.

Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas, en la población laboral, según situación laboral, sector de actividad, categoría ocupacional y jornada laboral (%). España, 2007-2022.

	BEBIDAS ALCOHÓLICAS						TABACO						HIPNOSEDANTES					
	2007	2013	2015	2018	2020	2022	2007	2013	2015	2018	2020	2022	2007	2013	2015	2018	2020	2022
POBLACIÓN LABORAL (media)	11,0	10,5	10,0	7,7	9,6	9,8	33,1	33,8	34,4	37,6	35,6	35,9	5,1	7,3	6,9	6,6	7,3	8,4
SITUACIÓN LABORAL																		
Empleados (trabajando o temporalmente ausentes)	11,2	10,5	10,1	7,5	9,4	9,7	32,2	31,0	32,4	35,9	34,1	35,0	4,6	6,2	5,9	5,6	6,4	7,6
Parados con empleo previo	9,6	10,5	9,9	8,9	10,9	10,4	36,1	39,9	40,9	45,4	42,5	41,3	8,5	9,3	10,4	11,4	11,8	13,1
SECTOR DE ACTIVIDAD																		
Act. artísticas, recreativas y deportivas	-	7,3	9,3	7,3	5,3	7,6	-	34,1	26,6	40,3	38,8	31,9	-	6,5	4,3	6,6	5,6	5,8
Act. domésticas y servicios personales	4,3	4,0	5,5	3,3	4,1	4,8	22,8	28,8	30,6	33,2	28,2	28,8	6,7	10,9	8,3	10,1	8,7	13,4
Act. financiera, seguros, inmobiliarias y serv. empresariales	9,6	10,5	8,5	5,0	8,3	7,8	31,7	30,0	30,9	34,8	32,2	32,1	4,6	7,8	6,2	7,4	7,9	8,3
Agricultura, pesca, ganadería y extracción	19,7	13,5	14,9	15,1	18,8	17,7	31,6	40,2	42,0	46,1	37,1	39,3	5,7	4,1	4,5	5,2	10,2	9,5
Admón. pública, educación, sanidad y serv. sociales	10,0	8,4	7,8	5,6	6,7	6,4	28,5	25,8	24,3	28,5	27,1	26,0	5,7	8,6	8,7	7,1	8,9	8,1
Comercio y reparación vehículos a motor	8,2	8,7	7,8	6,0	8,0	8,3	34,6	33,5	35,0	37,9	34,7	36,7	4,7	6,2	7,3	6,6	6,7	8,7
Construcción	15,8	19,4	18,0	16,0	20,0	20,0	43,6	43,4	45,3	45,4	46,0	48,5	4,4	4,8	5,1	6,1	5,3	6,8
Hostelería	10,0	11,3	10,4	8,2	9,3	10,5	39,0	42,6	43,3	45,5	44,3	46,2	5,4	8,2	7,0	6,0	7,2	8,1
Industria manufacturera y suministros	12,8	11,6	12,1	10,3	11,5	13,9	32,9	36,0	36,1	38,5	40,4	41,9	5,2	6,6	6,9	6,1	6,2	6,9
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	10,6	11,1	10,6	8,0	11,6	9,0	33,2	32,3	33,9	37,9	37,5	35,3	3,2	5,0	6,5	4,0	4,9	7,8
CATEGORÍA OCUPACIONAL																		
Directivos y profesionales	16,0	9,4	8,6	6,0	7,1	7,9	31,8	25,4	25,5	28,1	26,8	25,7	4,8	5,6	6,5	6,2	6,1	6,5
Personal administrativo	9,3	6,9	8,0	4,7	7,0	6,7	31,4	29,3	27,7	33,3	33,3	30,8	6,2	8,7	7,3	5,9	8,2	7,0
Serv. restauración, personales, protección y vendedores	-	8,6	8,3	6,3	7,8	8,4	-	36,6	36,8	40,7	38,6	38,5	-	8,3	7,4	6,9	8,0	9,1
Trabajador manual cualificado	10,9	17,6	17,7	16,3	17,1	19,0	35,3	40,6	42,9	43,5	42,0	47,2	4,4	5,8	6,3	6,5	5,6	7,5
Trabajador manual no cualificado	10,9	10,7	9,3	7,6	12,0	10,2	36,8	36,3	37,9	41,8	39,3	40,5	5,2	7,5	7,1	7,2	8,6	11,0
JORNADA LABORAL																		
Jornada partida (mañana y tarde)	11,7	12,0	10,6	8,0	11,1	10,3	35,1	35,2	36,5	38,2	36,9	37,8	4,9	6,6	6,2	6,8	6,6	7,4
Jornada continua de mañana	11,2	9,4	9,6	6,8	8,6	9,6	30,2	31,8	31,3	35,3	32,4	33,3	5,4	7,3	8,1	6,5	8,6	8,7
Jornada continua de tarde	7,3	4,3	4,8	5,6	7,2	6,6	34,3	31,7	30,7	37,0	33,9	37,7	3,6	4,4	8,6	5,7	6,2	11,6
Jornada continua de noche	8,9	11,5	11,7	11,2	7,2	9,7	38,2	49,1	37,0	43,3	41,9	44,7	7,2	9,7	8,2	7,2	8,4	12,5
Jornada reducida	3,9	3,6	4,1	3,4	3,6	3,3	21,4	30,1	32,9	34,0	32,0	31,9	8,0	11,0	9,2	6,6	13,4	12,6
Turnos rotatorios con el de noche	11,6	11,0	8,7	10,0	8,3	9,4	33,9	31,0	31,8	36,9	36,4	32,8	6,5	8,4	5,6	6,2	8,3	7,7
Turnos rotatorios sin el de noche	10,8	8,4	10,1	7,2	9,9	10,7	33,8	32,0	35,7	39,7	39,4	37,9	4,9	8,8	6,4	6,2	6,4	8,3

1.1.284. (continuación)

	CANNABIS						COCAÍNA					
	2007	2013	2015	2018	2020	2022	2007	2013	2015	2018	2020	2022
POBLACIÓN LABORAL (media)	7,8	6,7	7,9	10,1	8,5	8,8	3,7	2,4	2,4	2,5	3,1	2,7
SITUACIÓN LABORAL												
Empleados (trabajando o temporalmente ausentes)	7,4	5,3	6,9	9,5	7,8	8,2	3,5	2,0	2,3	2,4	2,8	2,5
Parados con empleo previo	10,7	9,8	11,0	12,6	11,4	12,5	5,2	3,2	2,7	3,0	4,3	3,8
SECTOR DE ACTIVIDAD												
Act. artísticas, recreativas y deportivas	-	10,4	11,3	13,5	17,2	12,4	-	5,6	5,9	3,1	5,2	2,4
Act. domésticas y servicios personales	1,6	4,3	4,5	7,8	4,6	5,2	0,9	1,2	1,3	1,3	0,9	1,1
Act. financiera, seguros, inmobiliarias y serv. empresariales	5,3	5,0	5,6	9,7	8,2	7,2	3,8	2,3	1,7	3,0	3,5	2,6
Agricultura, pesca, ganadería y extracción	5,5	7,2	8,4	9,3	9,3	9,6	1,9	2,0	2,9	3,7	3,7	2,9
Admón. pública, educación, sanidad y serv. sociales	6,3	3,6	4,1	5,8	4,0	4,7	2,9	1,3	1,1	1,0	1,3	1,3
Comercio y reparación vehículos a motor	7,6	6,6	7,2	9,7	7,6	8,7	3,2	2,0	2,2	2,2	3,3	2,3
Construcción	13,1	11,7	12,9	17,0	11,8	13,6	6,8	3,9	3,9	5,2	6,2	6,2
Hostelería	11,2	10,9	12,8	11,8	12,6	13,2	4,9	4,0	3,5	2,9	3,4	3,8
Industria manufacturera y suministros	7,6	6,2	9,2	12,4	9,4	9,9	3,5	2,4	2,7	2,7	3,2	3,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	9,8	6,9	8,4	9,7	10,3	10,1	5,4	2,3	2,3	2,6	3,6	3,1
CATEGORÍA OCUPACIONAL												
Directivos y profesionales	7,1	4,7	6,7	9,3	7,8	7,8	3,1	2,2	2,7	2,8	2,7	2,7
Personal administrativo	7,1	4,4	4,1	6,1	5,8	4,9	4,0	4,1	1,1	1,8	3,0	1,3
Serv. restauración, personales, protección y vendedores	-	7,6	8,6	9,8	8,7	8,8	-	2,6	2,3	2,2	2,8	2,3
Trabajador manual cualificado	8,6	8,9	10,5	14,7	10,6	11,5	4,1	2,7	3,5	3,7	4,1	4,5
Trabajador manual no cualificado	7,9	7,3	8,3	10,3	9,2	10,1	3,7	2,4	1,9	2,4	3,3	2,9
JORNADA LABORAL												
Jornada partida (mañana y tarde)	8,1	6,8	7,9	10,0	8,1	8,5	3,6	2,4	2,6	2,8	3,4	2,8
Jornada continua de mañana	6,6	5,7	6,3	9,3	7,3	7,8	3,7	1,7	1,2	1,8	2,5	2,5
Jornada continua de tarde	8,4	7,4	12,1	11,4	10,9	12,1	4,9	3,6	3,0	2,7	3,5	2,6
Jornada continua de noche	12,0	12,2	11,6	15,7	15,7	12,5	5,5	2,6	3,7	2,6	3,1	6,1
Jornada reducida	7,8	6,2	7,8	6,7	12,1	7,4	3,0	0,9	2,6	1,6	3,5	1,7
Turnos rotatorios con el de noche	7,6	6,5	7,9	9,8	7,8	9,1	4,5	2,6	1,1	3,3	2,3	3,4
Turnos rotatorios sin el de noche	7,1	5,9	5,9	9,8	9,2	8,8	3,4	2,3	2,5	2,6	2,6	1,8

* Población laboral: empleados (trabajando actualmente o temporalmente ausentes) y parados (con trabajo previo) de 16 a 64 años.

Bebidas alcohólicas y tabaco: consumo diario de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días.

Hipnosedantes: consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días.

Cannabis: consumo de cannabis en los últimos 30 días.

Cocaína: consumo de cocaína en los últimos 12 meses.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.285.

Prevalencia de riesgo de suicidio en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.286.

Prevalencia de riesgo de suicidio en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2022.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ideas de suicidio	1,9	1,6	2,1	2,2	1,7	2,8	1,7	1,5	1,8
Planes de suicidio	1,0	0,8	1,1	1,4	0,9	1,9	0,8	0,8	0,8
Intento de suicidio	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3

T = total; H = hombre; M = mujer.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.287.

Perfil general de la población de 15 a 64 años y de la población con riesgo de suicidio (%). España, 2022.

		Total población 15-64 años	Ideas de suicidio	Planes de suicidio	Intento de suicidio
Sexo	Hombre	50,2	42,5	42,6	40,3
	Mujer	49,8	57,5	57,4	59,7
Edad	15-34 años	32,4	39,1	45,9	47,9
	35-64 años	67,6	60,9	54,1	52,1
	Edad media	41,5	39,1	37,5	36,0
Estado civil	Soltero	41,3	55,4	58,3	52,5
	Casado	48,2	25,7	24,9	26,9
	Separado/divorciado	8,6	16,9	16,4	20,6
	Viudo	2,0	2,0	0,4	0,0
Convivencia	Solo	12,5	18,0	12,3	8,5
	Familia propia	62,5	43,8	39,9	41,8
	Familia de origen	24,0	35,3	41,9	42,5
Nivel de estudios	Sin estudios/primarios	9,9	13,1	17,0	17,4
	Secundarios	68,2	70,5	71,7	69,9
	Universitarios	21,9	16,3	11,3	12,6
País de nacimiento	España	86,2	81,8	82,7	82,5
	Otro	13,8	18,2	17,3	17,5
Consumo de alcohol diario		9,0	11,2	9,9	11,4
Consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días		9,7	44,9	49,9	51,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.288.


Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de botellón y policonsumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población con riesgo de suicidio (%). España, 2022.

	Total población 15-64 años	Ideas de suicidio	Planes de suicidio	Intento de suicidio
Borracheras últimos 30 días	6,4	15,9	14,7	13,6
Binge drinking últimos 30 días	15,4	23,9	23,6	18,1
Botellón últimos 12 meses	7,4	15,6	19,4	19,7
Consumo de 2 drogas	28,1	32,4	32,2	30,6
Consumo de 3 drogas	9,5	20,2	21,4	19,9
Consumo de 4 drogas o más	3,2	18,9	20,3	22,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.289.

Prevalencia de consumo de diferentes sustancias legales e ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en la población con riesgo de suicidio (%). España, 2022.




* Consumo de riesgo de alcohol = Hombres: AUDIT ≥6 y Mujeres = AUDIT ≥8.

** Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.290.

Prevalencia autodeclarada de distintas patologías en la población general de 15 a 64 años y en la población con ideas de suicidio (%). España, 2022.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.291.

Prevalencia de riesgo de suicidio en la población de 15 a 64 años según variables sociodemográficas y variables relacionadas con el ámbito laboral (% de fila). España, 2022.

		Ideas de suicidio	Planes de suicidio	Intento de suicidio
Ingresos mensuales netos del hogar	Hasta 999 €	4,3	2,2	1,0
	De 1.000 a 1.999 €	2,0	1,0	0,4
	De 2.000 a .2999 €	1,1	0,4	0,2
	Más de 2.999 €	1,2	0,7	0,3
Nivel de estudios	Sin estudios/primarios	2,5	1,7	0,6
	Secundarios	1,9	1,0	0,4
	Universitarios	1,4	0,5	0,2
Situación laboral	Trabajando	1,2	0,6	0,2
	En paro	3,6	2,0	0,8
	Jubilado	1,5	0,7	0,4
	Incapacitado permanente	8,0	4,2	2,1
	Estudiando	2,5	1,5	0,5
	Labores del hogar	1,2	0,5	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.292.

Prevalencia autodeclarada de distintas patologías en la población general de 15 a 64 años y en la población con riesgo de suicidio (%). España, 2022.

	Total población 15-64 años	Ideas de suicidio	Planes de suicidio	Intento de suicidio
Ludopatía	0,4	3,8	5,2	8,2
Ansiedad	13,7	53,7	59,5	58,0
Depresión	8,7	52,5	55,3	64,3
Insomnio	6,7	26,1	30,2	31,2
TDHA	0,6	6,2	9,2	12,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2023

En 2023, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1994, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha llevado a cabo la décimoquinta edición de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

El objetivo general de la misma es conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias (Enseñanza Secundaria Obligatoria —ESO—, Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional), en todo el territorio nacional, con la finalidad de conseguir información que permita diseñar, desarrollar y evaluar estrategias y políticas dirigidas a prevenir el consumo y a abordar las consecuencias negativas del uso de drogas, del mal uso de las tecnologías y de otras conductas relacionadas.

Los objetivos concretos y comunes a toda la serie de encuestas son conocer:

- La prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
- Las características sociodemográficas de los consumidores.
- Los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
- La disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante diversas conductas de consumo.
- La visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
- La opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas para reducirlos.
- La evolución temporal (desde 1994) de los aspectos antes expuestos.

Al cierre de este informe los resultados de ESTUDES 2023 no están disponibles, por lo que serán publicados en el próximo Informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

La metodología y los resultados, hasta el año 2021, pueden consultarse en la página web del Plan Nacional sobre Drogas: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm


A large, stylized number '2' in a dark purple color, positioned on the right side of the page. The '2' is composed of thick, rounded strokes. The top part is a semi-circle, the middle is a curved line, and the bottom is a horizontal bar.

Problemas relacionados con las drogas

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2021

2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2021.




Total admisiones		Total admisiones	
1998	54.338	2010	53.434
1999	51.482	2011	50.281
2000	49.487	2012	49.678
2001	49.376	2013	51.946
2002	46.744	2014	48.926
2003	50.103	2015	47.308
2004	52.128	2016	45.637
2005	50.630	2017	46.799
2006	49.283	2018	47.972
2007	50.555	2019	50.035
2008	53.155	2020	38.544
2009	52.549	2021	44.347

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales y por alcohol. España, 1998-2021.




	■ Drogas ilegales	■ Alcohol
1998	54.338	-
2002	46.744	-
2004	52.128	-
2005	50.630	18.950
2006	49.283	19.454
2007	50.555	19.224
2008	53.155	26.318
2009	52.549	27.958
2010	53.434	28.111
2011	50.281	29.014
2012	49.678	28.234
2013	51.946	28.652
2014	48.926	27.658
2015	47.308	27.469
2016	45.637	26.655
2017	46.799	25.753
2018	47.972	25.796
2019	50.035	27.209
2020	38.544	20.017
2021	44.347	25.140

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales (total, con tratamiento previo y tratados por primera vez en la vida). España, 1998-2021.




	Total admisiones	Primeras admisiones	Con tratamiento previo
1998	54.338	-	-
1999	51.482	19.757	-
2000	49.487	17.135	-
2001	49.376	17.591	-
2002	46.744	22.064	-
2003	50.103	22.066	-
2004	52.128	25.064	-
2005	50.630	24.553	23.714
2006	49.283	22.333	24.814
2007	50.555	23.034	25.392
2008	53.155	22.944	27.769
2009	52.549	24.605	25.098
2010	53.434	26.805	24.611
2011	50.281	24.999	23.232
2012	49.678	25.209	23.024
2013	51.946	28.239	22.577
2014	48.926	23.656	18.786
2015	47.308	23.777	19.519
2016	45.637	22.816	20.124
2017	46.799	23.738	21.353
2018	47.972	24.663	21.382
2019	50.035	27.492	20.689
2020	38.544	20.006	17.154
2021	44.347	23.482	18.359

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1996-2021.




	Heroína	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Anfetaminas	Extasis	Alucinógenos	Otras sustancias*
1996	46.635	2.980	1.613	168	319	226	74	875
1997	44.089	4.647	2.214	263	323	237	85	582
1998	43.598	6.154	2.879	346	347	154	62	798
1999	37.417	8.978	2.826	331	339	135	50	1.406
2000	34.563	8.272	2.895	381	288	240	64	2.784
2001	32.305	9.023	3.506	469	255	335	83	3.400
2002	26.213	11.904	4.772	592	342	452	68	2.401
2003	23.225	18.359	5.711	607	266	254	63	1.618
2004	20.532	21.646	6.500	693	330	236	44	1.955
2005	18.653	23.746	5.524	618	386	229	39	1.435
2006	18.803	22.242	5.304	717	426	165	37	1.589
2007	18.904	23.037	5.936	795	415	172	43	1.253
2008	17.456	24.680	7.419	845	400	155	43	2.157
2009	16.989	23.132	9.503	963	461	127	69	1.305
2010	17.325	22.087	11.192	944	501	93	66	1.226
2011	13.898	20.335	12.873	1.143	595	102	83	1.252
2012	12.238	19.497	14.869	1.083	512	134	107	1.238
2013	11.756	19.848	16.848	1.175	671	201	120	1.327
2014	10.911	17.864	16.478	1.192	635	133	82	1.631
2015	10.978	17.327	15.676	1.068	636	157	77	1.389
2016	10.807	17.889	13.304	1.105	699	89	82	1.662
2017	10.384	20.168	12.932	1.032	608	68	73	1.534
2018	10.086	20.981	13.459	1.050	662	72	76	1.586
2019	9.904	22.345	14.202	992	720	96	127	1.649
2020	7.652	17.490	10.587	824	580	72	112	1.227
2021	7.419	20.741	12.350	1.077	837	91	127	1.705

* Otras sustancias incluye: metadona, otros opiáceos y otras sustancias sin especificar.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2021.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	30.146	2006	3.318	14.502	18.803
1992	20.017	15.956	37.239	2007	3.672	14.331	18.904
1993	18.977	16.703	37.188	2008	3.840	13.616	17.456
1994	18.770	17.526	37.225	2009	3.412	12.750	16.989
1995	17.878	20.369	40.007	2010	4.526	12.166	17.325
1996	16.647	28.382	46.635	2011	2.951	10.391	13.898
1997	12.993	30.173	44.089	2012	2.555	9.302	12.238
1998	11.867	30.756	43.598	2013	2.572	8.940	11.756
1999	10.473	26.031	37.417	2014*	2.356	8.555	10.911
2000	8.151	26.412	34.563	2015	2.202	7.713	10.978
2001	7.461	24.844	32.305	2016	2.353	7.907	10.807
2002	5.051	21.162	26.213	2017	2.259	7.775	10.384
2003	4.337	17.867	23.225	2018	2.223	7.530	10.086
2004	3.836	15.617	20.532	2019	2.384	7.177	9.904
2005	3.604	14.005	18.653	2020	1.771	5.594	7.652
				2021	1.820	5.083	7.419


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2021.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	-	2006	13.463	8.036	22.242
1992	932	367	-	2007	13.429	8.753	23.037
1993	1.146	431	-	2008	12.847	10.786	24.680
1994	1.265	491	-	2009	12.142	9.107	23.132
1995	1.415	516	-	2010	12.130	9.095	22.087
1996	1.892	932	-	2011	10.637	8.889	20.335
1997	3.129	1.402	-	2012	10.142	8.855	19.497
1998	4.174	1.838	-	2013	10.734	8.726	19.848
1999	6.126	2.576	-	2014*	9.683	8.182	17.864
2000	5.499	2.773	-	2015	8.445	7.248	17.327
2001	5.977	3.046	-	2016	9.052	7.678	17.889
2002	7.125	3.893	11.904	2017	10.393	9.025	20.168
2003	11.851	5.893	18.359	2018	10.871	9.226	20.981
2004	14.126	6.747	21.646	2019	12.491	8.989	22.345
2005	15.258	7.562	23.746	2020	9.092	7.744	17.490
				2021	10.647	9.004	20.741


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2021.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	–	2009	7.273	1.705	9.503
1997	1.768	387	–	2010	8.639	2.101	11.192
1998	2.412	407	–	2011	9.736	2.603	12.873
1999	2.335	418	–	2012	10.982	3.402	14.869
2000	2.487	408	–	2013	12.912	3.585	16.914
2001	2.966	540	–	2014*	12.968	3.510	16.478
2002	3.972	665	4.772	2015	11.185	3.448	15.676
2003	4.613	871	5.711	2016	9.278	3.208	13.304
2004	5.319	928	6.500	2017	9.122	3.314	12.932
2005	4.426	844	5.524	2018	9.485	3.386	13.459
2006	4.125	941	5.304	2019	10.372	3.306	14.202
2007	4.619	1.114	5.936	2020	7.334	2.893	10.587
2008	5.058	2.055	7.419	2021	8.529	3.160	12.350


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2021.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	-	2009	598	312	963
1997	144	111	-	2010	580	323	944
1998	197	143	-	2011	709	386	1.143
1999	165	147	-	2012	648	421	1.083
2000	214	154	-	2013	787	374	1.175
2001	299	170	-	2014*	871	321	1.192
2002	350	242	-	2015	742	256	1.098
2003	382	225	-	2016	772	282	1.105
2004	441	224	693	2017	721	269	1.032
2005	383	209	618	2018	744	261	1.050
2006	466	223	717	2019	715	242	992
2007	503	261	795	2020	595	201	824
2008	463	352	845	2021	768	252	1.077


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de estimulantes distintos de la cocaína: anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis. España, 1996-2021.




	Anfetaminas	Metanfetaminas	Éxtasis		Anfetaminas	Metanfetaminas	Éxtasis
1996	319	-	226	2009	461	-	127
1997	323	-	237	2010	501	-	93
1998	347	-	154	2011	595	-	102
1999	339	-	135	2012	512	-	134
2000	288	-	240	2013	671	-	201
2001	255	-	335	2014	635	20	133
2002	342	-	452	2015	636	38	157
2003	266	-	254	2016	699	55	89
2004	330	-	236	2017	608	81	68
2005	386	-	229	2018	662	93	72
2006	426	-	165	2019	716	119	96
2007	415	-	172	2020	580	129	72
2008	400	-	155	2021	837	127	91

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alucinógenos (ketamina u otros alucinógenos). España, 2005-2021.




	■ Alucinógenos*	■ Ketamina	■ Otros alucinógenos
2005	39	8	31
2006	37	10	27
2007	43	22	21
2008	43	20	23
2009	69	43	26
2010	66	46	20
2011	83	54	29
2012	107	66	41
2013	120	70	50
2014	82	49	33
2015	77	42	35
2016	82	54	28
2017	73	52	21
2018	76	53	23
2019	127	91	36
2020	112	83	29
2021	127	98	29

* Alucinógenos incluye ketamina y otros alucinógenos.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2021.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950	2013	15.121	12.978	28.652
2006	10.172	8.611	19.454	2014*	15.240	12.418	27.658
2007	9.898	8.587	19.224	2015	13.457	11.254	27.469
2008	9.395	9.753	26.318	2016	13.319	11.323	26.655
2009	10.924	11.288	27.958	2017	13.060	11.556	25.753
2010	15.126	11.764	28.111	2018	13.243	11.224	25.796
2011	11.612	10.350	29.014	2019	14.907	11.215	27.209
2012	14.816	12.714	28.234	2020	10.501	8.705	20.017
				2021	13.575	10.234	25.140


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2021.




	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fentanilo	28	44	70	66	100	103	79	174
Mefedrona	0	8	0	35	38	74	102	219
Spice	2	3	5	1	5	14	25	31
Tramadol	27	24	28	24	33	37	31	39

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Número* de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2021.



	■ Inyección alguna vez en la vida	■ Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014**	6.360	1.664
2015	5.904	2.413
2016	6.117	2.621
2017	5.946	2.691
2018	5.223	2.161
2019	4.877	1.977
2020	3.692	1.545
2021	3.161	1.119


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Número* de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2021.



	■ Inyección alguna vez en la vida	■ Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014**	1.065	261
2015	1.038	367
2016	1.141	416
2017	1.150	471
2018	1.039	392
2019	1.034	428
2020	752	335
2021	873	361


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2021.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7	2004	35,4	20,8
1988	25,4	19,8	2005	35,6	20,6
1989	25,7	19,8	2006	36,4	20,3
1990	26,2	20,0	2007	36,8	21,0
1991	26,4	20,3	2008	37,5	21,1
1992	26,6	20,3	2009	37,9	20,9
1993	27,2	20,3	2010	38,4	21,4
1994	27,8	20,6	2011	39,3	20,8
1995	28,5	20,6	2012	40,4	20,7
1996	29,3	20,6	2013	40,8	20,9
1997	30,0	20,7	2014	40,9	21,1
1998	30,7	20,6	2015	41,3	21,5
1999	31,3	20,8	2016*	41,6	21,1
2000	32,0	20,6	2017	42,6	21,5
2001	32,0	20,8	2018	43,0	21,7
2002	33,6	20,9	2019	43,2	22,0
2003	33,9	20,7	2020	43,8	22,1
			2021	45,1	22,2

* Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2021.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6	2006	33,0	21,5
1992	26,0	20,6	2007	34,1	23,3
1993	26,4	20,7	2008	35,0	22,9
1994	27,3	21,0	2009	34,5	22,8
1995	27,9	21,2	2010	35,0	23,5
1996	28,6	21,3	2011	36,7	22,6
1997	29,2	21,4	2012	38,1	22,4
1998	29,9	21,2	2013	38,2	22,3
1999	30,3	21,8	2014	37,9	23,5
2000	30,9	22,1	2015	38,0	23,8
2001	31,4	22,3	2016*	38,2	23,5
2002	31,8	22,6	2017	39,9	24,1
2003	31,9	22,3	2018	40,1	24,6
2004	33,0	22,8	2019	40,1	25,3
2005	33,0	22,0	2020	40,1	25,5
			2021	42,4	25,3

* Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2021.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9	2004	30,0	21,3
1988	26,1	21,3	2005	30,5	21,0
1989	26,2	21,2	2006	31,2	20,8
1990	26,5	21,4	2007	31,7	21,2
1991	27,0	21,9	2008	32,1	21,0
1992	27,6	22,1	2009	32,5	20,7
1993	27,9	22,0	2010	33,3	20,9
1994	28,5	22,0	2011	33,9	20,7
1995	29,1	22,5	2012	34,5	20,7
1996	29,3	22,3	2013	35,0	20,6
1997	29,1	22,2	2014	35,3	20,6
1998	29,1	22,1	2015	36,0	20,7
1999	28,6	21,7	2016*	36,0	20,4
2000	29,1	21,5	2017	36,6	20,6
2001	29,8	21,6	2018	36,6	20,7
2002	29,8	21,9	2019	36,9	20,9
2003	29,8	21,3	2020	37,5	21,0
			2021	38,4	21,0

* Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2021.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9	2006	30,4	20,9
1992	27,2	22,3	2007	30,8	21,5
1993	27,6	22,3	2008	31,2	21,1
1994	28,2	22,2	2009	31,6	20,9
1995	28,6	22,6	2010	32,4	21,2
1996	28,8	22,4	2011	33,0	21,1
1997	28,6	22,4	2012	33,4	21,1
1998	28,4	22,2	2013	33,9	21,0
1999	27,8	21,9	2014	34,1	20,8
2000	28,2	21,6	2015	34,8	21,1
2001	29,0	21,8	2016*	34,8	21,1
2002	28,8	21,7	2017	35,4	21,2
2003	28,8	21,5	2018	35,3	21,4
2004	29,1	21,4	2019	35,7	21,5
2005	30,0	21,1	2020	36,3	21,8
			2021	37,2	21,8

* Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.19.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2021.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada		Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822	2006	2.320	486	303
1992	9.585	8.232	1.219	2007	2.842	470	327
1993	10.493	7.129	995	2008	2.891	455	285
1994	10.873	6.435	978	2009	2.719	386	256
1995	11.161	5.033	1.028	2010	3.589	465	258
1996	10.934	4.488	696	2011	2.211	365	201
1997	8.487	3.011	887	2012	1.870	276	159
1998	7.884	2.518	910	2013	2.047	283	175
1999	7.033	1.969	968	2014	1.670	154	125
2000	5.917	1.414	532	2015	1.831	167	145
2001	5.461	1.276	471	2016	1.982	186	146
2002	3.540	894	399	2017	1.870	209	147
2003	2.805	748	386	2018	1.892	141	128
2004	2.690	648	358	2019	2.039	147	150
2005	2.487	544	350	2020	1.524	104	99
				2021	1.568	90	101

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.
FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.20.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2021.




	Pulmonar	Intravenosa	Esnifada		Pulmonar	Intravenosa	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8	2006	73,8	15,5	9,6
1992	50,0	42,9	6,4	2007	77,4	12,8	8,9
1993	56,1	38,1	5,3	2008	78,5	12,4	7,7
1994	59,2	35,0	5,3	2009	79,7	11,3	7,5
1995	64,5	29,1	5,9	2010	82,0	10,6	5,9
1996	67,0	27,5	4,3	2011	77,7	12,8	7,1
1997	67,2	23,8	7,0	2012	78,3	11,6	6,7
1998	68,3	21,8	7,9	2013	79,6	11,0	6,8
1999	69,3	19,4	9,5	2014	80,6	7,4	6,0
2000	74,1	17,7	6,7	2015	83,7	7,6	6,6
2001	74,9	17,5	6,5	2016	84,7	7,9	6,2
2002	71,8	18,1	8,1	2017	83,0	9,3	6,5
2003	69,3	18,5	9,5	2018	85,8	6,4	5,8
2004	68,0	16,4	9,0	2019	86,1	6,2	6,3
2005	69,0	15,1	9,7	2020	86,1	5,9	5,6
				2021	87,1	5,0	5,6

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2021.




	■ Esnifada	■ Pulmonar	■ Inyectada		■ Esnifada	■ Pulmonar	■ Inyectada
1991	315	139	109	2006	11.155	1.617	103
1992	547	196	121	2007	11.393	1.295	130
1993	611	278	108	2008	10.391	1.276	117
1994	714	238	97	2009	10.272	1.139	136
1995	739	287	74	2010	9.952	1.203	166
1996	1.307	413	82	2011	8.787	1.205	97
1997	2.172	741	100	2012	8.346	781	95
1998	3.073	856	128	2013	8.995	1.320	129
1999	4.777	1.048	128	2014	6.798	986	56
2000	4.067	1.172	105	2015	7.005	1.078	30
2001	4.413	1.284	91	2016	7.564	1.107	33
2002	5.613	1.403	156	2017	8.730	1.304	36
2003	9.228	1.242	485	2018	9.030	1.435	41
2004	11.140	1.837	693	2019	10.464	1.482	35
2005	12.298	1.755	793	2020	7.626	1.087	26
				2021	9.006	1.226	39

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.
 FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2021.




	■ Snifada	■ Pulmonar	■ Intravenosa		■ Snifada	■ Pulmonar	■ Intravenosa
1991	55,4	24,4	19,2	2006	86,0	12,5	0,8
1992	62,7	22,5	13,9	2007	88,0	10,0	1,0
1993	60,8	27,7	10,7	2008	86,9	10,7	1,0
1994	67,4	22,5	9,2	2009	87,7	9,7	1,2
1995	66,5	25,8	6,7	2010	86,8	10,5	1,4
1996	71,7	22,6	4,5	2011	85,5	11,7	0,9
1997	71,0	24,2	3,3	2012	88,3	8,3	1,0
1998	74,8	20,8	3,3	2013	83,8	12,3	1,2
1999	79,5	17,4	2,1	2014	82,6	12,0	0,7
2000	75,2	21,7	1,9	2015	83,5	12,9	0,4
2001	75,2	21,9	1,6	2016	83,9	12,3	0,4
2002	77,0	19,2	2,1	2017	84,3	12,6	0,3
2003	83,0	11,2	4,4	2018	83,6	13,3	0,4
2004	80,9	13,3	4,8	2019	84,2	11,9	0,3
2005	80,6	11,5	5,2	2020	84,4	12,0	0,3
				2021	85,1	11,6	0,4

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.
 FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.23.

Proporción de tratados por primera vez por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA. España, 1991-2021.



2.1.24.

Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol*, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2021.



	Opioides	Cocaína	Estimulantes sin cocaína	Cannabis	Hipnosedantes
2005	5,7	57,4	5,9	42,7	8,9
2006	6,1	58,7	5,2	44,1	9,0
2007	6,4	58,0	4,6	43,3	8,5
2008	6,1	66,1	4,3	49,1	10,6
2009	5,9	61,5	3,9	50,9	9,8
2010	6,6	63,4	4,3	52,0	9,9
2011	6,5	63,7	4,9	51,6	9,3
2012	7,1	62,1	4,6	52,9	10,1
2013	6,7	60,8	4,8	53,5	9,1
2014	4,5	56,7	2,8	48,3	8,1
2015	5,3	60,3	4,4	51,4	8,2
2016	4,4	62,3	4,1	51,1	7,3
2017	4,5	64	4	49,5	8
2018	4,1	64,5	3,9	50	6,3
2019	3,8	65,5	4,6	48,8	6,2
2020	3,6	65,9	4,1	50,3	6,2
2021	3,6	64,9	4,5	50,4	6,4

* El 74,6% (n = 18.742) de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 25,4% restante (n = 6.398).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.


Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2015-2021.

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Sólo alcohol	21.041	76,6	20.251	76,0	19.361	75,2	19.211	74,5	19.742	72,6	14.705	73,5	18.742	74,6
Alcohol y otras drogas	6.428	23,4	6.404	24,0	6.392	24,8	6.585	25,5	7.467	27,4	5.312	26,5	6.398	25,4
Una droga más	4.729	17,2	4.733	17,8	4.695	18,2	4.870	18,9	5.597	20,6	3.857	19,3	4.641	18,5
Dos drogas más	1.424	5,2	1.411	5,3	1.403	5,4	1.452	5,6	1.569	5,8	1.238	6,2	1.519	6,0
Tres o más drogas	275	1,0	260	0,9	294	1,1	263	1,0	301	1,1	217	1,0	238	0,9

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Número* de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2021.



	■ Inyección alguna vez en la vida	■ Inyección en 12 meses previos a la admisión		■ Inyección alguna vez en la vida	■ Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224	2009	9.637	3.763
1997	29.419	21.605	2010	9.697	3.549
1998	28.527	18.910	2011	8.195	3.010
1999	24.520	15.562	2012	7.580	2.562
2000	24.941	13.955	2013	7.026	2.237
2001	19.988	10.898	2014**	6.360	1.664
2002	17.950	9.583	2015	5.904	2.413
2003	15.806	7.966	2016	6.117	2.621
2004	13.605	6.516	2017	5.946	2.691
2005	12.252	5.620	2018	5.223	2.161
2006	11.601	4.892	2019	4.877	1.977
2007	12.487	5.055	2020	3.692	1.545
2008	12.066	5.050	2021	3.161	1.119


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2021.




	Hombres	Mujeres	Total
1996	35,9	43,4	37,1
1997	32,4	41,0	33,7
1998	32,4	39,7	33,6
1999	31,9	40,2	33,0
2000	32,7	37,9	33,5
2001	32,7	40,2	33,7
2002	30,9	38,9	32,0
2003	31,5	39,3	32,6
2004	27,7	38,3	29,3
2005	31,5	39,5	32,7
2006	32,7	37,4	33,4
2007	30,0	36,2	30,9
2008	26,7	33,3	27,6
2009	26,0	32,2	26,9
2010	29,8	31,7	30,2
2011	28,5	30,0	28,7
2012	28,2	30,0	28,4
2013	24,2	26,1	24,4
2014	26,3	24,4	26,0
2015	33,4	35,4	33,7
2016	33,9	39,0	34,6
2017	31,3	37,6	32,0
2018	28,7	40,4	30,1
2019	29,3	36,3	30,1
2020	36,6	35,4	35,6
2021	34,0	36,0	34,2

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Prevalencia de infección por VIH (por grupos de edad) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad (%). España, 1996-2021.



	<25 años	25-34 años	>34 años		<25 años	25-34 años	>34 años
1996	20,3	39,3	48,9	2009	2,2	15,2	34,7
1997	17,5	34	46,4	2010	8,1	14,8	38
1998	15,1	33,4	45,8	2011	9,9	14,5	35,6
1999	15,2	32	44	2012	8,6	11,7	35,4
2000	13,1	30,5	45,5	2013	4,7	8,9	30,4
2001	14	29,1	44,4	2014	5,9	12,0	31,2
2002	12,1	26,7	42,8	2015	11,5	12,1	38,4
2003	9,2	25,5	43,8	2016	3,1	16,0	39,3
2004	7,1	20,9	39,4	2017	4,2	19,7	35,1
2005	9,7	23,1	41,9	2018	0,0	19,7	31,3
2006	7,2	21,4	42,2	2019	7,3	18,4	33,3
2007	3,2	18,7	40,3	2020	16,0	23,1	38,9
2008	3,2	16,9	35,6	2021	26,7	30,4	35,0

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.29.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (%). España, 2019-2021.

	2019		2020		2021	
	Nº admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Nº admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Nº admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	22.345	28,9	17.490	29,9	20.741	29,8
Cocaína polvo	19.627	25,4	15.357	26,2	17.989	25,9
Cocaína base	2.710	3,5	2.122	3,6	2.719	3,9
Opioides	11.170	14,5	8.502	14,5	8.518	12,3
Heroína	9.904	12,8	7.652	13,1	7.419	10,7
Metadona (mal uso)	461	0,6	289	0,5	335	0,5
Otros opioides	805	1,0	560	1,0	764	1,1
Cannabis	14.202	18,4	10.587	18,1	12.350	17,8
Hipnosedantes	992	1,3	824	1,4	1.077	1,5
Estimulantes	1.086	1,4	950	1,6	1.368	2,0
Anfetaminas/metanfetamina	839	1,1	709	1,2	996	1,4
Éxtasis y derivados	96	0,1	72	0,1	91	0,1
Otros estimulantes	151	0,2	166	0,3	281	0,4
Alucinógenos	127	0,2	112	0,2	127	0,1
Inhalantes volátiles	35	0,0	20	0,0	68	0,1
Otras drogas ilegales	78	0,1	59	0,1	98	0,1
Alcohol	27.209	35,2	20.017	34,2	25.140	36,2
Total drogas ilegales	50.035		38.544		44.347	
Total drogas ilegales y alcohol	77.244		58.561		69.487	

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30.

Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal por sexo (%). España, 2021.

	Hombres		Mujeres	
	Nº de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Nº de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	17.572	32,0	3.151	21,8
Cocaína polvo	15.285	27,8	2.689	18,6
Cocaína base	2.260	4,1	456	3,2
Opioides	7.180	13,1	1.328	9,2
Heroína	6.402	11,6	1.008	7,0
Metadona (mal uso)	271	0,5	64	0,4
Otros opioides	507	0,9	256	1,8
Cannabis	9.637	17,5	2.701	18,7
Hipnosedantes	639	1,2	438	3,0
Estimulantes	1.145	2,1	222	1,5
Anfetaminas/metanfetamina	807	1,5	188	1,3
Éxtasis y derivados	76	0,1	15	0,1
Otros estimulantes	262	2,1	19	0,1
Alucinógenos	100	0,2	26	0,2
Inhalantes volátiles	54	0,1	14	0,1
Otras drogas ilegales	65	0,1	33	0,2
Alcohol	18.593	33,8	6.533	45,2
Total drogas ilegales	36.392		7.913	
Total drogas ilegales y alcohol	54.985		14.446	

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.31.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2021.




* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.32.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2021.




* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.33.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2021.



	Todas las admisiones		Admitidos primera vez en la vida		Admitidos menores 18 años*		Nacidos fuera de España	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Opioides	19,7	16,8	10,7	9,5	0,6	0,2	19,4	19,8
Cocaína	48,3	39,8	47,2	37,8	1,9	3,0	39,3	40,0
Cannabis	26,5	34,1	34,9	41,9	93,9	93,4	32,9	31,9
Estimulantes sin cocaína	3,1	2,8	3,9	3,0	0,4	0,6	5,2	3,4
Hipnosedantes	1,8	5,5	2,4	6,6	1,6	0,4	2,3	3,6
Otras sustancias	0,6	1,0	0,9	1,2	1,6	2,4	0,9	1,3
Número de admisiones	36.392	7.913	18.769	4.693	1.345	469	4.934	992


* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.34.

Número de casos y tasas por 100.000 habitantes de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2021.



2.1.35.

Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2021.

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Total	44.347	18.359	23.482	36.392	7.913
Tratamiento previo					
Sí	43,9	100,0	0,0	45,4	36,9
No	56,1	0,0	100,0	54,6	63,1
Edad	36,9	40,0	34,4	37,0	36,5
Sexo					
Hombre	82,1	85,1	80,0		
Mujer	17,9	14,9	20,0		
Máximo nivel de estudios					
Sin estudios	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0
Primaria	52,6	56,5	50,1	53,9	46,2
Secundaria	40,9	38,3	42,5	40,0	45,0
Estudios superiores	5,7	4,5	6,6	5,2	7,8
Situación laboral					
Trabajo	36,8	34,3	38,7	38,9	26,9
Parado no habiendo trabajado antes	6,4	6,1	6,4	6,0	8,1
Parado habiendo trabajado antes	38,2	43,1	34,7	37,5	41,4
Otras	18,7	16,5	20,1	17,6	23,6

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Fuente de referencia principal					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	4,7	8,6	1,8	4,7	4,8
Médico general, Atención Primaria de Salud	12,1	8,6	14,7	11,8	13,4
Hospitales u otros servicios de salud	8,1	6,4	9,5	7,2	12,4
Servicios Sociales	4,1	2,8	5,0	2,8	9,8
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	5,5	7,4	3,9	6,1	2,8
Servicios legales o policiales	6,5	5,7	7,3	7,0	4,3
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0
Familiares y amigos	11,5	7,4	15,0	11,9	9,8
Iniciativa propia	45,4	51,9	40,5	46,6	39,7
Servicios de educación	0,6	0,2	0,8	0,5	1,1
Otra	1,3	1,1	1,5	1,2	1,9
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	16,0	18,7	13,9	16,4	14,1
Únicamente con pareja	12,3	12,5	12,2	11,5	16,1
Únicamente con hijos/as	2,5	2,4	2,6	1,2	8,3
Con la pareja e hijos/as	17,2	15,9	18,3	17,7	15,1
Con padres o familia de origen	37,2	34,2	39,5	38,0	33,3
Con amigos/as	4,2	4,2	4,1	4,1	4,3
Detenido (Ej. centro penitenciario, centro inserción social)	4,8	6,2	3,8	5,5	1,8
En instituciones no detenido (Ej. albergue)	2,7	2,9	2,5	2,5	3,3
Otros	3,1	3,1	3,2	3,0	3,7
Lugar vive					
Casas, pisos, apartamentos	87,7	84,5	90,5	87,1	90,7
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	5,2	6,9	3,8	5,9	2,0
Otras instituciones	2,5	2,7	2,4	2,3	3,3
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4
Alojamiento inestable/ precarios	2,9	3,8	2,1	2,9	2,7
Otros lugares	1,2	1,4	1,0	1,2	1,0
Español o extranjero					
Español	97,0	89,6	84,9	86,8	87,8
Extranjero	13,0	10,4	15,1	13,2	12,2
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	19,2	29,6	10,5	19,7	16,8
Heroína	16,7	27,7	7,8	17,6	12,7
Metadona	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8
Otros opioides	1,7	1,1	2,1	1,4	3,2
Cocaína	46,8	49,0	45,3	48,3	39,8
CLH Cocaína	40,6	41,4	40,1	42,0	34,0
Cocaína base	6,1	7,5	5,2	6,2	5,8
Cocaína otras	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Estimulantes sin cocaína	3,1	2,5	3,7	3,1	2,8
Anfetaminas	1,9	1,9	1,9	1,8	2,2
Metanfetaminas	0,4	0,2	0,5	0,4	0,2
MDMA y derivados	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
Otros estimulantes	0,6	0,2	1,0	0,7	0,2
Hipnosedantes	2,4	1,4	3,3	1,8	5,5
Alucinógenos	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Inhalables volátiles	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2
Cannabis	27,8	17,2	36,3	26,5	34,1
Alcohol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras sustancias	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	20,4	19,8	20,8	20,0	22,1
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	45,8	41,2	49,0	45,1	49,2
4-6 días/semana	8,7	8,0	9,2	9,0	7,2
2-3 días/semana	15,0	13,8	15,9	15,3	13,2
1 día/semana	5,2	5,0	5,4	5,2	4,9
Menos de 1 día/semana	6,6	7,2	6,1	6,7	6,5
No consumió	18,8	24,7	14,5	18,7	18,9
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,4	4,8	7,5	5,5	10,8
Pulmonar	47,9	47,3	48,5	47,3	50,6
Intranasal	42,2	43,0	41,6	43,6	35,8
Parenteral	2,4	3,9	1,2	2,6	1,4
Otras	1,1	1,0	1,2	1,1	1,3
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	9,5	15,7	4,7	10,0	6,8
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	3,4	5,2	1,9	3,6	2,1
Prevalencia VIH mínima	3,0	4,4	2,0	3,1	2,6
Prevalencia VIH máxima	8,7	9,2	7,6	9,0	7,6
Prevalencia hepatitis C mínima	4,0	7,4	1,6	4,2	3,4
Prevalencia hepatitis C máxima	12,0	15,7	6,1	12,4	10,1
Prevalencia hepatitis B mínima	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3
Prevalencia hepatitis B máxima	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7

Notas:

El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de desconocidos en las variables de cruce.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido).

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.36.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2021.

	Total	Sexo		Tratamiento previo	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Total	25.140	18.593	6.533	10.234	13.575
Tratamiento previo (%)					
Sí	43,0	43,8	40,5	100,0	0,0
No	57,0	56,2	59,5	0,0	100,0
Edad media (años)	47,3	47,1	47,6	48,7	46,2
Sexo					
Hombre	74,0	100,0	0,0	75,4	72,8
Mujer	26,0	0,0	100,0	24,6	27,2
Máximo nivel de estudios (%)					
Sin estudios	0,6	0,6	0,4	0,4	0,7
Primaria	42,7	46,0	33,5	46,2	40,5
Secundaria	45,2	44,0	48,6	43,7	46,1
Estudios superiores	11,5	9,3	17,5	9,6	12,6
Situación laboral (%)					
Trabajando	44,9	46,8	39,3	39,7	48,8
Parado no habiendo trabajado antes	2,8	2,4	3,8	2,7	2,8
Parado habiendo trabajado antes	32,5	31,2	36,1	36,3	29,6
Otras	19,9	19,6	20,8	21,3	18,8
Fuente de referencia principal (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	2,9	2,7	3,4	4,4	1,8
Médico general, Atención Primaria de Salud	24,8	24,9	24,4	19,7	28,7
Hospitales u otros servicios de salud	13,9	12,9	16,7	12,1	15,5
Servicios Sociales	4,4	3,7	6,2	4,4	4,5
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	1,5	2,0	0,3	1,5	1,5
Servicios legales o policiales	2,0	2,3	1,2	1,9	2,0
Empresas o empleador	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Familiares y amigos	11,3	11,5	10,7	9,3	12,8
Iniciativa propia	37,1	37,8	35,1	44,8	31,0
Servicios de educación	0,5	0,4	0,7	0,4	0,6
Otra	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4

	Total	Sexo		Tratamiento previo	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	22,9	22,9	22,9	25,2	21,1
Únicamente con pareja	17,7	17,2	19,3	16,9	18,5
Únicamente con hijos/as	5,0	2,3	13,0	4,6	5,5
Con la pareja e hijos/as	23,2	24,6	19,3	20,7	25,0
Con padres o familia de origen	21,5	23,2	16,6	21,9	21,3
Con amigos/as	3,4	3,2	3,9	3,7	3,1
Detenido (Ej. centro penitenciario, centro de inserción social)	1,5	1,9	0,3	1,6	1,3
En instituciones no detenido (Ej. albergue)	2,4	2,5	2,1	3,0	2,0
Otros. Especificar	2,4	2,3	2,7	2,4	2,4
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	92,3	91,3	95,2	90,9	93,7
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	1,5	1,9	0,4	1,5	1,4
Otras instituciones	2,0	2,1	1,9	2,6	1,6
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4
Alojamiento inestable/ precarios	2,6	3,0	1,4	3,0	2,2
Otros lugares	1,1	1,1	0,8	1,4	0,7
Español o extranjero (%)					
Extranjero	16,9	16,0	19,5	13,7	19,6
Español	83,1	84,0	80,5	86,3	80,4
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)					
Opioides	3,6	3,9	2,6	3,9	3,0
Cocaína	64,9	66,7	56,7	65,0	64,0
Estimulantes sin cocaína	4,5	4,4	5,3	4,3	4,4
Hipnosedantes	6,4	5,2	11,9	6,4	6,5
Alucinógenos	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6
Sustancias volátiles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cannabis	50,4	50,8	48,7	48,9	51,5
Otras sustancias psicoactivas	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4

	Total	Sexo		Tratamiento previo	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Edad de inicio droga principal (años)	18,5	17,6	21,1	17,9	18,8
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	58,1	59,6	53,8	55,5	59,9
4-6 días a la semana	7,2	6,9	8,1	6,5	7,7
2-3 días a la semana	12,0	11,2	14,3	10,5	13,3
1 día a la semana	3,7	3,5	4,2	3,5	3,9
Menos de 1 día a la semana	4,5	4,3	5,2	5,0	4,1
No consumió	14,5	14,5	14,3	19,0	11,2
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	99,5	99,4	99,5	99,5	99,4
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5
Intranasal o esnifada	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Inyectada o parenteral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Inyección alguna vez en la vida (%)	2,4	2,7	1,6	3,2	1,8
Inyección últimos 12 meses (%)	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4
Inyección últimos 30 días (%)	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3
Prevalencia mínima VIH (%)	0,9	1,0	0,7	0,9	1,0
Prevalencia de hepatitis C mínima (%)	1,5	1,7	1,1	2,1	1,2
Prevalencia de hepatitis B mínima (%)	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2

Notas:

El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de desconocidos en las variables de cruce.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.37.

Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2021.

	Alcohol	Cocaína polvo	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes	Otros opioides	Metadona
Total	25.140	17.989	12.350	7.419	2.719	1.077	1.368	764	335
Tratamiento previo (%)									
Si	43,0	44,7	27,0	73,6	53,0	24,7	34,7	30,3	45,6
No	57,0	55,3	73,0	26,4	47,0	75,3	65,3	69,7	54,4
Sexo (%)									
Hombre	74,0	85,0	78,1	86,4	83,2	59,3	83,8	66,4	80,9
Mujer	26,0	15,0	21,9	13,6	16,8	40,7	16,2	33,6	19,1
Edad media (años)	47,3	38,2	28,3	45,1	39,3	42,2	37,2	47,0	46,6
Máximo nivel de estudios (%)									
Sin estudios	0,6	0,6	0,5	1,6	1,4	1,8	0,2	2,3	11,8
Primaria	42,7	48,7	51,0	68,1	61,8	46,7	30,0	40,8	63,7
Secundaria	45,2	44,9	43,3	27,8	33,9	38,4	50,2	44,0	20,3
Estudios Superiores	11,5	5,8	5,2	2,5	2,9	13,0	19,7	12,9	4,2
Situación laboral (%)									
Trabajando	44,9	51,1	28,4	20,9	25,6	26,6	45,0	29,1	18,7
Parado no trabajado antes	2,8	3,6	9,6	7,5	6,5	10,8	4,6	3,9	15,8
Parado habiendo trabajado antes	32,5	35,5	31,7	52,9	51,0	36,5	38,2	25,9	40,8
Otras	19,9	9,8	30,3	18,7	16,9	26,1	12,2	41,1	24,7
Español o extranjero (%)									
Español	83,1	89,5	84,5	87,6	86,2	86,3	79,7	83,0	82,5
Extranjero	16,9	10,5	15,5	12,4	13,8	13,7	20,3	17,0	17,5
Fuente de referencia principal (%)									
Otros servicios de tratamiento drogodependencias	2,9	3,2	1,6	12,8	4,8	1,9	7,1	6,3	17,3
Médico general, Atención Primaria de Salud	24,8	13,6	12,7	4,9	9,6	23,6	13,7	25,4	4,3
Hospitales u otros servicios de salud	13,9	6,9	11,0	2,8	6,2	19,7	16,0	17,4	5,5
Servicios Sociales	4,4	2,5	8,0	2,0	3,4	4,2	3,1	1,5	0,9
Prisión, centro de reforma o internamiento menores	1,5	3,9	5,2	9,8	6,7	5,4	4,4	1,5	17,6
Servicios legales o policiales	2,0	5,2	11,4	3,0	6,4	3,4	6,9	0,8	2,4
Empresas o empleador	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Familiares y amigos	11,3	13,3	14,2	5,6	9,3	8,0	8,0	5,2	2,7
Iniciativa propia	37,1	49,9	32,2	58,0	52,5	32,1	38,4	40,5	48,6
Servicios de educación	0,5	0,2	1,5	0,1	0,3	0,5	0,4	0,1	0,3
Otra	1,4	1,0	2,1	1,1	0,9	1,2	1,8	1,2	0,3
Número de hijos	1,2	1,0	0,5	1,1	1,1	1,0	0,4	1,2	1,2

	Alcohol	Cocaína polvo	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes	Otros opioides	Metadona
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Solo/a	22,9	15,0	11,0	22,9	19,3	20,8	24,0	20,6	20,7
Únicamente con pareja	17,7	14,1	9,0	11,9	11,4	16,1	13,5	21,6	14,3
Únicamente con hijos/as	5,0	2,8	1,8	2,1	2,6	6,2	1,6	4,6	4,1
Con la pareja e hijos/as	23,2	24,5	11,8	11,8	13,9	14,5	7,3	23,1	11,9
Con padres o familia de origen	21,5	32,9	51,7	28,9	33,6	26,5	31,1	21,2	25,2
Con amigos/as	3,4	3,1	3,5	5,6	4,7	4,7	13,0	4,0	7,1
Detenido (ej. centro penitenciario, inserción social)	1,5	4,0	3,5	9,0	8,0	4,6	3,3	0,8	8,5
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,4	1,2	4,2	3,6	2,6	3,3	3,0	2,4	4,1
Otros	2,4	2,3	3,6	4,2	3,7	3,3	3,3	1,7	4,1
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Casas, pisos, apartamentos	92,3	92,1	89,3	76,3	81,0	87,1	88,7	92,1	78,9
Prisiones, centros reforma o internamiento menores	1,5	4,3	3,6	9,9	8,8	4,1	3,8	1,2	9,2
Otras instituciones	2,0	1,1	3,9	3,4	2,3	3,6	2,9	2,1	4,8
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,3	0,3	0,9	0,7	0,5	0,4	0,8	1,7
Alojamientos inestables/precarios	2,6	1,4	1,7	7,1	5,4	3,7	3,8	2,9	3,7
Otros lugares	1,1	0,7	1,1	2,4	1,7	1,0	0,5	0,8	1,7
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)									
Opioides	3,6	2,6	2,6	9,3	22,3	6,7	2,3	6,7	20,8
Cocaína	64,9	0,4	41,7	45,7	3,6	33,2	24,6	35	23,1
Estimulantes sin cocaína	4,5	4,8	11,2	2,0	3,6	8,5	13,9	3,9	1,5
Hipnosedantes	6,4	4,5	8,6	11,4	13,9	0,0	18,9	27,2	13,1
Alucinógenos	0,6	1,0	1,6	0,3	0,8	3,1	5,1	2,2	0,0
Sustancias volátiles	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	1,0	2,0	0,6	0,0
Cannabis	50,4	50,9	0,0	51,3	63,4	54,4	48,7	38,3	49,2
Alcohol	0,0	70,9	67,2	33,2	48,9	47,9	41,3	35,0	33,1
Otras sustancias psicoactivas	0,4	0,3	0,7	0,1	0,6	2,3	1,9	1,1	0,0
Edad de inicio droga principal	18,5	20,9	15,8	22,2	21,5	29,7	25,3	34,7	29,6
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Todos los días	58,1	23,8	68,7	54,0	43,8	81,2	29,5	75,9	89,9
4-6 días a la semana	7,2	13,1	5,0	4,8	10,2	2,7	9,6	4,0	2,7
2-3 días a la semana	12,0	24,6	6,9	6,5	15,8	4,3	22,1	5,2	0,9
1 día a la semana	3,7	8,8	2,0	2,0	5,0	1,7	8,8	1,0	0,3
Menos de 1 día a la semana	4,5	10,4	3,1	3,5	6,9	1,8	12,1	2,4	0,6
No consumió	14,5	19,2	14,3	29,0	18,2	8,2	17,8	11,6	5,5

	Alcohol	Cocaína polvo	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes	Otros opioides	Metadona
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Oral	99,5	2,9	1,6	0,9	0,3	98,0	16,6	53,6	91,5
Pulmonar o fumada	0,4	0,5	97,7	81,5	97,4	1,5	14,7	14,7	4,8
Intranasal o esnifada	0,1	95,1	0,4	6,2	2,0	0,2	59,2	5,0	1,8
Parenteral o intravenosa	0,0	0,8	0,1	10,0	0,1	0,0	9,4	6,4	1,8
Otras	0,0	0,7	0,3	1,5	0,3	0,3	0,1	20,4	0,0
Se inyectó drogas (%)									
Alguna vez en la vida	2,4	2,7	1,7	35,5	11,4	3,7	17,0	13,5	41,2
Últimos 12 meses	0,4	1,2	0,4	11,5	2,4	1,0	14,0	7,0	5,8
Últimos 30 días	0,3	0,9	0,2	8,8	1,3	0,7	10,8	5,6	4,3
Prevalencia mínima VIH (%)	0,9	1,2	0,7	8,2	3,0	3,2	16,4	2,4	10,4
Prevalencia máxima de VIH (%)	2,8	3,7	3,2	16,8	7,1	9,7	32,8	7,0	22,7
Prevalencia mínima hepatitis C (%)	1,5	1,3	0,7	15,5	4,7	2,7	7,1	4,5	13,4
Prevalencia máxima hepatitis C (%)	4,6	3,9	2,8	31,9	11,2	8,1	15,7	13,0	29,6
Prevalencia mínima hepatitis B (%)	0,3	0,3	0,1	0,9	0,6	0,6	0,5	0,3	0,6
Prevalencia máxima hepatitis B (%)	1,3	1,3	0,9	3,3	2,2	2,9	1,8	1,4	1,9

Notas:

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido).

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.38.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento por sexo. España, 2021.

	Alcohol		Cocaína polvo		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Total	18.593	6.533	15.285	2.689	9.637	2.701	6.402	1.008	2.260	456	639	438	1.145	222
Tratamiento previo (%)														
Si	43,8	40,5	45,8	38,4	28,1	23,2	73,6	74,0	53,4	51,4	24,1	25,6	34,8	34,1
No	56,2	59,5	54,2	61,6	71,9	76,8	26,4	26,0	46,6	48,6	75,9	74,4	65,2	65,9
Edad media (años)	47,1	47,6	38,1	38,7	28,5	27,9	45,4	43,2	39,3	39,9	38,9	46,9	37,2	37,2
Máximo nivel de estudios (%)														
Sin estudios	0,6	0,4	0,5	0,8	0,5	0,5	1,6	1,9	1,5	0,7	2,5	0,7	0,2	0,0
Primaria	46,0	33,5	49,7	42,5	52,3	46,4	69,4	59,9	63,1	55,8	49,2	43,2	30,3	28,1
Secundaria	44,0	48,6	44,3	48,6	42,5	46,4	26,9	33,4	33,2	37,1	35,1	43,2	48,7	58,1
Estudios superiores	9,3	17,5	5,5	8,1	4,7	6,7	2,2	4,8	2,2	6,4	13,1	12,9	20,8	13,8

	Alcohol		Cocaína polvo		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Situación laboral (%)														
Trabajando	46,8	39,3	53,7	36,2	29,5	24,3	21,7	15,8	27,7	14,8	27,1	25,9	47,5	32,3
Parado, no habiendo trabajado antes	2,4	3,8	3,2	5,7	9,6	9,3	7,0	11,1	5,7	10,3	12,8	7,8	4,2	6,5
Parado, habiendo trabajado antes	31,2	36,1	33,8	45,2	31,2	33,7	52,6	54,5	50,5	53,7	38,3	33,9	36,4	47,9
Otras situaciones	19,6	20,8	9,3	12,9	29,6	32,7	18,7	18,6	16,1	21,1	21,8	32,5	11,9	13,4
Español o extranjero (%)														
Español	84,0	80,5	89,9	87,7	83,4	88,6	87,8	86,5	86,0	86,8	82,3	92,1	78,4	86,1
Extranjero	16,0	19,5	10,1	12,3	16,6	11,4	12,2	13,5	14,0	13,2	17,7	7,9	21,6	13,9
Fuente de referencia principal (%)														
Otro servicio de tratamiento de drogodependencias	2,7	3,4	3,1	3,8	1,7	1,2	12,3	16,0	4,5	6,5	1,8	2,1	7,6	4,5
Médico general o At. Primaria	24,9	24,4	13,7	13,2	12,5	13,4	5,0	4,4	9,8	8,5	22,2	25,7	12,7	19,0
Hospitales u otros serv. salud	12,9	16,7	6,0	11,8	10,2	14,0	2,5	4,1	5,5	10,0	17,4	22,9	16,5	13,6
Servicios Sociales	3,7	6,2	1,5	8,3	6,0	15,0	1,6	4,2	2,0	10,0	3,7	4,9	1,7	10,4
Centro penitenciario, de reforma o internamiento para menores	2,0	0,3	4,4	1,4	5,9	2,7	10,4	5,8	7,3	3,8	7,3	2,5	4,4	4,1
Servicios legales o policiales	2,3	1,2	5,4	4,0	12,8	6,5	3,1	2,3	7,0	3,3	5,3	0,7	7,3	5,0
Empresa o empleador	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Familiares o amigos/as	11,5	10,7	14,0	9,7	14,8	12,0	5,3	7,5	9,4	8,5	7,5	8,8	8,1	7,7
Iniciativa propia	37,8	35,1	50,7	45,8	32,7	30,2	58,5	54,5	53,6	46,8	33,1	30,8	39,5	33,0
Servicios de educación	0,4	0,7	0,2	0,3	1,2	2,3	0,1	0,0	0,2	0,4	0,3	0,7	0,4	0,5
Otra	1,4	1,3	0,9	1,6	2,0	2,6	1,1	1,1	0,6	2,2	1,4	0,9	1,7	2,3
Número de hijos														
	1,2	1,3	1,0	1,3	0,5	0,6	1,0	1,4	1,0	1,5	0,7	1,4	0,3	0,8
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Solo/a	22,9	22,9	15,0	14,8	11,3	10,0	23,4	19,3	20,1	15,5	23,4	16,9	24,7	20,5
Únicamente con pareja	17,2	19,3	13,8	15,9	8,0	12,6	10,4	21,6	10,0	18,5	13,0	20,7	14,0	11,0
Únicamente con hijos/as	2,3	13,0	1,4	10,8	0,8	5,1	1,2	7,8	1,2	9,7	1,6	13,1	1,0	5,0
Con la pareja e hijos/as	24,6	19,3	25,3	20,2	11,7	11,9	12,2	8,8	14,8	9,7	12,0	18,3	6,0	14,2
Con padres o familia de origen	23,2	16,6	33,9	27,5	52,8	47,7	30,0	22,2	34,8	27,5	28,6	23,3	31,4	29,7
Con amigos/as	3,2	3,9	2,9	4,3	3,5	3,5	5,6	5,7	4,4	6,3	6,1	2,6	14,0	8,2
Detenido (ej. centro penitenciario o inserción social)	1,9	0,3	4,5	1,0	4,1	1,3	9,6	4,7	8,9	3,8	6,2	2,1	3,4	2,3
En instituciones, no detenido (ej. albergue)	2,5	2,1	1,1	2,0	4,3	4,1	3,4	4,6	2,3	4,3	5,0	1,0	2,4	5,5
Otros	2,3	2,7	2,1	3,4	3,5	3,8	4,1	5,3	3,5	4,7	4,2	1,9	3,2	3,7

	Alcohol		Cocaína polvo		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Casas, pisos, apartamentos	91,3	95,2	91,8	94,2	88,6	92,0	76,0	78,4	80,6	83,3	82,1	94,4	88,8	88,7
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	1,9	0,4	4,8	1,0	4,2	1,2	10,5	5,8	9,5	5,1	5,6	2,1	4,0	2,7
Otras instituciones	2,1	1,9	1,0	1,7	3,8	4,3	3,2	5,0	2,0	3,8	5,2	1,2	2,7	4,1
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,9	0,9	0,9	0,0	0,8	0,0	0,3	0,9
Alojamiento inestable/precarios	3,0	1,4	1,3	2,0	1,8	1,4	7,0	7,5	5,4	5,8	4,9	1,9	3,8	3,6
Otros lugares	1,1	0,8	0,8	0,7	1,1	0,9	2,4	2,5	1,7	2,0	1,4	0,5	0,5	0,0
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)														
Opioides	3,9	2,6	2,5	3,4	2,7	2,3	8,9	12,4	21,7	25,4	7,8	4,2	2,5	1,0
Cocaína	66,7	56,7	0,5	0,2	42,7	37,4	44,5	54,1	3,9	2,1	34,6	30,3	24,5	25,5
Estimulantes sin cocaína	4,4	5,3	4,8	5,0	10,8	13,5	1,9	2,4	3,6	3,8	11,2	2,5	14,1	12,7
Hipnosedantes	5,2	11,9	4,1	7,3	8,8	7,6	11,5	10,3	15,0	7,6	0,0	0,0	20,9	5,9
Alucinógenos	0,6	0,5	0,9	1,4	1,6	1,7	0,3	0,2	0,7	0,8	3,7	1,7	5,3	3,9
Sustancias Volátiles	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,0	2,0
Cannabis	50,8	48,7	51,3	48,3	0,0	0,0	52,0	46,3	63,4	63,6	59,1	43,7	47,4	56,9
Alcohol	0,0	0,0	71,7	65,0	67,1	67,7	34,8	21,6	50,3	40,7	45,0	51,3	40,0	49,0
Otras sustancias psicoactivas	0,5	0,3	0,2	0,5	0,7	0,8	0,2	0,0	0,6	0,4	1,5	4,2	2,0	1,0
Edad de inicio droga principal	17,6	21,1	20,5	23,1	15,7	16,3	22,1	23,5	20,9	24,6	27,4	33,1	25,6	23,6
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Todos los días	59,6	53,8	24,2	21,6	69,2	67,0	53,9	54,7	44,7	39,6	78,2	85,7	28,8	33,5
4-6 días a la semana	6,9	8,1	13,2	12,7	5,2	4,2	5,0	3,8	10,5	8,8	3,6	1,4	9,7	8,8
2-3 días a la semana	11,2	14,3	24,6	24,5	7,0	6,5	6,5	6,6	15,4	18,2	5,8	2,1	22,9	18,1
1 día a la semana	3,5	4,2	8,7	9,5	1,8	2,6	2,2	1,3	5,1	4,7	1,8	1,6	9,4	6,0
Menos de 1 día a la semana	4,3	5,2	10,3	11,3	3,0	3,6	3,5	3,9	6,9	7,2	1,8	1,9	12,2	11,6
No consumió	14,5	14,3	19,0	20,4	13,8	16,1	28,9	29,8	17,5	21,4	8,9	7,3	17,1	21,9
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)														
Oral	99,4	99,5	3,0	2,6	1,5	1,6	0,8	1,1	0,3	0,2	97,1	99,3	14,9	25,3
Pulmonar o fumada	0,5	0,3	0,5	0,6	97,6	97,9	81,4	82,4	97,5	96,9	2,1	0,7	16,1	7,4
Intranasal o esnifada	0,1	0,0	95,1	95,3	0,5	0,3	6,0	7,0	1,9	2,6	0,3	0,0	57,9	65,9
Parenteral o intravenosa	0,0	0,0	0,8	0,4	0,1	0,0	10,3	8,6	0,1	0,2	0,0	0,0	11,0	1,4
Otras	0,0	0,1	0,7	1,1	0,3	0,3	1,5	1,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0
Se inyectó drogas (%)														
Alguna vez en la vida	2,7	1,6	2,7	2,9	1,9	1,1	35,9	32,7	11,7	10,1	4,9	2,0	19,4	3,9
Últimos 12 meses	0,5	0,2	1,2	1,4	0,4	0,3	11,9	8,9	2,2	3,6	1,5	0,3	16,2	1,7
Últimos 30 días	0,3	0,1	0,9	0,9	0,2	0,1	9,3	6,1	1,2	1,8	0,9	0,3	12,5	1,1
Prevalencia mínima VIH (%)	1,0	0,7	1,2	1,5	0,8	0,7	7,9	9,8	2,8	4,2	3,9	2,1	19,1	2,7
Prevalencia máxima de VIH (%)	3,2	2,0	3,6	4,0	3,3	2,7	16,4	20,0	6,6	9,7	11,3	7,1	36,9	6,4
Prevalencia mínima hepatitis C (%)	1,7	1,1	1,3	1,5	0,7	0,4	15,3	16,5	4,8	4,2	3,3	1,8	7,8	3,6
Prevalencia máxima hepatitis C (%)	5,1	3,2	3,9	4,0	3,2	1,8	31,5	34,3	11,5	9,6	9,3	6,2	16,9	8,9
Prevalencia máxima hepatitis B (%)	1,5	0,7	1,4	1,1	0,9	0,9	3,3	3,2	1,9	3,9	3,7	1,3	1,2	6,5
Prevalencia mínima hepatitis B (%)	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,9	0,8	0,5	0,9	0,9	0,2	0,3	1,4

* Estimulantes distintos de la cocaína.

Notas:

El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de desconocidos en las variables de cruce.

Prevalencia mínima: positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocidos).

Prevalencia máxima: positivos entre los casos con información (incluye positivos y negativos); en hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.39.

Edades medias de inicio del tratamiento, de inicio en el consumo y latencia entre primer uso e inicio de tratamiento. España, 2021.

	Edad media de entrada a tratamiento	Edad media de primer uso	Latencia (inicio-entrada a tratamiento)
Opioides (total)	45,31	23,63	21,69
Heroína	45,08	22,25	22,85
Metadona	46,60	29,63	17,46
Buprenorfina	43,73	33,53	10,20
Fentanilo	53,94	45,75	7,89
Otros opioides	44,93	31,29	13,51
Cocaína total	38,37	21,00	17,35
Cocaína polvo	38,23	20,92	17,29
Cocaína base	39,35	21,50	17,82
Estimulantes distintos de cocaína	37,19	25,29	11,80
Anfetaminas	37,38	21,88	15,35
Metanfetamina	38,19	31,57	6,77
Extasis y derivados	30,77	22,58	7,61
Catinonas sintéticas	38,16	34,04	4,08
Otros estimulantes	38,13	25,43	12,38
Hipnosedantes	42,17	29,72	12,16
Alucinógenos	32,06	21,91	9,27
Inhalantes volátiles	22,91	17,37	5,51
Cannabis	28,33	15,80	12,48
Total	36,92	20,38	16,45

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.40.

Número de casos que entran a tratamiento en función de que presenten policonsumo* de sustancias, total y en función del tratamiento previo. España, 2021.

	Policonsumo Si	Policonsumo No	Total
Sin tratamiento previo	5.615	17.867	23.482
Con tratamiento previo	4.761	13.598	18.359
Desconocido	273	2.230	2.506
Total admisiones	10.652	33.695	44.347

Nota: Se utiliza el término "policonsumo" cuando el sujeto consume más de una sustancia y resulta "prácticamente imposible" identificar cuál es la droga principal. Es decir, cuál es la droga que el terapeuta considera que ha producido la dependencia o los problemas clínicos o sociales más importantes que han motivado la admisión a tratamiento.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.41.

Número de casos admitidos a tratamiento por grupos de edad en función de la droga principal. España, 2021.


	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥65	Desc.	Total
Opioides	5	22	151	324	743	1.153	1.399	1.686	1.586	904	359	178	8	8.518
Heroína	4	14	118	257	669	1.035	1.247	1.493	1.421	791	274	88	8	7.419
Metadona	0	1	4	10	19	39	65	68	55	43	21	10	0	335
Buprenorfina	0	0	1	1	1	1	2	4	4	0	1	0	0	15
Fentanilo	0	0	3	6	6	8	18	26	25	18	21	43	0	174
Otros opioides	1	7	25	50	48	70	67	95	81	52	42	37	0	575
Cocaína (total)	7	173	1.061	2.224	3.676	4.461	4.171	2.638	1.436	629	181	75	9	20.741
Cocaína CLH	7	144	923	1.944	3.267	3.905	3.636	2.243	1.199	502	146	67	6	17.989
Cocaína base	0	28	136	275	403	551	526	394	236	125	34	8	3	2.719
Estimulantes dif. cocaína	2	33	102	164	241	264	254	170	92	32	10	3	1	1.368
Anfetaminas	2	21	63	96	137	159	157	117	60	20	3	1	1	837
Metanfetaminas	0	0	9	18	29	32	35	22	9	5	0	0	0	159
Éxtasis	0	11	16	17	18	16	7	3	0	0	3	0	0	91
Catinonas sintéticas	0	1	9	26	48	44	46	24	18	6	2	1	0	225
Otros opioides	0	0	5	7	9	13	9	4	5	1	2	1	0	56
Hipnosedantes	1	69	94	76	113	93	147	145	109	96	69	65	0	1.077
Alucinógenos	0	4	21	35	25	18	11	9	1	0	2	1	0	127
Sustancias volátiles	9	33	10	5	2	0	3	2	1	2	0	1	0	68
Cannabis	120	3.114	2.377	1.901	1.619	1.233	867	511	304	161	113	27	3	12.350
Otras sustancias	0	5	2	14	15	10	11	12	10	12	5	2	0	98
Total	144	3.453	3.818	4.743	6.434	7.232	6.863	5.173	3.539	1.836	739	352	21	44.347

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, 1996-2021

2.2.1.

Porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España*, 1996-2021.



* Comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2.

Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España*, 1996-2021.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnóticos y sedantes	Heroína	Antetaminas	Otros opioides	MDMA y derivados	Alucinógenos	Inhalables volátiles
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4
2014	6.441	43,7	38,7	35,5	18,5	10,3	8,6	7,6	4,5	2,5	0,3
2015	5.238	43,5	39,8	42,2	18,2	11,2	8,0	7,4	3,7	1,6	0,3
2016	4.565	42,5	43,9	40,1	20,5	8,6	7,5	7,7	3,2	1,5	0,3
2017	4.293	50,2	37,1	50,3	16,9	9,0	8,7	10,3	2,8	1,5	0,5
2018	5.027	52,0	39,0	49,4	17,9	7,4	7,6	10,1	3,4	1,4	0,5
2019	5.352	50,7	40,3	50,6	19,5	7,0	7,8	9,9	3,8	1,8	0,5
2020	4.657	39,9	40,6	44,9	34,6	6,7	5,7	8,9	2,6	0,8	0,4
2021	6.209	40,3	41,4	44,5	35,9	5,0	7,3	8,1	2,8	1,3	0,2

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Número de urgencias relacionadas con el uso de analgésicos opioides*. España**, 2005-2021.




* Incluye morfina, Fentanilos, petidina, tramadol, buprenorfina, codeína, dextrometorfano, hidromorfona, oxycodona y tapentadol.

** Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Proporción de urgencias por tipo de opiáceo notificado en el total de urgencias relacionadas con opiáceos. España*, 2005-2021.



* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** Otros opiáceos: opiáceos distintos de la heroína y de los analgésicos opioides. Incluye: metadona, opio y otros opiáceos sin especificar.

*** Analgésicos opioides: incluye morfina, fentanilos, petidina, tramadol, buprenorfina, codeína, dextrometorfano, hidromorfona, oxycodona y tapentadol.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1996-2021.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nº episodios	2.585	2.099	2.328	2.673	5.828	7.042	6.431	5.626	5.999	6.441	5.238	4.565	4.293	5.027	5.352	4.657	6.209
Edad media (años)	27,8	29,1	30,3	29,8	31,0	31,6	32,4	32,6	32,8	33,2	34,1	34,3	34,6	34,8	34,1	36,5	36,1
Sexo (%)																	
Mujeres	21,4	23,1	27,4	27,4	28,0	26,1	22,7	26,3	26,1	24,5	22,6	22,6	22,7	25,3	25,7	29,3	30,6
Sustancias psicoactivas relacionadas (%)																	
Heroína	56,1	38,7	35,3	21,4	17,5	16,9	17,2	17,8	13,0	10,3	11,2	8,6	9,0	7,4	7,0	6,7	5,0
Otros opiodes	13,5	16,8	18,0	13,1	9,1	8,5	7,5	6,7	6,1	7,6	7,4	7,7	10,3	10,1	9,9	8,9	8,1
Cocaína	19,9	31,6	40,9	44,7	50,0	51,1	55,1	49,5	46,0	43,7	43,5	42,5	50,2	52,0	50,7	39,9	40,3
Anfetaminas	2,2	3,0	2,2	3,4	2,3	4,7	4,4	5,5	8,9	8,6	8,0	7,5	8,7	7,6	7,8	5,7	7,3
MDMA y der.	1,3	2,2	4,5	5,3	3,2	6,4	4,2	2,9	4,6	4,5	3,7	3,2	2,8	3,4	3,8	2,6	2,8
Hipnosedantes	23,6	24,3	28,9	30,1	22,3	21,0	15,6	16,7	18,3	18,5	18,1	20,5	16,9	17,9	19,5	34,6	35,9
Cannabis	6,2	8,9	12,8	19,9	19,3	23,9	24,7	30,5	33,0	35,5	42,2	40,1	50,3	49,4	50,6	44,9	44,5
Alucinógenos	2,1	2,4	2,7	1,3	0,8	1,7	1,6	1,7	2,5	2,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,8	0,8	1,3
l. volátiles	0,2	0,3	0,3	0,2	0,6	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2
Alcohol	12,4	22,2	26,8	35,4	30,7	36,0	37,3	36,3	39,0	38,7	39,8	43,9	37,1	39,0	40,3	40,6	41,4
Resolución urgencia (%)																	
Alta médica	80,5	81,2	78,7	82,1	81,4	76,2	80,0	79,6	75,9	69,8	72,2	71,6	71,1	72,7	73,0	70,4	73,4
Alta voluntaria	7,0	8,8	8,5	7,4	5,3	8,6	8,5	7,0	8,2	9,9	8,2	8,2	8,3	8,4	8,8	7,9	7,5
Ingreso hospitalario	7,6	6,0	8,3	6,3	8,0	8,8	7,8	10,2	12,5	15,9	16,0	17,0	17,1	15,2	15,1	17,3	14,3
Muerte en urgencias	0,1	0,0	0,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Traslado otro centro	4,8	3,9	3,7	4,0	5,3	6,3	3,7	3,2	3,3	4,2	3,6	3,1	3,5	3,7	3,1	4,3	4,7

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Notas: Incluye las sustancias para las que el médico expresa en la historia clínica una relación directa con la urgencia. El alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

En esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Vía de administración (número y porcentaje) de los episodios de urgencias hospitalarias en consumidores de drogas, según tipo de droga. España*, 2011-2021.

Drogas y vía de administración		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heroína	Oral	1,6	0,8	0,2	1,5	1,5	2,2	2,7	9,0	5,3	9,6	8,0
	Pulmonar o fumada	35,4	25,4	30,6	25,7	26,0	50,0	61,0	50,7	57,3	54,2	59,3
	Intranasal o esnifada	6,8	8,9	9,5	5,2	5,3	6,7	5,1	11,9	13,6	8,5	9,9
	Parenteral o inyectada	56,3	64,9	59,6	67,7	68,5	41,1	30,7	27,9	23,8	27,7	21,6
	Otra vía	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,2
Otros opioides	Oral	94,5	96,8	98,7	89,3	85,0	91,3	95,1	95,9	95,0	92,1	93,0
	Pulmonar o fumada	1,1	0,8	0,4	1,8	3,2	1,7	1,4	0,8	1,5	4,4	1,7
	Intranasal o esnifada	1,8	1,0	0,1	0,0	2,4	0,4	0,0	0,6	0,5	0,3	0,8
	Parenteral o inyectada	1,9	0,8	0,5	7,7	7,3	6,1	1,6	1,1	1,5	2,2	3,1
	Otra vía	0,7	0,6	0,2	1,2	2,0	0,4	1,9	1,6	1,5	1,0	1,4
Cocaína	Oral	1,4	1,0	0,5	2,3	2,0	3,3	2,5	1,6	2,1	5,0	1,7
	Pulmonar o fumada	20,8	18,2	18,5	10,4	18,4	17,9	11,1	11,8	14,1	13,4	9,8
	Intranasal o esnifada	61,9	57,5	61,2	72,7	71,6	73,5	85,6	85,1	81,9	78,5	85,4
	Parenteral o inyectada	15,8	23,1	19,6	14,4	10,0	8,6	3,3	1,5	1,7	2,5	3,2
	Otra vía	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,7	0,0
Anfetaminas	Oral	81,6	78,0	69,9	71,9	68,2	65,9	72,3	75,0	73,2	73,5	70,5
	Pulmonar o fumada	5,3	5,9	10,6	4,5	7,1	4,8	9,9	2,4	3,0	2,4	4,4
	Intranasal o esnifada	12,5	16,1	18,7	21,9	24,7	27,8	17,7	22,6	23,4	23,5	23,5
	Parenteral o inyectada	0,3	0,0	0,4	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,4	0,6	1,6
	Otra vía	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA	Oral	97,3	97,4	98,6	95,3	92,1	98,1	100,0	96,2	96,2	93,7	88,9
	Pulmonar o fumada	1,4	1,1	0,0	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,1
	Intranasal o esnifada	0,9	1,6	0,0	2,4	4,8	1,9	0,0	3,8	3,8	3,8	6,1
	Parenteral o inyectada	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Otra vía	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes	Oral	99,5	99,3	99,5	98,8	99,3	99,5	98,5	99,1	99,1	99,5	99,3
	Pulmonar o fumada	0,1	0,2	0,2	0,8	0,2	0,3	0,7	0,6	0,6	0,2	0,4
	Intranasal o esnifada	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3
	Parenteral o inyectada	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
	Otra vía	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Cannabis	Oral	2,6	2,4	2,2	5,3	4,3	5,1	1,8	4,8	4,8	5,9	3,8
	Pulmonar o fumada	96,6	97,3	97,3	93,5	95,5	94,8	98,1	94,8	94,8	93,7	95,3
	Intranasal o esnifada	0,6	0,3	0,4	0,7	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,8
	Parenteral o inyectada	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Otra vía	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0
Alucinógenos	Oral	72,9	73,3	54,8	37,1	76,1	82,8	77,8	86,6	86,6	96,0	75,7
	Pulmonar o fumada	15,3	2,7	11,3	2,2	13,0	3,4	0,0	6,7	6,7	4,0	0,0
	Intranasal o esnifada	11,9	14,7	17,7	16,9	2,2	13,8	22,2	6,7	6,7	0,0	13,5
	Parenteral o inyectada	0,0	6,7	16,1	43,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
	Otra vía	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.7.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España*, 2021.



	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y derivados	Alucinógenos
Oral	1,7	3,8	99,3	8,0	70,5	93,0	88,9	75,7
Pulmonar o fumada	9,8	95,3	0,4	59,3	4,4	1,7	5,1	0,0
Intranasal o esnifada	85,4	0,8	0,3	9,9	23,5	0,8	6,1	13,5
Parenteral o inyectada	3,2	0,0	0,0	21,6	1,6	3,1	0,0	10,8
Otra vía	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,4	0,0	0,0

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.8.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España*, 2021.

	Total	Según sexo		Según droga							
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Cannabis	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Número de episodios	6.209	4.301	1.902	2.325	2.572	290	419	467	159	73	14
Edad media (años)	36,1	36,4	35,5	37,6	32,2	41,6	34,1	42,8	29,2	29,7	34,4
Sexo (%) mujeres	30,6	-	-	20	23,4	16,6	22,9	29,6	24,5	19,4	42,9
Resolución de la urgencia (%)											
Alta médica	73,4	73,5	73,1	74,8	73,7	63,9	69,1	65,7	71,7	63,0	71,4
Alta voluntaria	7,5	8,3	5,9	8,8	7,1	12,3	6,2	11,1	13,8	9,6	7,1
Ingreso hospitalario	14,3	13,7	15,8	12,1	14,5	19,6	18,0	18,0	11,3	24,7	21,4
Muerte en urgencias	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	4,7	4,5	5,2	4,3	4,7	4,2	6,7	5,2	3,1	2,7	0,0

* Comunidades autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.9.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas, según sexo. España*, 2021.

	Total	Hombres	Mujeres
Cannabis	44,4	48,2	35,5
Alcohol**	41,3	42,1	39,4
Cocaína	40,2	45,6	27,4
Hipnosedantes**	35,8	29,6	50,8
Heroína	5,0	5,9	2,8
Anfetaminas	7,2	7,9	5,7
Otros opioides	8,1	8,1	8,1
MDMA y derivados	2,7	2,9	2,3
Alucinógenos	1,3	1,4	0,8
Inhalables volátiles	0,2	0,2	0,4

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.10.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas). España*, 2020-2021.

	2020	2021
Número de episodios	9.239	12.476
Eda media (años)	38,2	36,8
Sexo (%)		
Mujeres	34,8	36,8
Sustancias psicoactivas relacionadas (%)		
Heroína	3,3%	2,4%
Otros opiodes	4,4%	3,9%
Cocaína	20,0%	19,3%
Anfetaminas	2,9%	3,5%
MDMA y derivados	1,3%	1,3%
Hipnosedantes	33,6%	33,5%
Cannabis	22,5%	21,3%
Alucinógenos	0,4%	0,6%
Inhalables volátiles	0,2%	0,1%
Alcohol	54,0%	55,5%
Resolución urgencia (%)		
Alta médica	73,1%	75,6%
Alta voluntaria	8,5%	8,7%
Ingreso hospitalario	14,8%	12,1%
Muerte en urgencias	0,1%	0,0%
Traslado a otro centro	3,5%	3,6%


* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Notas: Incluye las sustancias para las que el médico expresa en la historia clínica una relación directa con la urgencia. El alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.11.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas), según sexo. España, 2021.



	Total	Hombres	Mujeres
Alcohol	55,5	60,7	46,5
Hipnosedantes	33,5	24,2	49,7
Cannabis	21,4	25,7	13,8
Cocaína	19,3	24,2	10,6
Otros opioides	2,4	4,3	3,2
Heroína	2,4	3,2	1,1
Anfetaminas	3,5	4,2	2,2
MDMA y derivados	1,3	1,6	0,9
Alucinógenos	0,6	0,8	0,3
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,1


* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.12.

Sintomatología* que provoca la urgencia en función de las drogas que se relacionan (%). España** 2021.



	Cocaína (pero no opioides)	Cannabis (sin opioides ni cocaína)	Sólo hipnosedantes	Opiaceos y no cocaína	Sólo alcohol
■ Agitación, agresividad, irritabilidad	31,4	31,6	14,6	22,7	22,1
■ Alucinaciones, delirios o episodios psicóticos	14,8	16,3	2,5	7,1	3,1
■ Ansiedad	41,6	44,0	57,1	33,3	18,5
■ Coma, pérdida de conciencia o síncope	13,5	12,0	25,0	29,4	19,3
■ Dolor en el pecho	8,0	-	-	-	-
■ Palpitaciones, arritmias o taquicardias	9,0	-	-	-	-
■ Dolor abdominal	-	7,4	7,4	7,4	9,4
■ Vómitos o náuseas	7,4	14,3	14,3	11,3	25,8


* Se presentan los síntomas que aparecen al menos en un 5% de las urgencias.

** Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.13.

Prevalencia de patología dual en los episodios de urgencias en los que se detecta únicamente una sustancia, en función de la sustancia detectada (%). España, 2021.




** Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.14.

Tipo de consumo de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España* 2021.



	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y derivados	Alucinógenos	Alcohol
Ocasional	15,1	10,4	7,4	11,6	27,5	2,9	39,2	46,2	23,4
Habitual	80,6	87,9	34,3	86,2	65,9	74,3	57,0	48,7	71,1
Intento autolítico	4,2	1,7	58,2	2,2	6,6	22,8	3,8	5,1	5,5
Sumisión química	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: El alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2021

2.3.1.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2021.

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Estimación nacional	266	440	453	516	741	1.067	1.440	1.440	1.833	1.760	1.399	1.067	1.051
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	82	139	143	163	234	337	455	455	579	558	444	388	395
Registro General de Mortalidad (INE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Estimación nacional	1.310	1.127	1.049	972	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	703	773
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	-	-	-	-	444	496	496	493	468	455	428	475	424
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	421	339	306	291	284	268	229	270	212	242	218	188	139
Registro General de Mortalidad (INE)	-	-	-	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2107	2018	2019	2020	2021
Estimación nacional	739	706	736	707	727	767	936	866	782	777	1.015	978	1.046
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	438	517	408	519	489	556	600	613	696	732	920	974	1.046
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210	212	259
Registro General de Mortalidad (INE)	442	393	361	383	403	455	390	483	437	450	546	774	820

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.


Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro General de Mortalidad (INE - Instituto Nacional de Estadística): Se incluyen los códigos CIE-10: F11, F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

2.3.2.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2021.



Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro General de Mortalidad (INE - Instituto Nacional de Estadística): Se incluyen los códigos CIE-10: F11, F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2003-2021.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Nº de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732	920	974	1.046	
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632	657	819	872	910	
Sexo (%)																				
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7	80,9	80,6	83,4	78,1	81,6	80,8	77,4	78,0	
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3	19,1	19,4	16,6	21,9	18,4	19,2	22,6	22,0	
Edad media (años)																				
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42,0	42,7	44,3	43,6	44,1	44,5	44,9	44,4	45,5	46,7	
Grupo de edad (años)																				
15-19 años	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,5	0,0	0,3	0,8	0,9	1,2	
20-24 años	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4	1,5	2,7	1,8	1,0	2,2	2,6	1,5	2,7	
25-29 años	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6	4,7	4,7	5,4	5,5	4,4	4,1	4,7	4,5	
30-34 años	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1	10,4	9,3	8,3	8,3	7,8	9,1	7,3	6,4	
35-39 años	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7	13,8	18,3	14,0	15,9	13,0	12,7	11,5	10,4	
40-44 años	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6	17,7	16,5	19,4	16,7	16,5	17,8	17,1	14,1	
≥45 años	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3	51,2	47,7	50,6	52,6	55,8	52,9	56,9	60,7	

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Estado civil (%)																				
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3	59,3	64,8	64,2	63,3	62,9	62,0	59,6	61,6	
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9	14,5	17,8	17,8	20,9	17,2	20,1	19,1	17,2	
Separado**	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9	23,1	16,5	15,6	13,9	17,8	15,6	17,7	18,9	
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,0	3,1	0,9	2,5	1,9	2,1	2,4	3,6	2,3	
Procedencia del cadáver (%)																				
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7	74,4	72,6	68,5	71,9	68,7	70,6	69,4	70,6	
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1	2,4	3,3	3,8	4,0	2,6	3,6	4,7	2,7	
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1	10,1	8,2	8,2	6,1	7,5	9,1	9,4	10,0	
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5	0,9	2,1	2,1	3,0	2,6	2,2	1,8	2,3	
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6	5,5	5,9	8,4	7,7	6,6	6,0	5,8	6,9	
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1	1,5	3,1	3,3	2,7	5,6	3,1	3,2	2,3	
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0	5,1	4,7	5,6	4,6	6,5	5,4	5,7	5,3	
Evidencias de consumo reciente (%)																				
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8	81,8	84,9	82,0	88,1	80,4	85,4	83,8	75,0	
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2	18,2	15,1	18,0	11,9	19,6	14,6	16,2	25,0	
Evidencia de suicidio (%)																				
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1	20,3	26,4	20,6	22,9	18,4	23,2	26,1	26,9	
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9	79,7	73,6	79,4	77,1	81,6	76,8	73,9	73,1	
Signos recientes venopunción(%)																				
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2	12,5	13,5	13,0	13,3	11,3	12,8	8,7	8,2	
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8	87,5	86,5	87,0	86,7	88,7	87,2	91,3	91,8	
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)																				
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0	35,4	27,0	31,5	38,2	31,0	27,9	35,7	36,0	
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0	64,6	73,0	68,5	61,8	69,0	72,1	64,3	64,0	
Anticuerpos anti-VIH (%)																				
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5	27,2	26,2	21,4	22,1	25,8	18,0	17,4	18,3	
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5	72,8	73,8	78,6	77,9	74,2	82,0	82,6	81,7	

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

** Separado/divorciado

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.4.

Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en función del sexo. España*, 2021.


		Hombres	Mujeres
Sexo (N)	Hombre	815	–
	Mujer	–	230
Edad categorías (%)	Menor de 20 años	1,2	0,9
	Entre 20 y 24 años	3,1	1,3
	Entre 25 y 29 años	5,1	2,2
	Entre 30 y 34 años	7,5	3,1
	Entre 35 y 39 años	10,2	11,0
	Entre 40 y 44 años	15,3	9,7
	45 años o más	57,6	71,8
	Estado civil (%)	Soltero	66,3
Casado		14,0	29,0
Separado legalmente/Divorciado		19,1	18,0
Viudo		0,5	9,0
Procedencia del cadáver (%)	Domicilio	67,3	82,3
	Hotel/Pensión	2,4	3,5
	Calle	11,9	2,7
	Establecimiento público	2,3	2,2
	Hospital	7,0	6,6
	Cárcel	2,8	0,4
	Otro lugar	6,2	2,2
Evidencias de consumo reciente de sustancias psicoactivas (%)	Sí	73,7	79,5
	No	26,3	20,5
Signos de autopsia compatible con muerte RASUPSI (%)	Sí	78,3	76,1
	No	21,7	23,9
Diagnóstico forense de muerte (%)	Sí	83,1	86,0
	No	16,9	14,0
Evidencias de suicidio (%)	Sí	19,7	50,3
	No	80,3	49,7
Signos recientes de venopunciones (%)	Sí	9,3	4,4
	No	90,7	95,6
Muerte cuya causa es una patología previa (%)	Sí	38,1	29,7
	No	61,9	70,3
Anticuerpos del VIH (%)	Positivo	20,5	12,3
	Negativo	79,5	87,7

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.5.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1996-2021.



* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.6.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1996-2021.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Opioides	90,4	89,8	90,1	88,0	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7	72,8	77,7
Cocaína	32,7	41,4	51,2	63,3	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0	67,0	60,2
Hipnosedantes	47,7	58,6	47,4	48,8	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7	46,9	45,1
Anfetaminas	4,0	8,6	2,8	4,5	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6	3,6	2,2
Cannabis	6,5	12,2	11,3	14,3	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8	14,6	15,6
MDMA	0,1	1,5	0,0	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7	1,1	1,4
Alcohol**	27,7	28,6	26,2	30,5	35,5	35,3	42,5	39,0	35,8	33	34,3	27,8	25,9
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opioides	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	64,0	64,7	63,9	58,1	58,6	59,0	59,5	55,7
Cocaína	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	51,7	48,8	53,7	53,2	61,6	60,3	52,9	52,4
Hipnosedantes	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	65,8	68,0	67,3	68,0	63,2	66,8	63,3	66,3
Anfetaminas	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	7,9	4,4	6,2	5,9	5,8	6,8	6,5	9,3
Cannabis	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	16,5	23,4	23,4	20,7	24,8	25,5	22,4	22,9
Extasis	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	3,5	2,3	2,8	1,7	4,3	2,3	1,9	1,9
Alcohol**	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	40,8	39,8	42,9	44,0	47,5	39,7	30,5	36,4


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.7.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España*, 2021.



	Hombres	Mujeres	Total
Opioides	55,4	56,5	55,7
Cocaína	57,6	34,9	52,4
Hipnosedantes	62,1	79,9	66,3
Anfetaminas	10,9	4,3	9,3
Cannabis	25,3	14,4	22,9
Extasis	1,9	1,9	1,9
Alcohol**	37,4	33,0	36,4

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.8.

Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España*, 2005-2021.


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo cocaína)	14,5	13,8	17,3	12,5	11,0	12,2	13,7	12,3	
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye solo cocaína)	20,4	18,5	25,1	18,9	16,4	18,0	17,2	19,0	
Sólo cocaína	5,9	4,7	7,8	6,4	5,4	5,8	3,4	6,7	
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo opioides)	25,7	32,0	22,9	28,5	31,4	33,3	38,7	35,1	
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides)	29,7	36,7	30,7	35,8	39,6	39,7	42,9	37,9	
Sólo opioides	4,0	4,7	7,8	7,3	8,2	6,4	4,2	2,7	
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides y cocaína)	48,8	40,0	40,8	40,3	41,5	39,5	35,0	39,5	
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, sin sólo opioides y cocaína)	39,6	29,4	29,3	26,4	31,9	33,5	31,1	34,7	
Solo opioides y cocaína	9,2	10,5	11,6	13,9	9,6	6,0	3,9	4,8	
Nº de defunciones con información toxicológica	455	428	475	424	427	517	408	478	
Número total de fallecidos	455	428	475	424	438	517	453	519	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo cocaína)	12,1	13,1	13,5	16,8	22,0	21,3	20,5	13,9	15,6
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye solo cocaína)	19,7	17,7	18,0	20,0	25,5	26,8	26,0	22,0	21,3
Sólo cocaína	7,6	4,6	4,4	3,2	3,5	5,5	5,5	8,1	5,7
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo opioides)	38,2	26,9	32,0	30,1	27,4	21,9	22,6	25,8	22,4
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides)	42,8	30,0	33,8	32,1	30,4	23,7	24,7	28,7	24,6
Sólo opioides	4,6	3,1	1,7	2,0	3,0	1,8	2,1	2,9	2,2
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides y cocaína)	34,3	34,0	30,9	33,7	27,7	34,9	34,3	30,8	31,1
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, sin sólo opioides y cocaína)	29,3	29,0	27,2	29,3	24,2	30,7	31,7	28,1	28,1
Solo opioides y cocaína	5,0	5,0	3,7	4,4	3,5	4,1	2,6	2,8	3,0
Nº de defunciones con información toxicológica	437	520	518	501	632	657	819	872	910
Número total de fallecidos	489	556	600	613	696	732	920	974	1.046

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.9.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España*, 2003-2021.




	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Opioides	376	349	356	338	340	324	346	409	318	
Cocaína	305	280	315	250	313	251	247	297	213	
Benzodiazepinas	234	225	241	203	212	186	180	292	258	
Anfetaminas	15	12	12	15	17	9	13	8	19	
Cannabis	82	78	95	70	68	65	88	123	100	
Alcohol	191	167	150	143	130	108	120	149	136	
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opioides	366	337	333	335	320	367	385	483	519	507
Cocaína	280	236	269	253	269	336	405	494	461	477
Benzodiazepinas	291	265	327	336	319	403	410	522	522	587
Anfetaminas	18	27	41	23	31	37	38	56	57	85
Cannabis	107	94	86	121	117	131	163	209	195	208
Alcohol	138	136	212	206	215	278	312	325	266	331
Casos analizados	478	437	520	518	501	632	657	819	872	910

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.10.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opiode, aunque haya otras sustancias). España*, 2005-2021.




* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.11.

Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España*, 1985-2021.



* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.12.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos). España*, 2005-2021.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<15 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
15-19 años	6	4	3	8	3	2	5	2	1	4	2	3	0	1	7	9	12
20-24 años	27	18	20	26	28	13	20	15	7	8	16	11	7	16	24	16	28
25-29 años	49	55	45	45	35	41	24	35	37	26	28	33	38	32	38	46	46
30-34 años	88	77	82	69	76	64	49	60	64	57	56	51	58	57	83	73	67
35-39 años	127	102	112	94	83	132	80	82	77	76	110	86	111	95	115	113	107
40-44 años	91	91	103	84	109	128	86	116	96	97	99	119	116	120	162	168	145
45-49 años	34	47	61	53	70	83	79	114	96	133	115	122	146	162	183	167	187
50-54 años	13	19	27	29	26	35	42	62	68	86	89	97	110	121	148	145	188
55-59 años	3	5	5	11	6	12	11	20	27	45	49	59	76	81	99	118	132
60-64 años	1	2	7	3	2	6	5	9	9	17	29	30	34	40	49	39	75
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	43
Desconocido	16	8	10	2	0	1	51	4	7	7	4	0	0	6	12	53	16
Total	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732	920	974	1.046

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.13.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en hombres). España*, 2010-2021.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<15 años	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
15-19 años	1	1	2	1	2	0	3	0	0	4	9	10
20-24 años	11	16	12	4	8	11	10	4	12	21	12	25
25-29 años	34	21	31	29	22	27	30	28	28	32	34	41
30-34 años	58	40	54	55	43	47	44	46	49	72	63	60
35-39 años	114	70	70	60	64	92	72	94	84	101	94	82
40-44 años	109	70	99	82	70	84	103	94	94	124	139	123
45-49 años	66	60	94	76	104	95	102	118	132	146	127	141
50-54 años	29	32	54	55	64	65	76	88	102	112	111	143
55-59 años	7	7	15	19	33	34	48	48	59	85	81	100
60-64 años	3	2	7	7	10	22	21	23	29	35	23	53
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	24

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.14.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en mujeres). España*, 2010-2021.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<15 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15-19 años	1	2	0	0	2	2	0	0	0	3	0	2
20-24 años	2	4	3	3	0	5	1	3	4	3	4	3
25-29 años	7	3	4	8	3	1	3	10	4	6	12	5
30-34 años	6	8	5	9	10	9	7	12	8	11	10	7
35-39 años	18	10	11	17	8	18	14	16	11	14	19	25
40-44 años	19	13	16	14	22	15	16	22	25	37	28	22
45-49 años	16	17	20	20	21	20	20	28	30	37	38	46
50-54 años	6	9	8	12	15	23	21	22	19	35	33	44
55-59 años	4	3	5	8	9	15	11	28	22	14	37	32
60-64 años	3	2	2	2	3	7	9	11	11	13	16	22
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.15.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo. España*, 2004-2021.




* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.16.

Número de fallecidos por códigos CIE* en el Registro General de Mortalidad. España, 2010-2021.




	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
F	47	27	33	22	23	24	25	13	39	24	33	42
X42	112	118	104	88	85	63	124	81	73	114	340	350
X44	230	211	239	289	338	285	329	330	332	388	380	390
X62	4	4	5	4	9	15	5	11	4	15	21	37
Y12	0	1	2	0	0	3	0	2	2	5	0	1

* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12. Edad mayores de 10 años.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.17.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas en el Registro General de Mortalidad, según sexo. España, 1999-2021.




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Hombres	657	610	558	564	552	568	539	417	462	470	366	
Mujeres	95	81	92	88	81	91	97	72	57	70	76	
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hombres	330	291	324	333	376	321	403	348	374	447	561	615
Mujeres	63	70	59	70	79	69	80	89	76	99	213	205
Total	393	361	383	403	455	390	483	437	450	546	774	820

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.18.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas en el Registro General de Mortalidad, según edad. España, 1999-2021.




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<35 años	505	429	391	349	310	285	262	200	192	193	141	
≥35 años	247	262	259	303	323	374	374	289	327	347	301	
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<35 años	108	101	104	93	76	80	99	87	74	111	115	135
≥35 años	285	260	279	310	379	310	384	350	376	435	659	685
Total	393	361	383	403	455	390	483	437	450	546	774	820

* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.19.

Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2021.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Con opioides*	182	170	136	104	140	143	148	152	141	105	94	105	102	86	105	108	122
Sin opioides*	55	48	52	35	41	39	33	43	51	60	65	53	70	91	87	74	100
Casos con información	237	218	188	139	181	182	181	195	192	165	159	158	172	177	192	182	222
Total	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210	212	259

* Independientemente de la aparición o no de otras sustancias.

Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.20.

Número de fallecidos por grupos de edad en 6 ciudades españolas*. España, 2005-2021.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<15 años	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19 años	3	3	1	0	2	0	2	1	1	0	0	3	0	0	2	1	0
20-24 años	17	7	8	9	8	4	5	7	1	0	3	5	2	4	6	3	6
25-29 años	31	25	24	15	12	12	11	10	17	9	6	12	11	7	13	6	12
30-34 años	40	42	30	22	35	21	14	21	24	23	10	14	18	14	17	11	19
35-39 años	66	43	32	23	26	48	40	29	32	20	35	29	31	18	23	33	20
40-44 años	52	44	39	23	49	39	41	45	31	28	27	40	29	28	29	37	35
45-49 años	19	27	23	26	35	39	34	37	42	38	24	29	30	41	43	43	44
50-54 años	5	13	6	15	12	13	18	30	30	32	39	29	31	30	36	28	50
55-59 años	1	5	0	4	2	2	6	12	14	13	17	20	26	21	27	30	39
60-64 años	1	1	2	2	0	3	5	3	4	7	10	13	11	10	11	6	21
≥65 años	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10
Desconocida	2	0	23	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	3	3	0	3
Total fallecidos	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210	212	259

* Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.21.


Índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad-Registro Específico). España, 2005-2021.

Año	Índice de Infranotificación
2005	1,58
2006	1,68
2007	1,35
2008	1,43
2009	1,67
2010	1,80
2011	2,04
2012	1,85
2013	1,80
2014	1,69
2015	2,40
2016	1,79
2017	1,79
2018	1,76
2019	1,86
2020	1,26
2021	1,28

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad y Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.22.

Estimación nacional del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2021.



FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad y Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Información complementaria

Páginas web de interés

MINISTERIO DE SANIDAD

<http://www.sanidad.gob.es/>

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<https://pnsd.sanidad.gob.es/>

Encuesta Nacional de Salud

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/>

MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

MINISTERIO DE HACIENDA

<https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx>

Comisionado para el Mercado de Tabacos

<https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/CMTabacos/Paginas/hometabacos.aspx>

Informes Anuales de Recaudación Tributaria

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria.shtml

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

<https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx>

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

<https://www.mdsocialesa2030.gob.es/>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

<https://www.ine.es/>

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

<https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx>

RED ESPAÑOLA DE ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES

<https://www.esarnet.es/>

OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE)
INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD (INCB)

<https://www.incb.org/>

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)
EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)
THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

ENCUESTA EUROPEA SOBRE DROGAS: PATRONES DE USO
EUROPEAN WEB SURVEY ON DRUGS: PATTERNS OF USE (EWS)

https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO
EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

<https://europa.eu/eurobarometer/screen/home>

RED EUROPEA DE EPIDEMIOLOGÍA BASADA EN ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES

<https://score-network.eu/>