

ESTADÍSTICAS 2016

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

**INDICADOR URGENCIAS HOSPITALARIAS
EN CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS,
1996-2014**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Rosario SENDINO. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación Adjunta al Delegado del Gobierno.

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Aurora RUIZ. Eva SÁNCHEZ-FRANCO.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Rosa ARANGUREN

Francisca BIBILONI

Juana VANRELL

Canarias

Baltasar FERNÁNDEZ

Amelia M^a HERNÁNDEZ

Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

Castilla-La Mancha

Berta HERNÁNDEZ

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier ROCA

M. Teresa BRUGAL

Extremadura

Antonia María VAS

M^a Pilar MORCILLO

Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Madrid

Ana RUIZ

M^a Angeles GUTIÉRREZ

Murcia

Andrés ALCARAZ

Pedro PARDO

Josefa DURÁN

Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@msssi.es

Internet: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-16-095-1


ÍNDICE

| | |
|---|----------|
| 2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2014 | 4 |
| 2.2.1. Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España, 1996-2014 | 4 |
| 2.2.2. Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España, 1996-2014 | 5 |
| 2.2.3. Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2014 | 6 |
| 2.2.4. Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España, 2014 | 7 |
| 2.2.5. Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2014 | 7 |
| 2.2.6. Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España, 2014 | 8 |
| 2.2.7. Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según tipo de sustancia psicoactiva (total, hombres y mujeres). España, 2014 | 8 |

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2014

2.2.1.

Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España*, 1996-2014.



| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cocaína | 19,9 | 25,0 | 31,6 | 39,4 | 40,9 | 40,5 | 44,7 | 50,0 | 55,5 | 51,1 | 53,8 | 55,1 | 51,1 | 49,5 | 45,2 | 46,0 | 44,9 | 43,7 |
| Alcohol | 12,4 | 15,2 | 22,2 | 20,0 | 26,8 | 29,0 | 35,4 | 30,7 | 32,3 | 36,0 | 35,7 | 37,3 | 40,2 | 36,3 | 40,4 | 39,0 | 38,7 | 38,7 |
| Cannabis | 6,2 | 6,6 | 8,9 | 9,3 | 12,8 | 16,9 | 19,9 | 19,3 | 21,7 | 23,9 | 22,9 | 24,7 | 29,5 | 30,5 | 33,3 | 33,0 | 34,6 | 35,5 |
| Hipnosedantes | 23,6 | 18,9 | 24,3 | 23,8 | 28,9 | 29,2 | 30,1 | 22,3 | 17,0 | 21,0 | 15,8 | 15,6 | 16,5 | 16,7 | 18,9 | 18,3 | 17,8 | 18,5 |
| Heroína | 56,1 | 50,9 | 38,7 | 33,0 | 35,3 | 29,2 | 21,4 | 17,5 | 19,0 | 16,9 | 16,9 | 17,2 | 17,1 | 17,8 | 14,2 | 13,0 | 11,9 | 10,3 |
| Anfetaminas | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 9,8 | 2,2 | 4,2 | 3,4 | 2,3 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,5 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 8,6 |
| Otros opioides | 13,5 | 17,4 | 16,8 | 18,9 | 18,0 | 17,4 | 13,1 | 9,1 | 8,3 | 8,5 | 8,1 | 7,5 | 7,6 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 5,7 | 7,6 |
| MDMA y derivados | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | 4,4 | 5,3 | 3,2 | 4,7 | 6,4 | 5,0 | 4,2 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,6 | 4,8 | 4,5 |
| Otras sustancias | 4,1 | 3,2 | 4,9 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 8,7 | 3,3 | 4,9 | 6,0 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 2,6 |
| Alucinógenos | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| Inhalables volátiles | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2.

Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España*, 1996-2014.

| | Nº de episodios | Cocaína | Alcohol | Cannabis | Hipnóticos y sedantes | Heroína | Anfetaminas | Otros opiáceos | Éxtasis y derivados | Alucinógenos | Inhalables volátiles |
|------|-----------------|---------|---------|----------|-----------------------|---------|-------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1996 | 2.585 | 19,9 | 12,4 | 6,2 | 23,6 | 56,1 | 2,2 | 13,5 | 1,3 | 2,1 | 0,2 |
| 1997 | 1.932 | 25,0 | 15,2 | 6,6 | 18,9 | 50,9 | 2,9 | 17,4 | 2,2 | 1,8 | 0,1 |
| 1998 | 2.099 | 31,6 | 22,2 | 8,9 | 24,3 | 38,7 | 3,0 | 16,8 | 2,2 | 2,4 | 0,3 |
| 1999 | 2.141 | 39,4 | 20,0 | 9,3 | 23,8 | 33,0 | 9,8 | 18,9 | 2,4 | 1,7 | 0,1 |
| 2000 | 2.328 | 40,9 | 26,8 | 12,8 | 28,9 | 35,3 | 2,2 | 18,0 | 4,5 | 2,7 | 0,3 |
| 2001 | 2.145 | 40,5 | 29,0 | 16,9 | 29,2 | 29,2 | 4,2 | 17,4 | 4,4 | 1,9 | 0,9 |
| 2002 | 2.673 | 44,7 | 35,4 | 19,9 | 30,1 | 21,4 | 3,4 | 13,1 | 5,3 | 1,3 | 0,2 |
| 2004 | 5.828 | 50,0 | 30,7 | 19,3 | 22,3 | 17,5 | 2,3 | 9,1 | 3,2 | 0,8 | 0,6 |
| 2005 | 7.089 | 55,5 | 32,3 | 21,7 | 17,0 | 19,0 | 4,2 | 8,3 | 4,7 | 1,7 | 0,5 |
| 2006 | 7.042 | 51,1 | 36,0 | 23,9 | 21,0 | 16,9 | 4,7 | 8,5 | 6,4 | 1,7 | 0,4 |
| 2007 | 7.822 | 53,8 | 35,7 | 22,9 | 15,8 | 16,9 | 4,2 | 8,1 | 5,0 | 2,0 | 0,5 |
| 2008 | 6.431 | 55,1 | 37,3 | 24,7 | 15,6 | 17,2 | 4,4 | 7,5 | 4,2 | 1,6 | 0,5 |
| 2009 | 5.567 | 51,1 | 40,2 | 29,5 | 16,5 | 17,1 | 4,6 | 7,6 | 2,4 | 2,6 | 0,5 |
| 2010 | 5.626 | 49,5 | 36,3 | 30,5 | 16,7 | 17,8 | 5,5 | 6,7 | 2,9 | 1,7 | 0,4 |
| 2011 | 5.279 | 45,2 | 40,4 | 33,3 | 18,9 | 14,2 | 9,2 | 6,2 | 3,9 | 2,1 | 0,3 |
| 2012 | 5.999 | 46,0 | 39,0 | 33,0 | 18,3 | 13,0 | 8,9 | 6,1 | 4,6 | 2,5 | 0,5 |
| 2013 | 5.715 | 44,9 | 38,7 | 34,6 | 17,8 | 11,9 | 9,0 | 5,7 | 4,8 | 2,5 | 0,4 |
| 2014 | 6.441 | 43,7 | 38,7 | 35,5 | 18,5 | 10,3 | 8,6 | 7,6 | 4,5 | 2,5 | 0,3 |

El sumatorio de los porcentajes supera el 100% debido a que en cada episodio puede aparecer más de una sustancia.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1996-2014.

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Número de episodios | 2.585 | 1.932 | 2.099 | 2.141 | 2.328 | 2.145 | 2.673 | 5.828 | 7.089 | 7.042 | 7.822 | 6.431 | 5.567 | 5.626 | 5.279 | 5.999 | 5.715 | 6.441 |
| Edad media (años) | 27,8 | 28,1 | 29,1 | 29,4 | 30,3 | 29,8 | 29,8 | 31,0 | 30,7 | 31,6 | 32,0 | 32,4 | 33,0 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 33,0 | 33,2 |
| Sexo (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres | 21,4 | 20,8 | 23,1 | 23,5 | 27,4 | 27,1 | 27,4 | 28,0 | 25,0 | 26,1 | 23,4 | 22,7 | 21,6 | 26,3 | 24,7 | 26,1 | 26,1 | 24,5 |
| Condición legal (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detenido | 14,4 | 22,4 | 11,7 | 9,4 | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 4,1 | 4,9 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 4,3 |
| Resolución urgencia (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alta médica | 80,5 | 82,0 | 81,2 | 80,9 | 78,7 | 79,1 | 82,1 | 81,4 | 79,1 | 76,2 | 79,1 | 80,0 | 80,9 | 79,6 | 75,4 | 75,9 | 72,8 | 69,8 |
| Alta voluntaria | 7,0 | 6,7 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 7,5 | 7,4 | 5,3 | 6,7 | 8,6 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 7,0 | 8,5 | 8,2 | 9,4 | 9,9 |
| Ingreso hospitalario | 7,6 | 7,2 | 6,0 | 6,5 | 8,3 | 7,8 | 6,3 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 7,8 | 8,1 | 10,2 | 12,5 | 12,5 | 14,8 | 15,9 |
| Muerte en urgencias | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Traslado a otro centro | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 5,4 | 4,0 | 5,3 | 5,7 | 6,3 | 4,1 | 3,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 4,2 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España*, 2014.

| | Total | Según sexo | | Según droga | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------|---------|-------------|---------|----------|---------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Hombres | Mujeres | Cocaína | Alcohol | Cannabis | Hipnosedantes | Heroína | Anfetaminas | Otros opiáceos | Éxtasis y der. | Alucinógenos | I. volátiles |
| Número de episodios | 6.441 | 4.857 | 1.580 | 2.651 | 2.349 | 2.154 | 1.124 | 623 | 524 | 464 | 274 | 150 | 17 |
| Edad media (años) | 33,2 | 33,6 | 32,0 | 34,4 | 34,3 | 29,9 | 35,6 | 38,5 | 30,7 | 39,7 | 27,6 | 28,6 | 31,2 |
| Sexo (% mujeres) | 24,5 | - | - | 23,1 | 23,7 | 21,9 | 27,7 | 15,4 | 24,5 | 21,8 | 29,6 | 25,3 | 58,8 |
| Detenidos (%) | 4,3 | 4,8 | 2,6 | 5,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 5,6 | 2,3 | 6,9 | 1,8 | 10,8 | 17,6 |
| Resolución de la urgencia (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Alta médica | 69,8 | 69,8 | 70,2 | 70,3 | 72,5 | 69,2 | 67,6 | 60,5 | 74,3 | 66,2 | 79,1 | 59,2 | 66,7 |
| Alta voluntaria | 9,9 | 10,1 | 9,1 | 9,2 | 11,1 | 6,7 | 9,9 | 12,8 | 10,6 | 8,8 | 12,6 | 12,3 | 6,7 |
| Ingreso hospitalario | 15,9 | 16,1 | 15,7 | 15,7 | 13,9 | 20,2 | 17,0 | 18,8 | 10,8 | 20,0 | 5,3 | 16,2 | 26,7 |
| Muerte en urgencias | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Traslado a otro centro | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 4,6 | 2,5 | 3,9 | 5,5 | 7,9 | 4,4 | 4,7 | 2,9 | 12,3 | 0,0 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España*, 2014.

| Vía de administración | Cocaína | Cannabis | Hipnosedantes | Heroína | Anfetaminas | Otros opiáceos | Éxtasis y der. | Alucinógenos |
|------------------------|---------|----------|---------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Oral | 2,3 | 5,3 | 98,8 | 1,5 | 71,9 | 89,3 | 95,3 | 37,1 |
| Pulmonar o esnifada | 10,4 | 93,5 | 0,8 | 25,7 | 4,5 | 1,8 | 1,6 | 2,2 |
| Intranasal o esnifada | 72,7 | 0,7 | 0,2 | 5,2 | 21,9 | 0,0 | 2,4 | 16,9 |
| Parenteral o inyectada | 14,4 | 0,2 | 0,2 | 67,7 | 1,7 | 7,7 | 0,8 | 43,8 |
| Otra vía | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España*, 2014.


| | Total | Hombres | Mujeres |
|----------------------|-------|---------|---------|
| Cocaína | 43,7 | 44,4 | 41,3 |
| Alcohol | 38,7 | 39,1 | 37,5 |
| Cannabis | 35,5 | 36,7 | 31,8 |
| Hipnosedantes | 18,5 | 17,7 | 21,0 |
| Heroína | 10,3 | 11,5 | 6,5 |
| Anfetaminas | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Otros opioides | 7,6 | 7,9 | 6,8 |
| MDMA y derivados | 4,5 | 4,2 | 5,5 |
| Otras sustancias | 2,6 | 2,1 | 4,0 |
| Alucinógenos | 2,5 | 2,4 | 2,6 |
| Inhalables volátiles | 0,3 | 0,2 | 0,7 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.7.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según tipo de sustancia psicoactiva (total, hombres y mujeres). España*, 2014.



| | Cocaína | Alcohol | Cannabis | Hipnosedantes | Heroína | Anfetaminas | Otros opioides | MDMA y der. | Otras sust. | Alucinógenos | I. volátiles |
|---------|---------|---------|----------|---------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Total | 43,7 | 38,7 | 35,5 | 18,5 | 10,3 | 8,6 | 7,6 | 4,5 | 2,6 | 2,5 | 0,3 |
| Hombres | 44,4 | 39,1 | 36,7 | 17,7 | 11,5 | 8,6 | 7,9 | 4,2 | 2,1 | 2,4 | 0,2 |
| Mujeres | 41,3 | 37,5 | 31,8 | 21,0 | 6,5 | 8,6 | 6,8 | 5,5 | 4,0 | 2,6 | 0,7 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.