

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2012

Tabla 1.2.1.

Distribución de la muestra de la encuesta ESTUDES 2012 por Comunidad/Ciudad Autónoma.

CCAA	Número de colegios			Número de alumnos			Error muestral***
	PNSD*	Ampliación**	Tamaño final	PNSD*	Ampliación**	Tamaño final	
Andalucía	63	–	63	2.378	–	2.378	2,1%
Aragón	24	44	68	870	1.594	2.464	2,0%
Asturias	25	34	59	858	1.166	2.024	2,2%
Baleares	22	–	22	806	–	806	3,5%
Canarias	32	–	32	1.155	–	1.155	2,9%
Cantabria	23	35	58	763	1.160	1.923	2,3%
Castilla-La Mancha	30	13	43	1.201	520	1.721	2,4%
Castilla y León	33	–	33	1.151	–	1.151	2,9%
Cataluña	55	–	55	2.353	–	2.353	2,1%
C. Valenciana	48	–	48	1.696	–	1.696	2,4%
Extremadura	27	–	27	860	–	860	3,4%
Galicia	38	22	60	1.281	741	2.022	2,2%
Madrid	52	29	81	2.086	1.164	3.250	1,8%
Murcia	27	–	27	1.054	–	1.054	3,1%
Navarra	17	–	17	605	–	605	4,1%
País Vasco	30	–	30	1.096	–	1.096	3,0%
La Rioja	12	–	12	477	–	477	4,6%
Ceuta	6	–	6	232	–	232	6,6%
Melilla	6	–	6	236	–	236	6,5%
Total España	570	177	747	21.157	6.346	27.503	0,6%

* Muestra financiada por el PNSD.

** Muestra financiada por las CCAA

*** Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95% y $p=q=0,5$

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.2.

Evolución del tamaño de muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.




1.2.3.

Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.




1.2.4.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.




1.2.5.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.




1.2.6.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.8.

Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5
Hipnosedantes* (sin receta)	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9
Cánnabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4
Cocaína (polvo y/o base)	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9
GHB	-	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.9.

Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6
Hipnosedantes* (sin receta)	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8
Cánnabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7
Cocaína (polvo y/o base)	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2
GHB	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.10.

Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	37,4	27,8	32,4	26,2	29,7
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	3,6	5,1	5,2	6,6
Hipnosedantes* (sin receta)	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4
Cánnabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0
Cocaína (polvo y/o base)	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8
GHB	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	0,5	0,7

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.11.

Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	21,6	23,7	23,1	23	21	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5
Alcohol	–	–	–	–	–	–	1,9	2,9	6,0	2,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	0,4	0,6	0,7	0,9
Hipnosedantes* (sin receta)	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3
Cánnabis	1,0	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.12.

Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.13.

Evolución de la edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6
Tabaco (consumo diario)	–	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5
Alcohol	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9
Alcohol (consumo semanal)	–	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	15,6	14,8	15,1
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	13,8	14,0	13,9	14,3
Hipnosedantes* (sin receta)	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,2	14,6
Cánnabis	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9
Cocaína (polvo y/o base)	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,3	15,3	14,9	15,5
Cocaína polvo	–	–	–	–	–	–	15,4	15,4	15,4	15,6
Cocaína base	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,2
Heroína	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4
Anfetaminas	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5
Alucinógenos	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4
Inhalables volátiles	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4
Éxtasis	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8
GHB	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,1

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.14.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
	T	H	M	14 T	14 H	14 M	15 T	15 H	15 M	16 T	16 H	16 M	17 T	17 H	17 M	18 T	18 H	18 M
Alguna droga ilegal ¹	34,1	37,0	31,2	13,9	15,7	12,1	23,3	24,1	22,6	33,0	36,0	30,2	43,6	47,9	39,1	51,7	54,5	48,6
Alguna droga ilegal sin cánnabis ²	6,3	8,2	4,4	2,6	3,3	1,9	3,7	4,0	3,5	5,2	7,0	3,6	7,8	9,8	5,8	12,2	16,8	7,0
Alguna droga excepto alcohol y tabaco ³	44,0	43,5	44,4	23,9	23,9	23,8	33,5	30,8	36,2	43,5	42,7	44,4	52,6	53,6	51,6	61,4	60,1	62,8
Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes ⁴	34,5	37,4	31,6	14,8	16,6	13,0	23,6	24,3	22,9	33,5	36,4	30,7	43,9	48,2	39,4	51,9	54,7	48,9
Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnos. con receta ⁵	38,6	40,0	37,2	18,7	19,8	17,6	27,6	26,3	28,8	38,1	39,1	37,2	47,6	50,6	44,5	56,3	57,5	54,9
Tabaco	43,8	41,6	46,1	27,1	24,2	30,0	35,4	31,2	39,4	43,0	40,6	45,2	50,9	50,0	51,9	59,1	56,6	61,9
Borracheras	60,7	59,9	61,5	31,5	29,2	33,8	47,4	42,6	52,0	62,3	61,5	63,1	73,1	74,1	72,1	80,4	81,3	79,4
Alcohol	83,9	82,9	84,9	65,9	63,2	68,6	77,7	75,7	79,6	86,2	84,8	87,5	90,8	90,4	91,2	92,6	93,2	92,1
Hipnosedantes ⁶ (con/sin receta)	18,5	14,1	23,0	12,7	10,5	14,9	15,8	11,7	19,8	18,5	13,8	23,0	20,4	15,3	25,8	23,8	18,2	30,0
Hipnosedantes ⁶ (sin receta)	8,9	6,9	11,0	5,8	5,1	6,5	6,9	4,4	9,4	9,3	6,9	11,7	9,9	7,8	12,1	12,1	10,1	14,3
Cánnabis	33,6	36,3	30,7	13,5	15,2	11,7	22,9	23,6	22,3	32,5	35,3	29,9	43,1	47,2	38,8	50,7	53,2	47,9
Cocaína (polvo y/o base)	3,6	4,8	2,5	1,4	1,9	0,9	2,1	2,4	1,8	2,8	3,8	1,9	4,4	5,7	3,1	7,6	10,2	4,7
Cocaína en polvo	2,9	3,9	1,8	0,8	1,3	0,4	1,4	1,7	1,1	2,2	3,0	1,5	3,5	4,6	2,3	6,6	9,0	4,0
Cocaína base	2,2	3,0	1,4	1,1	1,5	0,8	1,6	1,7	1,5	1,8	2,7	1,0	2,6	3,4	1,8	3,9	5,7	1,9
Éxtasis	3,0	3,9	2,0	1,1	1,5	0,6	1,6	1,6	1,6	2,5	3,2	1,8	3,9	4,9	2,9	5,6	8,1	2,8
Anfetaminas/speed	2,4	3,2	1,5	0,9	1,2	0,5	1,2	1,3	1,1	2,0	2,7	1,3	3,1	4,0	2,2	4,5	6,6	2,1
Alucinógenos	3,1	4,1	2,1	1,2	1,7	0,7	2,0	2,0	1,9	2,7	3,8	1,6	3,7	4,7	2,7	6,0	8,4	3,3
Heroína	1,0	1,4	0,5	0,6	1,0	0,2	1,0	0,9	1,0	0,9	1,5	0,3	1,2	1,7	0,7	0,9	1,6	0,3
Inhalables volátiles	1,9	2,4	1,3	1,7	2,1	1,3	1,4	1,3	1,5	2,0	2,7	1,2	2,1	2,9	1,2	2,0	2,9	1,1
GHB	1,3	1,9	0,8	0,6	1,0	0,3	0,9	0,8	1,0	1,4	2,3	0,5	1,5	1,9	1,1	2,2	3,4	0,9
Ketamina	1,1	1,5	0,7	0,6	0,8	0,5	0,8	0,9	0,7	1,0	1,5	0,6	1,3	1,8	0,8	1,6	2,3	0,7
Spice	1,4	1,9	1,0	0,4	0,6	0,2	0,8	0,8	0,8	1,3	2,2	0,4	1,9	2,5	1,3	2,5	2,7	2,1
Piperazinas	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5	0,9	0,2	0,5	0,7	0,3	0,3	0,3	0,4
Mefedrona	0,5	0,7	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0	0,1	0,6	1,0	0,3	0,3	0,2	0,4
Nexus	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	1,0	0,1	0,7	1,1	0,3	0,5	0,5	0,4
Metanfetamina	0,9	1,3	0,6	0,4	0,5	0,2	0,6	0,7	0,6	0,9	1,3	0,5	1,2	1,7	0,7	1,4	1,9	0,8
Setas mágicas	2,2	3,0	1,4	0,8	1,4	0,3	1,2	1,2	1,2	1,8	2,8	0,8	2,9	3,7	1,9	4,4	6,0	2,7
Research chemicals	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,1	0,5	0,7	0,2	0,4	0,4	0,5
Legal highs	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,1	0,5	0,4	0,6	0,4	0,8	0,1	0,5	0,7	0,3	0,3	0,4	0,3
Salvia	0,8	1,2	0,4	0,5	0,7	0,2	0,7	0,8	0,7	0,7	1,2	0,2	0,9	1,3	0,5	1,2	2,0	0,4
Esteroides anabolizantes	0,7	1,1	0,3	0,5	0,9	0,2	0,6	0,8	0,5	0,7	1,3	0,1	1,0	1,6	0,4	0,6	0,8	0,4

1. Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlo.

2. Alguna droga ilegal sin cánnabis: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

3. Alguna droga excepto alcohol y tabaco: hipnosedantes en general + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

4. Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes (ni con y/o sin, ni sin): inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

5. Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnosedantes con receta (son aquellas personas que han contestado que consumen hipnosedantes en general pero no han contestado sin receta): hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína.

6. Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
	T	H	M	14 T	14 H	14 M	15 T	15 H	15 M	16 T	16 H	16 M	17 T	17 H	17 M	18 T	18 H	18 M
Alguna droga ilegal ¹	27,1	30,5	23,7	11,0	12,0	9,9	19,2	20,0	18,5	26,9	29,9	24,2	34,8	39,7	29,5	39,4	44,7	33,4
Alguna droga ilegal sin cánnabis ²	4,4	6,1	2,7	1,9	2,2	1,5	2,7	3,2	2,3	4,0	5,6	2,5	5,2	6,9	3,4	8,2	12,2	3,6
Alguna droga excepto alcohol y tabaco ³	34,4	35,1	33,8	17,4	17,0	17,8	26,0	24,2	27,6	34,2	34,4	33,9	42,0	44,0	39,9	48,3	50,0	46,4
Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnos. ⁴	27,4	30,8	24,0	11,5	12,6	10,3	19,5	20,3	18,7	27,2	30,1	24,4	35,1	40,1	29,8	39,6	44,9	33,7
Alguna droga sin alcohol, tabaco e hipnos. con receta ⁵	30,7	32,9	28,5	14,2	14,7	13,7	22,3	21,5	22,9	30,5	32,2	29,0	38,3	42,3	34,1	44,0	47,8	39,8
Tabaco	35,3	33,1	37,5	20,6	16,9	24,5	28,6	24,7	32,3	34,7	32,2	37,1	40,9	40,0	41,9	48,6	47,3	50,1
Borracheras	52,0	51,7	52,3	26,1	23,1	29,2	40,2	35,5	44,6	53,4	52,6	54,1	62,6	65,1	60,1	70,5	73,1	67,6
Alcohol	81,9	80,9	82,9	63,1	60,0	66,2	75,3	73,2	77,3	84,2	82,9	85,4	89,2	89,0	89,5	91,3	91,9	90,5
Alcohol + cánnabis	26,1	29,1	23,1	10,2	10,9	9,4	18,5	19,1	17,9	26,1	28,7	23,7	33,6	38,0	29,0	37,8	42,9	32,2
Alcohol + cocaína (polvo y/o base)	2,4	3,2	1,5	1,0	1,2	0,7	1,5	1,7	1,3	2,1	3,0	1,2	2,7	3,4	2,0	4,8	6,8	2,5
Hipnosedantes ⁶ (con/sin receta)	11,6	8,4	14,9	7,8	6,1	9,5	9,9	7,0	12,7	11,6	7,9	15,1	12,9	9,2	16,8	15,0	11,3	19,1
Hipnosedantes ⁶ (sin receta)	5,8	4,4	7,3	3,7	3,2	4,3	4,5	2,7	6,3	6,0	4,0	7,8	6,4	5,1	7,8	7,9	6,5	9,5
Cánnabis	26,6	29,7	23,3	10,5	11,5	9,5	18,9	19,6	18,2	26,4	29,1	23,9	34,1	38,8	29,1	38,4	43,7	32,5
Cocaína (polvo y/o base)	2,5	3,4	1,6	1,0	1,3	0,7	1,5	1,8	1,3	2,2	3,2	1,2	2,9	3,8	2,0	4,8	6,9	2,5
Cocaína en polvo	2,0	2,8	1,2	0,7	1,1	0,4	1,0	1,2	0,8	1,8	2,5	1,1	2,3	3,1	1,5	4,3	6,3	2,1
Cocaína base	1,6	2,2	1,0	0,9	1,1	0,6	1,2	1,2	1,1	1,4	2,3	0,6	1,8	2,3	1,2	2,8	4,2	1,3
Éxtasis	2,2	3,0	1,4	0,9	1,1	0,6	1,0	1,1	1,0	2,1	2,8	1,4	2,8	3,6	1,9	3,8	5,9	1,6
Anfetaminas/speed	1,7	2,4	1,1	0,7	1,0	0,4	0,9	1,0	0,9	1,5	2,3	0,8	2,4	3,2	1,6	2,8	4,1	1,5
Alucinógenos	2,0	2,9	1,1	0,9	1,2	0,5	1,4	1,6	1,2	1,9	2,8	1,0	2,2	3,2	1,3	3,5	5,6	1,2
Heroína	0,7	1,1	0,4	0,5	0,9	0,2	0,8	0,9	0,7	0,8	1,3	0,3	0,8	1,2	0,4	0,5	0,7	0,3
Inhalables volátiles	1,2	1,6	0,8	1,1	1,5	0,7	0,9	1,0	0,8	1,4	1,9	0,9	1,3	1,8	0,9	1,1	1,5	0,6
GHB	1,0	1,5	0,5	0,5	0,8	0,3	0,7	0,6	0,7	1,1	2,0	0,4	1,1	1,5	0,6	1,7	2,6	0,8
Ketamina	0,7	0,9	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,6	0,4	0,7	1,1	0,4	0,9	1,1	0,6	0,6	1,0	0,3
Spice	1,0	1,3	0,7	0,2	0,4	0,1	0,6	0,6	0,6	1,0	1,7	0,3	1,4	1,7	1,0	1,6	1,7	1,5
Piperazinas	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,1	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,3	0,4	0,9	0,0	0,4	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
Nexus	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,3	0,5	0,9	0,1	0,5	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0
Metanfetamina	0,7	1,0	0,4	0,2	0,3	0,1	0,5	0,6	0,5	0,7	1,2	0,3	0,9	1,3	0,5	0,9	1,3	0,4
Setas mágicas	1,4	2,1	0,8	0,6	1,0	0,2	0,9	0,8	0,9	1,2	1,9	0,4	1,9	2,6	1,1	2,4	3,9	0,8
Research chemicals	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,7	0,0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Legal highs	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,0	0,4	0,4	0,5	0,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,2	0,1	0,3	0,0
Salvia	0,5	0,9	0,2	0,4	0,7	0,1	0,5	0,5	0,4	0,5	1,0	0,1	0,7	0,9	0,4	0,6	1,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,5	0,8	0,2	0,4	0,7	0,1	0,5	0,6	0,3	0,4	0,8	0,1	0,7	1,1	0,3	0,2	0,4	0,0

1. Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlo.

2. Alguna droga ilegal sin cánnabis: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

3. Alguna droga excepto alcohol y tabaco: hipnosedantes en general + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

4. Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes (ni con y/o sin, ni sin): inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

5. Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnosedantes con receta (son aquellas personas que han contestado que consumen hipnosedantes en general pero no han contestado sin receta): hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína.

6. Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.16.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
	T	H	M	14 T	14 H	14 M	15 T	15 H	15 M	16 T	16 H	16 M	17 T	17 H	17 M	18 T	18 H	18 M
Alguna droga ilegal ¹	16,7	19,9	13,6	6,2	6,8	5,5	11,8	12,8	10,8	16,4	19,3	13,7	21,3	25,4	16,9	25,6	31,4	19,0
Alguna droga ilegal sin cánnabis ²	2,5	3,8	1,3	1,1	1,3	0,9	1,5	1,8	1,1	2,2	3,4	1,1	3,0	4,3	1,7	4,9	8,0	1,4
Alguna droga excepto alcohol y tabaco ³	21,8	23,2	20,4	10,1	9,9	10,4	16,4	15,9	16,8	21,1	22,4	19,9	26,7	28,8	24,4	32,1	35,3	28,5
Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes ⁴	16,9	20,1	13,8	6,5	7,3	5,7	11,9	12,9	11,0	16,5	19,4	13,9	21,5	25,6	17,3	25,8	31,8	19,2
Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnos. con receta ⁵	19,3	21,7	16,9	8,2	8,5	8,0	13,9	14,0	13,8	18,9	20,9	17,0	24,1	27,6	20,4	28,9	33,7	23,5
Tabaco	29,7	28,1	31,3	15,6	13,0	18,3	23,3	19,8	26,6	29,1	27,1	31,0	34,6	34,7	34,5	43,2	41,8	44,8
Borracheras	30,8	31,3	30,3	12,7	10,8	14,6	21,3	17,8	24,6	30,9	32,2	29,7	38,8	41,5	36,0	46,5	48,4	44,4
Binge drinking	41,8	44,1	39,6	20,3	18,4	22,1	30,4	28,2	32,6	42,6	44,8	40,4	50,7	55,8	45,3	59,9	65,1	54,3
Alcohol	74,0	72,9	75,2	53,2	49,5	57,0	66,0	63,1	68,8	75,6	74,5	76,7	82,4	81,7	83,2	86,4	88,0	84,6
Hipnosedantes ⁶ (con/sin receta)	6,6	4,7	8,5	4,5	3,3	5,7	5,9	4,4	7,4	6,3	4,5	8,1	7,3	5,1	9,7	8,7	6,0	11,6
Hipnosedantes ⁶ (sin receta)	3,4	2,6	4,3	2,3	1,8	2,8	2,9	1,8	3,9	3,4	2,4	4,3	3,9	3,2	4,6	4,6	3,7	5,6
Cánnabis	16,1	18,9	13,3	5,6	6,2	5,1	11,4	12,2	10,6	15,9	18,7	13,3	20,6	24,4	16,6	24,5	29,7	18,9
Cocaína (polvo y/o base)	1,5	2,2	0,8	0,6	0,7	0,4	0,9	1,0	0,7	1,4	2,2	0,6	1,6	2,3	0,9	3,0	4,8	1,1
Cocaína en polvo	1,1	1,7	0,5	0,4	0,6	0,2	0,6	0,7	0,6	1,1	1,6	0,5	1,1	1,8	0,4	2,4	4,0	0,7
Cocaína base	1,1	1,6	0,6	0,5	0,6	0,4	0,7	0,7	0,6	1,0	1,7	0,3	1,2	1,6	0,8	2,1	3,2	0,9
Éxtasis	1,2	1,8	0,6	0,5	0,7	0,3	0,6	0,6	0,5	1,1	1,7	0,5	1,7	2,4	1,0	2,0	3,2	0,7
Anfetaminas/speed	1,0	1,4	0,6	0,5	0,7	0,3	0,6	0,5	0,6	0,7	1,1	0,3	1,5	2,1	0,8	1,7	2,6	0,7
Alucinógenos	1,0	1,6	0,4	0,3	0,5	0,2	0,7	0,7	0,6	1,1	1,8	0,4	1,4	2,1	0,6	1,5	2,6	0,3
Heroína	0,6	0,8	0,3	0,3	0,5	0,2	0,5	0,6	0,4	0,6	1,0	0,3	0,7	1,1	0,4	0,5	0,7	0,2
Inhalables volátiles	0,8	1,0	0,6	0,7	1,1	0,2	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	0,6	0,8	0,9	0,7	0,9	1,3	0,5
GHB	0,7	1,0	0,3	0,3	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,7	1,2	0,2	0,8	1,3	0,3	1,0	1,6	0,3
Ketamina	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,2	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	0,0
Spice	0,6	0,9	0,3	0,2	0,4	0,0	0,4	0,5	0,3	0,6	1,1	0,2	0,8	1,1	0,5	0,9	1,1	0,6
Piperazinas	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,0	0,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0
Mefedrona	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,0	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0
Nexus	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,0	0,4	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0
Metanfetamina	0,4	0,6	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,4	0,3	0,4	0,8	0,1	0,5	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0
Setas mágicas	0,6	1,0	0,3	0,3	0,7	0,0	0,5	0,4	0,5	0,6	1,2	0,1	0,8	1,1	0,5	0,8	1,3	0,3
Research chemicals	0,2	0,3	0,1	0,2	0,5	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Legal highs	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,0	0,4	0,2	0,5	0,2	0,4	0,0	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0
Salvia	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,0	0,4	0,5	0,2	0,3	0,6	0,0
Esteroides anabolizantes	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,0	0,5	0,7	0,3	0,2	0,3	0,0

1. Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlo.

2. Alguna droga ilegal sin cánnabis: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

3. Alguna droga excepto alcohol y tabaco: hipnosedantes en general + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

4. Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes (ni con y/o sin, ni sin): inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

5. Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnosedantes con receta (son aquellas personas que han contestado que consumen hipnosedantes en general pero no han contestado sin receta): hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína.

6. Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.17.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
	T	H	M	14 T	14 H	14 M	15 T	15 H	15 M	16 T	16 H	16 M	17 T	17 H	17 M	18 T	18 H	18 M
Tabaco	12,5	12,0	13,1	2,4	2,0	2,7	6,8	5,7	7,8	11,5	10,2	12,7	16,8	17,0	16,7	23,4	22,4	24,5
Borracheras	0,5	0,7	0,4	0,2	0,3	0,0	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,1	0,7	0,9	0,4	1,2	1,4	1,0
Binge drinking	1,2	1,6	0,8	0,6	0,7	0,5	0,8	1,0	0,6	1,1	1,4	0,8	1,5	2,1	0,9	2,1	2,5	1,5
Alcohol	2,7	3,3	2,0	1,1	1,3	1,0	1,9	2,0	1,7	2,2	2,8	1,7	3,1	4,2	2,0	4,9	5,8	4,0
Hipnosedantes* (con/sin receta)	0,9	0,9	0,8	0,6	0,8	0,4	0,7	0,9	0,6	0,8	0,8	0,7	1,2	0,9	1,4	0,9	1,1	0,7
Cánnabis	2,7	3,8	1,5	0,3	0,5	0,2	1,2	1,4	1,0	2,0	2,8	1,3	4,1	5,9	2,1	5,4	7,7	2,9

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.18.

Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Tabaco	56,6	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	
Alcohol	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	
Hipnosedantes* (con/sin receta)	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	
Hipnosedantes* (sin receta)	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	
Cánnabis	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	
Éxtasis	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	
Alucinógenos	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	
Anfetaminas	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	
Cocaína (polvo y/o base)	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	
Heroína	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	
Inhalables volátiles	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.19.

Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5
Alcohol	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9
Hipnosedantes* (sin receta)	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3
Cánnabis	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3
Éxtasis	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4
Alucinógenos	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1
Anfetaminas	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1
Cocaína (polvo y/o base)	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6
Heroína	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4
Inhalables volátiles	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.20.

Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	32,9	41,9	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3
Alcohol	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5
Hipnosedantes* (sin receta)	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3
Cánnabis	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22	22,3	18,0	23	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3
Éxtasis	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6
Alucinógenos	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4
Anfetaminas	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8	1,3	0,5	1,4	0,6
Cocaína (polvo y/o base)	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8
Heroína	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3
Inhalables volátiles	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.21.

Prevalencias de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			A diario en los últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	41,2	39,1	43,2	33,5	31,5	35,5	28,0	26,0	30,0	11,5	9,5	13,5
Aragón	2.464	55,2	53,2	57,2	46,2	44,2	48,2	39,8	37,8	41,8	22,5	20,5	24,4
Asturias	2.024	45,5	43,4	47,7	38,8	36,7	41,0	32,5	30,3	34,7	13,4	11,2	15,5
Baleares	806	46,5	43,1	50,0	39,0	35,5	42,5	33,7	30,3	37,2	10,0	6,6	13,5
Canarias	1.155	35,5	32,6	38,3	28,5	25,6	31,4	22,1	19,3	25,0	6,3	3,4	9,2
Cantabria	1.923	40,2	38,0	42,4	33,6	31,3	35,8	28,2	26,0	30,4	13,7	11,5	15,9
Castilla y León	1.151	47,9	45,0	50,8	38,3	35,4	41,2	32,8	29,9	35,7	15,8	12,9	18,7
Castilla-La Mancha	1.721	42,2	39,9	44,6	34,6	32,2	36,9	30,1	27,7	32,5	14,3	11,9	16,6
Cataluña	2.353	46,5	44,4	48,5	37,1	35,1	39,2	30,0	28,0	32,0	12,4	10,4	14,5
C. Valenciana	1.696	43,3	40,9	45,7	34,4	32,0	36,8	30,0	27,6	32,3	12,5	10,1	14,9
Extremadura	860	40,2	36,9	43,6	32,7	29,3	36,0	28,2	24,8	31,5	13,4	10,1	16,8
Galicia	2.022	42,7	40,5	44,8	34,1	31,9	36,3	29,1	26,9	31,3	10,5	8,4	12,7
Madrid	3.250	45,5	43,7	47,2	36,9	35,2	38,7	31,3	29,6	33,0	13,8	12,1	15,5
Murcia	1.054	39,3	36,3	42,3	29,7	26,7	32,7	24,6	21,6	27,6	9,7	6,7	12,8
Navarra	605	44,5	40,5	48,5	37,8	33,8	41,8	32,0	28,0	36,0	15,2	11,2	19,2
País Vasco	1.096	46,8	43,8	49,7	35,4	32,4	38,3	29,7	26,7	32,6	11,0	8,1	14,0
Rioja	477	43,4	38,9	47,9	35,7	31,2	40,2	29,1	24,6	33,6	12,2	7,7	16,7
Ceuta	232	24,8	18,3	31,2	19,3	12,9	25,7	15,8	9,4	22,2	2,5	0,0	9,0
Melilla	236	27,0	20,6	33,4	22,8	16,4	29,2	20,1	13,8	26,5	7,8	1,4	14,1
Total	27.503	43,8	43,2	44,4	35,3	34,7	35,9	29,7	29,1	30,3	12,5	11,9	13,1

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.22.

Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	83,3	81,3	85,3	81,6	79,6	83,6	74,1	72,1	76,2
Aragón	2.464	88,4	86,5	90,4	86,9	84,9	88,8	80,4	78,4	82,4
Asturias	2.024	89,3	87,1	91,4	88,1	85,9	90,3	82,1	79,9	84,3
Baleares	806	86,3	82,8	89,7	84,1	80,7	87,6	74,3	70,8	77,7
Canarias	1.155	80,8	77,9	83,6	77,6	74,7	80,5	67,5	64,6	70,4
Cantabria	1.923	84,6	82,3	86,8	82,7	80,5	84,9	76,5	74,3	78,8
Castilla y León	1.151	88,8	85,9	91,7	87,6	84,7	90,5	80,4	77,5	83,3
Castilla-La Mancha	1.721	87,3	84,9	89,6	84,9	82,6	87,3	79,7	77,3	82,1
Cataluña	2.353	79,8	77,7	81,8	78,0	76,0	80,0	70,0	68,0	72,0
C. Valenciana	1.696	87,0	84,6	89,4	84,5	82,1	86,9	74,7	72,3	77,1
Extremadura	860	83,5	80,2	86,8	81,3	77,9	84,6	74,6	71,3	78,0
Galicia	2.022	82,6	80,4	84,8	80,6	78,4	82,7	73,0	70,8	75,2
Madrid	3.250	83,1	81,3	84,8	81,3	79,6	83,0	72,1	70,3	73,8
Murcia	1.054	81,7	78,7	84,7	79,4	76,4	82,4	74,0	70,9	77,0
Navarra	605	86,1	82,1	90,1	83,6	79,6	87,6	76,6	72,6	80,6
País Vasco	1.096	87,7	84,7	90,7	85,4	82,5	88,4	78,2	75,2	81,2
Rioja	477	86,2	81,7	90,7	85,0	80,5	89,5	80,1	75,6	84,6
Ceuta	232	33,0	26,6	39,4	31,3	24,9	37,8	27,9	21,5	34,3
Melilla	236	60,1	53,8	66,5	57,2	50,9	63,6	50,5	44,1	56,9
Total	27.503	83,9	83,3	84,5	81,9	81,3	82,5	74,0	73,4	74,6

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.23.

Prevalencias de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	60,9	58,9	62,9	50,8	48,8	52,8	29,1	27,0	31,1
Aragón	2.464	70,9	69,0	72,9	62,1	60,1	64,0	39,5	37,5	41,4
Asturias	2.024	64,0	61,8	66,2	55,6	53,4	57,8	35,5	33,4	37,7
Baleares	806	63,5	60,1	67,0	54,8	51,3	58,2	27,5	24,1	31,0
Canarias	1.155	53,5	50,6	56,3	43,6	40,7	46,5	21,9	19,0	24,8
Cantabria	1.923	61,4	59,1	63,6	53,5	51,3	55,8	35,3	33,0	37,5
Castilla y León	1.151	68,1	65,2	71,0	61,1	58,2	64,0	39,7	36,8	42,6
Castilla-La Mancha	1.721	65,1	62,7	67,5	55,9	53,6	58,3	35,4	33,0	37,8
Cataluña	2.353	55,4	53,4	57,4	48,0	46,0	50,0	28,5	26,5	30,5
C. Valenciana	1.696	65,8	63,5	68,2	57,6	55,2	60,0	36,6	34,2	39,0
Extremadura	860	56,3	52,9	59,6	45,9	42,6	49,2	26,1	22,8	29,4
Galicia	2.022	55,7	53,6	57,9	47,5	45,3	49,7	28,1	26,0	30,3
Madrid	3.250	59,4	57,7	61,1	51,6	49,8	53,3	29,1	27,3	30,8
Murcia	1.054	55,1	52,1	58,2	44,6	41,6	47,7	21,7	18,6	24,7
Navarra	605	64,8	60,8	68,8	58,2	54,2	62,2	33,4	29,4	37,4
País Vasco	1.096	64,9	61,9	67,8	55,9	53,0	58,9	36,8	33,9	39,8
Rioja	477	64,3	59,8	68,8	58,6	54,1	63,0	40,1	35,6	44,6
Ceuta	232	24,6	18,1	31,0	18,9	12,5	25,3	11,6	5,2	18,1
Melilla	236	36,8	30,4	43,2	26,1	19,7	32,4	17,0	10,6	23,4
Total	27.503	60,7	60,1	61,3	52,0	51,4	52,6	30,8	30,2	31,4

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.24.

Prevalencias de *binge drinking* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Últimos 30 días		
	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	42,7	40,7	44,7
Aragón	51,3	49,3	53,2
Asturias	48,3	46,1	50,4
Baleares	38,5	35,1	42,0
Canarias	35,1	32,2	38,0
Cantabria	45,7	43,5	48,0
Castilla y León	49,0	46,1	51,9
Castilla-La Mancha	50,2	47,8	52,6
Cataluña	34,0	32,0	36,1
C. Valenciana	49,6	47,3	52,0
Extremadura	43,4	40,1	46,8
Galicia	39,2	37,0	41,4
Madrid	36,7	35,0	38,4
Murcia	39,1	36,0	42,1
Navarra	40,4	36,4	44,4
País Vasco	48,3	45,3	51,2
Rioja	46,8	42,3	51,3
Ceuta	15,3	8,8	21,7
Melilla	24,1	17,8	30,5
Total	41,8	41,3	42,4

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.25.

Prevalencias de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	63,7	61,7	65,7	49,5	47,5	51,5
Aragón	2.464	75,0	73,0	76,9	57,0	55,0	59,0
Asturias	2.024	67,5	65,4	69,7	43,1	40,9	45,3
Baleares	806	60,7	57,3	64,2	38,0	34,6	41,5
Canarias	1.155	39,7	36,8	42,6	22,9	20,0	25,8
Cantabria	1.923	59,4	57,2	61,7	43,2	41,0	45,4
Castilla y León	1.151	70,1	67,2	73,0	48,5	45,6	51,4
Castilla-La Mancha	1.721	73,3	71,0	75,7	58,3	55,9	60,6
Cataluña	2.353	51,6	49,6	53,6	31,3	29,3	33,3
C. Valenciana	1.696	68,7	66,3	71,1	48,4	46,0	50,8
Extremadura	860	73,5	70,1	76,8	56,2	52,8	59,5
Galicia	2.022	54,1	51,9	56,3	37,0	34,8	39,2
Madrid	3.250	61,0	59,3	62,8	39,6	37,9	41,3
Murcia	1.054	65,0	61,9	68,0	44,9	41,9	47,9
Navarra	605	57,2	53,2	61,1	35,9	31,9	39,9
País Vasco	1.096	71,1	68,1	74,0	51,0	48,0	53,9
Rioja	477	68,6	64,1	73,1	47,5	43,0	51,9
Ceuta	232	28,1	21,7	34,6	24,8	18,4	31,3
Melilla	236	44,0	37,6	50,4	33,0	26,6	39,4
Total	27.503	62,0	61,4	62,6	43,4	42,8	44,0

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.26.

Prevalencias de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	28,3	26,3	30,3	22,9	20,9	24,9	13,3	11,3	15,3
Aragón	2.464	41,1	39,1	43,1	31,5	29,5	33,5	20,3	18,3	22,3
Asturias	2.024	33,4	31,2	35,6	26,6	24,5	28,8	16,8	14,6	18,9
Baleares	806	40,3	36,9	43,8	33,3	29,9	36,8	17,8	14,3	21,2
Canarias	1.155	31,5	28,6	34,4	25,3	22,4	28,2	15,1	12,2	18,0
Cantabria	1.923	33,0	30,7	35,2	26,6	24,4	28,9	16,0	13,8	18,3
Castilla y León	1.151	34,5	31,6	37,4	25,7	22,8	28,6	15,4	12,5	18,3
Castilla-La Mancha	1.721	31,9	29,5	34,3	23,7	21,4	26,1	15,4	13,0	17,7
Cataluña	2.353	35,9	33,8	37,9	29,0	27,0	31,0	17,3	15,3	19,3
C. Valenciana	1.696	38,4	36,0	40,8	29,4	27,0	31,8	18,4	16,0	20,8
Extremadura	860	22,6	19,3	26,0	17,2	13,8	20,5	11,4	8,0	14,7
Galicia	2.022	29,1	27,0	31,3	24,2	22,0	26,4	16,7	14,5	18,8
Madrid	3.250	36,0	34,3	37,8	28,6	26,9	30,3	16,9	15,2	18,6
Murcia	1.054	26,6	23,6	29,6	20,1	17,1	23,1	10,8	7,8	13,8
Navarra	605	40,6	36,6	44,5	35,2	31,3	39,2	23,5	19,5	27,4
País Vasco	1.096	40,8	37,9	43,8	32,7	29,7	35,6	21,7	18,7	24,6
Rioja	477	30,9	26,5	35,4	22,2	17,7	26,7	13,0	8,5	17,4
Ceuta	232	19,1	12,7	25,6	15,6	9,1	22,0	10,1	3,7	16,6
Melilla	236	20,1	13,8	26,5	13,3	6,9	19,7	8,0	1,6	14,4
Total	27.503	33,6	33,0	34,1	26,6	26,0	27,1	16,1	15,5	16,7

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.27.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño de muestra	Edad media inicio en el consumo de tabaco	Edad media inicio en el consumo de tabaco diario	Edad media inicio en el consumo de alcohol	Edad media inicio en el consumo de cánnabis
Andalucía	2.378	13,6	14,5	14,0	15,1
Aragón	2.464	13,2	14,2	13,5	14,6
Asturias	2.024	13,8	14,6	14,0	14,9
Baleares	806	13,5	14,7	13,9	15,0
Canarias	1.155	14,0	14,4	14,1	15,0
Cantabria	1.923	13,7	14,4	13,9	15,1
Castilla y León	1.151	13,6	14,5	13,6	15,0
Castilla-La Mancha	1.721	13,4	14,4	13,7	14,9
Cataluña	2.353	13,5	14,5	13,9	14,7
C. Valenciana	1.696	13,7	14,6	13,6	14,8
Extremadura	860	13,6	14,5	13,9	14,8
Galicia	2.022	13,7	14,8	14,2	15,1
Madrid	3.250	13,7	14,7	13,9	15,0
Murcia	1.054	13,6	14,4	13,9	14,9
Navarra	605	13,4	14,6	13,8	14,7
País Vasco	1.096	13,6	14,3	13,6	14,6
Rioja	477	13,6	14,3	13,5	14,9
Ceuta	232	14,0	15,1	14,0	15,0
Melilla	236	14,2	14,8	14,5	15,4
Total	27.503	13,6	14,5	13,9	14,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.28.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Cánnabis	Éxtasis	Cocaína en polvo	Heroína	Alucinógenos	GHB	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Hipnosedantes*
Andalucía	2.378	64,9	22,8	31,6	23,6	28,5	19,9	93,3	92,8	50,3
Aragón	2.464	79,2	34,1	42,1	27,1	39,1	26,2	94,9	95,7	56,1
Asturias	2.024	73,1	35,6	44,7	31,3	40,5	31,0	95,4	94,8	62,0
Baleares	806	68,1	21,5	22,4	18,2	27,5	16,8	91,8	91,8	50,8
Canarias	1.155	64,5	26,7	33,7	25,7	27,8	22,5	89,2	88,7	48,2
Cantabria	1.923	71,3	29,7	35,2	25,9	33,6	26,4	93,6	92,9	53,9
Castilla y León	1.151	72,4	26,4	32,8	22,7	30,0	20,8	95,2	93,8	50,8
Castilla-La Mancha	1.721	71,5	24,7	35,5	24,4	31,6	22,3	94,3	94,0	54,2
Cataluña	2.353	68,5	23,3	31,4	22,4	28,2	20,1	90,2	92,5	52,4
C. Valenciana	1.696	71,4	25,9	33,1	23,6	29,0	22,7	92,9	91,6	54,6
Extremadura	860	62,8	24,8	29,3	24,4	25,1	20,5	91,6	91,3	46,4
Galicia	2.022	69,7	31,7	41,4	32,7	38,2	27,7	93,9	92,9	54,4
Madrid	3.250	71,3	28,9	34,1	26,6	35,5	24,6	93,5	93,5	57,2
Murcia	1.054	64,2	23,7	32,1	23,3	26,6	21,0	93,2	92,3	48,9
Navarra	605	77,8	28,5	39,5	23,6	33,0	19,4	94,6	92,5	52,3
País Vasco	1.096	77,2	31,3	40,5	25,8	31,8	26,0	94,7	94,6	64,2
Rioja	477	75,5	28,7	37,2	27,4	36,8	24,6	97,1	96,3	51,8
Ceuta	232	65,9	24,9	28,3	23,7	29,9	20,0	77,4	84,1	49,1
Melilla	236	49,5	26,9	26,5	26,6	25,6	21,6	88,4	88,2	56,3
Total	27.503	69,4	26,2	33,8	24,8	30,9	22,3	92,9	92,8	53,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

Se excluyen de la base los casos que no contestan o no saben.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.29.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes)* por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012.

	Campañas publicitarias	Educación en las escuelas	Tratamiento voluntario a consumidores	Tratamiento obligatorio a consumidores	Administración médica de metadona	Administración médica de heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas contra las drogas	Legalización de cannabis	Legalización de todas las drogas
Andalucía	91,4	96,2	93,9	92,1	88,2	79,0	92,9	88,1	56,6	40,9
Aragón	89,2	95,3	94,0	89,5	87,4	78,8	90,0	84,4	54,4	33,9
Asturias	88,9	94,6	94	89,9	87,6	76,3	91,1	85,5	56,2	36,2
Baleares	93,0	96	95,6	91,3	87,5	81,5	91,6	86,9	60,7	37,6
Canarias	89,8	95,5	94	88,5	88,7	79,0	92,7	85,6	55,9	36,2
Cantabria	89,1	95,0	94,5	90,7	88,1	77,9	91,0	86,2	57,6	38,0
Castilla y León	91,7	96,3	94,6	89,5	87,9	77,3	90,7	85,3	53,9	32,4
Castilla-La Mancha	90,6	94,5	95	88,8	87,3	80,5	91,0	86,5	56,7	39,5
Cataluña	91,2	95,6	93,2	91,2	89,0	83,1	91,0	86,8	63,3	43,0
C. Valenciana	91,9	94,8	93,0	89,8	86,8	80,4	91,5	86,5	62,8	41,2
Extremadura	92,3	96,0	93,9	89,1	87,8	76,5	91,8	86,6	55,4	42,5
Galicia	89,9	95,6	95,1	88,6	88,0	75,6	87,3	81,5	56,1	34,9
Madrid	89,2	96,2	95,5	89,3	89,3	79,1	90,7	85,4	57,0	39,5
Murcia	92,1	95,7	94,3	92,4	89,6	82,6	92,8	88,4	57,9	47,9
Navarra	88,4	94,9	93	85,7	86,0	74,1	86,6	81,3	57,1	37,9
País Vasco	91,9	95,9	95,4	90,7	82,2	70,4	87,8	84,3	61,8	35,4
Rioja	91,6	96,8	94,9	91,2	88,3	80,9	92,0	85,1	50,3	33,2
Ceuta	90,3	96,6	94,5	90,5	89,3	85,5	91,0	88,9	66,7	57,8
Melilla	85,2	90	89,3	88,1	81,7	76,9	89,6	84,1	61,6	50,8
Total	90,9	95,7	94,2	90,3	88,0	79,3	91,2	86,2	58,3	39,6

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.30.

Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han recibido información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012.

	Madre	Padre	Pareja de mi padre o de mi madre	Hermanos/hermanas	Hijos de la pareja de mi padre o de mi madre	Otros familiares	Amigos	Profesores	Profesionales sanitarios	Organismos oficiales	Medios de comunicación	Charlas o cursos sobre el tema	Personas que han tenido contacto con ellas	Libros y/o folletos	Internet	Ninguna
Andalucía	62,8	57,8	3,1	20,2	0,9	24,7	43,2	56,7	38,3	26,3	57,1	64,6	27,3	28,6	40,3	2,9
Aragón	65,0	59,1	3,2	18,0	1,0	23,8	48,0	58,8	34,7	34,7	56,2	69,7	29,6	30,1	43,5	1,9
Asturias	64,5	58,3	2,7	16,4	0,7	25,9	44,0	55,0	33,3	29,8	55,2	64,6	28,2	30,7	42,7	2,6
Baleares	63,1	57,7	5,5	22,0	0,8	24,5	48,1	54,7	37,2	30,0	53,8	58,1	28,6	30,4	47,8	3,4
Canarias	60,9	54,8	3,6	17,5	1,2	27,2	46,3	53,0	37,3	35,8	53,5	65,7	31,6	26,8	46,6	2,9
Cantabria	60,1	53,9	2,4	16,2	0,7	23,5	40,3	55,2	35,6	37,1	54,8	62,1	24,7	29,0	39,5	3,4
Castilla y León	64,5	58,8	2,5	15,4	0,6	24,4	45,1	57,2	37,1	31,0	61,3	69,4	28,3	35,9	39,3	1,9
Castilla-La Mancha	59,9	55,9	2,0	18,1	0,8	22,4	40,8	57,3	36,1	26,8	58,2	64,2	25,8	30,0	41,9	3,7
Cataluña	58,2	54,4	3,9	18,4	1,1	24,8	45,2	56,6	46,0	25,8	55,7	64,2	30,0	28,5	47,0	3,7
C. Valenciana	60,3	56,0	2,2	18,8	0,5	23,0	41,8	57,4	42,6	28,9	56,2	62,9	26,3	32,1	42,2	2,6
Extremadura	60,5	56,3	2,0	19,1	0,5	27,5	44,2	55,3	37,7	33,4	58,0	66,0	26,3	28,9	43,2	2,9
Galicia	59,9	54,4	2,5	17,4	1,0	22,1	39,4	52,5	32,9	31,9	53,7	73,2	28,0	30,8	38,7	2,4
Madrid	63,4	57,1	2,7	17,6	0,9	22,9	43,1	53,4	38,8	30,2	54,7	64,8	27,0	28,8	40,3	2,8
Murcia	60,2	54,7	2,8	18,1	1,1	24,0	40,3	51,9	29,4	25,3	49,8	58,5	23,5	28,1	37,4	4,3
Navarra	58,4	55,7	1,0	19,7	0,3	21,3	42,1	51,0	36,2	32,0	49,3	65,8	22,7	26,2	32,9	1,5
País Vasco	55,3	51,6	2,9	16,3	1,3	13,4	46,2	46,2	37,3	24,5	40,4	47,0	28,3	17,8	35,5	2,6
Rioja	62,5	59,8	3,3	16,1	1,1	24,7	36,7	52,2	52,9	57,2	62,7	82,6	29,0	36,5	39,9	1,6
Ceuta	53,3	53,1	1,7	19,3	1,4	27,8	43,5	50,4	36,7	27,8	58,6	59,6	38,0	29,5	43,3	9,7
Melilla	59,4	55,4	4,1	19,6	3,5	25,6	41,8	53,2	32,4	27,1	46,1	48,3	21,8	32,5	44,3	6,1
Total	61,1	56,2	2,9	18,4	0,9	23,7	43,5	55,2	39,0	28,8	55,1	64,2	27,7	29,1	41,7	2,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.31.

Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años les gustaría recibir información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012.

	Madre	Padre	Pareja de mi padre o de mi madre	Hermanos/hermanas	Hijos de la pareja de mi padre o de mi madre	Otros familiares	Amigos	Profesores	Profesionales sanitarios	Organismos oficiales	Medios de comunicación	Charlas o cursos sobre el tema	Personas que han tenido contacto con ellas	Libros y/o folletos	Internet	Ninguna
Andalucía	26,4	25,4	1,5	7,0	0,8	6,3	9,8	22,1	48,1	28,8	25,3	46,7	35,1	19,7	26,6	9,4
Aragón	24,3	23,6	1,2	5,6	0,6	6,2	10,5	18,8	40,2	31,3	22,8	43,4	33,2	18,7	22,9	13,4
Asturias	24,5	23,5	1,7	5,3	0,9	7,6	10,2	20,0	37,8	29,0	23,7	41,2	31,9	18,0	24,8	13,8
Baleares	26,0	23,6	1,4	7,6	1,1	8,5	11,3	24,8	45,3	34,5	27,2	42,9	35,7	23,0	30,4	10,6
Canarias	18,4	17,3	2,0	4,6	1,5	7,4	9,9	20,4	43,8	35,1	26,0	47,4	35,3	19,3	26,9	10,3
Cantabria	22,5	21,9	1,3	5,5	1,2	7,4	10,0	19,5	39,4	30,3	24,2	38,4	31,3	20,0	24,2	14,2
Castilla y León	25,4	24,3	1,2	5,1	0,3	6,9	10,6	21,9	46,3	32,8	28,2	50,4	40,2	25,4	25,1	8,8
Castilla-La Mancha	26,2	25,8	1,4	7,3	0,9	7,6	10,7	22,5	43,1	28,3	27,8	45,0	32,6	21,6	28,6	11,0
Cataluña	22,9	21,8	1,9	6,5	1,1	7,1	10,7	24,1	45,8	28,4	27,1	44,0	37,9	20,4	27,1	10,6
C. Valenciana	23,7	22,2	1,3	6,1	0,7	6,2	10,0	22,0	45,4	30,8	26,6	45,6	35,1	21,2	27,7	10,7
Extremadura	27,7	27,4	1,4	7,5	1,0	8,4	11,2	25,4	45,2	33,7	27,9	47,6	34,8	21,3	29,4	8,5
Galicia	19,9	18,9	1,2	6,0	1,1	4,7	7,7	18,9	38,4	32,0	24,1	43,7	36,7	18,1	21,2	13,3
Madrid	23,6	22,6	1,6	5,9	0,7	6,9	8,7	19,2	45,3	30,8	24,1	43,6	34,5	19,3	22,7	11,4
Murcia	26,0	25,2	1,9	7,1	1,7	6,9	10,0	21,0	38,6	26,3	24,1	41,6	29,2	18,8	24,0	12,4
Navarra	20,0	19,9	0,3	6,2	0,1	6,2	8,4	17,7	41,9	30,0	22,4	41,2	34,8	14,7	20,4	12,0
País Vasco	30,0	28,3	1,4	6,9	0,5	5,3	14,9	20,0	45,4	25,1	15,5	38,0	36,0	16,6	22,5	6,1
Rioja	20,2	19,3	0,6	4,4	0,0	5,3	8,2	20,0	42,9	39,7	29,9	49,3	33,3	18,9	21,5	13,2
Ceuta	26,4	26,4	1,5	8,2	0,0	8,1	8,6	22,2	33,4	26,7	31,1	42,0	32,6	16,7	26,0	20,6
Melilla	31,6	28,7	1,4	4,9	2,2	5,6	9,8	22,6	38,7	23,9	24,4	29,6	24,2	19,6	26,8	13,3
Total	24,3	23,2	1,5	6,3	0,9	6,6	10,1	21,5	44,7	30,0	25,3	44,7	35,3	20,0	25,6	10,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.32.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de *binge drinking* (últimos 30 días), edad media de inicio al consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.33.

Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.34.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo.
España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.784
Edad media de inicio del consumo (años)	13,1	13,8	13,5	14,0	13,5	14,0	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8	13,6	13,8	13,7	13,7	13,8	13,9
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	-	-	15,0	15,0	15,0	15,1	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	15,1	15,0
Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9
Prevalencia de consumo de alcohol en últimos 12 meses	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9
Prevalencia de consumo de alcohol en últimos 30 días	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2
Prevalencia de consumo de alcohol en fin de semana en los últimos 30 días	-	-	66,0	66,4	67,0	68,1	60,1	59,8	56,3	55,2	65,1	65,5	57,7	57,7	61,2	61,3	71,3	71,5	70,1	72,8
Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables los últimos 30 días	-	-	26,8	14,9	26,0	16,1	30,0	16,8	20,8	10,6	26,5	14,1	24,2	13,9	28,4	17,8	33,1	21,4	35,3	25,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.35.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Alguna vez en la vida										
Total	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9
Sexo										
Hombre	84,3	84,3	85,5	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9
Mujer	84,0	84,1	86,4	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9
Edad										
14 años	69,6	67,6	71,5	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9
15 años	81,8	81,7	82,5	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7
16 años	88,0	88,7	89,7	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2
17 años	91,9	91,3	92,8	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8
18 años	92,5	93,4	96,2	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6
Últimos 12 meses										
Total	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9
Sexo										
Hombre	82,8	82,3	83,0	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9
Mujer	82,7	82,5	84,5	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9
Edad										
14 años	67,7	64,3	67,9	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1
15 años	80,4	79,7	80,5	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3
16 años	86,7	87,4	88,0	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2
17 años	90,7	89,9	90,9	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2
18 años	91,1	92,4	94,1	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3
Últimos 30 días										
Total	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0
Sexo										
Hombre	75,3	66,8	67,5	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9
Mujer	74,9	66,7	68,5	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2
Edad										
14 años	56,7	40,1	43,2	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2
15 años	71,8	60,1	62,2	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0
16 años	80,0	74,1	73,4	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6
17 años	85,1	79,4	81,1	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4
18 años	86,2	84,1	85,0	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.36.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2012.




1.2.37.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas tanto en días laborables como en fin de semana según edad entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.38.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.39.


Prevalencia de consumo de alcohol algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 2012.

	Algún fin de semana (1, 2 o 3)	Todos los fines de semana	Algún día laborable (1, 2 o 3 por semana)	Todos los días laborables
Total	53,3	18,2	27,7	2,9
Sexo				
Hombres	49,2	21,0	31,2	4,1
Mujeres	57,4	15,4	24,0	1,6
Edad				
14 años	42,6	6,8	16,0	1,6
15 años	51,2	11,4	21,5	1,9
16 años	55,4	17,7	25,5	2,6
17 años	57,0	23,6	33,5	3,2
18 años	55,5	29,0	40,0	5,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.40.

Prevalencias de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras), en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.41.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en el último mes (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.42.

Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 2012.

	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	2008	2010	2012	2008	2010	2012	2008	2010	2012
Total	56,2	58,8	60,7	47,1	52,9	52,0	29,1	35,6	30,8
Sexo									
Hombres	54,8	58,0	59,9	46,5	52,2	51,7	29,4	36,4	31,3
Mujeres	57,5	59,5	61,5	47,7	53,5	52,3	28,7	34,8	30,3
Edad									
14 años	30,4	27,8	31,5	24,5	24,6	26,1	13,4	16,0	12,7
15 años	48,5	52,2	47,4	41,0	47,3	40,2	24,2	32,0	21,3
16 años	62,2	66,2	62,3	53,0	59,8	53,4	31,7	38,8	30,9
17 años	72,6	76,8	73,1	59,7	69,1	62,6	39,0	46,6	38,8
18 años	76,9	77,8	80,4	65,8	69,8	70,5	45,2	52,8	46,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.43.


Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Borracheras alguna vez	29,2	42,6	61,5	74,1	81,3	33,8	52,0	63,1	72,1	79,4
Borracheras últimos 12 meses	23,1	35,5	52,6	65,1	73,1	29,2	44,6	54,1	60,1	67,6
Borracheras últimos 30 días	10,8	17,8	32,2	41,5	48,4	14,6	24,6	29,7	36,0	44,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.44.

Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (*binge drinking*) en los últimos 30 días según sexo y edad entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

1.2.45.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracción (*binge drinking*)* (porcentajes). España, 2008-2012.

	2008	2010	2012
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14 a 18 años que han consumido en el mismo periodo	64,4	66,5	56,8
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14 a 18 años	41,4	36,7	41,8

* Beber 5 o más bebidas en hombres y 4 o más bebidas en mujeres en un intervalo de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.46.

Prevalencia *binge drinking** en los últimos 30 días según sexo y edad entre los estudiantes de 14 a 18 años (%). España, 2012.

	14 a 18 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Total	41,8	20,3	30,4	42,6	50,7	59,9
Hombres	44,1	18,4	28,2	44,8	55,8	65,1
Mujeres	39,6	22,1	32,6	40,4	45,3	54,3

* Beber 5 o más bebidas en hombres y 4 o más bebidas en mujeres en un intervalo de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.47.


Porcentaje de menores (14-17 años) que han conseguido y consumido alcohol (en el último mes) en diferentes lugares. España, 2012.

	Conseguido	Consumido
Bares o pubs	57,7	61,4
Discotecas	47,1	52,1
Domicilio de otros	24,0	39,9
Domicilio propio	16,8	20,6
Supermercados	61,8	–
Espacios públicos abiertos (calles, parques, playas)	–	57,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.48.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hagan botellón o no (porcentajes). España, 2012.




1.2.49.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.50.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2012.




1.2.51.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2012.




1.2.52.

Número de días en los últimos 12 meses en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han viajado como pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, según sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.53.

Consumo de alcohol en los últimos 30 días por edad y tipo de día de consumo (porcentajes). España, 2012.



1.2.54.

Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1996-2012.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Consumo en días laborables									
Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días (algún día o todos los días)									
Vino	8,1	8,9	8,2	4,9	6,6	5,3	5,8	5,2	6,3
Cerveza	15,3	14,0	16,2	10,5	14,1	12,8	15,0	13,7	17,5
Aperitivos	3,0	3,2	2,6	1,7	2,4	3,0	4,1	3,6	5,6
Combinados	5,4	6,4	6,8	5,0	6,8	7,4	10,6	10,2	10,8
Licores fuertes	3,2	3,6	3,5	2,3	3,2	3,5	5,5	5,3	5,7
Licores frutas	6,6	7,5	6,2	3,8	4,2	4,6	6,6	5,3	6,5
Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 días									
Vino	0,8	1,0	0,9	0,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3
Cerveza	1,7	1,5	2,2	0,9	1,7	0,8	1,1	0,7	1,2
Aperitivos	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5
Combinados	0,2	0,3	0,6	0,2	0,6	0,4	0,7	0,6	0,7
Licores fuertes	0,1	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2	0,5	0,3	0,5
Licores frutas	0,3	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,3	0,5
Consumo en fin de semana									
Algún día de viernes a domingo durante los últimos 30 días (algún día o todos los días)									
Vino	32,8	32,8	23,7	21,0	27,7	18,8	17,0	17,3	21,1
Cerveza	46,9	40,7	30,8	27,1	34,1	27,9	28,6	30,0	37,5
Aperitivos	12,0	13,6	9,6	8,0	11,0	8,3	8,4	9,4	11,8
Combinados	48,8	53,7	49,2	48,2	58,4	51,6	54,0	50,3	58,0
Licores fuertes	24,5	26,7	22,4	22,3	27,8	23,0	25,0	23,7	25,8
Licores frutas	36,2	37,1	25,6	22,6	26,0	20,6	20,8	18,3	23,6
Todos los días de viernes a domingo durante los últimos 30 días									
Vino	9,6	10,6	8,6	5,9	7,5	3,5	2,9	3,3	1,7
Cerveza	19,9	17,6	14,4	10,7	13,8	8,6	8,5	8,2	8,9
Aperitivos	2,9	4,2	3,3	2,1	2,7	1,5	1,9	2,2	1,8
Combinados	19,6	23,5	22,2	18,9	22,5	16,8	17,9	13,8	10,9
Licores fuertes	8,2	10,8	10,1	7,7	9,4	5,5	5,9	4,1	3,6
Licores frutas	10,2	12,0	9,0	6,0	6,8	3,8	3,5	2,5	2,2

Nota: % calculado sobre el total de la muestra

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.55.

Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida entre los estudiantes de 14-18 años que consumieron alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2012.

	Algún fin de semana			Algún día laborable		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Total	70,1	72,8	71,5	35,3	25,6	30,6
Tipo de bebida						
Vino/champán	26,6	25,6	26,1	8,6	5,8	7,2
Cerveza	49,1	39,7	44,5	24,8	14,8	19,9
Aperitivos/vermut	16,7	13,4	15,1	8,4	4,7	6,6
Combinados/cubatas	60,3	64,5	62,4	15,8	10,0	12,9
Licores de frutas	27,2	31,0	29,1	8,6	6,3	7,5
Licores fuertes	33,1	30,0	31,6	8,6	4,4	6,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.56.


Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	62,0	43,4
Sexo		
Hombres	61,3	42,8
Mujeres	62,7	44,1
Edad		
14 años	36,4	20,6
15 años	51,5	32,7
16 años	65,2	45,5
17 años	71,7	52,8
18 años	77,0	58,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.57.

Prevalencia de botellón, por lo menos una vez al año, según sexo y edad entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.58.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hagan o no botellón por lo menos una vez a la semana (porcentajes). España, 2012.



1.2.59.


Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días según el consumo de alcohol entre los estudiantes de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.

	Ha consumido alcohol alguna vez en la vida		Ha consumido alcohol en los últimos 12 meses	
	No ha realizado botellón en el último año	Ha realizado botellón en el último año	No ha realizado botellón en el último año	Ha realizado botellón en el último año
Ha consumido hachís o marihuana en los últimos 30 días	4,9	24,5	5,3	24,6
Ha consumido cocaína en los últimos 30 días	0,4	2,2	0,4	2,2
Ha consumido anfetaminas o speed en los últimos 30 días	0,3	1,5	0,3	1,5
Ha consumido alucinógenos en los últimos 30 días	0,3	1,5	0,3	1,5
Ha consumido éxtasis en los últimos 30 días	0,4	1,8	0,4	1,8
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	15,8	63,0	17,4	63,4
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	7,9	48,3	8,7	48,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.60.

Prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

1.2.61.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.62.

Evolución de la proporción de consumidores de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.63.

Evolución del porcentaje de personas que fuman diariamente en los hogares de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2012.



1.2.64.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,7	14,1	13,1	13,5	13,0	13,4	12,9	13,2	13,0	13,1	13,1	13,2	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,7
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	-	-	14,5	14,6	14,6	14,5	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,3	14,4	14,3	14,6	14,5
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	56,0	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	54,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1
Prevalencia (%) últimos 30 días	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3
Prevalencia (%) de consumo diario	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº)																				
1-5	37,7	47,3	41,8	50,3	43,8	49,5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0	56,1	58,3	65,0	68,5	54,7	57,0
6-10	33,8	36,8	33,9	34,8	35,2	34,9	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2	28,0	30,1	23,3	23,9	32,4	32,9
>10	28,5	15,9	24,3	14,8	20,9	15,6	20,8	15,8	21,8	17,5	22,7	20,0	15,3	9,8	15,9	11,6	11,7	7,6	12,9	10,1
Media de cigarrillos al día	9,1	7,2	8,3	6,9	7,9	7,0	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3	5,1	5,0	5,7	4,8	6,4	6,0

* En fumadores actuales y exfumadores (años).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.65.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes* (con o sin receta) y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.66.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes* (con o sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.67.

Características del consumo de hipnosedantes* (con o sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8
Prevalencia (%) de consumo hipnosedantes con y/o sin receta alguna vez en la vida	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	9,3	13,6	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0
Prevalencia (%) de consumo hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0
Prevalencia (%) de consumo hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3
Prevalencia (%) de consumo hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días																				
Nunca	98,1	96,7	98,5	97,1	98,5	97,0	98,3	96,6	98,3	96,9	98,2	97,0	98,0	97,1	97,6	96,6	97,7	96,3	97,4	95,7
1 a 2 días	1,3	2,1	1,1	1,9	1,0	2,1	1,0	2,2	1,1	2,0	1,0	2,0	1,2	2,0	1,4	2,2	1,2	2,2	1,5	2,3
3 a 5 días	0,3	0,7	0,2	0,7	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0,4	1,4
6 a 9 días	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
10 a 19 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2

* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.68.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes* (sin receta) y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentaje). España, 1994-2012.



1.2.69.

Características del consumo de hipnosedantes* (sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio del consumo (años)	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0
Prevalencia (%) últimos 12 meses	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días																				
Nunca	98,1	96,7	98,5	97,1	98,5	97,0	98,3	96,6	98,3	96,9	98,2	97,0	98,0	97,1	97,6	96,6	97,7	96,3	97,4	95,7
1 a 2 días	1,3	2,1	1,1	1,9	1,0	2,1	1,0	2,2	1,1	2,0	1,0	2,0	1,2	2,0	1,4	2,2	1,2	2,2	1,5	2,3
6 a 9 días	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2


* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

Nota: Los % están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.70.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes* (sin receta) en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.71.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes* (sin receta) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en el último año (%)**	72	74	73	72	69	67	63	61	54	65
De los que han consumido en el último año, porcentaje que ha consumido en el último mes (%)***	59	49	49	50	53	51	50	51	54	59
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en el último mes (%)****	43	36	36	36	37	34	32	31	29	39

* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

** Prevalencia últimos 12 meses/prevalencia alguna vez en la vida.


*** Prevalencia último 30 días/prevalencia últimos 12 meses.

**** Prevalencia últimos 30 días/prevalencia alguna vez en la vida.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.72.

Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes) y edad media de inicio del consumo. España, 1994-2012.




1.2.73.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.74.

Prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.75.

Características del consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	15,1	15,2	15,1	15,2	14,9	15,1	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8	14,8	15,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7
Prevalencia (%) últimos 12 meses	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	26,8	23,3	29,7	23,3
Prevalencia (%) últimos 30 días	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	18,6	14,6	18,9	13,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	84,9	90,2	81,6	86,8	79,7	85,5	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0	74,7	82,5	80,3	84,7	81,1	86,7
1 a 2 días	6,9	5,1	7,3	7,2	8,4	7,4	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4	7,9	7,1	6,9	6,8	7,1	6,2
3 a 5 días	3,0	2,1	4,1	2,7	3,8	3,0	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8	5,0	4,6	3,9	3,7	3,9	3,0
6 a 9 días	2,1	1,4	2,9	1,3	3,2	1,9	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8	2,6	1,8	2,2	1,4	2,1	1,3
10 a 19 días	1,5	0,6	2,0	1,0	2,1	1,3	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8	3,6	2,0	2,5	1,6	2,0	1,3
20 a 29 días	1,5	0,6	2,2	0,9	2,8	1,0	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2	4,5	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5

Nota: Los % están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.76.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	83,9	4,3	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7	2,7
Sexo								
Hombres	81,1	4,4	2,7	1,9	2,0	2,1	2,0	3,8
Mujeres	86,7	4,2	2,0	1,5	1,5	1,3	1,3	1,5
Edad								
14 años	94,4	1,9	0,9	0,8	0,7	0,4	0,5	0,3
15 años	88,6	3,4	1,9	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2
16 años	84,1	4,7	2,4	1,8	1,7	1,5	1,8	2,0
17 años	79,4	5,3	2,9	2,0	1,9	2,4	2,1	4,1
18 años	75,5	5,2	3,4	2,2	3,2	2,7	2,4	5,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.77.

Continuidad en el consumo de cánnabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Prevalencia alguna vez en la vida (%) A	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6
Prevalencia últimos 12 meses (%) B	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6
Prevalencia últimos 30 días (%) C	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1
De los que han consumido alguna vez, porcentaje										
que ha consumido en el último año (%) B/A	87	88	87	86	87	85	82	86	80	78
De los que han consumido alguna vez, porcentaje										
que ha consumido en el último mes (%) C/A	59	59	58	62	60	58	55	57	52	47
De los que han consumido en último año, porcentaje										
que ha consumido en último mes (%) C/B	68	67	66	72	68	68	67	65	65	60

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.78.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.79.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.




1.2.80.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.




1.2.81.

Prevalencia de consumo de cocaína base y cocaína en polvo alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.82.

Prevalencia de consumo de cocaína base y cocaína en polvo en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.83.

Características del consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (n°)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,9	15,9	15,9	15,7	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	14,7	15,0	15,5	15,5
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	98,6	99,3	97,9	98,8	96,8	98,2	96,6	98,5	96,3	97,2	94,9	97,4	96,9	98,4	97,2	98,3	98,2	99,3	97,8	99,2
1 a 2 días	0,9	0,4	1,5	0,8	1,8	1,0	2,5	1,1	2,3	2,1	3,1	1,7	1,6	1,0	1,3	0,6	0,8	0,4	1,0	0,4
3 a 5 días	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,2	0,9	0,5	1,0	0,5	0,7	0,3	0,7	0,3	0,3	0	0,4	0,1
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
10 a 19 días	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.84.

Continuidad en el consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Prevalencia alguna vez en la vida (%) A	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6
Prevalencia últimos 12 meses (%) B	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5
Prevalencia últimos 30 días (%) C	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en el último año (%) B/A	72	79	83	74	81	80	72	71	67	68
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en el último mes (%) C/A	44	47	46	38	42	42	40	39	38	41
De los que han consumido en último año, porcentaje que ha consumido en último mes (%) C/B	61	59	56	52	52	53	56	56	58	60

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.85.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)


1.2.86.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (base y polvo) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.87.

Evolución de la prevalencia de éxtasis y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.88.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.89.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.90.

Características del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.784
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,6	15,7	15,5	15,5	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,5	15,2	15,2	15,2	15,4	15,9	15,6
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0
Prevalencia (%) últimos 12 meses	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2	1,7	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	97,1	98,6	97,2	98,1	98,1	98,7	96,2	98,3	97,9	98,4	98,1	99,0	97,8	99,3	98,4	99,4	98,6	99,4	98,2	99,4
1 a 2 días	1,6	1,0	1,3	1,2	1,0	0,6	2,2	1,3	1,6	1,1	1,0	0,7	1,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,3	1,1	0,3
3 a 5 días	0,6	0,2	0,7	0,4	0,3	0,3	1,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
6 a 9 días	0,4	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.91.


Evolución de la prevalencia de amfetaminas y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)


1.2.92.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.93.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.94.

Características del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.784
Edad media de inicio de consumo (años)	15,5	15,4	15,7	15,7	15,7	15,5	15,7	15,3	15,6	15,5	15,8	15,6	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,2
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,6	2,8	3,4	1,8	3,2	1,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,0	1,9	2,2	1,0	2,4	1,1
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,5	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,7	0,7	1,3	0,5	1,4	0,6
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	44,8	49,8	51,8	52,0	51,1	53,1	55,1	59,1	57,9	66,8	97,3	99,0	98,0	99,0	97,4	99,2	98,6	99,5	98,6	99,4
1 a 2 días	32,7	33,6	31,5	29,0	29,5	29,9	31,6	27,4	30,1	23,6	1,3	0,6	1,0	0,6	0,8	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4
3 a 5 días	10,6	8,9	8,8	12,5	8,4	8,9	7,0	9,7	5,9	6,1	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
6 a 9 días	7,0	3,7	5,5	4,5	5,3	3,9	0,9	1,9	3,7	2,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	3,1	2,3	0,7	0,7	2,8	1,8	4,3	0,5	1,3	1,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	1,8	1,6	1,8	1,3	2,9	2,4	1,1	1,3	1,0	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.95.


Evolución de la prevalencia de alucinógenos y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)


1.2.96.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.97.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.98.

Características del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	15,4	15,4	15,6	15,6	15,5	15,4	15,6	15,3	15,6	15,4	15,8	15,7	15,5	15,5	15,4	15,2	15,3	15,4	15,5	15,2
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1
Prevalencia (%) últimos 12 meses	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1
Prevalencia (%) últimos 30 días	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	96,4	98,3	96,2	98,1	97,4	98,5	97,4	98,7	98,2	99,3	97,7	99,3	97,9	99,2	97,4	98,9	98,5	99,4	98,4	99,6
1 a 2 días	2,4	1,2	2,3	1,4	1,7	1,1	1,7	1,1	1,3	0,6	1,5	0,5	1,2	0,5	1,0	0,4	0,8	0,4	0,9	0,2
3 a 5 días	0,7	0,3	0,9	0,2	0,5	0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,1
6 a 9 días	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.99.


Evolución del consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

1.2.100.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.101.

Características del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (n°)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	14,4	14,1	14,6	15,1	14,0	15,1	15,5	15,1	14,9	14,8	14,2	15,0	14,5	14,7	14,3	14,2	14,2	14,7	14,7	13,8
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,9	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	99,6	99,9	99,6	99,9	99,4	99,8	99,5	99,9	99,7	99,8	99,3	99,9	99,0	99,8	98,4	99,5	99,3	99,7	99,2	99,7
1 a 2 días	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
3 a 5 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
6 a 9 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
20 a 29 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.102.

Prevalencia de consumo y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.103.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.104.

Características del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	13,8	12,4	13,9	13,3	13,7	13,0	14,0	13,7	14,3	14,2	13,9	14,1	13,8	13,4	13,6	14,2	13,1	13,2	13,8	12,6
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,2	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,7	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	98,5	99,2	98,5	99,0	97,8	98,5	98,2	98,9	98,5	99,2	98,4	99,3	98,2	99,4	97,7	99,1	98,8	99,5	99,0	99,4
1 a 2 días	0,8	0,5	0,9	0,8	1,1	1,0	1,3	0,7	1,0	0,5	0,8	0,4	0,8	0,3	0,8	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4
3 a 5 días	0,2	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.105.

Prevalencia de consumo de ninguna, una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	13,9	16,8	23,8
Una sola sustancia	32,6	38,9	41,8
Dos sustancias	20,4	20,1	19,8
Tres sustancias	21,3	17,5	11,6
Cuatro sustancias	7,4	3,9	1,6
Cinco o más sustancias	4,3	2,8	1,4

* Drogas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, cánnabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles y GHB).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.106.

Distribución del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en el último año entre los consumidores en función de la edad (porcentajes). España, 2012.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Ninguna sustancia	35,4	23,2	14,5	10,0	7,1
Una sola sustancia	39,3	41,9	41,2	38,1	32,4
Dos sustancias	14,4	17,2	20,6	21,8	25,6
Tres sustancias	8,6	13,4	17,1	21,9	23,9
Cuatro sustancias	1,4	2,7	4,0	4,7	6,0
Cinco o más sustancias	1,0	1,7	2,5	3,5	4,9

* Drogas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, cánnabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles y GHB).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.107.

Prevalencia de consumo de ninguna, una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 2012.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
Ningún consumo	15,0	12,8	17,9	15,7	25,1	22,4
Una sustancia	33,9	31,3	39,8	38,0	41,7	41,9
Dos sustancias	18,3	22,5	17,6	22,8	17,1	22,5
Tres sustancias	20,5	22,1	17,3	17,7	12,4	10,8
Cuatro sustancias	6,8	8,1	3,6	4,1	1,7	1,6
Cinco sustancias o más	3,0	2,0	2,1	1,0	1,0	0,4

* Drogas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, cánnabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles y GHB).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.108.

Prevalencia de consumo de ninguna, una sola o más sustancias psicoactivas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	13,9	16,8	23,8
Una sola sustancia	27,9	22,7	14,2
Dos sustancias	2,5	1,6	0,8
Tres sustancias	1,1	0,8	0,4
Cuatro sustancias	0,8	0,5	0,2
Cinco o más sustancias	1,5	1,1	0,7

* Drogas ilegales: cánnabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.109.

Proporción de consumidores de otras drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2012.

	Alcohol	Tabaco	Cánnabis	Hipnosedantes* sin receta	Hipnosedantes* (con/sin receta)	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	42,5	32,3	6,6	12,8	2,4	1,9	2,9	2,1	2,4	2,6	0,9	1,3	1,2
Tabaco	98,2	100,0	60,0	8,6	16,3	4,9	3,7	5,9	4,1	4,7	5,0	1,6	2,2	2,5
Cánnabis	98,8	79,4	100,0	9,6	17,5	7,0	5,6	8,6	6,1	7,0	7,6	2,5	3,2	3,6
Hipnosedantes* (sin receta)	92,8	52,2	43,8	100,0	100,0	10,2	9,9	12,4	10,4	10,7	11,3	5,8	7,5	7,8
Hipnosedantes* (con/sin receta)	90,5	49,4	40,0	50,8	100,0	6,3	5,9	7,6	6,3	6,9	7,2	3,5	4,6	4,5
Cocaína en polvo	97,9	86,6	94,0	30,3	37,2	100,0	58,0	100,0	56	50,5	60,0	25,8	21,2	36,9
Cocaína base	97,5	81,3	93,6	37,6	44,0	71,3	100,0	100,0	51,1	54,4	60,0	33,4	27,7	45,2
Cocaína (polvo y/o base)	97,1	83,9	92,2	30,2	36,6	81,6	66,3	100,0	49,0	44,5	54,4	23,4	19,4	33,1
Anfetaminas/speed	98,0	85,0	93,5	35,3	43,1	63,8	46,7	69,8	100,0	54,7	64,0	30	26,8	39,7
Alucinógenos	97,9	82,6	93,7	31,4	40,4	50,5	43,0	54,8	48,2	100,0	52,6	29,4	25,5	36,8
Éxtasis	97,8	85,1	93,7	31,0	39,0	55,9	45,2	62,3	51,5	48,2	100,0	26,0	20,5	38,5
Heroína	96,3	76,3	91,0	47,6	58,0	71,0	70,0	78,8	71,4	78,9	76,1	100,0	52,7	66,8
Inhalables volátiles	93,5	66,4	72,0	37,3	45,9	35,3	36,7	40,2	39,1	42,1	37,1	32,7	100,0	32,5
GHB	97,2	84,5	93,2	44,1	50,1	71,2	68,9	78,3	67,3	70,7	80,4	48,1	38,1	100,0

Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.110.

Proporción de consumidores de otras drogas en el último año, que han consumido alcohol en el mismo periodo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.

	%
Cánnabis	98,8
Cocaína (polvo y base)	97,1
Anfetaminas	98,0
Alucinógenos	97,9
Éxtasis	97,8
Heroína	96,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.111.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan hecho *binge drinking** o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2012.

	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días
Consumo de CÁNNABIS en los últimos 30 días	31,2	5,5
Consumo de COCAÍNA EN POLVO Y/O BASE en los últimos 30 días	3,1	0,3
Consumo de ÉXTASIS en los últimos 30 días	2,5	0,2
Consumo de ANFETAMINAS O SPEED en los últimos 30 días	2,0	0,2
Consumo de ALUCINÓGENOS en los últimos 30 días	2,1	0,2
Consumo de HEROÍNA en los últimos 30 días	1,1	0,1
Consumo de INHALABLES VOLÁTILES en los últimos 30 días	1,4	0,3
Consumo de GHB en los últimos 30 días	1,4	0,1

* Beber 5 o más bebidas en hombres y 4 o más bebidas en mujeres en un intervalo de 2 horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.112.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2012.

	Se han emborrachado en los últimos 30 días	No se han emborrachado en los últimos 30 días
Consumo de CÁNNABIS en los últimos 30 días	37,0	6,7
Consumo de COCAÍNA EN POLVO Y/O BASE en los últimos 30 días	3,8	0,3
Consumo de ÉXTASIS en los últimos 30 días	3,1	0,3
Consumo de ANFETAMINAS O SPEED en los últimos 30 días	2,6	0,2
Consumo de ALUCINÓGENOS en los últimos 30 días	2,7	0,3
Consumo de HEROÍNA en los últimos 30 días	1,3	0,1
Consumo de INHALABLES VOLÁTILES en los últimos 30 días	1,6	0,4
Consumo de GHB en los últimos 30 días	1,8	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.113.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cánnabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	2008	2010	2012
Total	24,9	22,9	19,6
Sexo			
Hombres	28,0	24,8	22,7
Mujeres	21,8	21,0	16,5
Edad			
14 años	11,4	9,1	6,8
15 años	21,0	17,3	12,9
16 años	27,3	26,2	19,6
17 años	33,2	33,4	25,8
18 años	38,1	35,9	29,7

* Consumo de alcohol y cánnabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.114.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	2008	2010	2012
Total	4,1	3,0	1,6
Sexo			
Hombres	5,1	3,7	2,2
Mujeres	3,1	2,3	1,0
Edad			
14 años	2,6	1,8	0,5
15 años	3,4	2,0	0,8
16 años	4,0	2,7	1,4
17 años	4,9	4,4	1,9
18 años	8,1	6,1	3,5

* Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.115.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo y edad. (porcentajes). España, 2012.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Nunca	7,5	7,3	7,7	16,1	11,3	6,5	3,9	3,0
Menos de una noche al mes	15,5	14,2	16,9	21,6	19,3	15,4	12,6	10,6
De 1 a 3 noches al mes	29,7	27,8	31,7	25,2	27,6	30,7	32,4	30,2
1 noche a la semana	18,5	18,9	18,0	15,4	16,4	19,4	20,0	19,6
2 noches a la semana	20,6	22,5	18,6	15,4	17,6	19,7	22,7	26,4
3-4 noches a la semana	4,9	5,5	4,4	4,0	4,5	5,1	5,0	6,1
Más de 4 noches a la semana	3,3	3,8	2,8	2,3	3,4	3,2	3,3	4,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.116.


Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, en los últimos 12 meses, en estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según frecuencia de salidas nocturnas (porcentajes). España, 2012.

	Alcohol	Tabaco	Cánnabis	Cocaína
Nunca	33,3	8,1	4,7	0,5
Menos de una noche al mes	70,8	20,9	12,7	0,7
De 1 a 3 noches al mes	88,2	35,0	25,6	1,4
1 noche a la semana	88,8	39,3	29,8	2,5
2 noches a la semana	92,1	47,1	38,8	4,0
3-4 noches a la semana	93,7	56,1	45,1	4,8
Más de 4 noches a la semana	93,6	58,0	46,3	13,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.117.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según frecuencia de salidas nocturnas (porcentajes). España, 2012.



1.2.118.

Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2006-2012.



1.2.119.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Antes de las 12 de la noche	13,5	13,0	13,9	31,2	21,8	11,5	5,3	3,7
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	12,9	13,5	12,4	20,1	18,8	14,3	8,2	4,8
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	10,4	10,5	10,3	10,6	12,3	11,9	9,6	6,8
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	10,6	10,9	10,3	8,2	10,1	11,6	12,1	9,0
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	13,8	12,5	15,2	7,2	11,5	15,4	16,0	16,3
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	23,3	22,9	23,6	4,9	10,1	21,7	33,6	41,9
Después de las 8 de la mañana	7,9	9,3	6,5	2,0	4,3	6,8	11,1	14,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.120.

Prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales* en los últimos 12 meses según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (porcentaje). España, 2012.


	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Antes de las 12 de la noche	56,5	64,6	71,8	69,1	69,4
Entre las 12 de la noche y la 1 de la noche	72,9	80,3	82,9	83,3	80,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	80,6	86,5	88,3	89,4	84,6
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	84,3	89,3	89,6	93,2	93,9
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	88,3	92,2	94,6	95,4	96,5
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	93,6	96,6	97,5	97,0	98,8
Después de las 8 de la mañana	88,0	93,3	97,9	95,7	98,4

* Sustancias legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes. Sustancias ilegales: cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, GHB e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.121.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2012.




1.2.122.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en el último año, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2012.



1.2.123.

Prevalencia de consumo de distintas drogas legales e ilegales en los últimos 12 meses, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.124.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.

	Borracheras	No borracheras
Antes de las 12 de la noche	21,1	78,9
Entre las 12 de la noche y la 1 de la noche	36,9	63,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	47,5	52,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	54,3	45,7
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	65,0	35,0
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	76,9	23,1
Después de las 8 de la mañana	80,4	19,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.125.

Porcentaje de estudiantes, de 14 a 18 años, que hacen o no *binge drinking** (en el último mes) según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). España, 2012.


	Binge drinking	No binge drinking
Antes de las 12 de la noche	14,3	85,7
Entre las 12 de la noche y la 1 de la noche	25,9	74,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	33,8	66,2
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	42,5	57,5
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	51,8	48,2
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	66,1	33,9
Después de las 8 de la mañana	72,8	27,2

* Beber 5 o más bebidas en hombres y 4 o más bebidas en mujeres en un intervalo de 2 horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.126.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensan que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2012.



1.2.127.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Fumar un paquete de tabaco diario	91,4	89,6	93,1	90,8	91,5	91,4	91,5	91,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	47,5	44,7	50,3	56,2	51,9	46,7	42,6	44,4
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	59,7	55,1	64,1	61,6	61,1	59,5	59,1	57,4
Fumar cánnabis habitualmente	88,1	84,3	91,7	91,4	89,7	88,6	86,2	85,8
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,5	88,7	90,3	89,1	90,3	88,5	90,3	89,0
Consumir éxtasis habitualmente	96,5	95,2	97,8	95,3	96,6	96,2	97,2	96,6
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,6	95,4	97,9	95,9	96,6	96,6	97,2	96,4
Consumir heroína habitualmente	96,9	95,7	98,0	95,9	96,8	96,8	97,5	97,0

Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no saben o no contestan.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.128.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (porcentajes). España, 1994-2012.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Fumar un paquete de tabaco diario	76,9	75,2	78	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,4	51,3	47,2	47	47,5
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	50,5	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7
Fumar cánnabis habitualmente	91,9	87,7	85,9	82,8	71,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1
Tomar hipnosedantes habitualmente	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5
Consumir éxtasis habitualmente	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6
Consumir heroína habitualmente	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9

Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.129.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual (una vez por semana o más frecuentemente) de drogas. España, 2008-2012.



1.2.130.

Riesgo percibido* del consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Fumar un paquete de tabaco diario	75	79	73	77	76	80	75	80	77	81	78	82	85	89	87	91	89	92	90	93
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	40	48	41	49	40	49	42	48	41	48	37	46	49	54	45	49	44	50	45	50
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	46	55	44	53	42	49	39	48	39	48	37	46	52	62	53	63	57	63	55	64
Fumar cánnabis habitualmente	90	94	85	90	82	89	79	86	78	85	81	86	86	92	85	92	86	92	84	92
Tomar hipnosedantes habitualmente	90	91	88	89	88	89	87	88	88	89	90	90	86	89	85	88	84	87	89	90
Consumir éxtasis habitualmente	97	98	96	98	96	98	95	96	96	97	97	97	96	98	94	98	95	97	95	98
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98	99	97	98	97	98	96	98	97	98	98	98	96	98	94	98	95	97	95	98
Consumir heroína habitualmente	98	99	97	99	98	99	98	99	98	99	99	99	96	98	94	98	95	98	96	98

* Porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas. Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.131.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.132.

Percepción de disponibilidad de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.


	Porcentaje* que cree que conseguir cada una de estas drogas, en 24 horas, es fácil/muy fácil								Porcentaje de No sabe/No contesta	
	Total	Sexo		Edad						Total
		H	M	14	15	16	17	18		
Tabaco	82,4	80,4	84,4	68,3	77,2	84,6	88,5	88,1	11,2	
Bebidas alcohólicas	82,8	81,0	84,6	68,0	77,6	84,8	89,1	89,0	10,9	
Hipnosedantes	29,9	28,9	30,9	20,2	23,4	29,0	36,3	37,4	43,9	
Cánnabis	48,9	51,7	46,0	27,6	39,3	50,2	59,5	60,2	29,5	
Cocaína en polvo	18,2	20,0	16,4	10,1	12,4	16,3	23,5	26,9	46,3	
Heroína	12,4	13,9	11,0	8,1	9,5	12,0	14,8	17,0	49,7	
Anfetaminas	14,2	16,1	12,3	7,7	9,2	12,7	18,7	21,4	50,4	
Éxtasis	13,0	14,6	11,3	7,4	8,8	12,0	16,3	19,5	50,5	
Alucinógenos	15,7	17,5	13,8	8,7	10,6	14,5	20,4	22,5	49,2	
GHB	10,8	12,4	9,2	6,3	7,4	9,9	13,6	15,9	51,6	

* Teniendo en cuenta todas las respuestas, incluidos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.133.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (porcentajes). España, 2008-2012.



1.2.134.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	-	-	-	-	-	-	91,7	90,9	93,6	92,8
Bebidas alcohólicas	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9
Hipnosedantes	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3
Cánnabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4
Cocaína en polvo	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9
GHB	-	-	-	-	-	-	25,5	22,4	25,8	22,3
Inhalables volátiles	61,4	54,8	54,2	51,6	54,1	51,1	-	-	-	-

Se excluyen de la base los casos que no saben o no contestan.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.135.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.136.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, percepción de riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y disponibilidad de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.137.

Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la disponibilidad de cánnabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.138.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la disponibilidad de cocaína percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.139.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y según edad (porcentajes). España, 2012.




1.2.140.

Vías por las que han recibido información y vías por las que les gustaría recibir información a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2012.




1.2.141.

Evolución sobre las principales vías de información sobre drogas por las que reciben información los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.142.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.




1.2.143.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2006-2012.




1.2.144.

Prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (porcentajes). España, 2012.



1.2.145.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (porcentajes). España, 2012.



1.2.146.


Prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.

Sustancia	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida	Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses	Prevalencia de consumo en los últimos 30 días
Ketamina	1,1	0,7	0,4
Spice	1,4	1,0	0,6
Piperazinas	0,4	0,3	0,2
Mefedrona	0,5	0,3	0,2
Nexus	0,5	0,4	0,3
Metanfetamina	0,9	0,7	0,4
Setas mágicas	2,2	1,4	0,6
Research chemicals	0,4	0,3	0,2
Legal highs	0,4	0,3	0,2
Salvia	0,8	0,5	0,3
Esteroides anabolizantes	0,7	0,5	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.147.

Proporción de consumidores de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años alguna vez en la vida, según sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.148.


Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2010-2012.

	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida		Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses		Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
Ketamina	1,1	1,1	0,8	0,7	0,4	0,4
Spice	1,1	1,4	0,8	1,0	0,5	0,6
Piperazinas	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
Mefedrona	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
Nexus	0,5	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3
Metanfetamina	0,8	0,9	0,6	0,7	0,4	0,4
Setas mágicas	2,1	2,2	1,6	1,4	0,7	0,6
Research chemicals	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
Legal highs	0,7	0,4	0,6	0,3	0,5	0,2
Salvia	-	0,8	-	0,5	-	0,3
Esteroides anabolizantes	-	0,7	-	0,5	-	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.149.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.150.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de estas sustancias porque no han oído nunca hablar de ellas (porcentajes). España, 2012.

	Nunca he oído habla de esta droga
Ketamina	55,5
Spice	59,2
Piperazinas	69,1
Mefedrona	69,4
Nexus	68,9
Metanfetamina	46,2
Setas mágicas	42,6
Research chemicals	71,3
Legal highs	72,4
Salvia	69,2
Esteroides anabolizantes	42,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.151.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Consumir ketamina alguna vez	68,2	66,0	70,5	63,4	64,2	65,4	69,8	74,9
Consumir spice alguna vez	72,4	70,1	74,9	70,0	67,9	70,8	74,0	77,4
Consumir piperazinas alguna vez	74,4	71,3	78,2	69,3	70,5	72,6	76,2	80,8
Consumir mefedrona alguna vez	74,8	72,2	78,0	70,5	71,7	71,4	77,2	81,3
Consumir nexus alguna vez	75,3	72,4	78,8	70,8	70,9	73,1	77,3	82,2
Consumir metanfetamina alguna vez	75,4	73,1	78,2	72,4	72,7	74,3	76,2	80,7
Consumir setas mágicas alguna vez	65,3	62,4	68,5	67,3	65,9	64,5	63,6	67,6
Consumir research chemicals alguna vez	76,7	73,3	81,2	70,9	72,5	75,1	79,2	82,5
Consumir legal highs alguna vez	74,0	71,3	77,4	69,8	69,5	71,9	77,0	79,3
Consumir salvia alguna vez	71,2	67,8	75,5	67,4	68,8	70,2	72,2	75,3
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	65,3	61,4	70,3	62,3	62,6	63,5	65,6	72,3

Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.152.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir habitualmente alguna de las siguientes nuevas sustancias, según consuman o no consuman la sustancia (porcentajes). España, 2010-2012.

	Todos		Sí consumen esa sustancia		No consumen esa sustancia	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
Consumir ketamina habitualmente	40,8	30,9	24,3	14,4	41,0	31,2
Consumir spice habitualmente	44,0	33,2	27,7	11,4	44,2	33,7
Consumir piperazinas habitualmente	48,0	40,2	31,4	15,3	48,0	40,4
Consumir mefedrona habitualmente	48,3	40,5	30,8	19,6	48,3	40,7
Consumir nexus habitualmente	48,7	40,1	26,6	20,9	48,8	40,3
Consumir metanfetamina habitualmente	44,3	32,2	26,6	11,5	44,5	32,5
Consumir setas mágicas habitualmente	41,4	28,6	22,6	14,5	41,8	29,1
Consumir research chemicals habitualmente	50,1	41,4	31,7	27,4	50,2	41,5
Consumir legal highs habitualmente	50,1	38,1	30,9	10,7	50,2	38,4
Consumir salvia habitualmente	–	41,1	–	10,8	–	41,6
Consumir e. anabolizantes habitualmente	–	32,9	–	15,1	–	33,1

Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

Se excluyen de la base los casos que no contestan y no han oído hablar nunca de la sustancia

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.153.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna vez alguna de las siguientes nuevas sustancias, según consuman o no consuman la sustancia (porcentajes). España, 2010-2012.

	Todos		Sí consumen esa sustancia		No consumen esa sustancia	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
Consumir ketamina alguna vez	42,8	32,8	19,5	15,0	43,1	33,1
Consumir spice alguna vez	45,2	34,1	23,9	9,9	45,5	34,6
Consumir piperazinas alguna vez	49,3	40,9	35,3	17,8	49,4	41,1
Consumir mefedrona alguna vez	49,7	41,4	30,3	19,0	49,8	41,6
Consumir nexus alguna vez	50,3	42,2	28,7	18,6	50,4	42,4
Consumir metanfetamina alguna vez	45,7	34,0	23,2	10,9	45,9	34,3
Consumir setas mágicas alguna vez	42,1	28,5	17,5	11,0	42,7	29,1
Consumir research chemicals alguna vez	51,1	41,2	28,8	22,3	51,2	41,4
Consumir legal highs alguna vez	51,2	38,7	31,3	8,2	51,3	39,0
Consumir salvia alguna vez	–	41,9	–	8,5	–	42,5
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	–	34,0	–	15,5	–	34,1

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

Se excluyen de la base los casos que no contestan y no han oído hablar nunca de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.154.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (porcentajes). España, 2012.

	Sí consumen esa sustancia	No consumen esa sustancia
Consumir ketamina	37,2	68,9
Consumir spice	42,9	73,4
Consumir piperazinas	37,1	75,0
Consumir mefedrona	42,3	75,4
Consumir nexus	41,1	75,9
Consumir metanfetamina	43,4	76,2
Consumir setas mágicas	28,7	66,9
Consumir research chemicals	44,9	77,2
Consumir legal highs	39,5	74,7
Consumir salvia	32,1	72,4
Consumir esteroides anabolizantes	37,8	65,7

Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.155.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (porcentajes). España, 2010-2012.


	Todos		Sí consumen esa sustancia		No consumen esa sustancia	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
Ketamina	40,2	41,8	83,6	74,4	39,4	41,0
Spice	39,8	42,5	79,1	73,4	39	41,4
Piperazinas	31,5	34,2	75,6	66,2	31,2	33,8
Mefedrona	30,9	34,2	78,2	66,2	30,5	33,8
Nexus	30,5	34,6	73,4	66,2	30,1	34,1
Metanfetamina	39,8	43,6	80,5	74,7	39,2	43,0
Setas mágicas	50,3	52,0	84,7	84,2	48,9	50,4
Research chemicals	30,6	34,2	67	75,6	30,3	33,8
Legal highs	32,8	35,1	79,3	73,9	32,2	34,7
Salvia	-	37,3	-	75,4	-	36,4
Esteroides anabolizantes	-	53,9	-	72,7	-	53,7

Se excluyen de la base los casos que no contestan y no han oído hablar nunca de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.156.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (porcentajes). España, 2012.



1.2.157.

Prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias. España, 2012.

	Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	Sustancias ilegales*	Ninguna sustancia legal e ilegal
Consumidor de nuevas sustancias alguna vez en la vida	97,7	73,1	1,5
No consumidor de nuevas sustancias	74,5	14,3	24,1

*Sustancias ilegales: cánnabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.158.

Tipo de sustancias psicoactivas (nuevas frente a legales) consumidas alguna vez en la vida, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.159.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (porcentajes). España, 2012.

