



NUEVOS OPIOIDES SINTÉTICOS
Jueves 10 de octubre de 2024

Los analgésicos opioides en nuestro sistema de vigilancia de drogas y adicciones.

Alberto M. Domínguez Lázaro

Consejero Técnico del Observatorio Español de las drogas y las adicciones.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad.




SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

01 Introducción

¿En qué situación estamos?



Fuentes de información

¿Existe un problema de Salud Pública?

Encuestas

Consumo farmacéutico

Indicadores




SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD


DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

02 Encuestas

Prevalencia de consumo de Analgésicos Opioides, por sexo
Población de 15-64 años. España, 2022.




Evolución de la prevalencia de consumo de Analgésicos Opioides
Población de 15-64 años. España, 2018-2022.




02 Encuestas

¿Qué Analgésicos Opioides se consumen más?




¿Por qué se consumen los Analgésicos Opioides?



02 Encuestas


¿Cómo se consumen los Analgésicos Opioides? (EDADES 2022)




02 Encuestas

Prevalencia de consumo de Analgésicos Opioides **sin receta**

Población de 15-64 años. España, 2020-2022



¿Cómo consiguen los Analgésicos Opioides **sin receta**?



*que no me recetaron a mí




SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

02 Encuestas


ESTUDES

Prevalencia de consumo de Analgésicos Opioides **sin receta** Estudiantes de 14 a 18 años. España, 2019-2023.




03 Consumo farmacéutico

Evolución número de envases vendidos de Analgésicos Opioides vendidos
2012-2023




03 Consumo farmacéutico



04 Indicadores

Analgésicos Opioides en los indicadores
España, 2005-2022



— Admisiones a tratamiento como droga principal
— Urgencias relacionadas

— Admisiones a tratamiento como droga secundaria
— Mortalidad

Morfina, Fentanilos, Petidina, Tramadol, Buprenorfina, Codeína, Dextrometorfano, Hidromorfona, Oxicodeona y Tapentadol. Metopón y la Mirofina.
*No sintéticos

04 Indicadores


ADMISIONES A
TRATAMIENTO

2022

45.853 total admisiones ➡ 8.553 opioides ➡ 290 Analgésicos Opioides

0,63% de las admisiones

Evolución Analgésicos Opioides como sustancia principal en admitidos a tratamiento 2014-2022




04 Indicadores

ADMISSIONES A
TRATAMIENTO

2022

Como sustancia secundaria 119 personas ➔ 123 veces.


Evolución Analgésicos Opioides en admisiones a tratamiento como sustancia secundaria.
España, 2014-2022



04 Indicadores

2022

6.627 admisiones a urgencias ➡ 631 relacionados con opioides ➡ 100 Analgésicos Opioides **1,5% urgencias + freq mujeres**




Proporción de urgencias por tipo de opiáceo notificado en el total de urgencias relacionadas con opiáceos. España*, 2005-2022



04 Indicadores

MORTALIDAD


Los opioides siguen una tendencia descendente, siendo superados por la cocaína.



04 Indicadores

SUSTANCIAS AL DETALLE: FENTANILOS

Fentanilos en los indicadores. España. 2008-2022



Perfil de tratamiento


El 45% son mujeres.
Edad media: 52 años
Edad de inicio: 44 años
Sin tratamiento previo.
Consumo diario, vía oral o transdérmica.
Llegan derivados del MAP.
Y no consumen otras sustancias.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
En droga principal: % sobre opiáceos	0,04	0,07	0,03	0,13	0,15	0,19	0,23	0,36	0,57	0,57	0,88	0,92	0,93	2,04	1,52
En droga principal: % sobre total admisiones	0,02	0,02	0,01	0,04	0,04	0,05	0,06	0,09	0,15	0,14	0,21	0,21	0,20	0,39	0,28

04 Indicadores

SUSTANCIAS AL DETALLE: TRAMADOL

Tramadol en los indicadores. España. 2009-2022



Perfil de tratamiento

El 41% son mujeres.
Edad media: 43 años
Edad de inicio: 35 años
Sin tratamiento previo.
Consumo diario, vía oral.
Llegan derivados de Servicios de Salud.
Y no consumen otras sustancias.

05 Conclusiones

El consumo de AO de riesgo (sin indicación y sin receta) en población general es muy aislado.
Es prescrito por el personal médico, se consume según indicación y es más habitual en mujeres.

El consumo farmacéutico de envases parece mostrar cierta tendencia ascendente. Aumentan las DDD (tramadol).

Las consecuencias sociosanitarias del consumo son:

- Aumenta la presencia de AO en las urgencias, en admitidos a tratamiento y en mortalidad.

pero...

...el peso relativo respecto el total de sustancias sigue siendo minoritario
y los perfiles específicos asociados, reflejan un problema derivado del consumo médico prescrito, más que
un consumo ilegal o recreativo.



GRACIAS

adominguezla@sanidad.gob.es