

ESTADÍSTICAS 2013

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS

GESTION, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT). Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Elena ÁLVAREZ
Noelia LLORENS

Begoña BRIME
Aurora RUIZ

Julia GONZÁLEZ
Rosario SENDINO

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS
Mercedes SUÁREZ
Rosario BALLESTA

Aragón

Carmen BARANGUAN
Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón DE HEVÍA
José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Margalida FIOLE
Elena TEJERA

Canarias

Nicolás AMADOR
Pilar Teresa DÍAZ

Cantabria

M^a Carmen DIEGO
Inés RUIZ

Castilla-La Mancha

Berta HERNÁNDEZ
Carmen DE PEDRO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ
Susana REDONDO

Cataluña

Lara GARCÍA
Josep M^a SUELVE

Extremadura

Antonia María VAS
José Luis ARROYO

Galicia

Bernardo SEOANE
Jaime FRAGA

Madrid

Ana RUIZ
Júlio PÉREZ

Murcia

Josefa DURÁN
Isabel CASCALES
Andrés ALCARAZ

Navarra

Miguel MARTÍNEZ
Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA
Oskar LONGO

La Rioja

Juan DEL POZO
Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

Francesc J. VERDÚ
M^a Lidon CALDUCH

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO
Natalia MARTÍNEZ

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a los coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las comunidades autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.

También agradecen a Eva Sánchez, su colaboración en el tratamiento de textos y en la elaboración de tablas y figuras.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid
Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08
Correo electrónico: cendocupnd@msssi.es
Internet: www.pnsd.msssi.gob.es

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-183-8

Conocer la situación y las tendencias de los consumos de drogas, así como las opiniones y actitudes ante las drogas de la población residente en España, es fundamental para la formulación de políticas basadas en datos contrastados para poder orientar el desarrollo y evaluación de intervenciones destinadas a reducir el consumo de drogas y los problemas asociados.

Desde el año 1985, el Plan Nacional sobre Drogas trabaja en actividades de recogida y análisis de datos y de difusión de la información, tanto de carácter estadístico como epidemiológico sobre el consumo de drogas y otras cuestiones relacionadas, por lo que se dispone de una serie temporal cada vez más dilatada que permite analizar la evolución de los consumos de alcohol, tabaco, hipnosedantes y drogas psicoactivas de comercio ilegal, así como las pautas de consumo dominantes, los perfiles de los consumidores, las percepciones sociales ante el problema, y las medidas que los españoles consideran más efectivas para resolverlo.

Por otro lado, la proliferación de nuevas sustancias y su mayor accesibilidad a través de las nuevas tecnologías, hace necesario continuar vigilando periódicamente este consumo, y para ello, se ha creado el Sistema Español de Alerta Temprana, un instrumento para la vigilancia y control de sustancias psicoactivas, desarrollado al amparo de la Decisión del Consejo 2005/387/JAI, que tiene por objeto la detección, análisis, evaluación y control de cualquier eventualidad relacionada con la demanda u oferta de sustancias psicoactivas que induzca consecuencias no esperadas desde el punto de vista de la salud pública.

El 31 de enero de 2013 fue aprobado el Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016, y dentro del eje cuarto de la Estrategia, que hace referencia a la mejora del conocimiento básico y aplicado, se contempla como una de sus acciones la mejora de la difusión de los datos del sistema de información a través de publicaciones y medios virtuales.

El documento que aquí se presenta, responde a la necesidad de continuar dando cumplimiento a dicha acción y contiene la información necesaria e imprescindible para conocer la situación real en nuestro país tanto desde el punto de vista de reducción de la demanda como del de reducción de la oferta, con objeto de poder planificar nuestras acciones conforme a las evidencias que estas informaciones nos aportan.

Se trata por tanto, a la vez, de un instrumento estratégico para la planificación, así como de un rendimiento de cuentas ante la sociedad, mediante una concreción de los compromisos previamente asumidos.

Por último, no quiero finalizar estas palabras sin manifestar mi agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a la elaboración de esta publicación y, de una forma especial, al equipo que compone el Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías que, una vez más, ha hecho gala de su gran profesionalidad y buen hacer, al plasmar su trabajo en las páginas que siguen a este breve prólogo.

Francisco de Asís Babín Vich
Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías

ESTADÍSTICAS 2013

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

ÍNDICE

Presentación	3
Introducción	22
1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas	23
1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2011	24
Metodología	
1.1.1. Distribución de la muestra de la encuesta EDADES 2011 por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2011	24
1.1.2. Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2011	25
Prevalencia de consumo de drogas 1995-2011: evolución temporal. Edad y sexo	
1.1.3. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011	25
1.1.4. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011	26
1.1.5. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011	26
1.1.6. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población española de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011	27
1.1.7. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011	27
1.1.8. Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011	28
1.1.9. Edad media de inicio en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2011	28
1.1.10. Edad media de inicio de consumo de las diferentes sustancias entre la población de 15-64 años. España, 1995-2011	28
1.1.11. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	29
1.1.12. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	30
1.1.13. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	31
1.1.14. Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	32

1.1.15.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1995-2011	32
1.1.16.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1997-2011	33
1.1.17.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2011	33
1.1.18.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2011	34
1.1.19.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2011	34
Prevalencia de consumo de drogas 2011: Comunidad/Ciudad Autónoma		
1.1.20.	Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2011	35
1.1.21.	Prevalencia de consumo de tabaco diario entre la población de 15-64 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2011	35
1.1.22.	Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2011	36
Consumo por tipo de drogas: bebidas alcohólicas		
1.1.23.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas y edad media en el inicio de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011	36
1.1.24.	Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	37
1.1.25.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	37
1.1.26.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según el tipo de bebida consumida (porcentajes). España, 2011	38
1.1.27.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días en fin de semana, en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	38
1.1.28.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en función de los días de la semana que se consuma, y según edad y sexo (porcentajes). España, 2011	39
1.1.29.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2011	39
1.1.30.	Prevalencia de consumo en atracón de bebidas alcohólicas (<i>binge drinking</i>) en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011	40
1.1.31.	Prevalencia de bebedores de riesgo entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	40
Consumo por tipo de drogas: tabaco		
1.1.32.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011	41
1.1.33.	Prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011	41
1.1.34.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2011	42
Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes		
1.1.35.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011	42

1.1.36.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011	43
1.1.37.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	43
1.1.38.	Evolución temporal de la prevalencia de consumo de hipnosedantes (sin receta) en la población de 15-64 años. España, 2003-2011	44
1.1.39.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes (sin receta) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	44
1.1.40.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes (sin receta) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011	44
Consumo por tipo de drogas: cánnabis		
1.1.41.	Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis y edad media de inicio en el consumo de cánnabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011	45
1.1.42.	Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011	45
1.1.43.	Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días en las mujeres de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2009-2011	46
1.1.44.	Prevalencia y continuidad en el consumo de cánnabis en la población de 15-64 años. España, 1995-2011	46
Consumo por tipo de drogas: cocaína		
1.1.45.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011	47
1.1.46.	Prevalencia de consumo de cocaína general (base y/o polvo) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011	47
1.1.47.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011	48
1.1.48.	Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (base y polvo) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011	48
1.1.49.	Prevalencia de consumo de cocaína general (base y/o polvo) en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011	49
1.1.50.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15 a 64 años según sexo. España, 1995-2011	49
1.1.51.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15 a 64 años, según grupo de edad. España, 1995-2011	50
1.1.52.	Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15 a 64 años. España, 1997-2011	50
Consumo por tipo de drogas: éxtasis		
1.1.53.	Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011	51
1.1.54.	Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011	51
Consumo por tipo de drogas: anfetaminas		
1.1.55.	Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011	52
1.1.56.	Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011	52

Consumo por tipo de drogas: alucinógenos

- 1.1.57. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011 53
- 1.1.58. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011 53

Consumo por tipo de drogas: heroína e inhalables volátiles

- 1.1.59. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011 54
- 1.1.60. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011 54

Patrones de consumo de drogas: policonsumo y uso inyectado

- 1.1.61. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales o ilegales) entre las personas que han consumido al menos una droga legal o ilegal en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (%). España, 2011 55
- 1.1.62. Prevalencias de consumo múltiple de drogas en los últimos 12 meses entre los consumidores de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2011 56
- 1.1.63. Prevalencias de consumo múltiple de drogas en los últimos 30 días entre los consumidores de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2011 56
- 1.1.64. Prevalencia de policonsumo de dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes de columna). España, 2011 . . . 57
- 1.1.65. Distribución del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los consumidores, en función de la edad (porcentajes). España, 2011 57
- 1.1.66. Proporción de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, tranquilizantes, somníferos, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína general (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína o inhalables volátiles en los últimos 12 meses (porcentajes de columna). España, 2011 58
- 1.1.67. Proporción de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, tranquilizantes, somníferos, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína general (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína o inhalables volátiles en los últimos 30 días (porcentajes de columna). España, 2011 59
- 1.1.68. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de heroína, cocaína u otras drogas ilegales a través de inyección en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011 59

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

- 1.1.69. Proporción de la población española de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas (porcentajes). España, 2011 60
- 1.1.70. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas). España, 1997-2011 61
- 1.1.71. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas), según sexo y edad. España, 2011 62
- 1.1.72. Evolución de la prevalencia de consumo de un paquete de tabaco diario en los últimos 30 días y riesgo percibido ante el consumo diario de tabaco (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas). España, 1997-2011 63

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

- 1.1.73. Evolución de la percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2011 63
- 1.1.74. Evolución de la disponibilidad percibida de cannabis (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y el precio por gramo de hachís en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011 64
- 1.1.75. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (1 vez o menos al mes). Porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. España, 1997-2011 64

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: relación entre riesgo percibido, percepción de disponibilidad y prevalencia de consumo

- 1.1.76. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (1 vez o menos al mes). Porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. España, 1997-2011 65
- 1.1.77. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en los últimos 12 meses y disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2001-2011 65
- 1.1.78. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (1 vez o menos al mes). Porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. España, 1997-2011 66

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción sobre la importancia del problema del consumo de drogas y visibilidad del problema

- 1.1.79. Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2011 66
- 1.1.80. Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive), diferencia en los últimos 10 años. España, 1995-2011 66
- 1.1.81. Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2011 67

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: vías de información sobre drogas

- 1.1.82. Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre drogas y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2011 67

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

- 1.1.83. Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011 68
- 1.1.84. Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995, 2003 y 2011 69

Nuevas sustancias psicoactivas

- 1.1.85. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2011 69
- 1.1.86. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011 70

1.1.87.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida en la población española de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2010-2011	70
1.1.88.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida en la población española de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2011	71
1.1.89.	Prevalencia de consumo de diversas sustancias alguna vez en la vida en la población española de 15-34 años (porcentajes). España, 2011	71
1.1.90.	Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de nuevas sustancias (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2011	72
1.1.91.	Disponibilidad percibida de nuevas sustancias (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011	72
1.1.92.	Vías de obtención de nuevas sustancias entre aquellos que las han conseguido alguna vez, en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011	73
1.1.93.	Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre nuevas sustancias y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de nuevas sustancias, los efectos y los problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2011	74
1.1.94.	Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre nuevas sustancias y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de nuevas sustancias, los efectos y los problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2011	74
1.1.95.	Número de sustancias psicoactivas consumidas alguna vez en la vida entre los consumidores de cada una de las nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011	75
1.1.96.	Proporción de consumidores de algunas drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido “nuevas sustancias” (ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y esteroides anabolizantes) en los últimos 12 meses (%). España, 2011.	75
1.2.	Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2012	76
	Metodología	
1.2.1.	Distribución de la muestra de la encuesta ESTUDES 2012 por Comunidad/Ciudad Autónoma.	76
1.2.2.	Evolución del tamaño de muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012	77
1.2.3.	Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012	77
	Prevalencia de consumo de drogas 1994-2012: evolución temporal. Edad y sexo	
1.2.4.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012	78
1.2.5.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012	78
1.2.6.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012	79
1.2.7.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012	79
1.2.8.	Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	80

1.2.9.	Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	80
1.2.10.	Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012 ..	81
1.2.11.	Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	81
1.2.12.	Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	82
1.2.13.	Evolución de la edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	82
1.2.14.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012	83
1.2.15.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012	84
1.2.16.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012	85
1.2.17.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012	86
1.2.18.	Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012	86
1.2.19.	Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012	87
1.2.20.	Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012	87

Prevalencia de consumo de drogas 2012: Comunidad/Ciudad Autónoma

1.2.21.	Prevalencias de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012	88
1.2.22.	Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012	89
1.2.23.	Prevalencias de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012	90
1.2.24.	Prevalencias de <i>binge drinking</i> entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012	91
1.2.25.	Prevalencias de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012	92
1.2.26.	Prevalencias de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012	93
1.2.27.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012	94
1.2.28.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012	95

1.2.29.	Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes) por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012	96
1.2.30.	Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han recibido información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012 ..	97
1.2.31.	Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años les gustaría recibir información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012	98

Consumo por tipo de drogas: bebidas alcohólicas

1.2.32.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de <i>binge drinking</i> (últimos 30 días), edad media de inicio al consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	99
1.2.33.	Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	99
1.2.34.	Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2012	100
1.2.35.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 1994-2012	101
1.2.36.	Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2012	102
1.2.37.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas tanto en días laborables como en fin de semana según edad entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	102
1.2.38.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	103
1.2.39.	Prevalencia de consumo de alcohol algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 2012	103
1.2.40.	Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras), en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	104
1.2.41.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en el último mes (porcentajes). España, 1994-2012	104
1.2.42.	Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 2012	105
1.2.43.	Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	105
1.2.44.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (<i>binge drinking</i>) en los últimos 30 días según sexo y edad entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	105
1.2.45.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón (<i>binge drinking</i>) (porcentajes). España, 2008-2012	106
1.2.46.	Prevalencia <i>binge drinking</i> en los últimos 30 días según sexo y edad entre los estudiantes de 14 a 18 años (%). España, 2012	106

1.2.47.	Porcentaje de menores (14-17 años) que han conseguido y consumido alcohol (en el último mes) en diferentes lugares. España, 2012	106
1.2.48.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hagan botellón o no (porcentajes). España, 2012	107
1.2.49.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2012	107
1.2.50.	Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2012	108
1.2.51.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2012	108
1.2.52.	Número de días en los últimos 12 meses en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han viajado como pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, según sexo (porcentajes). España, 2012	109
1.2.53.	Consumo de alcohol en los últimos 30 días por edad y tipo de día de consumo (porcentajes). España, 2012	109
1.2.54.	Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1996-2012	110
1.2.55.	Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida entre los estudiantes de 14-18 años que consumieron alcohol en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2012	111
1.2.56.	Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	111
1.2.57.	Prevalencia de botellón, por lo menos una vez al año, según sexo y edad entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	112
1.2.58.	Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hagan o no botellón por lo menos una vez a la semana (porcentajes). España, 2012	112
1.2.59.	Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días según el consumo de alcohol entre los estudiantes de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012	113

Consumo por tipo de drogas: tabaco

1.2.60.	Prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	113
1.2.61.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012	114
1.2.62.	Evolución de la proporción de consumidores de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (porcentajes). España, 1994-2012	114
1.2.63.	Evolución del porcentaje de personas que fuman diariamente en los hogares de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2012	115
1.2.64.	Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012	115

Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

1.2.65.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012	116
---------	--	-----

1.2.66.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012	116
1.2.67.	Características del consumo de hipnosedantes (con o sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012	117
1.2.68.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes (sin receta) y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentaje). España, 1994-2012	118
1.2.69.	Características del consumo de hipnosedantes (sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012	118
1.2.70.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes (sin receta) en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012	119
1.2.71.	Continuidad en el consumo de hipnosedantes (sin receta) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012	119

Consumo por tipo de drogas: cánnabis

1.2.72.	Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes) y edad media de inicio del consumo. España, 1994-2012 ..	120
1.2.73.	Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012	120
1.2.74.	Prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	121
1.2.75.	Características del consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012	121
1.2.76.	Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (porcentajes). España, 2012	122
1.2.77.	Continuidad en el consumo de cánnabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012	122

Consumo por tipo de drogas: cocaína

1.2.78.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012	123
1.2.79.	Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012	123
1.2.80.	Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	124
1.2.81.	Prevalencia de consumo de cocaína base y cocaína en polvo alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad (porcentajes). España, 2012 ..	124
1.2.82.	Prevalencia de consumo de cocaína base y cocaína en polvo en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad (porcentajes). España, 2012 ..	125
1.2.83.	Características del consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012	125
1.2.84.	Continuidad en el consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012	126

1.2.85.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012 . . .	126
1.2.86.	Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (base y polvo) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	127
Consumo por tipo de drogas: éxtasis		
1.2.87.	Evolución de la prevalencia de éxtasis y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012	127
1.2.88.	Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012	128
1.2.89.	Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012	128
1.2.90.	Características del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012	129
Consumo por tipo de drogas: anfetaminas		
1.2.91.	Evolución de la prevalencia de anfetaminas y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012	129
1.2.92.	Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012 . .	130
1.2.93.	Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012	130
1.2.94.	Características del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012	131
Consumo por tipo de drogas: alucinógenos		
1.2.95.	Evolución de la prevalencia de alucinógenos y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012	131
1.2.96.	Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012 . .	132
1.2.97.	Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012	132
1.2.98.	Características del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012	133
Consumo por tipo de drogas: heroína		
1.2.99.	Evolución del consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012	133
1.2.100.	Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012	134
1.2.101.	Características del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo. España, 1994-2012	134
Consumo por tipo de drogas: inhalables volátiles		
1.2.102.	Prevalencia de consumo y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012	135
1.2.103.	Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012	135
1.2.104.	Características del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012	136

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

1.2.105. Prevalencia de consumo de ninguna, una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012 . . .	136
1.2.106. Distribución del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en el último año entre los consumidores en función de la edad (porcentajes). España, 2012	137
1.2.107. Prevalencia de consumo de ninguna, una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 2012	137
1.2.108. Prevalencia de consumo de ninguna, una sola o más sustancias psicoactivas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	137
1.2.109. Proporción de consumidores de otras drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2012	138
1.2.110. Proporción de consumidores de otras drogas en el último año, que han consumido alcohol en el mismo periodo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	138
1.2.111. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan hecho <i>binge drinking</i> o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2012	139
1.2.112. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2012	139
1.2.113. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cánnabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	139
1.2.114. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	140

Patrones de consumo de drogas: frecuencia de salidas nocturnas y horarios de regreso a casa

1.2.115. Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	140
1.2.116. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, en los últimos 12 meses, en estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según frecuencia de salidas nocturnas (porcentajes). España, 2012	140
1.2.117. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según frecuencia de salidas nocturnas (porcentajes). España, 2012 . .	141
1.2.118. Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2006-2012	141
1.2.119. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	142
1.2.120. Prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales en los últimos 12 meses según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (porcentaje). España, 2012	142
1.2.121. Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2012	143

1.2.122. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en el último año, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2012	143
1.2.123. Prevalencia de consumo de distintas drogas legales e ilegales en los últimos 12 meses, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	144
1.2.124. Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	144
1.2.125. Porcentaje de estudiantes, de 14 a 18 años, que hacen o no <i>binge drinking</i> (en el último mes) según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). España, 2012	145

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.2.126. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensan que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2012	145
1.2.127. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (porcentajes). España, 2012	146
1.2.128. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (porcentajes). España, 1994-2012	146
1.2.129. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual (una vez por semana o más frecuentemente) de drogas. España, 2008-2012	147
1.2.130. Riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012	147

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.2.131. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) (porcentajes). España, 1994-2012	148
1.2.132. Percepción de disponibilidad de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012	148
1.2.133. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (porcentajes). España, 2008-2012	149
1.2.134. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) (porcentajes). España, 1994-2012	149

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: relación entre riesgo percibido, percepción de disponibilidad y prevalencia de consumo

1.2.135. Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco según sexo (porcentajes). España, 1994-2012	150
1.2.136. Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, percepción de riesgo (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y disponibilidad de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	150

1.2.137. Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la disponibilidad de cánnabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	151
1.2.138. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la disponibilidad de cocaína percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012	151
Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: vías de información sobre drogas	
1.2.139. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y según edad (porcentajes). España, 2012	152
1.2.140. Vías por las que han recibido información y vías por las que les gustaría recibir información a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2012	152
1.2.141. Evolución sobre las principales vías de información sobre drogas por las que reciben información los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994- 2012	153
Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas	
1.2.142. Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	153
Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: relación con sus iguales	
1.2.143. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2006-2012	154
1.2.144. Prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (porcentajes). España, 2012	154
1.2.145. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (porcentajes). España, 2012	155
Nuevas sustancias psicoactivas	
1.2.146. Prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012	155
1.2.147. Proporción de consumidores de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años alguna vez en la vida, según sexo (porcentajes). España, 2012	156
1.2.148. Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2010-2012	156
1.2.149. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	157
1.2.150. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de estas sustancias porque no han oído nunca hablar de ellas (porcentajes). España, 2012	157
1.2.151. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (porcentajes). España, 2012	158

1.2.152. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir habitualmente alguna de las siguientes nuevas sustancias, según consuman o no consuman la sustancia (porcentajes). España, 2010-2012	158
1.2.153. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna vez alguna de las siguientes nuevas sustancias, según consuman o no consuman la sustancia (porcentajes). España, 2010-2012	159
1.2.154. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (porcentajes). España, 2012	159
1.2.155. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (porcentajes). España, 2010-2012	160
1.2.156. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (porcentajes). España, 2012	160
1.2.157. Prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias. España, 2012	161
1.2.158. Tipo de sustancias psicoactivas (nuevas frente a legales) consumidas alguna vez en la vida, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012	161
1.2.159. Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (porcentajes). España, 2012	162

2. Problemas relacionados con las drogas 163

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2011 164

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2011

2.1.1. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2011	164
2.1.2. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2011	165
2.1.3. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2011	165
2.1.4. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cánnabis. España, 1996-2011	166
2.1.5. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2011	166
2.1.6. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos España, 1996-2011	167
2.1.7. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2011	167
2.1.8. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2011	168
2.1.9. Número de inyectadores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total de tratados y tratados por primera vez). España, 1996-2011	169
2.1.10. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por heroína (total de tratados y tratados por primera vez). España, 1987-2011	170

2.1.11.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por cocaína (total de tratados y tratados por primera vez). España, 1987-2011	171
2.1.12.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2011	172
2.1.13.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2011	173
2.1.14.	Proporción (%) de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA. España, 1991-2011	174
2.1.15.	Proporción (%) de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, que ha consumido otras drogas ilegales durante los 30 días previos a la admisión. España, 2009-2011 . .	175
2.1.16.	Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los 12 meses previos y conocían su estado serológico (distribución por sexo y edad). España, 1996-2011	176

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2011

2.1.17.	Número y proporción (%) de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2011	177
2.1.18.	Proporción (%) de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según droga principal. España, 2011	177
2.1.19.	Proporción (%) de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total, admitidos primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). España, 2011	178
2.1.20.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2011	179
2.1.21.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2011	180
2.1.22.	Admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol: número y porcentaje de personas según hayan consumido sólo alcohol o alcohol y otras drogas en los 30 días previos a la admisión a tratamiento. España, 2011	182
2.1.23.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2011	182
2.1.24.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según droga principal. España, 2011	184
2.1.25.	Proporción (%) de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol según el número de “otras drogas” consumidas durante los 30 días previos a la admisión. España, 2011	186
2.1.26.	Prevalencia de infección por VIH entre los inyectadores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (%). España, 2011	187

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2011 188

2.2.1.	Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España, 1996-2011	188
2.2.2.	Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionados con el consumo de drogas. España, 1996-2011	189
2.2.3.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionados con el consumo de drogas, total, según sexo y según droga. España, 2011	189
2.2.4.	Vía de administración (número y porcentaje) en los episodios de urgencias hospitalarias relacionados con el consumo de drogas, según tipo de droga. España, 2011	190
2.2.5.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2011	191

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1999-2011	192
Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a drogas	
2.3.1. Número de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas (Indicador Mortalidad y seis ciudades). España, 1983-2011	192
2.3.2. Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2011	193
2.3.3. Proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1983-2011	194
2.3.4. Número y proporción (%) de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 2003-2011	194
2.3.5. Proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína y no opioides, sólo cocaína, sólo cocaína y alcohol). España, 1985-2011	195
2.3.6. Proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides con benzodiazepinas (BZD) y/o alcohol. España, 1983-2011	195
2.3.7. Proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (metadona, sólo metadona, metadona y no otro opiáceo, sólo metadona y benzodiazepinas). España, 1996-2011	196
Registro General de Mortalidad	
2.3.8. Evolución de la mortalidad por consumo de sustancias psicoactivas según sexo. España, 1999-2011	196
2.3.9. Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas desagregado por edad. España, 1999-2011	197
Estimación de la mortalidad a partir del Registro Especifico y del Registro General de Mortalidad	
2.3.10. Estimación del número total de defunciones por drogas ilegales. España, 1983-2011	197
Información complementaria	198
Páginas web de interés	199

INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, drogas ilegales y nuevas sustancias), y los problemas asociados en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

Este documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2013*, se publica, por primera vez, junto con otro documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2013*, al que complementa con una selección de tablas y gráficos.

El presente documento se estructura en dos capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población ante las drogas de 1994 a 2012. Las fuentes de información son dos encuestas: Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) y Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


EDADES y ESTUDES se realizan de forma bienal (un año EDADES y el siguiente ESTUDES), y se promueven y financian directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando, la segunda, con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas de 1987 a 2012. La información procede de tres indicadores clave: Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas e Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal y laboratorios toxicológicos). En algunos casos, los Ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas <http://www.pnsd.msssi.gob.es/> pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998.

Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2011

1.1.1.

Distribución de la muestra de la encuesta EDADES 2011 por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2011.

CCAA	PNSD*	Ampliación**	Realizadas	Error muestral***
Andalucía	2.209	–	2.209	2,1%
Aragón	871	–	871	3,3%
Asturias	786	–	786	3,5%
Baleares	774	204	978	3,1%
Canarias	1.109	1.368	2.477	2,0%
Cantabria	577	415	992	3,1%
Castilla-La Mancha	1.064	–	1.064	3,0%
Castilla y León	1.213	–	1.213	2,8%
Cataluña	2.069	–	2.069	2,2%
C. Valenciana	1.712	–	1.712	2,4%
Extremadura	804	–	804	3,5%
Galicia	1.262	–	1.262	2,8%
Madrid	1.905	–	1.905	2,2%
Murcia	900	–	900	3,3%
Navarra	605	–	605	4,0%
País Vasco	1.117	–	1.117	2,9%
La Rioja	432	317	749	3,6%
Ceuta	209	–	209	6,8%
Melilla	206	–	206	6,8%
Total España	19.824	2.304	22.128	0,7%

* Muestra financiada por el PNSD.


** Muestra financiada por las CCAA.

*** Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95% y $p=q=0,5$

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.2.

Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2011.




1.1.3.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.



1.1.4.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.



1.1.5.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	-	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7
Alcohol	-	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9
Cánnabis	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9
Anfetaminas/speed	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3
Cocaína en polvo	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8
Cocaína base	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	8,3	10,2	8,8
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	7,0	13,0	11,0	17,1
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	4,6	6,0	6,3	7,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	8,7	15,4	13,4	19,5

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.6.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población española de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	–	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2
Alcohol	68,5	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6
Cánnabis	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,1	0,8	0,7
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4
Anfetaminas/speed	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6
Cocaína en polvo	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	3,1	2,7	2,3
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Tranquilizantes (con/sin receta)	–	–	–	–	–	3,9	6,9	5,5	9,8
Tranquilizantes (sin receta)	–	–	–	–	–	0,9	0,9	1,6	0,9
Somníferos (con/sin receta)	–	–	–	–	–	2,7	3,8	3,6	4,4
Somníferos (sin receta)	–	–	–	–	–	0,8	0,8	1,1	0,6
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	5,1	8,6	7,1	11,4
Hipnosedantes* (sin receta)	12,3	2,3	2,3	2,8	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.7.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6
Alcohol	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3
Cánnabis	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0
Éxtasis	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3
Alucinógenos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Anfetaminas/speed	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3
Cocaína en polvo	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	1,3	1,1
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	–	0,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	–	–	–	–	2,7	4,7	4,0	6,9
Somníferos (con/sin receta)	–	–	–	–	2,0	2,5	2,7	3,4
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	3,7	5,9	5,2	8,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.8.

Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011.


	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4
Alcohol	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2
Cánnabis	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,6	2,0	1,7
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	2,6	2,3	4,0
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	1,1	1,4	1,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	3,1	2,7	4,6

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.9.

Edad media de inicio en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2011.



* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES)

1.1.10.

Edad media de inicio de consumo de las diferentes sustancias entre la población de 15-64 años. España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	15,9	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5
Bebidas alcohólicas	-	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7
Cánnabis	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7
Cocaína en polvo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0
Heroína	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7
Anfetaminas	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2
Alucinógenos	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5
Inhalables volátiles	17,7	19,0	18,1	17,5	17,5	17,8	19,7	19,2	19,7
Cocaína base	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	21,4	23,1	22,4
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	20,9	21,0
Éxtasis	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	33,8	34,5	34,5
Hipnosedantes* (sin receta)	35,2	28,7	29,2	29,5	30,0	-	29,1	29,5	27,8

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.11.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Tabaco	71,7	77,6	65,7	60,6	72,5	74,4	78,0	69,3	40,7	72,8	67,8	74,2
Alcohol	90,9	94,0	87,7	86,3	91,5	92,0	92,5	90,6	69,7	91,6	89,5	91,7
Cánnabis	27,4	35,4	19,2	34,6	38,4	30,1	22,1	9,0	18,1	27,7	36,9	21,6
Éxtasis	3,6	5,1	2,0	4,0	6,8	4,2	1,4	0,4	0,9	3,7	5,7	2,3
Alucinógenos	2,9	4,4	1,4	3,0	5,3	3,5	1,6	0,4	1,0	3,0	4,4	2,0
Anfetaminas/speed	3,3	4,8	1,7	3,0	5,7	4,2	1,9	0,5	0,4	3,4	4,6	2,4
Cocaína (polvo y/o base)	8,8	12,8	4,7	7,1	13,7	11,8	7,0	1,8	1,6	9,1	11,1	7,4
Cocaína en polvo	8,8	12,7	4,7	7,0	13,7	11,7	6,9	1,8	1,6	9,0	11,0	7,4
Cocaína base	0,9	1,5	0,3	0,4	1,0	1,5	1,2	0,2	0,0	1,0	0,8	1,0
Heroína	0,6	0,9	0,2	0,2	0,6	0,9	0,7	0,1	0,0	0,6	0,4	0,6
Inhalables volátiles	0,8	1,1	0,4	0,8	1,3	1,1	0,4	0,1	0,7	0,8	1,1	0,6
Tranquilizantes (con/sin receta)	17,1	11,9	22,3	7,2	13,0	17,2	21,8	25,3	2,8	17,5	10,7	21,0
Tranquilizantes (sin receta)	1,9	1,7	2,1	1,6	2,0	2,4	1,8	1,6	1,1	1,9	1,8	2,0
Somníferos (con/sin receta)	7,9	5,5	10,2	2,3	5,1	7,9	10,7	13,2	0,7	8,1	3,9	10,3
Somníferos (sin receta)	1,3	1,1	1,4	0,8	1,1	1,6	1,4	1,2	0,1	1,3	1,0	1,4
Hipnosedantes* (con/sin receta)	19,5	13,7	25,4	8,0	14,8	19,3	24,9	29,8	3,3	20,1	12,1	24,1
Hipnosedantes* (sin receta)	2,4	2,1	2,6	2,0	2,5	2,9	2,2	2,1	1,1	2,4	2,3	2,5
Ketamina	1,0	1,5	0,5	1,4	2,0	1,0	0,4	0,0	0,2	1,0	1,8	0,5
Spice	0,8	1,2	0,3	1,0	1,4	0,9	0,4	0,1	0,3	0,8	1,2	0,5
Piperazinas	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,1	0,2	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1
Nexus	0,2	0,3	0,1	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1
Metanfetamina	0,8	1,2	0,3	0,9	1,2	1,0	0,3	0,1	0,3	0,8	1,1	0,5
Setas mágicas	2,4	3,5	1,2	3,3	4,9	2,1	1,0	0,1	1,5	2,4	4,3	1,2
Research chemicals	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Legal highs	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Salvia	0,9	1,3	0,4	1,1	1,8	0,8	0,3	0,1	0,4	0,9	1,5	0,5
Esteroides anabolizantes	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,4	0,0	0,1	0,0	0,3	0,4	0,2

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.12.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Tabaco	40,2	44,2	36,0	40,6	45,9	42,7	40,9	27,7	26,6	40,6	43,8	37,9
Alcohol	76,6	83,2	69,9	78,5	79,5	78,0	76,5	69,3	62,2	77,1	79,1	75,1
Cánnabis	9,6	13,6	5,5	20,7	14,6	8,5	4,3	1,3	13,4	9,5	17,0	5,1
Éxtasis	0,7	1,0	0,4	1,7	1,2	0,4	0,2	0,0	0,5	0,7	1,4	0,2
Alucinógenos	0,4	0,6	0,2	1,3	0,6	0,2	0,1	0,0	0,8	0,4	0,9	0,1
Anfetaminas/speed	0,6	0,9	0,3	1,4	0,9	0,5	0,2	0,0	0,3	0,6	1,1	0,3
Cocaína (polvo y/o base)	2,3	3,6	0,9	3,5	3,6	2,6	1,1	0,2	1,2	2,3	3,6	1,4
Cocaína en polvo	2,2	3,6	0,9	3,4	3,6	2,6	1,1	0,2	1,2	2,3	3,5	1,4
Cocaína base	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Heroína	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Tranquilizantes (con/sin receta)	9,8	6,4	13,2	3,9	6,6	9,3	13,1	15,9	2,2	10,0	5,5	12,4
Tranquilizantes (sin receta)	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	1,4	0,9	0,3	0,5	1,0	1,0	0,9
Somníferos (con/sin receta)	4,4	3,1	5,9	1,2	2,5	4,4	6,1	8,0	0,5	4,6	2,0	5,9
Somníferos (sin receta)	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,8	0,8	0,2	0,0	0,6	0,5	0,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	11,4	7,6	15,3	4,2	7,7	10,5	15,3	19,1	2,5	11,7	6,3	14,5
Hipnosedantes* (sin receta)	1,2	1,1	1,2	1,1	1,3	1,6	1,2	0,4	0,5	1,2	1,2	1,2
Ketamina	0,2	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,0
Spice	0,1	0,3	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0
Piperazinas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Nexus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Metanfetamina	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1
Setas mágicas	0,4	0,6	0,2	1,1	0,8	0,2	0,0	0,0	1,0	0,4	1,0	0,1
Research chemicals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1
Esteroides anabolizantes	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.13.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Tabaco	37,6	41,4	33,7	36,5	42,9	40,5	38,9	25,9	20,5	38,2	40,4	35,9
Alcohol	62,3	73,2	51,2	61,9	64,9	63,1	63,6	56,9	41,0	63,1	63,7	61,5
Cánnabis	7,0	10,2	3,8	14,7	11,0	6,3	2,7	1,1	8,2	7,0	12,5	3,7
Éxtasis	0,3	0,4	0,2	0,7	0,5	0,2	0,1	0,0	0,4	0,3	0,6	0,1
Alucinógenos	0,2	0,2	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1
Anfetaminas/speed	0,3	0,4	0,1	0,7	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,5	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	1,1	1,8	0,5	1,6	1,8	1,4	0,7	0,0	0,4	1,2	1,7	0,8
Cocaína en polvo	1,1	1,8	0,5	1,6	1,7	1,4	0,7	0,0	0,4	1,2	1,7	0,8
Cocaína base	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Heroína	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	6,9	4,4	9,6	1,8	3,5	6,5	10,1	12,9	0,3	7,2	2,8	9,5
Tranquilizantes (sin receta)	0,5	0,5	0,6	0,3	0,5	0,8	0,8	0,2	0,0	0,6	0,4	0,6
Somníferos (con/sin receta)	3,4	2,1	4,7	0,7	1,6	3,1	5,0	6,7	0,2	3,5	1,3	4,7
Somníferos (sin receta)	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,7	0,2	0,0	0,4	0,3	0,4
Hipnosedantes* (con/sin receta)	8,3	5,2	11,4	2,0	4,3	7,5	12,0	15,7	0,4	8,5	3,4	11,3
Hipnosedantes* (sin receta)	0,7	0,6	0,8	0,5	0,6	1,0	1,0	0,3	0,0	0,7	0,6	0,8
Ketamina	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
Spice	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Piperazinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nexus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Setas mágicas	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0
Research chemicals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
Esteroides anabolizantes	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.14.

Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Tabaco	30,4	34,1	26,7	26,8	34,2	33,7	32,3	21,9	13,8	31,0	31,3	29,9
Alcohol	10,2	15,3	5,0	1,6	4,8	9,2	14,4	21,6	1,0	10,5	3,5	14,4
Cánnabis	1,7	2,7	0,7	3,4	2,6	1,7	0,7	0,3	1,4	1,8	2,9	1,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	4,0	2,2	5,8	0,7	1,5	3,8	6	7,9	0,2	4,1	1,2	5,7
Somníferos (con/sin receta)	1,7	0,9	2,4	0,3	0,5	1,7	2,2	3,9	0,2	1,7	0,4	2,4
Hipnosedantes* (con/sin receta)	4,6	2,5	6,7	0,8	1,7	4,2	6,6	9,7	0,2	4,7	1,3	6,5

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EADADES).

1.1.15.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	55,0	38,7	50,3	39,2	51,5	40,5	53,0	42,6	47,2	37,5	46,0	37,6	48,4	37,0	44,2	36,0
Alcohol	79,3	58,0	86,4	70,5	83,2	67,2	85,2	70,9	84,5	68,4	84,0	69,2	80,4	66,4	84,4	72,7	83,2	69,9
Cánnabis	10,7	4,4	10,7	4,7	9,6	4,3	13,0	5,5	16,2	6,3	15,7	6,6	13,6	6,6	14,8	6,2	13,6	5,5
Éxtasis	1,9	0,7	1,2	0,5	1,2	0,5	2,8	0,7	2,0	0,8	1,8	0,6	1,6	0,5	1,4	0,3	1,0	0,4
Alucinógenos	1,1	0,4	1,4	0,4	0,8	0,4	1,2	0,2	0,9	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2
Anfetaminas/speed	1,3	0,7	1,4	0,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,1	0,5	1,4	0,5	1,3	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3
Cocaína en polvo	2,7	1,0	2,6	0,6	2,3	0,8	3,8	1,3	4,1	1,2	4,6	1,3	4,4	1,5	4,2	1,0	3,6	0,9
Cocaína base	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1,6	4,2	1,0	3,6	0,9
Heroína	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0
Inhalables	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,2	4,7	9,1	3,4	7,6	6,4	13,2
Tranquilizantes (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,0	0,9	0,9	1,5	1,7	0,9	1,0
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	2,8	4,3	2,6	4,6	3,1	5,9
Somníferos (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	0,6	0,8	1,1	1,0	0,5	0,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,7	6,8	11,5	4,6	9,3	7,6	15,3
Hipnosedantes* (sin receta)	8,2	1,6	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	3,1	2,9	3,3	1,1	1,3	1,2	1,4	1,9	1,9	1,1	1,2

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EADADES).

1.1.16.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1997-2011.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	51,4	34,4	45,0	35,2	46,5	36,3	47,9	37,9	43,1	33,6	42,6	34,7	44,7	34,0	41,4	33,7
Alcohol	75,8	52,1	74,4	49,1	76,4	50,9	75,8	52,1	76,0	52,9	71,4	49,0	74,0	52,2	73,2	51,2
Cánnabis	6,7	2,5	6,2	2,8	9,4	3,4	11,3	3,9	12,5	4,7	10,0	4,2	11,0	4,0	10,2	3,8
Éxtasis	0,5	0,1	0,3	0,2	1,3	0,3	0,5	0,2	0,9	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2
Alucinógenos	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
Anfetaminas/speed	0,4	0,1	0,4	0,2	0,9	0,2	0,4	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,1
Cocaína en polvo	1,5	0,2	1,3	0,4	2,2	0,5	1,6	0,5	2,5	0,7	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Inhalables	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,7	3,3	6,3	2,4	5,7	4,4	9,6
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,8	2,0	3,0	1,9	3,5	2,1	4,7
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,1	4,3	7,6	3,2	7,0	5,2	11,4

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.17.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	72,7	66,9	65,2	64,7	69,4	67,6	69,2	68,7	67,9	70,7	66,6	69,8	70,1	78,3	67,8	74,2
Alcohol	-	-	91,4	89,9	87,4	87,2	89,3	88,8	88,9	88,3	93,2	94,1	87,7	88,3	92,2	95,5	89,5	91,7
Cánnabis	22,9	6,1	32,4	14,4	28,1	12,3	34,3	15,3	39,0	21,0	39,4	20,4	37,5	20,2	42,4	25,2	36,9	21,6
Éxtasis	3,5	0,5	4,8	0,4	4,4	0,7	7,7	1,0	8,3	1,6	7,6	1,9	7,2	2,2	8,4	2,6	5,7	2,3
Alucinógenos	3,3	0,9	4,7	1,3	2,9	1,0	4,6	1,3	4,7	1,6	5,4	1,9	5,9	2,3	5,7	2,4	4,4	2,0
Anfetaminas/speed	3,7	1,0	4,2	1,3	3,1	1,3	4,6	1,5	4,7	1,9	5,2	2,0	5,6	2,6	5,7	2,4	4,6	2,4
Cocaína en polvo	5,4	1,4	5,5	1,6	4,7	1,8	7,7	2,4	8,9	3,6	10,4	4,4	11,4	5,5	13,5	7,9	11,0	7,4
Cocaína base	0,5	0,1	0,7	0,2	0,6	0,2	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,6	2,3	1,5	0,9	0,9	0,8	1,0
Heroína	1,4	0,2	0,9	0,3	0,6	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6
Inhalables	1,1	0,3	1,3	0,3	0,9	0,4	1,5	0,2	1,7	0,5	1,2	0,5	1,7	0,8	1,0	0,4	1,1	0,6
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	8,4	8,8	16	7,1	13,8	10,7	21,0
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,8	3,7	7,6	4,0	8,0	3,9	10,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.18.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	54,5	39,9	49,5	40,6	52,0	41,2	52,8	43,8	47,3	38,8	46,2	38,8	45,3	41,1	43,8	37,9
Alcohol	72,9	64,1	82,5	74,9	79,0	71,8	81,5	75,2	79,5	74,2	79,4	74,7	76,9	71,1	80,1	77,7	79,1	75,1
Cánnabis	12,7	2,3	14,2	1,8	12,6	2,2	16,7	3,3	20,1	4,2	19,8	4,7	18,9	3,9	19,4	4,6	17,0	5,1
Éxtasis	2,4	0,1	1,8	0,0	1,6	0,1	3,7	0,2	2,9	0,1	2,4	0,4	2,4	0,4	1,8	0,2	1,4	0,2
Alucinógenos	1,3	0,2	1,8	0,1	1,2	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,5	0,1	1,4	0,1	1,1	0,1	0,9	0,1
Anfetaminas/speed	1,8	0,2	1,8	0,1	1,3	0,2	2,2	0,2	1,6	0,2	1,9	0,3	1,7	0,2	1,4	0,1	1,1	0,3
Cocaína en polvo	3,1	0,5	2,9	0,5	2,8	0,5	4,5	0,9	4,8	0,9	5,2	1,3	5,3	1,3	4,3	1,5	3,5	1,4
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Heroína	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,8	4,4	8,4	3,1	7,1	5,5	12,4
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	1,8	4,6	1,9	4,7	2,0	5,9
Tranquilizantes (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	1,1	0,8	1,6	1,5	1,0	0,9
Somníferos (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,9	0,7	0,7	1,0	1,1	0,5	0,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.19.


Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2011.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	49,6	36,9	43,7	36,9	46,3	37,5	47,2	39,5	42,3	35,5	42,2	36,3	40,9	38,4	40,4	35,9
Alcohol	66,7	61,6	64,4	59,4	65,7	62,1	65,8	62,7	66,3	63,4	61,7	59,4	63,1	63,3	63,7	61,5
Cánnabis	8,5	1,1	7,9	1,5	11,5	2,3	13,4	2,9	15,4	3,6	13,5	2,8	14,1	3,2	12,5	3,7
Éxtasis	0,6	0,0	0,5	0,0	1,5	0,2	0,7	0,0	1,1	0,2	0,8	0,2	0,8	0,1	0,6	0,1
Alucinógenos	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1
Anfetaminas/speed	0,5	0,0	0,5	0,1	1,1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,5	0,1
Cocaína en polvo	1,6	0,2	1,5	0,3	2,4	0,5	1,9	0,4	2,8	0,7	2,9	0,7	2,0	0,7	1,7	0,8
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Inhalables	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,5	2,5	6,2	1,8	5,5	2,8	9,5
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,9	1	3,6	1,2	3,7	1,3	4,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.20.

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2011.




1.1.21.

Prevalencia de consumo de tabaco diario entre la población de 15-64 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2011.



1.1.22.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2011.




1.1.23.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas y edad media en el inicio de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011.



1.1.24.

Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.



1.1.25.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alguna vez en la vida	88,1	84,5	94,0	89,0	94,7	89,0	95,6	89,6	96,5	84,6
Último año	81,9	75,0	85,9	72,8	84,1	71,6	83,5	69,7	79,2	59,5
Último mes	67,3	56,3	74,9	54,4	74,6	50,8	74,6	53,0	72,2	41,2
Diario en el último mes	2,2	1,0	7,3	2,1	13,8	4,3	21,9	7,1	32,5	10,5
Nunca	11,9	15,5	6,0	11,0	5,3	11,0	4,4	10,4	3,5	15,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.26.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según el tipo de bebida consumida (porcentajes). España, 2011.



1.1.27.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días en fin de semana, en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.



1.1.28.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en función de los días de la semana que se consume, y según edad y sexo (porcentajes). España, 2011.

	% que ha consumido 1, 2 o 3 fines de semana en el último mes	% que ha consumido todos los fines de semana en el último mes	% que ha consumido 1, 2 o 3 días laborables por semana en el último mes	% que ha consumido todos los días laborables de la semana en el último mes
Total	32,4	28,6	18,4	12,3
Sexo				
Hombres	33,3	38,4	22,2	18,5
Mujeres	31,4	18,7	14,6	6,0
Edad				
15-17 años	29,6	10,4	6,5	1,1
18-64 años	32,5	29,3	18,8	12,7
15-34 años	38,2	24,3	19,1	4,6
35-64 años	28,8	31,3	18,0	17,0
15-64 años	32,4	28,6	18,4	12,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.29.


Evolución de la prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2011.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES)

1.1.30.

Prevalencia de consumo en atracón* de bebidas alcohólicas (*binge drinking*) en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.



1.1.31.

Prevalencia de bebedores de riesgo* entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	Total	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	Hombre	Mujer
Prevalencia de bebedores de riesgo	4,1	4,3	4,3	3,6	4,3	4,2	4,5	3,5

* Bebedor de riesgo: hombre que consume, por término medio, 50 cc o más de alcohol puro/día o mujer que consume, por término medio 30 cc o más de alcohol puro/día.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.32.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011.



1.1.33.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



1.1.34.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2011.




1.1.35.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes* (con o sin receta) y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.



1.1.36.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes* (con o sin receta) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



1.1.37.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	15 A 64 AÑOS			15 A 34 AÑOS			35 A 64 AÑOS		
	Global	Hombre	Mujer	Global	Hombre	Mujer	Global	Hombre	Mujer
Hipnosedantes* con o sin receta									
Alguna vez	19,5	13,7	25,4	12,1	8,9	15,4	24,1	16,7	31,5
Último año	11,4	7,6	15,3	6,3	4,8	7,9	14,5	9,3	19,8
Último mes	8,3	5,2	11,4	3,4	2,6	4,2	11,3	6,9	15,7
Tranquilizantes con o sin receta									
Alguna vez	17,1	11,9	22,3	10,7	7,8	13,8	21,0	14,5	27,5
Último año	9,8	6,4	13,2	5,5	4,1	7,1	12,4	7,9	16,9
Último mes	6,9	4,4	9,6	2,8	2,1	3,6	9,5	5,8	13,2
Somníferos con o sin receta									
Alguna vez	7,9	5,5	10,2	3,9	3,3	4,6	10,3	6,9	13,6
Último año	4,4	3,1	5,9	2,0	1,7	2,4	5,9	3,9	8,0
Último mes	3,4	2,1	4,7	1,3	1,0	1,5	4,7	2,9	6,6

* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.38.

Evolución temporal de la prevalencia de consumo de hipnosedantes* (sin receta) en la población de 15-64 años. España, 2003-2011.

	2003	2005	2007	2009	2011
Últimos 12 meses	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.39.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes* (sin receta) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.


	15 A 64 AÑOS			15 A 34 AÑOS			35 A 64 AÑOS		
	Global	Hombre	Mujer	Global	Hombre	Mujer	Global	Hombre	Mujer
Hipnosedantes (sin receta)	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3	1,1	1,2	1,0	1,3
Tranquilizantes (sin receta)	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	0,8	0,9	0,8	1,0
Somníferos (sin receta)	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6	0,8

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.40.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes* (sin receta) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.41.

Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis y edad media de inicio en el consumo de cánnabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.42.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



1.1.43.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días en las mujeres de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2009-2011.



1.1.44.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cánnabis en la población de 15-64 años. España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Prevalencia alguna vez en la vida (%) A	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4
Prevalencia últimos 12 meses (%) B	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6
Prevalencia últimos 30 días (%) C	–	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,1	7,6	7,0
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en los últimos 12 meses (%) B/A	51,7	33,6	35,7	38,7	39,0	39,2	37,0	33,0	35,2
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en los últimos 30 días (%) C/A	–	20,1	23,0	26,9	26,2	30,4	26,0	23,7	25,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.45.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.



1.1.46.

Prevalencia de consumo de cocaína general (base y/o polvo) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.47.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.48.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (base y polvo) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.




1.1.49.

Prevalencia de consumo de cocaína general (base y/o polvo) en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.50.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15 a 64 años según sexo. España, 1995-2011.



1.1.51.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15 a 64 años, según grupo de edad. España, 1995-2011.



1.1.52.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años. España, 1997-2011.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Prevalencia alguna vez en la vida (%) A	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8
Prevalencia últimos 12 meses (%) B	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2
Prevalencia últimos 30 días (%) C	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en los últimos 12 meses (%) B/A	47,1	51,6	52,1	45,8	42,9	37,5	25,5	25,6
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en los últimos 30 días (%) C/A	26,5	29,0	27,1	18,6	22,9	20,0	11,8	13,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.53.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.54.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.55.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.56.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.57.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.



1.1.58.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



1.1.59.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.



1.1.60.


Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.



1.1.61.


Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales o ilegales) entre las personas que han consumido al menos una droga legal o ilegal en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (%). España, 2011.

	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Una sola sustancia	51,9	57,1
Dos sustancias	34,7	33,2
Tres sustancias	10,0	7,8
Cuatro sustancias	2,2	1,3
Cinco o más sustancias	1,2	0,6




1.1.62.

Prevalencias de consumo múltiple de drogas en los últimos 12 meses entre los consumidores de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



1.1.63.

Prevalencias de consumo múltiple de drogas en los últimos 30 días entre los consumidores de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



1.1.64.

Prevalencia de policonsumo de dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes de columna). España, 2011.

	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro sustancias	Cinco o más sustancias
Alcohol	95,3	99,0	98,7	99,8
Tabaco	82,8	97,1	96,6	98,3
Cánnabis	5,0	62,6	95,1	95,1
Éxtasis	0,0	0,8	5,7	50,7
Tranquilizantes	14,5	30,5	36,4	43,2
Somníferos	6,4	14,6	16,1	23,8
Cocaína en polvo	0,2	4,0	54,1	82,3
Cocaína base	0,0	0,0	3,1	10,0
Anfetaminas/speed	0,0	0,5	4,5	49,0
Alucinógenos	0,0	0,3	3,3	31,9
Heroína	0,0	0,0	0,5	8,6
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,6	7,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.65.

Distribución del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los consumidores, en función de la edad (porcentajes). España, 2011.

	15-17	18-64	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Una sola sustancia	60,8	51,7	48,5	47,3	52	53,2	59,8
Dos sustancias	22,2	35	29,5	35,1	35,4	36,7	35
Tres sustancias	14,3	9,9	16,2	12,9	8,8	8,1	4,8
Cuatro sustancias	1,5	2,3	3,4	3	2,6	1,5	0,4
Cinco o mas sustancias	1,3	1,2	2,4	1,7	1,1	0,6	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.66.

Proporción de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, tranquilizantes, somníferos, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína general (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína o inhalables volátiles en los últimos 12 meses (porcentajes de columna). España, 2011.

	Alcohol	Tabaco	Cánnabis	Éxtasis	Tranquilizantes	Somníferos	Hipnosedantes*	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles
Alcohol	–	84,7	94,4	97,2	70,9	71,0	71,5	98,1	90,4	98,2	97,6	97,7	94,5	100,0
Tabaco	44,5	–	84	87,7	46,8	49,8	46,4	88,0	93,8	87,8	90,8	92,7	100,0	94,7
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,9	5,1	0,4	0,1	0,3	2,4	5,7	2,3	7,9	11,1	6,5	–
Anfetaminas/speed	0,8	1,4	5,0	51,4	1,4	2,0	1,5	18,2	20,9	18,0	–	52,6	37,1	51,3
Alucinógenos	0,5	0,9	3,7	29,7	0,9	1,1	0,9	10,0	10,3	9,9	35,4	–	24,7	48,9
Heroína	0,1	0,2	0,9	3,5	0,7	1,0	0,6	2,4	17,8	2,4	5,9	5,8	–	6,8
Tranquilizantes	9,0	11,4	12,4	16,3	–	64,6	86,2	17,4	45,0	17,5	23,1	22,5	69,6	43,1
Somníferos	4,1	5,5	5,8	9,8	29,2	–	39,2	10,9	35,7	10,8	14,7	12,3	46,5	6,2
Hipnosedantes*	10,6	13,2	13,6	18,2	–	–	–	19,2	47,5	19,3	28,1	24,9	73,8	43,1
Cánnabis	11,9	20,2	–	84,7	12,2	12,6	11,5	81,5	94,0	81,5	79,4	88,2	90,3	94,7
Éxtasis	0,9	1,5	6,0	–	1,1	1,5	1,1	19,6	29,5	19,6	57,9	49,7	24,7	39,2
Cocaína en polvo	2,9	4,9	19,0	64,2	3,9	5,4	3,7	–	84,3	98,9	68,7	55,1	56,7	57,3
Cocaína base	0,2	0,4	1,6	7,1	0,7	1,3	0,7	6,2	–	7,2	5,7	4,1	30,4	10,1
Cocaína (polvo y/o base)	2,9	5,0	19,2	65	4,0	5,4	3,8	–	–	–	68,7	55,1	56,7	57,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.67.

Proporción de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, tranquilizantes, somníferos, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína general (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína o inhalables volátiles en los últimos 30 días (porcentajes de columna). España, 2011.

	Alcohol	Tabaco	Cánnabis	Éxtasis	Tranquilizantes	Somníferos	Hipnosedantes*	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles
Alcohol	-	72,6	87,5	90,1	51,1	54,0	52,3	98,3	100,0	98,3	93,0	88,0	96,5	100,0
Tabaco	43,9	-	84,5	89,2	45,1	46,2	44,3	89,4	100,0	89,5	97,8	94,1	100,0	100,0
Inhalables volátiles	0,0	0,1	0,2	3,3	0,2	0,2	0,1	0,7	0,0	0,7	6,1	4,6	9,7	-
Anfetaminas/speed	0,4	0,7	2,9	46,9	0,5	0,9	0,5	11,3	9,8	11,3	-	48,0	38,3	63,0
Alucinógenos	0,2	0,4	1,8	30,6	0,4	0,5	0,4	4,8	14,4	4,8	32,3	-	25,7	31,6
Heroína	0,1	0,2	0,8	3,7	0,8	0,9	0,7	2,5	20,8	2,4	9,8	9,8	-	25,5
Tranquilizantes	5,6	8,4	8,4	11,1	-	61,4	84,1	15,2	37,5	15,3	13,3	17,4	83,4	50,7
Somníferos	2,9	4,2	4,6	8,3	30,1	-	41,3	11,2	32,6	11,1	12,7	9,4	47,4	22,1
Hipnosedantes*	6,9	9,8	9,7	12,4	-	-	-	18,1	42,4	18,1	17,4	19,5	83,4	50,7
Cánnabis	10,0	15,9	-	75,5	8,5	9,6	8,2	76,4	97,3	76,4	82,5	79,2	96,1	91,9
Éxtasis	0,4	0,7	2,9	-	0,4	0,7	0,4	11,7	19,6	11,6	52,2	49,8	15,9	37,4
Cocaína en polvo	1,8	2,7	12,4	48,5	2,5	3,7	2,4	-	92,5	99,4	51,6	32,6	43,5	34,5
Cocaína base	0,2	0,3	1,3	6,8	0,5	0,9	0,5	7,7	-	8,3	3,7	8,1	30,7	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	1,8	2,7	12,5	48,5	2,5	3,7	2,5	-	-	-	51,6	32,6	43,5	34,5

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.68.


Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de heroína, cocaína u otras drogas ilegales a través de inyección en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.

Total	Hombre	Mujer	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
0,4	0,6	0,2	0,1	0,3	0,8	0,5	0,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.69.

Proporción de la población española de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas (porcentajes)*. España, 2011.



Conductas	Porcentaje
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	49,3
Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos 1 vez o menos al mes	62,5
Fumar hachís o marihuana 1 vez o menos al mes	69,4
Probar cocaína 1 o 2 veces en su vida	76,5
Probar éxtasis, 1 o 2 veces en su vida	78,2
Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos 1 vez por semana o más	79,9
Fumar hachís o marihuana 1 vez por semana o más	85,5
Fumar un paquete de tabaco diario	89,1
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	91,7
Probar cocaína en forma de base o crack 1 o 2 veces en su vida	91,8
Consumir cocaína 1 vez o menos al mes	94,5
Consumir éxtasis 1 vez o menos al mes	95,4
Consumir alucinógenos (ácidos, tripsis, LSD) 1 vez o menos al mes	96,6
Consumir GHB o éxtasis líquido 1 vez o menos al mes	97,8
Consumir heroína 1 vez o menos al mes	98,0
Consumir éxtasis 1 vez por semana o más	98,9
Consumir cocaína 1 vez por semana o más	99,1
Consumir GHB o éxtasis líquido 1 vez por semana o más	99,4
Consumir heroína 1 vez por semana o más	99,6


* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES)

1.1.70.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas). España, 1997-2011.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95	95,8	94,6	94,5
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62	64,2	68,5	62,7	69,4
Consumir tranquil/somn una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45	49,3



1.1.71.


Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas), según sexo y edad. España, 2011.

	SEXO		EDAD						TOTAL	
	Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	
Fumar un paquete de tabaco diario	87,2	91,0	88,0	88,8	89,4	89,2	89,8	89,2	89,1	89,1
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	43,1	55,7	47,3	42,3	47,3	51,7	60,5	60,9	48,9	49,3
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	89,1	94,3	91,6	91,1	91,1	92,0	92,8	94,1	91,6	91,7
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	63,4	75,5	59,6	60,1	67,4	75,4	86,9	71,6	69,3	69,4
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	81,0	90,1	80,3	80,3	84,5	89,5	94,2	86,9	85,5	85,5
Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos una vez o menos al mes	62,5	62,4	65,8	61,4	61,3	62,6	62,6	73,6	62,1	62,5
Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos una vez por semana o más	79,9	79,9	83,7	80,9	79,3	79,5	76,5	86,7	79,7	79,9
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	75,0	81,5	71,6	72,9	76,5	82,7	88,9	75,8	78,3	78,2
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	94,0	96,7	92,5	93,8	95,4	97,4	97,8	94,0	95,4	95,4
Consumir éxtasis una vez por semana o más	98,5	99,4	98,4	98,5	99,1	99,3	99,4	98,9	98,9	98,9
Probar cocaína una o dos veces en su vida	72,4	80,7	71,1	70,9	74,5	80,8	87,0	76,2	76,5	76,5
Consumir cocaína una vez o menos al mes	92,7	96,4	92,4	92,3	94,4	95,8	98,0	94,1	94,6	94,5
Consumir cocaína una vez por semana o más	98,7	99,5	98,7	98,8	99,1	99,4	99,6	99,4	99,1	99,1
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,4	98,7	96,8	97,7	98,0	98,7	98,8	97,8	98,0	98,0
Consumir heroína una vez por semana o más	99,5	99,8	99,5	99,6	99,6	99,7	99,8	99,8	99,6	99,6
Consumir alucinógenos (ácidos, tripsis, LSD) una vez o menos al mes	95,6	97,7	94,5	95,3	96,9	97,9	98,6	96,9	96,6	96,6
Probar cocaína en forma de base o crack 1 o 2 veces en su vida	90,2	93,4	88,7	90,5	91,4	93,6	94,9	89,9	91,9	91,8
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	97,1	98,5	96,7	97,2	97,9	98,4	99,0	97,8	97,8	97,8
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	99,2	99,7	99,1	99,4	99,5	99,5	99,7	99,9	99,4	99,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.72.

Evolución de la prevalencia de consumo de un paquete de tabaco diario en los últimos 30 días y riesgo percibido ante el consumo diario de tabaco (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas). España, 1997-2011.




1.1.73.

Evolución de la percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes)*. España, 1995-2011.




1.1.74.

Evolución de la disponibilidad percibida de cánnabis (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y el precio por gramo de hachís en la población de 15-64 años (porcentajes)*. España, 1997-2011.




1.1.75.

Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (1 vez o menos al mes). Porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. España, 1997-2011.




1.1.76.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (1 vez o menos al mes). Porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. España, 1997-2011.




1.1.77.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en los últimos 12 meses y disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) en la población de 15-64 años (porcentajes)*. España, 2001-2011.



1.1.78.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (1 vez o menos al mes). Porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. España, 1997-2011.



1.1.79.

Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2011.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	Diferencia 2009- 2011
Nada importante	19,6	22,3	19,1	20,9	14,8	20,5	20,4	27,5	7,1
Algo importante	28,1	32,1	34,3	34,3	27,9	29,7	30,7	32,5	1,8
Muy importante	46,4	37,3	39,3	36,3	52	49,8	48,9	40	-8,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.80.


Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive), diferencia en los últimos 10 años. España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	Diferencia 2001-2011
Jeringuillas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2	3,8	2,9	-5,5
Personas inyectándose drogas	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8	2,9	2,1	-3,8
Personas fumando chinos	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6	4,4	3,3	-2,8
Personas drogadas caídas en el suelo	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6	6,2	5,2	-3,5
Vendedores que ofrecen drogas	11,4	10,0	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2	13,5	10,7	1,9
Personas esnifando drogas por la nariz	-	-	-	-	-	-	11,6	10,4	8,6	-

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.81.

Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2011.



1.1.82.


Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre drogas y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2011.



1.1.83.


Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes)*. España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Educación en las escuelas	94,3	93,1	91,8	89,4	89,5	88,8	90,6	90,4	91,8
Tratamiento voluntario a consumidores	86,3	87,1	84,8	81,6	82,7	82,4	83,2	85,1	84,9
Control policial y aduanero	85,8	83,7	82,1	80,5	78,8	79,8	83,3	84,7	84,2
Campañas publicitarias	84,5	81,5	79,8	77,6	75,6	77,7	79,1	77,7	81
Leyes estrictas contra las drogas	79,3	77	76,9	75,5	73,2	75,3	77,9	80,6	80,3
Administración médica de metadona	63,8	62,9	67,5	66,6	67,1	68,4	66,8	65,8	72,4
Tratamiento obligatorio a consumidores	56,2	57,2	57,9	62,8	59,7	58,2	56,3	57,2	65,7
Administración médica de heroína	43,3	47,5	53,9	58,2	59,3	59,9	52,8	48,9	60,2
Legalización de cánnabis	27,3	30,2	33,3	38,5	37,1	35,2	23,4	29,6	32,7
Legalización de todas las drogas	19,8	21,5	24,6	27,1	23,5	21,4	16,6	15,6	20,9



1.1.84.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995, 2003 y 2011.



1.1.85.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias* entre la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	15-18 años			19-34 años			35-64 años			15-64 años		
	Global	H	M	Global	H	M	Global	H	M	Global	H	M
Alguna vez en la vida	2,4	3,5	1,3	6,6	9,5	3,6	2,1	3,3	0,9	3,6	5,4	1,8
Último año	1,8	2,4	1,2	1,7	2,6	0,8	0,3	0,5	0,1	0,9	1,3	0,4
Último mes	0,4	0,6	0,2	0,8	1,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,2

* Incluye: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y esteroides anabolizantes.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.86.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias* entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ketamina	1,0	0,2	0,0
Spice	0,8	0,1	0,1
Piperazinas	0,1	0,0	0,0
Mefedrona	0,1	0,0	0,0
Nexus	0,2	0,0	0,0
Metanfetamina	0,8	0,2	0,1
Setas mágicas	2,4	0,4	0,1
Research chemicals	0,1	0,0	0,0
Legal highs	0,1	0,0	0,0
Salvia	0,9	0,2	0,1
Esteroides anabolizantes	0,3	0,1	0,1

* Incluye: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y esteroides anabolizantes.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.87.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias* alguna vez en la vida en la población española de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2010-2011.


	TOTAL	2010	2011								
		14-18	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Ketamina	1,0	1,1	1,4	2,0	1,0	0,4	0,0	0,2	1,0	1,8	0,5
Spice	0,8	1,1	1,0	1,4	0,9	0,4	0,1	0,3	0,8	1,2	0,5
Piperazinas	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1
Nexus	0,2	0,5	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1
Metanfetamina	0,8	0,8	0,9	1,2	1,0	0,3	0,1	0,3	0,8	1,1	0,5
Setas mágicas	2,4	2,1	3,3	4,9	2,1	1,0	0,1	1,5	2,4	4,3	1,2
Research chemicals	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Legal highs	0,1	0,7	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Salvia	0,9	–	1,1	1,8	0,8	0,3	0,1	0,4	0,9	1,5	0,5
Esteroides anabolizantes	0,3	–	0,3	0,6	0,4	0,0	0,1	0,0	0,3	0,4	0,2

* Incluye: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y esteroides anabolizantes.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES) y Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES).


1.1.88.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida en la población española de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2011.



1.1.89.

Prevalencia de consumo de diversas sustancias alguna vez en la vida en la población española de 15-34 años (porcentajes). España, 2011.



1.1.90.

Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de nuevas sustancias (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas)*, según sexo y edad. España, 2011.

	SEXO		EDAD					TOTAL
	Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Ketamina	94,4	96,5	93,9	94,4	95,8	96,6	97,2	95,4
Spice	94,3	96,7	93,0	94,6	96,2	96,4	97,5	95,4
Piperazinas	95,5	97,2	95,1	95,5	96,5	96,8	98,3	96,3
Mefedrona	95,6	97,3	95,2	95,5	96,9	96,8	98,3	96,4
Nexus	95,4	97,2	94,5	95,4	96,9	96,9	97,7	96,2
Metanfetamina	94,5	97,2	94,1	95,1	96,0	96,8	97,4	95,7
Setas mágicas	90,1	94,3	87,6	89,9	93,0	95,8	96,5	92,0
Research chemicals	95,7	97,4	95,4	95,7	96,9	97,1	97,7	96,5
Legal highs	95,4	97,4	95,3	95,2	96,8	97,0	98,0	96,3
Salvia	92,0	94,9	91,2	91,5	94,6	94,6	95,8	93,3
Esteroides anabolizantes	91,5	94,5	90,5	91,9	93,8	93,3	95,9	92,9

* Eliminando los casos que señalan que No conocen la sustancia o que han contestado Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.91.

Disponibilidad percibida de nuevas sustancias (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes)*. España, 2011.

	SEXO		EDAD					TOTAL
	Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Ketamina	43,0	39,2	45,8	45,5	42,0	36,1	28,4	41,4
Spice	45,3	42,2	49,0	49,0	44,0	38,4	30,9	43,9
Piperazinas	42,8	39,2	45,5	45,0	42,8	36,5	29,2	41,2
Mefedrona	42,2	38,7	45,6	44,7	41,5	36,2	28,6	40,7
Nexus	42,2	39,3	45,1	44,8	42,1	36,3	29,9	40,9
Metanfetamina	43,4	38,6	46,5	45,4	41,5	36,3	29,2	41,3
Setas mágicas	46,4	40,3	50,2	47,9	42,8	37,8	30,9	43,7
Research chemicals	42,7	39,3	45,9	44,9	42,1	37,5	28,5	41,2
Legal highs	42,5	39,1	45,8	45,2	42,2	36,4	28,2	41,0
Salvia	44,8	40,7	48,4	47,7	43,7	36,9	31,1	43,0
Esteroides anabolizantes	51,7	45,2	54,4	55,2	48,7	41,8	35,2	48,8


* Eliminando los casos que señalan que No conocen la sustancia o que han contestado Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.92.

Vías de obtención de nuevas sustancias entre aquellos que las han conseguido alguna vez, en la población de 15-64 años (porcentajes)*. España, 2011.

¿Dónde consiguió estas drogas?	
A través de Internet: páginas web	0,9
A través de Internet: redes sociales	0,4
A través de Internet: foros	0,1
Un amigo/a o conocido/a	55,0
A través de un distribuidor	13,2
En una discoteca o bar	13,2
En una tienda especializada (smart shop o head shop)	6,1
En un festival	5,4
Otros	5,6



1.1.93.


Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre nuevas sustancias y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de nuevas sustancias, los efectos y los problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2011.

	Vías por las que ha recibido información	Vías por las que le gustaría recibir información
A través de Internet: páginas web	6,1	14,2
A través de Internet: redes sociales	2,4	9,2
A través de Internet: foros	1,3	5,0
Padres/familiares	5,2	6,2
Un amigo/a, conocido/a o compañero/a de trabajo	14,2	5,1
Profesionales sociosanitarios (médicos, enfermeras/os, trabajadores sociales)	4,0	18,6
Profesores/as	6,7	14,4
Charlas o cursos sobre el tema	5,8	16,4
Organismos oficiales (ministerios, consejerías...)	2,6	11,8
Libros y/o folletos	6,8	14,6
Los medios de comunicación (prensa, televisión o radio)	30,0	39,4
La policía	1,2	5,0
Personas que han tenido contacto con ellas	6,6	8,0
Otros	1,4	0,7
No he recibido información sobre dichas drogas	50,8	-
No me interesa este tipo de información	-	34,5
No contesta	1,8	3,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.94.


Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre nuevas sustancias y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de nuevas sustancias, los efectos y los problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2011.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES)

1.1.95.

Número de sustancias psicoactivas consumidas alguna vez en la vida entre los consumidores de cada una de las nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.



1.1.96.

Proporción de consumidores de algunas drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido “nuevas sustancias” (ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y esteroides anabolizantes) en los últimos 12 meses (%). España, 2011.

	Ketamina	Spice	Piperazinas	Mefedrona	Nexus	Metanfetamina	Setas mágicas	Research chemicals	Legal highs	Salvia	E. anabolizantes
Alcohol	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Tabaco	97,2	85,2	79,0	100,0	100,0	88,2	87,9	79,0	100,0	81,4	82,0
Inhalables volátiles	12,4	7,4	55,3	19,2	0,0	12,8	5,6	26,5	0,0	4,7	0,0
Anfetaminas/speed	61,8	48,5	79,0	73,1	68,5	71,4	32,6	87,7	71,0	22,6	20,1
Alucinógenos	46,6	25,9	55,3	67,6	54,4	37,4	45,8	47,6	10,7	18,1	5,0
Heroína	9,2	11,4	0,0	10,4	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
Tranquilizantes	34,2	13,5	38,8	9,0	58,8	27,3	17,3	26,5	12,6	15,2	44,3
Somníferos	22,2	13,3	0,0	0,0	34,7	17,2	7,6	21,1	12,6	4,0	25,7
Hipnosedantes*	34,8	14,5	38,8	9,0	58,8	27,3	19,2	47,6	12,6	15,2	45,2
Cánnabis	94,1	90,8	100,0	100,0	100,0	84,3	84,9	100,0	100,0	73,3	55,5
Éxtasis	67,5	49,8	55,3	66,5	92,6	61,2	36,0	87,7	71,0	19,0	20,9
Cocaína en polvo	79,9	67,1	79,0	69,4	79,9	74,1	48,2	66,5	71,0	32,9	34,0
Cocaína base	13,2	20,3	0,0	0,0	0,0	15,3	3,9	21,0	0,0	3,7	19,1
Cocaína (polvo y/o base)	79,9	71,6	79,0	69,4	79,9	74,1	48,2	66,5	71,0	32,9	34,0

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2012

Tabla 1.2.1.

Distribución de la muestra de la encuesta ESTUDES 2012 por Comunidad/Ciudad Autónoma.

CCAA	Número de colegios			Número de alumnos			Error muestral***
	PNSD*	Ampliación**	Tamaño final	PNSD*	Ampliación**	Tamaño final	
Andalucía	63	–	63	2.378	–	2.378	2,1%
Aragón	24	44	68	870	1.594	2.464	2,0%
Asturias	25	34	59	858	1.166	2.024	2,2%
Baleares	22	–	22	806	–	806	3,5%
Canarias	32	–	32	1.155	–	1.155	2,9%
Cantabria	23	35	58	763	1.160	1.923	2,3%
Castilla-La Mancha	30	13	43	1.201	520	1.721	2,4%
Castilla y León	33	–	33	1.151	–	1.151	2,9%
Cataluña	55	–	55	2.353	–	2.353	2,1%
C. Valenciana	48	–	48	1.696	–	1.696	2,4%
Extremadura	27	–	27	860	–	860	3,4%
Galicia	38	22	60	1.281	741	2.022	2,2%
Madrid	52	29	81	2.086	1.164	3.250	1,8%
Murcia	27	–	27	1.054	–	1.054	3,1%
Navarra	17	–	17	605	–	605	4,1%
País Vasco	30	–	30	1.096	–	1.096	3,0%
La Rioja	12	–	12	477	–	477	4,6%
Ceuta	6	–	6	232	–	232	6,6%
Melilla	6	–	6	236	–	236	6,5%
Total España	570	177	747	21.157	6.346	27.503	0,6%

* Muestra financiada por el PNSD.

** Muestra financiada por las CCAA

*** Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95% y $p=q=0,5$

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.2.

Evolución del tamaño de muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.




1.2.3.

Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.




1.2.4.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.




1.2.5.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.




1.2.6.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.8.

Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5
Hipnosedantes* (sin receta)	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9
Cánnabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4
Cocaína (polvo y/o base)	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9
GHB	-	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.9.

Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6
Hipnosedantes* (sin receta)	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8
Cánnabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7
Cocaína (polvo y/o base)	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2
GHB	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.10.

Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	37,4	27,8	32,4	26,2	29,7
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	3,6	5,1	5,2	6,6
Hipnosedantes* (sin receta)	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4
Cánnabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0
Cocaína (polvo y/o base)	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8
GHB	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	0,5	0,7

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.11.

Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	21,6	23,7	23,1	23	21	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5
Alcohol	–	–	–	–	–	–	1,9	2,9	6,0	2,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	0,4	0,6	0,7	0,9
Hipnosedantes* (sin receta)	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3
Cánnabis	1,0	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.12.

Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.13.

Evolución de la edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6
Tabaco (consumo diario)	–	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5
Alcohol	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9
Alcohol (consumo semanal)	–	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	15,6	14,8	15,1
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	13,8	14,0	13,9	14,3
Hipnosedantes* (sin receta)	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,2	14,6
Cánnabis	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9
Cocaína (polvo y/o base)	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,3	15,3	14,9	15,5
Cocaína polvo	–	–	–	–	–	–	15,4	15,4	15,4	15,6
Cocaína base	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,2
Heroína	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4
Anfetaminas	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5
Alucinógenos	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4
Inhalables volátiles	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4
Éxtasis	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8
GHB	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,1

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.14.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
	T	H	M	14 T	14 H	14 M	15 T	15 H	15 M	16 T	16 H	16 M	17 T	17 H	17 M	18 T	18 H	18 M
Alguna droga ilegal ¹	34,1	37,0	31,2	13,9	15,7	12,1	23,3	24,1	22,6	33,0	36,0	30,2	43,6	47,9	39,1	51,7	54,5	48,6
Alguna droga ilegal sin cánnabis ²	6,3	8,2	4,4	2,6	3,3	1,9	3,7	4,0	3,5	5,2	7,0	3,6	7,8	9,8	5,8	12,2	16,8	7,0
Alguna droga excepto alcohol y tabaco ³	44,0	43,5	44,4	23,9	23,9	23,8	33,5	30,8	36,2	43,5	42,7	44,4	52,6	53,6	51,6	61,4	60,1	62,8
Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes ⁴	34,5	37,4	31,6	14,8	16,6	13,0	23,6	24,3	22,9	33,5	36,4	30,7	43,9	48,2	39,4	51,9	54,7	48,9
Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnos. con receta ⁵	38,6	40,0	37,2	18,7	19,8	17,6	27,6	26,3	28,8	38,1	39,1	37,2	47,6	50,6	44,5	56,3	57,5	54,9
Tabaco	43,8	41,6	46,1	27,1	24,2	30,0	35,4	31,2	39,4	43,0	40,6	45,2	50,9	50,0	51,9	59,1	56,6	61,9
Borracheras	60,7	59,9	61,5	31,5	29,2	33,8	47,4	42,6	52,0	62,3	61,5	63,1	73,1	74,1	72,1	80,4	81,3	79,4
Alcohol	83,9	82,9	84,9	65,9	63,2	68,6	77,7	75,7	79,6	86,2	84,8	87,5	90,8	90,4	91,2	92,6	93,2	92,1
Hipnosedantes ⁶ (con/sin receta)	18,5	14,1	23,0	12,7	10,5	14,9	15,8	11,7	19,8	18,5	13,8	23,0	20,4	15,3	25,8	23,8	18,2	30,0
Hipnosedantes ⁶ (sin receta)	8,9	6,9	11,0	5,8	5,1	6,5	6,9	4,4	9,4	9,3	6,9	11,7	9,9	7,8	12,1	12,1	10,1	14,3
Cánnabis	33,6	36,3	30,7	13,5	15,2	11,7	22,9	23,6	22,3	32,5	35,3	29,9	43,1	47,2	38,8	50,7	53,2	47,9
Cocaína (polvo y/o base)	3,6	4,8	2,5	1,4	1,9	0,9	2,1	2,4	1,8	2,8	3,8	1,9	4,4	5,7	3,1	7,6	10,2	4,7
Cocaína en polvo	2,9	3,9	1,8	0,8	1,3	0,4	1,4	1,7	1,1	2,2	3,0	1,5	3,5	4,6	2,3	6,6	9,0	4,0
Cocaína base	2,2	3,0	1,4	1,1	1,5	0,8	1,6	1,7	1,5	1,8	2,7	1,0	2,6	3,4	1,8	3,9	5,7	1,9
Éxtasis	3,0	3,9	2,0	1,1	1,5	0,6	1,6	1,6	1,6	2,5	3,2	1,8	3,9	4,9	2,9	5,6	8,1	2,8
Anfetaminas/speed	2,4	3,2	1,5	0,9	1,2	0,5	1,2	1,3	1,1	2,0	2,7	1,3	3,1	4,0	2,2	4,5	6,6	2,1
Alucinógenos	3,1	4,1	2,1	1,2	1,7	0,7	2,0	2,0	1,9	2,7	3,8	1,6	3,7	4,7	2,7	6,0	8,4	3,3
Heroína	1,0	1,4	0,5	0,6	1,0	0,2	1,0	0,9	1,0	0,9	1,5	0,3	1,2	1,7	0,7	0,9	1,6	0,3
Inhalables volátiles	1,9	2,4	1,3	1,7	2,1	1,3	1,4	1,3	1,5	2,0	2,7	1,2	2,1	2,9	1,2	2,0	2,9	1,1
GHB	1,3	1,9	0,8	0,6	1,0	0,3	0,9	0,8	1,0	1,4	2,3	0,5	1,5	1,9	1,1	2,2	3,4	0,9
Ketamina	1,1	1,5	0,7	0,6	0,8	0,5	0,8	0,9	0,7	1,0	1,5	0,6	1,3	1,8	0,8	1,6	2,3	0,7
Spice	1,4	1,9	1,0	0,4	0,6	0,2	0,8	0,8	0,8	1,3	2,2	0,4	1,9	2,5	1,3	2,5	2,7	2,1
Piperazinas	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5	0,9	0,2	0,5	0,7	0,3	0,3	0,3	0,4
Mefedrona	0,5	0,7	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0	0,1	0,6	1,0	0,3	0,3	0,2	0,4
Nexus	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	1,0	0,1	0,7	1,1	0,3	0,5	0,5	0,4
Metanfetamina	0,9	1,3	0,6	0,4	0,5	0,2	0,6	0,7	0,6	0,9	1,3	0,5	1,2	1,7	0,7	1,4	1,9	0,8
Setas mágicas	2,2	3,0	1,4	0,8	1,4	0,3	1,2	1,2	1,2	1,8	2,8	0,8	2,9	3,7	1,9	4,4	6,0	2,7
Research chemicals	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,1	0,5	0,7	0,2	0,4	0,4	0,5
Legal highs	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,1	0,5	0,4	0,6	0,4	0,8	0,1	0,5	0,7	0,3	0,3	0,4	0,3
Salvia	0,8	1,2	0,4	0,5	0,7	0,2	0,7	0,8	0,7	0,7	1,2	0,2	0,9	1,3	0,5	1,2	2,0	0,4
Esteroides anabolizantes	0,7	1,1	0,3	0,5	0,9	0,2	0,6	0,8	0,5	0,7	1,3	0,1	1,0	1,6	0,4	0,6	0,8	0,4

1. Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlo.

2. Alguna droga ilegal sin cánnabis: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

3. Alguna droga excepto alcohol y tabaco: hipnosedantes en general + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

4. Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes (ni con y/o sin, ni sin): inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

5. Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnosedantes con receta (son aquellas personas que han contestado que consumen hipnosedantes en general pero no han contestado sin receta): hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína.

6. Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
	T	H	M	14 T	14 H	14 M	15 T	15 H	15 M	16 T	16 H	16 M	17 T	17 H	17 M	18 T	18 H	18 M
Alguna droga ilegal ¹	27,1	30,5	23,7	11,0	12,0	9,9	19,2	20,0	18,5	26,9	29,9	24,2	34,8	39,7	29,5	39,4	44,7	33,4
Alguna droga ilegal sin cánnabis ²	4,4	6,1	2,7	1,9	2,2	1,5	2,7	3,2	2,3	4,0	5,6	2,5	5,2	6,9	3,4	8,2	12,2	3,6
Alguna droga excepto alcohol y tabaco ³	34,4	35,1	33,8	17,4	17,0	17,8	26,0	24,2	27,6	34,2	34,4	33,9	42,0	44,0	39,9	48,3	50,0	46,4
Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnos. ⁴	27,4	30,8	24,0	11,5	12,6	10,3	19,5	20,3	18,7	27,2	30,1	24,4	35,1	40,1	29,8	39,6	44,9	33,7
Alguna droga sin alcohol, tabaco e hipnos. con receta ⁵	30,7	32,9	28,5	14,2	14,7	13,7	22,3	21,5	22,9	30,5	32,2	29,0	38,3	42,3	34,1	44,0	47,8	39,8
Tabaco	35,3	33,1	37,5	20,6	16,9	24,5	28,6	24,7	32,3	34,7	32,2	37,1	40,9	40,0	41,9	48,6	47,3	50,1
Borracheras	52,0	51,7	52,3	26,1	23,1	29,2	40,2	35,5	44,6	53,4	52,6	54,1	62,6	65,1	60,1	70,5	73,1	67,6
Alcohol	81,9	80,9	82,9	63,1	60,0	66,2	75,3	73,2	77,3	84,2	82,9	85,4	89,2	89,0	89,5	91,3	91,9	90,5
Alcohol + cánnabis	26,1	29,1	23,1	10,2	10,9	9,4	18,5	19,1	17,9	26,1	28,7	23,7	33,6	38,0	29,0	37,8	42,9	32,2
Alcohol + cocaína (polvo y/o base)	2,4	3,2	1,5	1,0	1,2	0,7	1,5	1,7	1,3	2,1	3,0	1,2	2,7	3,4	2,0	4,8	6,8	2,5
Hipnosedantes ⁶ (con/sin receta)	11,6	8,4	14,9	7,8	6,1	9,5	9,9	7,0	12,7	11,6	7,9	15,1	12,9	9,2	16,8	15,0	11,3	19,1
Hipnosedantes ⁶ (sin receta)	5,8	4,4	7,3	3,7	3,2	4,3	4,5	2,7	6,3	6,0	4,0	7,8	6,4	5,1	7,8	7,9	6,5	9,5
Cánnabis	26,6	29,7	23,3	10,5	11,5	9,5	18,9	19,6	18,2	26,4	29,1	23,9	34,1	38,8	29,1	38,4	43,7	32,5
Cocaína (polvo y/o base)	2,5	3,4	1,6	1,0	1,3	0,7	1,5	1,8	1,3	2,2	3,2	1,2	2,9	3,8	2,0	4,8	6,9	2,5
Cocaína en polvo	2,0	2,8	1,2	0,7	1,1	0,4	1,0	1,2	0,8	1,8	2,5	1,1	2,3	3,1	1,5	4,3	6,3	2,1
Cocaína base	1,6	2,2	1,0	0,9	1,1	0,6	1,2	1,2	1,1	1,4	2,3	0,6	1,8	2,3	1,2	2,8	4,2	1,3
Éxtasis	2,2	3,0	1,4	0,9	1,1	0,6	1,0	1,1	1,0	2,1	2,8	1,4	2,8	3,6	1,9	3,8	5,9	1,6
Anfetaminas/speed	1,7	2,4	1,1	0,7	1,0	0,4	0,9	1,0	0,9	1,5	2,3	0,8	2,4	3,2	1,6	2,8	4,1	1,5
Alucinógenos	2,0	2,9	1,1	0,9	1,2	0,5	1,4	1,6	1,2	1,9	2,8	1,0	2,2	3,2	1,3	3,5	5,6	1,2
Heroína	0,7	1,1	0,4	0,5	0,9	0,2	0,8	0,9	0,7	0,8	1,3	0,3	0,8	1,2	0,4	0,5	0,7	0,3
Inhalables volátiles	1,2	1,6	0,8	1,1	1,5	0,7	0,9	1,0	0,8	1,4	1,9	0,9	1,3	1,8	0,9	1,1	1,5	0,6
GHB	1,0	1,5	0,5	0,5	0,8	0,3	0,7	0,6	0,7	1,1	2,0	0,4	1,1	1,5	0,6	1,7	2,6	0,8
Ketamina	0,7	0,9	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,6	0,4	0,7	1,1	0,4	0,9	1,1	0,6	0,6	1,0	0,3
Spice	1,0	1,3	0,7	0,2	0,4	0,1	0,6	0,6	0,6	1,0	1,7	0,3	1,4	1,7	1,0	1,6	1,7	1,5
Piperazinas	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,1	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,3	0,4	0,9	0,0	0,4	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0
Nexus	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,3	0,5	0,9	0,1	0,5	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0
Metanfetamina	0,7	1,0	0,4	0,2	0,3	0,1	0,5	0,6	0,5	0,7	1,2	0,3	0,9	1,3	0,5	0,9	1,3	0,4
Setas mágicas	1,4	2,1	0,8	0,6	1,0	0,2	0,9	0,8	0,9	1,2	1,9	0,4	1,9	2,6	1,1	2,4	3,9	0,8
Research chemicals	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,7	0,0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Legal highs	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,0	0,4	0,4	0,5	0,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,2	0,1	0,3	0,0
Salvia	0,5	0,9	0,2	0,4	0,7	0,1	0,5	0,5	0,4	0,5	1,0	0,1	0,7	0,9	0,4	0,6	1,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,5	0,8	0,2	0,4	0,7	0,1	0,5	0,6	0,3	0,4	0,8	0,1	0,7	1,1	0,3	0,2	0,4	0,0

1. Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlo.

2. Alguna droga ilegal sin cánnabis: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

3. Alguna droga excepto alcohol y tabaco: hipnosedantes en general + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

4. Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes (ni con y/o sin, ni sin): inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

5. Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnosedantes con receta (son aquellas personas que han contestado que consumen hipnosedantes en general pero no han contestado sin receta): hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína.

6. Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.16.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
	T	H	M	14 T	14 H	14 M	15 T	15 H	15 M	16 T	16 H	16 M	17 T	17 H	17 M	18 T	18 H	18 M
Alguna droga ilegal ¹	16,7	19,9	13,6	6,2	6,8	5,5	11,8	12,8	10,8	16,4	19,3	13,7	21,3	25,4	16,9	25,6	31,4	19,0
Alguna droga ilegal sin cánnabis ²	2,5	3,8	1,3	1,1	1,3	0,9	1,5	1,8	1,1	2,2	3,4	1,1	3,0	4,3	1,7	4,9	8,0	1,4
Alguna droga excepto alcohol y tabaco ³	21,8	23,2	20,4	10,1	9,9	10,4	16,4	15,9	16,8	21,1	22,4	19,9	26,7	28,8	24,4	32,1	35,3	28,5
Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes ⁴	16,9	20,1	13,8	6,5	7,3	5,7	11,9	12,9	11,0	16,5	19,4	13,9	21,5	25,6	17,3	25,8	31,8	19,2
Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnos. con receta ⁵	19,3	21,7	16,9	8,2	8,5	8,0	13,9	14,0	13,8	18,9	20,9	17,0	24,1	27,6	20,4	28,9	33,7	23,5
Tabaco	29,7	28,1	31,3	15,6	13,0	18,3	23,3	19,8	26,6	29,1	27,1	31,0	34,6	34,7	34,5	43,2	41,8	44,8
Borracheras	30,8	31,3	30,3	12,7	10,8	14,6	21,3	17,8	24,6	30,9	32,2	29,7	38,8	41,5	36,0	46,5	48,4	44,4
Binge drinking	41,8	44,1	39,6	20,3	18,4	22,1	30,4	28,2	32,6	42,6	44,8	40,4	50,7	55,8	45,3	59,9	65,1	54,3
Alcohol	74,0	72,9	75,2	53,2	49,5	57,0	66,0	63,1	68,8	75,6	74,5	76,7	82,4	81,7	83,2	86,4	88,0	84,6
Hipnosedantes ⁶ (con/sin receta)	6,6	4,7	8,5	4,5	3,3	5,7	5,9	4,4	7,4	6,3	4,5	8,1	7,3	5,1	9,7	8,7	6,0	11,6
Hipnosedantes ⁶ (sin receta)	3,4	2,6	4,3	2,3	1,8	2,8	2,9	1,8	3,9	3,4	2,4	4,3	3,9	3,2	4,6	4,6	3,7	5,6
Cánnabis	16,1	18,9	13,3	5,6	6,2	5,1	11,4	12,2	10,6	15,9	18,7	13,3	20,6	24,4	16,6	24,5	29,7	18,9
Cocaína (polvo y/o base)	1,5	2,2	0,8	0,6	0,7	0,4	0,9	1,0	0,7	1,4	2,2	0,6	1,6	2,3	0,9	3,0	4,8	1,1
Cocaína en polvo	1,1	1,7	0,5	0,4	0,6	0,2	0,6	0,7	0,6	1,1	1,6	0,5	1,1	1,8	0,4	2,4	4,0	0,7
Cocaína base	1,1	1,6	0,6	0,5	0,6	0,4	0,7	0,7	0,6	1,0	1,7	0,3	1,2	1,6	0,8	2,1	3,2	0,9
Éxtasis	1,2	1,8	0,6	0,5	0,7	0,3	0,6	0,6	0,5	1,1	1,7	0,5	1,7	2,4	1,0	2,0	3,2	0,7
Anfetaminas/speed	1,0	1,4	0,6	0,5	0,7	0,3	0,6	0,5	0,6	0,7	1,1	0,3	1,5	2,1	0,8	1,7	2,6	0,7
Alucinógenos	1,0	1,6	0,4	0,3	0,5	0,2	0,7	0,7	0,6	1,1	1,8	0,4	1,4	2,1	0,6	1,5	2,6	0,3
Heroína	0,6	0,8	0,3	0,3	0,5	0,2	0,5	0,6	0,4	0,6	1,0	0,3	0,7	1,1	0,4	0,5	0,7	0,2
Inhalables volátiles	0,8	1,0	0,6	0,7	1,1	0,2	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	0,6	0,8	0,9	0,7	0,9	1,3	0,5
GHB	0,7	1,0	0,3	0,3	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,7	1,2	0,2	0,8	1,3	0,3	1,0	1,6	0,3
Ketamina	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,2	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	0,0
Spice	0,6	0,9	0,3	0,2	0,4	0,0	0,4	0,5	0,3	0,6	1,1	0,2	0,8	1,1	0,5	0,9	1,1	0,6
Piperazinas	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,0	0,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0
Mefedrona	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,0	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0
Nexus	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,0	0,4	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0
Metanfetamina	0,4	0,6	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,4	0,3	0,4	0,8	0,1	0,5	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0
Setas mágicas	0,6	1,0	0,3	0,3	0,7	0,0	0,5	0,4	0,5	0,6	1,2	0,1	0,8	1,1	0,5	0,8	1,3	0,3
Research chemicals	0,2	0,3	0,1	0,2	0,5	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Legal highs	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,0	0,4	0,2	0,5	0,2	0,4	0,0	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0
Salvia	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,0	0,4	0,5	0,2	0,3	0,6	0,0
Esteroides anabolizantes	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,0	0,5	0,7	0,3	0,2	0,3	0,0

1. Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlo.

2. Alguna droga ilegal sin cánnabis: cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

3. Alguna droga excepto alcohol y tabaco: hipnosedantes en general + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

4. Alguna droga excepto alcohol, tabaco o hipnosedantes (ni con y/o sin, ni sin): inhalables volátiles + cánnabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

5. Alguna droga excepto alcohol, tabaco e hipnosedantes con receta (son aquellas personas que han contestado que consumen hipnosedantes en general pero no han contestado sin receta): hipnosedantes sin receta + inhalables volátiles + cánnabis + cocaína.

6. Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.17.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
	T	H	M	14 T	14 H	14 M	15 T	15 H	15 M	16 T	16 H	16 M	17 T	17 H	17 M	18 T	18 H	18 M
Tabaco	12,5	12,0	13,1	2,4	2,0	2,7	6,8	5,7	7,8	11,5	10,2	12,7	16,8	17,0	16,7	23,4	22,4	24,5
Borracheras	0,5	0,7	0,4	0,2	0,3	0,0	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,1	0,7	0,9	0,4	1,2	1,4	1,0
Binge drinking	1,2	1,6	0,8	0,6	0,7	0,5	0,8	1,0	0,6	1,1	1,4	0,8	1,5	2,1	0,9	2,1	2,5	1,5
Alcohol	2,7	3,3	2,0	1,1	1,3	1,0	1,9	2,0	1,7	2,2	2,8	1,7	3,1	4,2	2,0	4,9	5,8	4,0
Hipnosedantes* (con/sin receta)	0,9	0,9	0,8	0,6	0,8	0,4	0,7	0,9	0,6	0,8	0,8	0,7	1,2	0,9	1,4	0,9	1,1	0,7
Cánnabis	2,7	3,8	1,5	0,3	0,5	0,2	1,2	1,4	1,0	2,0	2,8	1,3	4,1	5,9	2,1	5,4	7,7	2,9

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.18.

Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Tabaco	56,6	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	
Alcohol	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	
Hipnosedantes* (con/sin receta)	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	
Hipnosedantes* (sin receta)	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	
Cánnabis	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	
Éxtasis	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	
Alucinógenos	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	
Anfetaminas	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	
Cocaína (polvo y/o base)	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	
Heroína	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	
Inhalables volátiles	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.19.

Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5
Alcohol	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9
Hipnosedantes* (sin receta)	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3
Cánnabis	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3
Éxtasis	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4
Alucinógenos	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1
Anfetaminas	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1
Cocaína (polvo y/o base)	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6
Heroína	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4
Inhalables volátiles	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.20.

Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	32,9	41,9	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3
Alcohol	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5
Hipnosedantes* (sin receta)	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3
Cánnabis	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22	22,3	18,0	23	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3
Éxtasis	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6
Alucinógenos	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4
Anfetaminas	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8	1,3	0,5	1,4	0,6
Cocaína (polvo y/o base)	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8
Heroína	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3
Inhalables volátiles	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.21.

Prevalencias de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			A diario en los últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	41,2	39,1	43,2	33,5	31,5	35,5	28,0	26,0	30,0	11,5	9,5	13,5
Aragón	2.464	55,2	53,2	57,2	46,2	44,2	48,2	39,8	37,8	41,8	22,5	20,5	24,4
Asturias	2.024	45,5	43,4	47,7	38,8	36,7	41,0	32,5	30,3	34,7	13,4	11,2	15,5
Baleares	806	46,5	43,1	50,0	39,0	35,5	42,5	33,7	30,3	37,2	10,0	6,6	13,5
Canarias	1.155	35,5	32,6	38,3	28,5	25,6	31,4	22,1	19,3	25,0	6,3	3,4	9,2
Cantabria	1.923	40,2	38,0	42,4	33,6	31,3	35,8	28,2	26,0	30,4	13,7	11,5	15,9
Castilla y León	1.151	47,9	45,0	50,8	38,3	35,4	41,2	32,8	29,9	35,7	15,8	12,9	18,7
Castilla-La Mancha	1.721	42,2	39,9	44,6	34,6	32,2	36,9	30,1	27,7	32,5	14,3	11,9	16,6
Cataluña	2.353	46,5	44,4	48,5	37,1	35,1	39,2	30,0	28,0	32,0	12,4	10,4	14,5
C. Valenciana	1.696	43,3	40,9	45,7	34,4	32,0	36,8	30,0	27,6	32,3	12,5	10,1	14,9
Extremadura	860	40,2	36,9	43,6	32,7	29,3	36,0	28,2	24,8	31,5	13,4	10,1	16,8
Galicia	2.022	42,7	40,5	44,8	34,1	31,9	36,3	29,1	26,9	31,3	10,5	8,4	12,7
Madrid	3.250	45,5	43,7	47,2	36,9	35,2	38,7	31,3	29,6	33,0	13,8	12,1	15,5
Murcia	1.054	39,3	36,3	42,3	29,7	26,7	32,7	24,6	21,6	27,6	9,7	6,7	12,8
Navarra	605	44,5	40,5	48,5	37,8	33,8	41,8	32,0	28,0	36,0	15,2	11,2	19,2
País Vasco	1.096	46,8	43,8	49,7	35,4	32,4	38,3	29,7	26,7	32,6	11,0	8,1	14,0
Rioja	477	43,4	38,9	47,9	35,7	31,2	40,2	29,1	24,6	33,6	12,2	7,7	16,7
Ceuta	232	24,8	18,3	31,2	19,3	12,9	25,7	15,8	9,4	22,2	2,5	0,0	9,0
Melilla	236	27,0	20,6	33,4	22,8	16,4	29,2	20,1	13,8	26,5	7,8	1,4	14,1
Total	27.503	43,8	43,2	44,4	35,3	34,7	35,9	29,7	29,1	30,3	12,5	11,9	13,1

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.22.

Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	83,3	81,3	85,3	81,6	79,6	83,6	74,1	72,1	76,2
Aragón	2.464	88,4	86,5	90,4	86,9	84,9	88,8	80,4	78,4	82,4
Asturias	2.024	89,3	87,1	91,4	88,1	85,9	90,3	82,1	79,9	84,3
Baleares	806	86,3	82,8	89,7	84,1	80,7	87,6	74,3	70,8	77,7
Canarias	1.155	80,8	77,9	83,6	77,6	74,7	80,5	67,5	64,6	70,4
Cantabria	1.923	84,6	82,3	86,8	82,7	80,5	84,9	76,5	74,3	78,8
Castilla y León	1.151	88,8	85,9	91,7	87,6	84,7	90,5	80,4	77,5	83,3
Castilla-La Mancha	1.721	87,3	84,9	89,6	84,9	82,6	87,3	79,7	77,3	82,1
Cataluña	2.353	79,8	77,7	81,8	78,0	76,0	80,0	70,0	68,0	72,0
C. Valenciana	1.696	87,0	84,6	89,4	84,5	82,1	86,9	74,7	72,3	77,1
Extremadura	860	83,5	80,2	86,8	81,3	77,9	84,6	74,6	71,3	78,0
Galicia	2.022	82,6	80,4	84,8	80,6	78,4	82,7	73,0	70,8	75,2
Madrid	3.250	83,1	81,3	84,8	81,3	79,6	83,0	72,1	70,3	73,8
Murcia	1.054	81,7	78,7	84,7	79,4	76,4	82,4	74,0	70,9	77,0
Navarra	605	86,1	82,1	90,1	83,6	79,6	87,6	76,6	72,6	80,6
País Vasco	1.096	87,7	84,7	90,7	85,4	82,5	88,4	78,2	75,2	81,2
Rioja	477	86,2	81,7	90,7	85,0	80,5	89,5	80,1	75,6	84,6
Ceuta	232	33,0	26,6	39,4	31,3	24,9	37,8	27,9	21,5	34,3
Melilla	236	60,1	53,8	66,5	57,2	50,9	63,6	50,5	44,1	56,9
Total	27.503	83,9	83,3	84,5	81,9	81,3	82,5	74,0	73,4	74,6

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.23.

Prevalencias de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	60,9	58,9	62,9	50,8	48,8	52,8	29,1	27,0	31,1
Aragón	2.464	70,9	69,0	72,9	62,1	60,1	64,0	39,5	37,5	41,4
Asturias	2.024	64,0	61,8	66,2	55,6	53,4	57,8	35,5	33,4	37,7
Baleares	806	63,5	60,1	67,0	54,8	51,3	58,2	27,5	24,1	31,0
Canarias	1.155	53,5	50,6	56,3	43,6	40,7	46,5	21,9	19,0	24,8
Cantabria	1.923	61,4	59,1	63,6	53,5	51,3	55,8	35,3	33,0	37,5
Castilla y León	1.151	68,1	65,2	71,0	61,1	58,2	64,0	39,7	36,8	42,6
Castilla-La Mancha	1.721	65,1	62,7	67,5	55,9	53,6	58,3	35,4	33,0	37,8
Cataluña	2.353	55,4	53,4	57,4	48,0	46,0	50,0	28,5	26,5	30,5
C. Valenciana	1.696	65,8	63,5	68,2	57,6	55,2	60,0	36,6	34,2	39,0
Extremadura	860	56,3	52,9	59,6	45,9	42,6	49,2	26,1	22,8	29,4
Galicia	2.022	55,7	53,6	57,9	47,5	45,3	49,7	28,1	26,0	30,3
Madrid	3.250	59,4	57,7	61,1	51,6	49,8	53,3	29,1	27,3	30,8
Murcia	1.054	55,1	52,1	58,2	44,6	41,6	47,7	21,7	18,6	24,7
Navarra	605	64,8	60,8	68,8	58,2	54,2	62,2	33,4	29,4	37,4
País Vasco	1.096	64,9	61,9	67,8	55,9	53,0	58,9	36,8	33,9	39,8
Rioja	477	64,3	59,8	68,8	58,6	54,1	63,0	40,1	35,6	44,6
Ceuta	232	24,6	18,1	31,0	18,9	12,5	25,3	11,6	5,2	18,1
Melilla	236	36,8	30,4	43,2	26,1	19,7	32,4	17,0	10,6	23,4
Total	27.503	60,7	60,1	61,3	52,0	51,4	52,6	30,8	30,2	31,4

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.24.

Prevalencias de *binge drinking* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Últimos 30 días		
	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	42,7	40,7	44,7
Aragón	51,3	49,3	53,2
Asturias	48,3	46,1	50,4
Baleares	38,5	35,1	42,0
Canarias	35,1	32,2	38,0
Cantabria	45,7	43,5	48,0
Castilla y León	49,0	46,1	51,9
Castilla-La Mancha	50,2	47,8	52,6
Cataluña	34,0	32,0	36,1
C. Valenciana	49,6	47,3	52,0
Extremadura	43,4	40,1	46,8
Galicia	39,2	37,0	41,4
Madrid	36,7	35,0	38,4
Murcia	39,1	36,0	42,1
Navarra	40,4	36,4	44,4
País Vasco	48,3	45,3	51,2
Rioja	46,8	42,3	51,3
Ceuta	15,3	8,8	21,7
Melilla	24,1	17,8	30,5
Total	41,8	41,3	42,4

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.25.

Prevalencias de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	63,7	61,7	65,7	49,5	47,5	51,5
Aragón	2.464	75,0	73,0	76,9	57,0	55,0	59,0
Asturias	2.024	67,5	65,4	69,7	43,1	40,9	45,3
Baleares	806	60,7	57,3	64,2	38,0	34,6	41,5
Canarias	1.155	39,7	36,8	42,6	22,9	20,0	25,8
Cantabria	1.923	59,4	57,2	61,7	43,2	41,0	45,4
Castilla y León	1.151	70,1	67,2	73,0	48,5	45,6	51,4
Castilla-La Mancha	1.721	73,3	71,0	75,7	58,3	55,9	60,6
Cataluña	2.353	51,6	49,6	53,6	31,3	29,3	33,3
C. Valenciana	1.696	68,7	66,3	71,1	48,4	46,0	50,8
Extremadura	860	73,5	70,1	76,8	56,2	52,8	59,5
Galicia	2.022	54,1	51,9	56,3	37,0	34,8	39,2
Madrid	3.250	61,0	59,3	62,8	39,6	37,9	41,3
Murcia	1.054	65,0	61,9	68,0	44,9	41,9	47,9
Navarra	605	57,2	53,2	61,1	35,9	31,9	39,9
País Vasco	1.096	71,1	68,1	74,0	51,0	48,0	53,9
Rioja	477	68,6	64,1	73,1	47,5	43,0	51,9
Ceuta	232	28,1	21,7	34,6	24,8	18,4	31,3
Melilla	236	44,0	37,6	50,4	33,0	26,6	39,4
Total	27.503	62,0	61,4	62,6	43,4	42,8	44,0

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.26.

Prevalencias de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior	Prevalencia	IC* inferior	IC* superior
Andalucía	2.378	28,3	26,3	30,3	22,9	20,9	24,9	13,3	11,3	15,3
Aragón	2.464	41,1	39,1	43,1	31,5	29,5	33,5	20,3	18,3	22,3
Asturias	2.024	33,4	31,2	35,6	26,6	24,5	28,8	16,8	14,6	18,9
Baleares	806	40,3	36,9	43,8	33,3	29,9	36,8	17,8	14,3	21,2
Canarias	1.155	31,5	28,6	34,4	25,3	22,4	28,2	15,1	12,2	18,0
Cantabria	1.923	33,0	30,7	35,2	26,6	24,4	28,9	16,0	13,8	18,3
Castilla y León	1.151	34,5	31,6	37,4	25,7	22,8	28,6	15,4	12,5	18,3
Castilla-La Mancha	1.721	31,9	29,5	34,3	23,7	21,4	26,1	15,4	13,0	17,7
Cataluña	2.353	35,9	33,8	37,9	29,0	27,0	31,0	17,3	15,3	19,3
C. Valenciana	1.696	38,4	36,0	40,8	29,4	27,0	31,8	18,4	16,0	20,8
Extremadura	860	22,6	19,3	26,0	17,2	13,8	20,5	11,4	8,0	14,7
Galicia	2.022	29,1	27,0	31,3	24,2	22,0	26,4	16,7	14,5	18,8
Madrid	3.250	36,0	34,3	37,8	28,6	26,9	30,3	16,9	15,2	18,6
Murcia	1.054	26,6	23,6	29,6	20,1	17,1	23,1	10,8	7,8	13,8
Navarra	605	40,6	36,6	44,5	35,2	31,3	39,2	23,5	19,5	27,4
País Vasco	1.096	40,8	37,9	43,8	32,7	29,7	35,6	21,7	18,7	24,6
Rioja	477	30,9	26,5	35,4	22,2	17,7	26,7	13,0	8,5	17,4
Ceuta	232	19,1	12,7	25,6	15,6	9,1	22,0	10,1	3,7	16,6
Melilla	236	20,1	13,8	26,5	13,3	6,9	19,7	8,0	1,6	14,4
Total	27.503	33,6	33,0	34,1	26,6	26,0	27,1	16,1	15,5	16,7

* IC = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.27.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño de muestra	Edad media inicio en el consumo de tabaco	Edad media inicio en el consumo de tabaco diario	Edad media inicio en el consumo de alcohol	Edad media inicio en el consumo de cánnabis
Andalucía	2.378	13,6	14,5	14,0	15,1
Aragón	2.464	13,2	14,2	13,5	14,6
Asturias	2.024	13,8	14,6	14,0	14,9
Baleares	806	13,5	14,7	13,9	15,0
Canarias	1.155	14,0	14,4	14,1	15,0
Cantabria	1.923	13,7	14,4	13,9	15,1
Castilla y León	1.151	13,6	14,5	13,6	15,0
Castilla-La Mancha	1.721	13,4	14,4	13,7	14,9
Cataluña	2.353	13,5	14,5	13,9	14,7
C. Valenciana	1.696	13,7	14,6	13,6	14,8
Extremadura	860	13,6	14,5	13,9	14,8
Galicia	2.022	13,7	14,8	14,2	15,1
Madrid	3.250	13,7	14,7	13,9	15,0
Murcia	1.054	13,6	14,4	13,9	14,9
Navarra	605	13,4	14,6	13,8	14,7
País Vasco	1.096	13,6	14,3	13,6	14,6
Rioja	477	13,6	14,3	13,5	14,9
Ceuta	232	14,0	15,1	14,0	15,0
Melilla	236	14,2	14,8	14,5	15,4
Total	27.503	13,6	14,5	13,9	14,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.28.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2012.

	Tamaño muestra	Cánnabis	Éxtasis	Cocaína en polvo	Heroína	Alucinógenos	GHB	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Hipnosedantes*
Andalucía	2.378	64,9	22,8	31,6	23,6	28,5	19,9	93,3	92,8	50,3
Aragón	2.464	79,2	34,1	42,1	27,1	39,1	26,2	94,9	95,7	56,1
Asturias	2.024	73,1	35,6	44,7	31,3	40,5	31,0	95,4	94,8	62,0
Baleares	806	68,1	21,5	22,4	18,2	27,5	16,8	91,8	91,8	50,8
Canarias	1.155	64,5	26,7	33,7	25,7	27,8	22,5	89,2	88,7	48,2
Cantabria	1.923	71,3	29,7	35,2	25,9	33,6	26,4	93,6	92,9	53,9
Castilla y León	1.151	72,4	26,4	32,8	22,7	30,0	20,8	95,2	93,8	50,8
Castilla-La Mancha	1.721	71,5	24,7	35,5	24,4	31,6	22,3	94,3	94,0	54,2
Cataluña	2.353	68,5	23,3	31,4	22,4	28,2	20,1	90,2	92,5	52,4
C. Valenciana	1.696	71,4	25,9	33,1	23,6	29,0	22,7	92,9	91,6	54,6
Extremadura	860	62,8	24,8	29,3	24,4	25,1	20,5	91,6	91,3	46,4
Galicia	2.022	69,7	31,7	41,4	32,7	38,2	27,7	93,9	92,9	54,4
Madrid	3.250	71,3	28,9	34,1	26,6	35,5	24,6	93,5	93,5	57,2
Murcia	1.054	64,2	23,7	32,1	23,3	26,6	21,0	93,2	92,3	48,9
Navarra	605	77,8	28,5	39,5	23,6	33,0	19,4	94,6	92,5	52,3
País Vasco	1.096	77,2	31,3	40,5	25,8	31,8	26,0	94,7	94,6	64,2
Rioja	477	75,5	28,7	37,2	27,4	36,8	24,6	97,1	96,3	51,8
Ceuta	232	65,9	24,9	28,3	23,7	29,9	20,0	77,4	84,1	49,1
Melilla	236	49,5	26,9	26,5	26,6	25,6	21,6	88,4	88,2	56,3
Total	27.503	69,4	26,2	33,8	24,8	30,9	22,3	92,9	92,8	53,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

Se excluyen de la base los casos que no contestan o no saben.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.29.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes)* por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012.

	Campañas publicitarias	Educación en las escuelas	Tratamiento voluntario a consumidores	Tratamiento obligatorio a consumidores	Administración médica de metadona	Administración médica de heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas contra las drogas	Legalización de cannabis	Legalización de todas las drogas
Andalucía	91,4	96,2	93,9	92,1	88,2	79,0	92,9	88,1	56,6	40,9
Aragón	89,2	95,3	94,0	89,5	87,4	78,8	90,0	84,4	54,4	33,9
Asturias	88,9	94,6	94	89,9	87,6	76,3	91,1	85,5	56,2	36,2
Baleares	93,0	96	95,6	91,3	87,5	81,5	91,6	86,9	60,7	37,6
Canarias	89,8	95,5	94	88,5	88,7	79,0	92,7	85,6	55,9	36,2
Cantabria	89,1	95,0	94,5	90,7	88,1	77,9	91,0	86,2	57,6	38,0
Castilla y León	91,7	96,3	94,6	89,5	87,9	77,3	90,7	85,3	53,9	32,4
Castilla-La Mancha	90,6	94,5	95	88,8	87,3	80,5	91,0	86,5	56,7	39,5
Cataluña	91,2	95,6	93,2	91,2	89,0	83,1	91,0	86,8	63,3	43,0
C. Valenciana	91,9	94,8	93,0	89,8	86,8	80,4	91,5	86,5	62,8	41,2
Extremadura	92,3	96,0	93,9	89,1	87,8	76,5	91,8	86,6	55,4	42,5
Galicia	89,9	95,6	95,1	88,6	88,0	75,6	87,3	81,5	56,1	34,9
Madrid	89,2	96,2	95,5	89,3	89,3	79,1	90,7	85,4	57,0	39,5
Murcia	92,1	95,7	94,3	92,4	89,6	82,6	92,8	88,4	57,9	47,9
Navarra	88,4	94,9	93	85,7	86,0	74,1	86,6	81,3	57,1	37,9
País Vasco	91,9	95,9	95,4	90,7	82,2	70,4	87,8	84,3	61,8	35,4
Rioja	91,6	96,8	94,9	91,2	88,3	80,9	92,0	85,1	50,3	33,2
Ceuta	90,3	96,6	94,5	90,5	89,3	85,5	91,0	88,9	66,7	57,8
Melilla	85,2	90	89,3	88,1	81,7	76,9	89,6	84,1	61,6	50,8
Total	90,9	95,7	94,2	90,3	88,0	79,3	91,2	86,2	58,3	39,6

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.30.

Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han recibido información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012.

	Madre	Padre	Pareja de mi padre o de mi madre	Hermanos/hermanas	Hijos de la pareja de mi padre o de mi madre	Otros familiares	Amigos	Profesores	Profesionales sanitarios	Organismos oficiales	Medios de comunicación	Charlas o cursos sobre el tema	Personas que han tenido contacto con ellas	Libros y/o folletos	Internet	Ninguna
Andalucía	62,8	57,8	3,1	20,2	0,9	24,7	43,2	56,7	38,3	26,3	57,1	64,6	27,3	28,6	40,3	2,9
Aragón	65,0	59,1	3,2	18,0	1,0	23,8	48,0	58,8	34,7	34,7	56,2	69,7	29,6	30,1	43,5	1,9
Asturias	64,5	58,3	2,7	16,4	0,7	25,9	44,0	55,0	33,3	29,8	55,2	64,6	28,2	30,7	42,7	2,6
Baleares	63,1	57,7	5,5	22,0	0,8	24,5	48,1	54,7	37,2	30,0	53,8	58,1	28,6	30,4	47,8	3,4
Canarias	60,9	54,8	3,6	17,5	1,2	27,2	46,3	53,0	37,3	35,8	53,5	65,7	31,6	26,8	46,6	2,9
Cantabria	60,1	53,9	2,4	16,2	0,7	23,5	40,3	55,2	35,6	37,1	54,8	62,1	24,7	29,0	39,5	3,4
Castilla y León	64,5	58,8	2,5	15,4	0,6	24,4	45,1	57,2	37,1	31,0	61,3	69,4	28,3	35,9	39,3	1,9
Castilla-La Mancha	59,9	55,9	2,0	18,1	0,8	22,4	40,8	57,3	36,1	26,8	58,2	64,2	25,8	30,0	41,9	3,7
Cataluña	58,2	54,4	3,9	18,4	1,1	24,8	45,2	56,6	46,0	25,8	55,7	64,2	30,0	28,5	47,0	3,7
C. Valenciana	60,3	56,0	2,2	18,8	0,5	23,0	41,8	57,4	42,6	28,9	56,2	62,9	26,3	32,1	42,2	2,6
Extremadura	60,5	56,3	2,0	19,1	0,5	27,5	44,2	55,3	37,7	33,4	58,0	66,0	26,3	28,9	43,2	2,9
Galicia	59,9	54,4	2,5	17,4	1,0	22,1	39,4	52,5	32,9	31,9	53,7	73,2	28,0	30,8	38,7	2,4
Madrid	63,4	57,1	2,7	17,6	0,9	22,9	43,1	53,4	38,8	30,2	54,7	64,8	27,0	28,8	40,3	2,8
Murcia	60,2	54,7	2,8	18,1	1,1	24,0	40,3	51,9	29,4	25,3	49,8	58,5	23,5	28,1	37,4	4,3
Navarra	58,4	55,7	1,0	19,7	0,3	21,3	42,1	51,0	36,2	32,0	49,3	65,8	22,7	26,2	32,9	1,5
País Vasco	55,3	51,6	2,9	16,3	1,3	13,4	46,2	46,2	37,3	24,5	40,4	47,0	28,3	17,8	35,5	2,6
Rioja	62,5	59,8	3,3	16,1	1,1	24,7	36,7	52,2	52,9	57,2	62,7	82,6	29,0	36,5	39,9	1,6
Ceuta	53,3	53,1	1,7	19,3	1,4	27,8	43,5	50,4	36,7	27,8	58,6	59,6	38,0	29,5	43,3	9,7
Melilla	59,4	55,4	4,1	19,6	3,5	25,6	41,8	53,2	32,4	27,1	46,1	48,3	21,8	32,5	44,3	6,1
Total	61,1	56,2	2,9	18,4	0,9	23,7	43,5	55,2	39,0	28,8	55,1	64,2	27,7	29,1	41,7	2,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.31.

Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años les gustaría recibir información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012.

	Madre	Padre	Pareja de mi padre o de mi madre	Hermanos/hermanas	Hijos de la pareja de mi padre o de mi madre	Otros familiares	Amigos	Profesores	Profesionales sanitarios	Organismos oficiales	Medios de comunicación	Charlas o cursos sobre el tema	Personas que han tenido contacto con ellas	Libros y/o folletos	Internet	Ninguna
Andalucía	26,4	25,4	1,5	7,0	0,8	6,3	9,8	22,1	48,1	28,8	25,3	46,7	35,1	19,7	26,6	9,4
Aragón	24,3	23,6	1,2	5,6	0,6	6,2	10,5	18,8	40,2	31,3	22,8	43,4	33,2	18,7	22,9	13,4
Asturias	24,5	23,5	1,7	5,3	0,9	7,6	10,2	20,0	37,8	29,0	23,7	41,2	31,9	18,0	24,8	13,8
Baleares	26,0	23,6	1,4	7,6	1,1	8,5	11,3	24,8	45,3	34,5	27,2	42,9	35,7	23,0	30,4	10,6
Canarias	18,4	17,3	2,0	4,6	1,5	7,4	9,9	20,4	43,8	35,1	26,0	47,4	35,3	19,3	26,9	10,3
Cantabria	22,5	21,9	1,3	5,5	1,2	7,4	10,0	19,5	39,4	30,3	24,2	38,4	31,3	20,0	24,2	14,2
Castilla y León	25,4	24,3	1,2	5,1	0,3	6,9	10,6	21,9	46,3	32,8	28,2	50,4	40,2	25,4	25,1	8,8
Castilla-La Mancha	26,2	25,8	1,4	7,3	0,9	7,6	10,7	22,5	43,1	28,3	27,8	45,0	32,6	21,6	28,6	11,0
Cataluña	22,9	21,8	1,9	6,5	1,1	7,1	10,7	24,1	45,8	28,4	27,1	44,0	37,9	20,4	27,1	10,6
C. Valenciana	23,7	22,2	1,3	6,1	0,7	6,2	10,0	22,0	45,4	30,8	26,6	45,6	35,1	21,2	27,7	10,7
Extremadura	27,7	27,4	1,4	7,5	1,0	8,4	11,2	25,4	45,2	33,7	27,9	47,6	34,8	21,3	29,4	8,5
Galicia	19,9	18,9	1,2	6,0	1,1	4,7	7,7	18,9	38,4	32,0	24,1	43,7	36,7	18,1	21,2	13,3
Madrid	23,6	22,6	1,6	5,9	0,7	6,9	8,7	19,2	45,3	30,8	24,1	43,6	34,5	19,3	22,7	11,4
Murcia	26,0	25,2	1,9	7,1	1,7	6,9	10,0	21,0	38,6	26,3	24,1	41,6	29,2	18,8	24,0	12,4
Navarra	20,0	19,9	0,3	6,2	0,1	6,2	8,4	17,7	41,9	30,0	22,4	41,2	34,8	14,7	20,4	12,0
País Vasco	30,0	28,3	1,4	6,9	0,5	5,3	14,9	20,0	45,4	25,1	15,5	38,0	36,0	16,6	22,5	6,1
Rioja	20,2	19,3	0,6	4,4	0,0	5,3	8,2	20,0	42,9	39,7	29,9	49,3	33,3	18,9	21,5	13,2
Ceuta	26,4	26,4	1,5	8,2	0,0	8,1	8,6	22,2	33,4	26,7	31,1	42,0	32,6	16,7	26,0	20,6
Melilla	31,6	28,7	1,4	4,9	2,2	5,6	9,8	22,6	38,7	23,9	24,4	29,6	24,2	19,6	26,8	13,3
Total	24,3	23,2	1,5	6,3	0,9	6,6	10,1	21,5	44,7	30,0	25,3	44,7	35,3	20,0	25,6	10,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.32.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de *binge drinking* (últimos 30 días), edad media de inicio al consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.33.

Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.34.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo.
España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.784
Edad media de inicio del consumo (años)	13,1	13,8	13,5	14,0	13,5	14,0	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8	13,6	13,8	13,7	13,7	13,8	13,9
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	-	-	15,0	15,0	15,0	15,1	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	15,1	15,0
Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9
Prevalencia de consumo de alcohol en últimos 12 meses	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9
Prevalencia de consumo de alcohol en últimos 30 días	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2
Prevalencia de consumo de alcohol en fin de semana en los últimos 30 días	-	-	66,0	66,4	67,0	68,1	60,1	59,8	56,3	55,2	65,1	65,5	57,7	57,7	61,2	61,3	71,3	71,5	70,1	72,8
Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables los últimos 30 días	-	-	26,8	14,9	26,0	16,1	30,0	16,8	20,8	10,6	26,5	14,1	24,2	13,9	28,4	17,8	33,1	21,4	35,3	25,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.35.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Alguna vez en la vida										
Total	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9
Sexo										
Hombre	84,3	84,3	85,5	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9
Mujer	84,0	84,1	86,4	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9
Edad										
14 años	69,6	67,6	71,5	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9
15 años	81,8	81,7	82,5	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7
16 años	88,0	88,7	89,7	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2
17 años	91,9	91,3	92,8	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8
18 años	92,5	93,4	96,2	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6
Últimos 12 meses										
Total	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9
Sexo										
Hombre	82,8	82,3	83,0	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9
Mujer	82,7	82,5	84,5	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9
Edad										
14 años	67,7	64,3	67,9	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1
15 años	80,4	79,7	80,5	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3
16 años	86,7	87,4	88,0	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2
17 años	90,7	89,9	90,9	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2
18 años	91,1	92,4	94,1	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3
Últimos 30 días										
Total	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0
Sexo										
Hombre	75,3	66,8	67,5	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9
Mujer	74,9	66,7	68,5	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2
Edad										
14 años	56,7	40,1	43,2	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2
15 años	71,8	60,1	62,2	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0
16 años	80,0	74,1	73,4	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6
17 años	85,1	79,4	81,1	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4
18 años	86,2	84,1	85,0	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.36.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2012.




1.2.37.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas tanto en días laborables como en fin de semana según edad entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.38.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.39.


Prevalencia de consumo de alcohol algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 2012.

	Algún fin de semana (1, 2 o 3)	Todos los fines de semana	Algún día laborable (1, 2 o 3 por semana)	Todos los días laborables
Total	53,3	18,2	27,7	2,9
Sexo				
Hombres	49,2	21,0	31,2	4,1
Mujeres	57,4	15,4	24,0	1,6
Edad				
14 años	42,6	6,8	16,0	1,6
15 años	51,2	11,4	21,5	1,9
16 años	55,4	17,7	25,5	2,6
17 años	57,0	23,6	33,5	3,2
18 años	55,5	29,0	40,0	5,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.40.

Prevalencias de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras), en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.41.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en el último mes (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.42.

Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 2012.

	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	2008	2010	2012	2008	2010	2012	2008	2010	2012
Total	56,2	58,8	60,7	47,1	52,9	52,0	29,1	35,6	30,8
Sexo									
Hombres	54,8	58,0	59,9	46,5	52,2	51,7	29,4	36,4	31,3
Mujeres	57,5	59,5	61,5	47,7	53,5	52,3	28,7	34,8	30,3
Edad									
14 años	30,4	27,8	31,5	24,5	24,6	26,1	13,4	16,0	12,7
15 años	48,5	52,2	47,4	41,0	47,3	40,2	24,2	32,0	21,3
16 años	62,2	66,2	62,3	53,0	59,8	53,4	31,7	38,8	30,9
17 años	72,6	76,8	73,1	59,7	69,1	62,6	39,0	46,6	38,8
18 años	76,9	77,8	80,4	65,8	69,8	70,5	45,2	52,8	46,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.43.


Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Borracheras alguna vez	29,2	42,6	61,5	74,1	81,3	33,8	52,0	63,1	72,1	79,4
Borracheras últimos 12 meses	23,1	35,5	52,6	65,1	73,1	29,2	44,6	54,1	60,1	67,6
Borracheras últimos 30 días	10,8	17,8	32,2	41,5	48,4	14,6	24,6	29,7	36,0	44,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.44.

Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (*binge drinking*) en los últimos 30 días según sexo y edad entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

1.2.45.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracción (*binge drinking*)* (porcentajes). España, 2008-2012.

	2008	2010	2012
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14 a 18 años que han consumido en el mismo periodo	64,4	66,5	56,8
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14 a 18 años	41,4	36,7	41,8

* Beber 5 o más bebidas en hombres y 4 o más bebidas en mujeres en un intervalo de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.46.

Prevalencia *binge drinking** en los últimos 30 días según sexo y edad entre los estudiantes de 14 a 18 años (%). España, 2012.

	14 a 18 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Total	41,8	20,3	30,4	42,6	50,7	59,9
Hombres	44,1	18,4	28,2	44,8	55,8	65,1
Mujeres	39,6	22,1	32,6	40,4	45,3	54,3

* Beber 5 o más bebidas en hombres y 4 o más bebidas en mujeres en un intervalo de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.47.


Porcentaje de menores (14-17 años) que han conseguido y consumido alcohol (en el último mes) en diferentes lugares. España, 2012.

	Conseguido	Consumido
Bares o pubs	57,7	61,4
Discotecas	47,1	52,1
Domicilio de otros	24,0	39,9
Domicilio propio	16,8	20,6
Supermercados	61,8	–
Espacios públicos abiertos (calles, parques, playas)	–	57,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.48.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hagan botellón o no (porcentajes). España, 2012.




1.2.49.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2012.




1.2.50.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2012.




1.2.51.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2012.




1.2.52.

Número de días en los últimos 12 meses en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han viajado como pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, según sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.53.

Consumo de alcohol en los últimos 30 días por edad y tipo de día de consumo (porcentajes). España, 2012.



1.2.54.

Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1996-2012.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Consumo en días laborables									
Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días (algún día o todos los días)									
Vino	8,1	8,9	8,2	4,9	6,6	5,3	5,8	5,2	6,3
Cerveza	15,3	14,0	16,2	10,5	14,1	12,8	15,0	13,7	17,5
Aperitivos	3,0	3,2	2,6	1,7	2,4	3,0	4,1	3,6	5,6
Combinados	5,4	6,4	6,8	5,0	6,8	7,4	10,6	10,2	10,8
Licores fuertes	3,2	3,6	3,5	2,3	3,2	3,5	5,5	5,3	5,7
Licores frutas	6,6	7,5	6,2	3,8	4,2	4,6	6,6	5,3	6,5
Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 días									
Vino	0,8	1,0	0,9	0,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3
Cerveza	1,7	1,5	2,2	0,9	1,7	0,8	1,1	0,7	1,2
Aperitivos	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5
Combinados	0,2	0,3	0,6	0,2	0,6	0,4	0,7	0,6	0,7
Licores fuertes	0,1	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2	0,5	0,3	0,5
Licores frutas	0,3	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,3	0,5
Consumo en fin de semana									
Algún día de viernes a domingo durante los últimos 30 días (algún día o todos los días)									
Vino	32,8	32,8	23,7	21,0	27,7	18,8	17,0	17,3	21,1
Cerveza	46,9	40,7	30,8	27,1	34,1	27,9	28,6	30,0	37,5
Aperitivos	12,0	13,6	9,6	8,0	11,0	8,3	8,4	9,4	11,8
Combinados	48,8	53,7	49,2	48,2	58,4	51,6	54,0	50,3	58,0
Licores fuertes	24,5	26,7	22,4	22,3	27,8	23,0	25,0	23,7	25,8
Licores frutas	36,2	37,1	25,6	22,6	26,0	20,6	20,8	18,3	23,6
Todos los días de viernes a domingo durante los últimos 30 días									
Vino	9,6	10,6	8,6	5,9	7,5	3,5	2,9	3,3	1,7
Cerveza	19,9	17,6	14,4	10,7	13,8	8,6	8,5	8,2	8,9
Aperitivos	2,9	4,2	3,3	2,1	2,7	1,5	1,9	2,2	1,8
Combinados	19,6	23,5	22,2	18,9	22,5	16,8	17,9	13,8	10,9
Licores fuertes	8,2	10,8	10,1	7,7	9,4	5,5	5,9	4,1	3,6
Licores frutas	10,2	12,0	9,0	6,0	6,8	3,8	3,5	2,5	2,2

Nota: % calculado sobre el total de la muestra

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.55.

Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida entre los estudiantes de 14-18 años que consumieron alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2012.

	Algún fin de semana			Algún día laborable		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Total	70,1	72,8	71,5	35,3	25,6	30,6
Tipo de bebida						
Vino/champán	26,6	25,6	26,1	8,6	5,8	7,2
Cerveza	49,1	39,7	44,5	24,8	14,8	19,9
Aperitivos/vermut	16,7	13,4	15,1	8,4	4,7	6,6
Combinados/cubatas	60,3	64,5	62,4	15,8	10,0	12,9
Licores de frutas	27,2	31,0	29,1	8,6	6,3	7,5
Licores fuertes	33,1	30,0	31,6	8,6	4,4	6,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.56.


Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	62,0	43,4
Sexo		
Hombres	61,3	42,8
Mujeres	62,7	44,1
Edad		
14 años	36,4	20,6
15 años	51,5	32,7
16 años	65,2	45,5
17 años	71,7	52,8
18 años	77,0	58,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.57.

Prevalencia de botellón, por lo menos una vez al año, según sexo y edad entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.58.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hagan o no botellón por lo menos una vez a la semana (porcentajes). España, 2012.



1.2.59.

Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días según el consumo de alcohol entre los estudiantes de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.

	Ha consumido alcohol alguna vez en la vida		Ha consumido alcohol en los últimos 12 meses	
	No ha realizado botellón en el último año	Ha realizado botellón en el último año	No ha realizado botellón en el último año	Ha realizado botellón en el último año
Ha consumido hachís o marihuana en los últimos 30 días	4,9	24,5	5,3	24,6
Ha consumido cocaína en los últimos 30 días	0,4	2,2	0,4	2,2
Ha consumido anfetaminas o speed en los últimos 30 días	0,3	1,5	0,3	1,5
Ha consumido alucinógenos en los últimos 30 días	0,3	1,5	0,3	1,5
Ha consumido éxtasis en los últimos 30 días	0,4	1,8	0,4	1,8
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	15,8	63,0	17,4	63,4
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	7,9	48,3	8,7	48,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.60.

Prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

1.2.61.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.62.

Evolución de la proporción de consumidores de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.63.

Evolución del porcentaje de personas que fuman diariamente en los hogares de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2012.



1.2.64.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (n°)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,7	14,1	13,1	13,5	13,0	13,4	12,9	13,2	13,0	13,1	13,1	13,2	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,7
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	-	-	14,5	14,6	14,6	14,5	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,3	14,4	14,3	14,6	14,5
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	56,0	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	54,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1
Prevalencia (%) últimos 30 días	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3
Prevalencia (%) de consumo diario	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (n°)																				
1-5	37,7	47,3	41,8	50,3	43,8	49,5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0	56,1	58,3	65,0	68,5	54,7	57,0
6-10	33,8	36,8	33,9	34,8	35,2	34,9	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2	28,0	30,1	23,3	23,9	32,4	32,9
>10	28,5	15,9	24,3	14,8	20,9	15,6	20,8	15,8	21,8	17,5	22,7	20,0	15,3	9,8	15,9	11,6	11,7	7,6	12,9	10,1
Media de cigarrillos al día	9,1	7,2	8,3	6,9	7,9	7,0	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3	5,1	5,0	5,7	4,8	6,4	6,0

* En fumadores actuales y exfumadores (años).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.65.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes* (con o sin receta) y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.66.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes* (con o sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.67.

Características del consumo de hipnosedantes* (con o sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.784
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8
Prevalencia (%) de consumo hipnosedantes con y/o sin receta alguna vez en la vida	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	9,3	13,6	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0
Prevalencia (%) de consumo hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0
Prevalencia (%) de consumo hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3
Prevalencia (%) de consumo hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días																				
Nunca	98,1	96,7	98,5	97,1	98,5	97,0	98,3	96,6	98,3	96,9	98,2	97,0	98,0	97,1	97,6	96,6	97,7	96,3	97,4	95,7
1 a 2 días	1,3	2,1	1,1	1,9	1,0	2,1	1,0	2,2	1,1	2,0	1,0	2,0	1,2	2,0	1,4	2,2	1,2	2,2	1,5	2,3
3 a 5 días	0,3	0,7	0,2	0,7	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0,4	1,4
6 a 9 días	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
10 a 19 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2

* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.68.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes* (sin receta) y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentaje). España, 1994-2012.



1.2.69.

Características del consumo de hipnosedantes* (sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio del consumo (años)	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0
Prevalencia (%) últimos 12 meses	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días																				
Nunca	98,1	96,7	98,5	97,1	98,5	97,0	98,3	96,6	98,3	96,9	98,2	97,0	98,0	97,1	97,6	96,6	97,7	96,3	97,4	95,7
1 a 2 días	1,3	2,1	1,1	1,9	1,0	2,1	1,0	2,2	1,1	2,0	1,0	2,0	1,2	2,0	1,4	2,2	1,2	2,2	1,5	2,3
6 a 9 días	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2


* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

Nota: Los % están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.70.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes* (sin receta) en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.71.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes* (sin receta) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en el último año (%)**	72	74	73	72	69	67	63	61	54	65
De los que han consumido en el último año, porcentaje que ha consumido en el último mes (%)***	59	49	49	50	53	51	50	51	54	59
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en el último mes (%)****	43	36	36	36	37	34	32	31	29	39

* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

** Prevalencia últimos 12 meses/prevalencia alguna vez en la vida.


*** Prevalencia último 30 días/prevalencia últimos 12 meses.

**** Prevalencia últimos 30 días/prevalencia alguna vez en la vida.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.72.

Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes) y edad media de inicio del consumo. España, 1994-2012.




1.2.73.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.74.

Prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.75.

Características del consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	15,1	15,2	15,1	15,2	14,9	15,1	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8	14,8	15,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7
Prevalencia (%) últimos 12 meses	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	26,8	23,3	29,7	23,3
Prevalencia (%) últimos 30 días	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	18,6	14,6	18,9	13,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	84,9	90,2	81,6	86,8	79,7	85,5	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0	74,7	82,5	80,3	84,7	81,1	86,7
1 a 2 días	6,9	5,1	7,3	7,2	8,4	7,4	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4	7,9	7,1	6,9	6,8	7,1	6,2
3 a 5 días	3,0	2,1	4,1	2,7	3,8	3,0	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8	5,0	4,6	3,9	3,7	3,9	3,0
6 a 9 días	2,1	1,4	2,9	1,3	3,2	1,9	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8	2,6	1,8	2,2	1,4	2,1	1,3
10 a 19 días	1,5	0,6	2,0	1,0	2,1	1,3	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8	3,6	2,0	2,5	1,6	2,0	1,3
20 a 29 días	1,5	0,6	2,2	0,9	2,8	1,0	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2	4,5	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5

Nota: Los % están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.76.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (porcentajes). España, 2012.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	83,9	4,3	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7	2,7
Sexo								
Hombres	81,1	4,4	2,7	1,9	2,0	2,1	2,0	3,8
Mujeres	86,7	4,2	2,0	1,5	1,5	1,3	1,3	1,5
Edad								
14 años	94,4	1,9	0,9	0,8	0,7	0,4	0,5	0,3
15 años	88,6	3,4	1,9	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2
16 años	84,1	4,7	2,4	1,8	1,7	1,5	1,8	2,0
17 años	79,4	5,3	2,9	2,0	1,9	2,4	2,1	4,1
18 años	75,5	5,2	3,4	2,2	3,2	2,7	2,4	5,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.77.

Continuidad en el consumo de cánnabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Prevalencia alguna vez en la vida (%) A	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6
Prevalencia últimos 12 meses (%) B	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6
Prevalencia últimos 30 días (%) C	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1
De los que han consumido alguna vez, porcentaje										
que ha consumido en el último año (%) B/A	87	88	87	86	87	85	82	86	80	78
De los que han consumido alguna vez, porcentaje										
que ha consumido en el último mes (%) C/A	59	59	58	62	60	58	55	57	52	47
De los que han consumido en último año, porcentaje										
que ha consumido en último mes (%) C/B	68	67	66	72	68	68	67	65	65	60

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.78.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.79.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.




1.2.80.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.




1.2.81.

Prevalencia de consumo de cocaína base y cocaína en polvo alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.82.

Prevalencia de consumo de cocaína base y cocaína en polvo en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.83.

Características del consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (n°)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,9	15,9	15,9	15,7	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	14,7	15,0	15,5	15,5
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	98,6	99,3	97,9	98,8	96,8	98,2	96,6	98,5	96,3	97,2	94,9	97,4	96,9	98,4	97,2	98,3	98,2	99,3	97,8	99,2
1 a 2 días	0,9	0,4	1,5	0,8	1,8	1,0	2,5	1,1	2,3	2,1	3,1	1,7	1,6	1,0	1,3	0,6	0,8	0,4	1,0	0,4
3 a 5 días	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,2	0,9	0,5	1,0	0,5	0,7	0,3	0,7	0,3	0,3	0	0,4	0,1
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
10 a 19 días	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.84.


Continuidad en el consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Prevalencia alguna vez en la vida (%) A	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6
Prevalencia últimos 12 meses (%) B	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5
Prevalencia últimos 30 días (%) C	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en el último año (%) B/A	72	79	83	74	81	80	72	71	67	68
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en el último mes (%) C/A	44	47	46	38	42	42	40	39	38	41
De los que han consumido en último año, porcentaje que ha consumido en último mes (%) C/B	61	59	56	52	52	53	56	56	58	60

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.85.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)


1.2.86.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (base y polvo) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.87.

Evolución de la prevalencia de éxtasis y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.88.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.89.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.90.

Características del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.784
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,6	15,7	15,5	15,5	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,5	15,2	15,2	15,2	15,4	15,9	15,6
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0
Prevalencia (%) últimos 12 meses	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2	1,7	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	97,1	98,6	97,2	98,1	98,1	98,7	96,2	98,3	97,9	98,4	98,1	99,0	97,8	99,3	98,4	99,4	98,6	99,4	98,2	99,4
1 a 2 días	1,6	1,0	1,3	1,2	1,0	0,6	2,2	1,3	1,6	1,1	1,0	0,7	1,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,3	1,1	0,3
3 a 5 días	0,6	0,2	0,7	0,4	0,3	0,3	1,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
6 a 9 días	0,4	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.91.

Evolución de la prevalencia de amfetaminas y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)


1.2.92.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.93.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.94.


Características del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.784
Edad media de inicio de consumo (años)	15,5	15,4	15,7	15,7	15,7	15,5	15,7	15,3	15,6	15,5	15,8	15,6	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,2
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,6	2,8	3,4	1,8	3,2	1,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,0	1,9	2,2	1,0	2,4	1,1
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,5	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,7	0,7	1,3	0,5	1,4	0,6
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	44,8	49,8	51,8	52,0	51,1	53,1	55,1	59,1	57,9	66,8	97,3	99,0	98,0	99,0	97,4	99,2	98,6	99,5	98,6	99,4
1 a 2 días	32,7	33,6	31,5	29,0	29,5	29,9	31,6	27,4	30,1	23,6	1,3	0,6	1,0	0,6	0,8	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4
3 a 5 días	10,6	8,9	8,8	12,5	8,4	8,9	7,0	9,7	5,9	6,1	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
6 a 9 días	7,0	3,7	5,5	4,5	5,3	3,9	0,9	1,9	3,7	2,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	3,1	2,3	0,7	0,7	2,8	1,8	4,3	0,5	1,3	1,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	1,8	1,6	1,8	1,3	2,9	2,4	1,1	1,3	1,0	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.95.


Evolución de la prevalencia de alucinógenos y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)


1.2.96.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.97.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.98.

Características del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (n°)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	15,4	15,4	15,6	15,6	15,5	15,4	15,6	15,3	15,6	15,4	15,8	15,7	15,5	15,5	15,4	15,2	15,3	15,4	15,5	15,2
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1
Prevalencia (%) últimos 12 meses	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1
Prevalencia (%) últimos 30 días	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	96,4	98,3	96,2	98,1	97,4	98,5	97,4	98,7	98,2	99,3	97,7	99,3	97,9	99,2	97,4	98,9	98,5	99,4	98,4	99,6
1 a 2 días	2,4	1,2	2,3	1,4	1,7	1,1	1,7	1,1	1,3	0,6	1,5	0,5	1,2	0,5	1,0	0,4	0,8	0,4	0,9	0,2
3 a 5 días	0,7	0,3	0,9	0,2	0,5	0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,1
6 a 9 días	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.99.


Evolución del consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

1.2.100.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.101.

Características del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (n°)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	14,4	14,1	14,6	15,1	14,0	15,1	15,5	15,1	14,9	14,8	14,2	15,0	14,5	14,7	14,3	14,2	14,2	14,7	14,7	13,8
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,9	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	99,6	99,9	99,6	99,9	99,4	99,8	99,5	99,9	99,7	99,8	99,3	99,9	99,0	99,8	98,4	99,5	99,3	99,7	99,2	99,7
1 a 2 días	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
3 a 5 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
6 a 9 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
20 a 29 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.102.

Prevalencia de consumo y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.103.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (porcentajes). España, 2012.



1.2.104.

Características del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 1994-2012.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Edad media de inicio de consumo (años)	13,8	12,4	13,9	13,3	13,7	13,0	14,0	13,7	14,3	14,2	13,9	14,1	13,8	13,4	13,6	14,2	13,1	13,2	13,8	12,6
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,2	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,7	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																				
Nunca	98,5	99,2	98,5	99,0	97,8	98,5	98,2	98,9	98,5	99,2	98,4	99,3	98,2	99,4	97,7	99,1	98,8	99,5	99,0	99,4
1 a 2 días	0,8	0,5	0,9	0,8	1,1	1,0	1,3	0,7	1,0	0,5	0,8	0,4	0,8	0,3	0,8	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4
3 a 5 días	0,2	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.105.

Prevalencia de consumo de ninguna, una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	13,9	16,8	23,8
Una sola sustancia	32,6	38,9	41,8
Dos sustancias	20,4	20,1	19,8
Tres sustancias	21,3	17,5	11,6
Cuatro sustancias	7,4	3,9	1,6
Cinco o más sustancias	4,3	2,8	1,4

* Drogas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, cánnabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles y GHB).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.106.

Distribución del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en el último año entre los consumidores en función de la edad (porcentajes). España, 2012.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Ninguna sustancia	35,4	23,2	14,5	10,0	7,1
Una sola sustancia	39,3	41,9	41,2	38,1	32,4
Dos sustancias	14,4	17,2	20,6	21,8	25,6
Tres sustancias	8,6	13,4	17,1	21,9	23,9
Cuatro sustancias	1,4	2,7	4,0	4,7	6,0
Cinco o más sustancias	1,0	1,7	2,5	3,5	4,9

* Drogas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, cánnabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles y GHB).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.107.

Prevalencia de consumo de ninguna, una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 2012.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
Ningún consumo	15,0	12,8	17,9	15,7	25,1	22,4
Una sustancia	33,9	31,3	39,8	38,0	41,7	41,9
Dos sustancias	18,3	22,5	17,6	22,8	17,1	22,5
Tres sustancias	20,5	22,1	17,3	17,7	12,4	10,8
Cuatro sustancias	6,8	8,1	3,6	4,1	1,7	1,6
Cinco sustancias o más	3,0	2,0	2,1	1,0	1,0	0,4

* Drogas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, cánnabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles y GHB).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.108.

Prevalencia de consumo de ninguna, una sola o más sustancias psicoactivas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	13,9	16,8	23,8
Una sola sustancia	27,9	22,7	14,2
Dos sustancias	2,5	1,6	0,8
Tres sustancias	1,1	0,8	0,4
Cuatro sustancias	0,8	0,5	0,2
Cinco o más sustancias	1,5	1,1	0,7

* Drogas ilegales: cánnabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.109.

Proporción de consumidores de otras drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2012.

	Alcohol	Tabaco	Cánnabis	Hipnosedantes* sin receta	Hipnosedantes* (con/sin receta)	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	42,5	32,3	6,6	12,8	2,4	1,9	2,9	2,1	2,4	2,6	0,9	1,3	1,2
Tabaco	98,2	100,0	60,0	8,6	16,3	4,9	3,7	5,9	4,1	4,7	5,0	1,6	2,2	2,5
Cánnabis	98,8	79,4	100,0	9,6	17,5	7,0	5,6	8,6	6,1	7,0	7,6	2,5	3,2	3,6
Hipnosedantes* (sin receta)	92,8	52,2	43,8	100,0	100,0	10,2	9,9	12,4	10,4	10,7	11,3	5,8	7,5	7,8
Hipnosedantes* (con/sin receta)	90,5	49,4	40,0	50,8	100,0	6,3	5,9	7,6	6,3	6,9	7,2	3,5	4,6	4,5
Cocaína en polvo	97,9	86,6	94,0	30,3	37,2	100,0	58,0	100,0	56	50,5	60,0	25,8	21,2	36,9
Cocaína base	97,5	81,3	93,6	37,6	44,0	71,3	100,0	100,0	51,1	54,4	60,0	33,4	27,7	45,2
Cocaína (polvo y/o base)	97,1	83,9	92,2	30,2	36,6	81,6	66,3	100,0	49,0	44,5	54,4	23,4	19,4	33,1
Anfetaminas/speed	98,0	85,0	93,5	35,3	43,1	63,8	46,7	69,8	100,0	54,7	64,0	30	26,8	39,7
Alucinógenos	97,9	82,6	93,7	31,4	40,4	50,5	43,0	54,8	48,2	100,0	52,6	29,4	25,5	36,8
Éxtasis	97,8	85,1	93,7	31,0	39,0	55,9	45,2	62,3	51,5	48,2	100,0	26,0	20,5	38,5
Heroína	96,3	76,3	91,0	47,6	58,0	71,0	70,0	78,8	71,4	78,9	76,1	100,0	52,7	66,8
Inhalables volátiles	93,5	66,4	72,0	37,3	45,9	35,3	36,7	40,2	39,1	42,1	37,1	32,7	100,0	32,5
GHB	97,2	84,5	93,2	44,1	50,1	71,2	68,9	78,3	67,3	70,7	80,4	48,1	38,1	100,0

Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.110.

Proporción de consumidores de otras drogas en el último año, que han consumido alcohol en el mismo periodo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.

	%
Cánnabis	98,8
Cocaína (polvo y base)	97,1
Anfetaminas	98,0
Alucinógenos	97,9
Éxtasis	97,8
Heroína	96,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.111.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan hecho *binge drinking** o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2012.

	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días
Consumo de CÁNNABIS en los últimos 30 días	31,2	5,5
Consumo de COCAÍNA EN POLVO Y/O BASE en los últimos 30 días	3,1	0,3
Consumo de ÉXTASIS en los últimos 30 días	2,5	0,2
Consumo de ANFETAMINAS O SPEED en los últimos 30 días	2,0	0,2
Consumo de ALUCINÓGENOS en los últimos 30 días	2,1	0,2
Consumo de HEROÍNA en los últimos 30 días	1,1	0,1
Consumo de INHALABLES VOLÁTILES en los últimos 30 días	1,4	0,3
Consumo de GHB en los últimos 30 días	1,4	0,1

* Beber 5 o más bebidas en hombres y 4 o más bebidas en mujeres en un intervalo de 2 horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.112.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2012.

	Se han emborrachado en los últimos 30 días	No se han emborrachado en los últimos 30 días
Consumo de CÁNNABIS en los últimos 30 días	37,0	6,7
Consumo de COCAÍNA EN POLVO Y/O BASE en los últimos 30 días	3,8	0,3
Consumo de ÉXTASIS en los últimos 30 días	3,1	0,3
Consumo de ANFETAMINAS O SPEED en los últimos 30 días	2,6	0,2
Consumo de ALUCINÓGENOS en los últimos 30 días	2,7	0,3
Consumo de HEROÍNA en los últimos 30 días	1,3	0,1
Consumo de INHALABLES VOLÁTILES en los últimos 30 días	1,6	0,4
Consumo de GHB en los últimos 30 días	1,8	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.113.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cánnabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	2008	2010	2012
Total	24,9	22,9	19,6
Sexo			
Hombres	28,0	24,8	22,7
Mujeres	21,8	21,0	16,5
Edad			
14 años	11,4	9,1	6,8
15 años	21,0	17,3	12,9
16 años	27,3	26,2	19,6
17 años	33,2	33,4	25,8
18 años	38,1	35,9	29,7

* Consumo de alcohol y cánnabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.114.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	2008	2010	2012
Total	4,1	3,0	1,6
Sexo			
Hombres	5,1	3,7	2,2
Mujeres	3,1	2,3	1,0
Edad			
14 años	2,6	1,8	0,5
15 años	3,4	2,0	0,8
16 años	4,0	2,7	1,4
17 años	4,9	4,4	1,9
18 años	8,1	6,1	3,5

* Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.115.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo y edad. (porcentajes). España, 2012.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Nunca	7,5	7,3	7,7	16,1	11,3	6,5	3,9	3,0
Menos de una noche al mes	15,5	14,2	16,9	21,6	19,3	15,4	12,6	10,6
De 1 a 3 noches al mes	29,7	27,8	31,7	25,2	27,6	30,7	32,4	30,2
1 noche a la semana	18,5	18,9	18,0	15,4	16,4	19,4	20,0	19,6
2 noches a la semana	20,6	22,5	18,6	15,4	17,6	19,7	22,7	26,4
3-4 noches a la semana	4,9	5,5	4,4	4,0	4,5	5,1	5,0	6,1
Más de 4 noches a la semana	3,3	3,8	2,8	2,3	3,4	3,2	3,3	4,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.116.


Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, en los últimos 12 meses, en estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según frecuencia de salidas nocturnas (porcentajes). España, 2012.

	Alcohol	Tabaco	Cánnabis	Cocaína
Nunca	33,3	8,1	4,7	0,5
Menos de una noche al mes	70,8	20,9	12,7	0,7
De 1 a 3 noches al mes	88,2	35,0	25,6	1,4
1 noche a la semana	88,8	39,3	29,8	2,5
2 noches a la semana	92,1	47,1	38,8	4,0
3-4 noches a la semana	93,7	56,1	45,1	4,8
Más de 4 noches a la semana	93,6	58,0	46,3	13,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.117.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según frecuencia de salidas nocturnas (porcentajes). España, 2012.



1.2.118.

Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2006-2012.



1.2.119.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Antes de las 12 de la noche	13,5	13,0	13,9	31,2	21,8	11,5	5,3	3,7
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	12,9	13,5	12,4	20,1	18,8	14,3	8,2	4,8
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	10,4	10,5	10,3	10,6	12,3	11,9	9,6	6,8
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	10,6	10,9	10,3	8,2	10,1	11,6	12,1	9,0
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	13,8	12,5	15,2	7,2	11,5	15,4	16,0	16,3
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	23,3	22,9	23,6	4,9	10,1	21,7	33,6	41,9
Después de las 8 de la mañana	7,9	9,3	6,5	2,0	4,3	6,8	11,1	14,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.120.

Prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales* en los últimos 12 meses según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (porcentaje). España, 2012.


	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Antes de las 12 de la noche	56,5	64,6	71,8	69,1	69,4
Entre las 12 de la noche y la 1 de la noche	72,9	80,3	82,9	83,3	80,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	80,6	86,5	88,3	89,4	84,6
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	84,3	89,3	89,6	93,2	93,9
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	88,3	92,2	94,6	95,4	96,5
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	93,6	96,6	97,5	97,0	98,8
Después de las 8 de la mañana	88,0	93,3	97,9	95,7	98,4

* Sustancias legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes. Sustancias ilegales: cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, GHB e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.121.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2012.




1.2.122.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en el último año, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2012.



1.2.123.

Prevalencia de consumo de distintas drogas legales e ilegales en los últimos 12 meses, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.124.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.

	Borracheras	No borracheras
Antes de las 12 de la noche	21,1	78,9
Entre las 12 de la noche y la 1 de la noche	36,9	63,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	47,5	52,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	54,3	45,7
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	65,0	35,0
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	76,9	23,1
Después de las 8 de la mañana	80,4	19,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.125.

Porcentaje de estudiantes, de 14 a 18 años, que hacen o no *binge drinking** (en el último mes) según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). España, 2012.


	Binge drinking	No binge drinking
Antes de las 12 de la noche	14,3	85,7
Entre las 12 de la noche y la 1 de la noche	25,9	74,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	33,8	66,2
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	42,5	57,5
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	51,8	48,2
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	66,1	33,9
Después de las 8 de la mañana	72,8	27,2

* Beber 5 o más bebidas en hombres y 4 o más bebidas en mujeres en un intervalo de 2 horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.126.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensan que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2012.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

1.2.127.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Fumar un paquete de tabaco diario	91,4	89,6	93,1	90,8	91,5	91,4	91,5	91,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	47,5	44,7	50,3	56,2	51,9	46,7	42,6	44,4
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	59,7	55,1	64,1	61,6	61,1	59,5	59,1	57,4
Fumar cánnabis habitualmente	88,1	84,3	91,7	91,4	89,7	88,6	86,2	85,8
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,5	88,7	90,3	89,1	90,3	88,5	90,3	89,0
Consumir éxtasis habitualmente	96,5	95,2	97,8	95,3	96,6	96,2	97,2	96,6
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,6	95,4	97,9	95,9	96,6	96,6	97,2	96,4
Consumir heroína habitualmente	96,9	95,7	98,0	95,9	96,8	96,8	97,5	97,0

Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no saben o no contestan.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.128.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (porcentajes). España, 1994-2012.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Fumar un paquete de tabaco diario	76,9	75,2	78	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,4	51,3	47,2	47	47,5
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	50,5	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7
Fumar cánnabis habitualmente	91,9	87,7	85,9	82,8	71,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1
Tomar hipnosedantes habitualmente	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5
Consumir éxtasis habitualmente	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6
Consumir heroína habitualmente	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9

Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.129.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual (una vez por semana o más frecuentemente) de drogas. España, 2008-2012.



1.2.130.

Riesgo percibido* del consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734
Fumar un paquete de tabaco diario	75	79	73	77	76	80	75	80	77	81	78	82	85	89	87	91	89	92	90	93
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	40	48	41	49	40	49	42	48	41	48	37	46	49	54	45	49	44	50	45	50
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	46	55	44	53	42	49	39	48	39	48	37	46	52	62	53	63	57	63	55	64
Fumar cánnabis habitualmente	90	94	85	90	82	89	79	86	78	85	81	86	86	92	85	92	86	92	84	92
Tomar hipnosedantes habitualmente	90	91	88	89	88	89	87	88	88	89	90	90	86	89	85	88	84	87	89	90
Consumir éxtasis habitualmente	97	98	96	98	96	98	95	96	96	97	97	97	96	98	94	98	95	97	95	98
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98	99	97	98	97	98	96	98	97	98	98	98	96	98	94	98	95	97	95	98
Consumir heroína habitualmente	98	99	97	99	98	99	98	99	98	99	99	99	96	98	94	98	95	98	96	98

* Porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas. Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.131.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.132.

Percepción de disponibilidad de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2012.


	Porcentaje* que cree que conseguir cada una de estas drogas, en 24 horas, es fácil/muy fácil								Porcentaje de No sabe/No contesta	
	Total	Sexo		Edad						Total
		H	M	14	15	16	17	18		
Tabaco	82,4	80,4	84,4	68,3	77,2	84,6	88,5	88,1	11,2	
Bebidas alcohólicas	82,8	81,0	84,6	68,0	77,6	84,8	89,1	89,0	10,9	
Hipnosedantes	29,9	28,9	30,9	20,2	23,4	29,0	36,3	37,4	43,9	
Cánnabis	48,9	51,7	46,0	27,6	39,3	50,2	59,5	60,2	29,5	
Cocaína en polvo	18,2	20,0	16,4	10,1	12,4	16,3	23,5	26,9	46,3	
Heroína	12,4	13,9	11,0	8,1	9,5	12,0	14,8	17,0	49,7	
Anfetaminas	14,2	16,1	12,3	7,7	9,2	12,7	18,7	21,4	50,4	
Éxtasis	13,0	14,6	11,3	7,4	8,8	12,0	16,3	19,5	50,5	
Alucinógenos	15,7	17,5	13,8	8,7	10,6	14,5	20,4	22,5	49,2	
GHB	10,8	12,4	9,2	6,3	7,4	9,9	13,6	15,9	51,6	

* Teniendo en cuenta todas las respuestas, incluidos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.133.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (porcentajes). España, 2008-2012.



1.2.134.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) (porcentajes). España, 1994-2012.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Tabaco	-	-	-	-	-	-	91,7	90,9	93,6	92,8
Bebidas alcohólicas	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9
Hipnosedantes	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3
Cánnabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4
Cocaína en polvo	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9
GHB	-	-	-	-	-	-	25,5	22,4	25,8	22,3
Inhalables volátiles	61,4	54,8	54,2	51,6	54,1	51,1	-	-	-	-

Se excluyen de la base los casos que no saben o no contestan.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.135.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco según sexo (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.136.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, percepción de riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y disponibilidad de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.



1.2.137.

Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la disponibilidad de cánnabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.138.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la disponibilidad de cocaína percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.139.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y según edad (porcentajes). España, 2012.




1.2.140.

Vías por las que han recibido información y vías por las que les gustaría recibir información a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2012.




1.2.141.

Evolución sobre las principales vías de información sobre drogas por las que reciben información los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 1994-2012.




1.2.142.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.




1.2.143.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2006-2012.




1.2.144.

Prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (porcentajes). España, 2012.



1.2.145.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (porcentajes). España, 2012.



1.2.146.


Prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2012.

Sustancia	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida	Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses	Prevalencia de consumo en los últimos 30 días
Ketamina	1,1	0,7	0,4
Spice	1,4	1,0	0,6
Piperazinas	0,4	0,3	0,2
Mefedrona	0,5	0,3	0,2
Nexus	0,5	0,4	0,3
Metanfetamina	0,9	0,7	0,4
Setas mágicas	2,2	1,4	0,6
Research chemicals	0,4	0,3	0,2
Legal highs	0,4	0,3	0,2
Salvia	0,8	0,5	0,3
Esteroides anabolizantes	0,7	0,5	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.147.

Proporción de consumidores de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años alguna vez en la vida, según sexo (porcentajes). España, 2012.



1.2.148.


Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (porcentajes). España, 2010-2012.

	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida		Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses		Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
Ketamina	1,1	1,1	0,8	0,7	0,4	0,4
Spice	1,1	1,4	0,8	1,0	0,5	0,6
Piperazinas	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
Mefedrona	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
Nexus	0,5	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3
Metanfetamina	0,8	0,9	0,6	0,7	0,4	0,4
Setas mágicas	2,1	2,2	1,6	1,4	0,7	0,6
Research chemicals	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
Legal highs	0,7	0,4	0,6	0,3	0,5	0,2
Salvia	-	0,8	-	0,5	-	0,3
Esteroides anabolizantes	-	0,7	-	0,5	-	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.149.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.150.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de estas sustancias porque no han oído nunca hablar de ellas (porcentajes). España, 2012.

	Nunca he oído habla de esta droga
Ketamina	55,5
Spice	59,2
Piperazinas	69,1
Mefedrona	69,4
Nexus	68,9
Metanfetamina	46,2
Setas mágicas	42,6
Research chemicals	71,3
Legal highs	72,4
Salvia	69,2
Esteroides anabolizantes	42,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.151.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (porcentajes). España, 2012.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Consumir ketamina alguna vez	68,2	66,0	70,5	63,4	64,2	65,4	69,8	74,9
Consumir spice alguna vez	72,4	70,1	74,9	70,0	67,9	70,8	74,0	77,4
Consumir piperazinas alguna vez	74,4	71,3	78,2	69,3	70,5	72,6	76,2	80,8
Consumir mefedrona alguna vez	74,8	72,2	78,0	70,5	71,7	71,4	77,2	81,3
Consumir nexus alguna vez	75,3	72,4	78,8	70,8	70,9	73,1	77,3	82,2
Consumir metanfetamina alguna vez	75,4	73,1	78,2	72,4	72,7	74,3	76,2	80,7
Consumir setas mágicas alguna vez	65,3	62,4	68,5	67,3	65,9	64,5	63,6	67,6
Consumir research chemicals alguna vez	76,7	73,3	81,2	70,9	72,5	75,1	79,2	82,5
Consumir legal highs alguna vez	74,0	71,3	77,4	69,8	69,5	71,9	77,0	79,3
Consumir salvia alguna vez	71,2	67,8	75,5	67,4	68,8	70,2	72,2	75,3
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	65,3	61,4	70,3	62,3	62,6	63,5	65,6	72,3

Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.152.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir habitualmente alguna de las siguientes nuevas sustancias, según consuman o no consuman la sustancia (porcentajes). España, 2010-2012.

	Todos		Sí consumen esa sustancia		No consumen esa sustancia	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
Consumir ketamina habitualmente	40,8	30,9	24,3	14,4	41,0	31,2
Consumir spice habitualmente	44,0	33,2	27,7	11,4	44,2	33,7
Consumir piperazinas habitualmente	48,0	40,2	31,4	15,3	48,0	40,4
Consumir mefedrona habitualmente	48,3	40,5	30,8	19,6	48,3	40,7
Consumir nexus habitualmente	48,7	40,1	26,6	20,9	48,8	40,3
Consumir metanfetamina habitualmente	44,3	32,2	26,6	11,5	44,5	32,5
Consumir setas mágicas habitualmente	41,4	28,6	22,6	14,5	41,8	29,1
Consumir research chemicals habitualmente	50,1	41,4	31,7	27,4	50,2	41,5
Consumir legal highs habitualmente	50,1	38,1	30,9	10,7	50,2	38,4
Consumir salvia habitualmente	–	41,1	–	10,8	–	41,6
Consumir e. anabolizantes habitualmente	–	32,9	–	15,1	–	33,1

Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

Se excluyen de la base los casos que no contestan y no han oído hablar nunca de la sustancia

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.153.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna vez alguna de las siguientes nuevas sustancias, según consuman o no consuman la sustancia (porcentajes). España, 2010-2012.

	Todos		Sí consumen esa sustancia		No consumen esa sustancia	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
Consumir ketamina alguna vez	42,8	32,8	19,5	15,0	43,1	33,1
Consumir spice alguna vez	45,2	34,1	23,9	9,9	45,5	34,6
Consumir piperazinas alguna vez	49,3	40,9	35,3	17,8	49,4	41,1
Consumir mefedrona alguna vez	49,7	41,4	30,3	19,0	49,8	41,6
Consumir nexus alguna vez	50,3	42,2	28,7	18,6	50,4	42,4
Consumir metanfetamina alguna vez	45,7	34,0	23,2	10,9	45,9	34,3
Consumir setas mágicas alguna vez	42,1	28,5	17,5	11,0	42,7	29,1
Consumir research chemicals alguna vez	51,1	41,2	28,8	22,3	51,2	41,4
Consumir legal highs alguna vez	51,2	38,7	31,3	8,2	51,3	39,0
Consumir salvia alguna vez	–	41,9	–	8,5	–	42,5
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	–	34,0	–	15,5	–	34,1

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

Se excluyen de la base los casos que no contestan y no han oído hablar nunca de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.154.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (porcentajes). España, 2012.

	Sí consumen esa sustancia	No consumen esa sustancia
Consumir ketamina	37,2	68,9
Consumir spice	42,9	73,4
Consumir piperazinas	37,1	75,0
Consumir mefedrona	42,3	75,4
Consumir nexus	41,1	75,9
Consumir metanfetamina	43,4	76,2
Consumir setas mágicas	28,7	66,9
Consumir research chemicals	44,9	77,2
Consumir legal highs	39,5	74,7
Consumir salvia	32,1	72,4
Consumir esteroides anabolizantes	37,8	65,7

Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.155.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (porcentajes). España, 2010-2012.


	Todos		Sí consumen esa sustancia		No consumen esa sustancia	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
Ketamina	40,2	41,8	83,6	74,4	39,4	41,0
Spice	39,8	42,5	79,1	73,4	39	41,4
Piperazinas	31,5	34,2	75,6	66,2	31,2	33,8
Mefedrona	30,9	34,2	78,2	66,2	30,5	33,8
Nexus	30,5	34,6	73,4	66,2	30,1	34,1
Metanfetamina	39,8	43,6	80,5	74,7	39,2	43,0
Setas mágicas	50,3	52,0	84,7	84,2	48,9	50,4
Research chemicals	30,6	34,2	67	75,6	30,3	33,8
Legal highs	32,8	35,1	79,3	73,9	32,2	34,7
Salvia	-	37,3	-	75,4	-	36,4
Esteroides anabolizantes	-	53,9	-	72,7	-	53,7

Se excluyen de la base los casos que no contestan y no han oído hablar nunca de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.156.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (porcentajes). España, 2012.



1.2.157.

Prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias. España, 2012.

	Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	Sustancias ilegales*	Ninguna sustancia legal e ilegal
Consumidor de nuevas sustancias alguna vez en la vida	97,7	73,1	1,5
No consumidor de nuevas sustancias	74,5	14,3	24,1

*Sustancias ilegales: cánnabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).


1.2.158.

Tipo de sustancias psicoactivas (nuevas frente a legales) consumidas alguna vez en la vida, según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes). España, 2012.



1.2.159.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (porcentajes). España, 2012.






Problemas
relacionados con
las drogas

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2011


2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2011.




2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2011.




2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2011.




2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cánnabis. España, 1996-2011.




2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2011.




2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2011.



2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2011*.



2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2011.




	Admisión a tratamiento (droga principal)	Admisión a tratamiento (droga secundaria)
2005	8	50
2006	10	59
2007	22	107
2008	20	112
2009	43	130
2010	46	132
2011	54	157

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número de inyectadores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total de tratados y tratados por primera vez). España, 1996-2011.



2.1.10.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por heroína (total de tratados y tratados por primera vez). España, 1987-2011.




2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por cocaína (total de tratados y tratados por primera vez). España, 1987-2011.



2.1.12.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2011.




2.1.13.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2011.




2.1.14.

Proporción (%) de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA. España, 1991-2011.



2.1.15.

Proporción (%) de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, que ha consumido otras drogas ilegales durante los 30 días previos a la admisión. España, 2009-2011.




	2009	2010	2011
Cocaína	61,5	63,4	63,7
Cánnabis	50,9	52,0	51,6
Hipnosedantes	9,0	9,9	9,0
Opiáceos	5,9	6,6	6,5
Estimulantes	3,9	4,3	4,0
Alucinógenos	0,9	1,3	1,5
I. volátiles	0,2	0,2	0,2

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los 12 meses previos y conocían su estado serológico (distribución por sexo y edad). España, 1996-2011.



2.1.17.


Número y proporción (%) de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2011.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	20.335	25,6
Cocaína polvo	19.730	24,9
Cocaína base	605	0,8
Opioides	14.925	18,8
Heroína	13.898	17,5
Metadona (mal uso)	587	0,7
Otros opioides	440	0,6
Cánnabis	12.873	16,2
Hipnosedantes	1.143	1,4
Estimulantes	745	0,9
Anfetaminas	595	0,8
Éxtasis y derivados	103	0,1
Otros estimulantes	47	0,1
Alucinógenos	83	0,1
Inhalantes volátiles	56	0,1
Otras drogas ilegales	121	0,2
Alcohol	29.014	36,6
Total drogas ilegales	50.281	63,4
Total drogas ilegales y alcohol	79.295	

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.


Proporción (%) de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según droga principal. España, 2011.



FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.19.

Proporción (%) de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total, admitidos primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). España, 2011.



2.1.20.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2011.

CCAA	Número	Tasa/100000
Andalucía	11.441	135,81
Aragón	1.208	89,73
Asturias	278	25,71
Baleares	1.033	92,80
Canarias	3.682	173,13
Cantabria	387	65,25
Castilla-La Mancha	1.374	53,70
Castilla y León	1.553	73,42
Cataluña	6.545	86,81
Ceuta	71	86,19
Comunidad Valenciana	6.117	119,54
Extremadura	1.627	146,66
Galicia	2.780	99,45
La Rioja	209	64,71
Madrid	8.957	138,02
Melilla	74	94,30
Murcia	1.182	80,40
Navarra	212	33,02
País Vasco	1.551	71,00
Total	50.281	106,50

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2011.

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Nº de casos	50.281	23.232	24.999	42.143	7.887
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	51,8	–	–	51,4	54,2
Edad media (años)	33,4	36,7	30,3	33,3	33,8
Mujeres (%)	15,8	15,0	16,5	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3
Enseñanza primaria	45,5	46,2	44,8	46,4	40,5
Enseñanzas secundarias	48,4	48,5	48,5	48,1	50,7
Estudios universitarios	4,3	5,0	5,0	3,8	6,9
Otros	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	29,3	27,2	31,1	30,2	24,7
Parado no habiendo trabajado	6,0	5,6	6,5	5,7	7,2
Parado habiendo trabajado	40,7	45,1	36,8	41,1	38,3
Otras	24,0	22,2	25,7	22,9	29,8
Nacidos fuera de España (%)	8,5	7,4	9,7	8,5	8,8
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	12,1	17,7	7,2	11,7	14,4
Médicos generales, atención primaria de salud	9,1	6,2	11,5	8,8	10,3
Hospitales u otros servicios de salud	6,2	7,6	5,0	5,6	9,5
Servicios sociales	5,3	3,7	6,6	4,6	8,8
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	8,7	10,4	7,3	9,2	5,7
Servicios legales o policiales	8,8	5,4	11,9	9,3	5,9
Empresas o empleadores	2,0	1,6	1,9	2,1	1,3
Familiares o amigos/as	12,9	8,3	16,9	13,1	11,9
Iniciativa propia	32,4	37,1	28,7	33,0	29,2
Otras	2,6	1,9	3,1	2,5	2,9
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	12,1	14,6	9,9	12,2	11,6
Únicamente con pareja	10,2	10,6	9,9	9,2	15,5
Únicamente con hijos	6,0	5,3	6,5	5,0	11,9
Con pareja e hijos/as	15,1	14,6	15,7	15,2	14,5
Con padres o familia de origen	40,9	36,4	45,2	42,5	32,1
Con amigos	2,9	3,2	2,7	2,8	3,8
Otros	12,7	15,3	10,2	13,0	10,6
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	84,9	80,4	89,3	84,3	87,9
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	7,1	8,5	5,8	7,9	2,8
Otras instituciones	2,3	3,1	1,6	2,3	2,6
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,9	0,5	0,6	0,9
Alojamientos inestables/precarios	2,6	3,9	1,5	2,6	3,2
Otros lugares	2,4	3,3	1,3	2,4	2,5

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	29,7	47,4	13,2	29,5	30,4
Heroína	27,6	44,7	11,8	27,7	27,3
Metadona	1,2	1,5	0,8	1,1	1,6
Otros Opioides	0,9	1,2	0,6	0,8	1,5
Cocaína	40,4	38,3	42,5	41,0	37,7
Cocaína CLH	39,2	37,0	41,4	39,8	36,3
Cocaína base	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3
Otros estimulantes	1,5	1,1	1,9	1,4	1,8
Anfetaminas	1,2	1,0	1,5	1,1	1,5
MDMA y derivados	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
Otros estimulantes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hipnosedantes	2,3	1,7	2,8	1,7	5,5
Barbitúricos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Benzodiazepinas	2,0	1,4	2,5	1,4	4,9
Otros hipnosedantes	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5
Alucinógenos	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3
LSD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros alucinógenos	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cánnabis	25,6	11,2	38,9	25,9	23,8
Otras sustancias	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,6	19,8	19,3	19,3	21,1
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	43,1	40,3	45,2	42,7	45,2
4-6 días/semana	6,9	5,8	7,7	6,9	6,5
2-3 días/semana	13,6	10,7	16,1	13,9	12,2
1 día/semana	5,6	4,9	6,2	5,6	5,7
Menos de 1 día/semana	7,0	7,3	6,7	7,1	6,6
No consumió	23,9	31,0	18,1	23,9	23,8
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,0	5,9	6,0	5,3	10,1
Pulmonar	51,3	49,7	52,8	51,7	48,9
Intranasal	35,7	32,6	38,6	36,0	33,8
Parenteral	6,1	10,5	2,0	6,1	6,2
Otras	0,9	1,2	0,7	0,9	1,1
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	16,7	28,2	6,5	16,9	15,4
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	6,2	9,9	2,8	6,2	6,0
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	5,9	10,2	1,8	5,6	7,4
Negativo (análisis últimos 6 meses)	22,0	26,2	18,4	21,8	23,2
Negativo (sin fecha de análisis)	20,7	26,5	15,9	20,8	20,0
Sin análisis o resultado desconocido	51,5	37,1	64,0	51,8	49,3

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol: número y porcentaje de personas según hayan consumido sólo alcohol o alcohol y otras drogas en los 30 días previos a la admisión a tratamiento. España, 2011.

	Número absoluto	Porcentaje
Han consumido sólo alcohol	22.815	78,6%
Han consumido alcohol y otras drogas	6.199	21,4%
Una droga más	4.228	14,6%
Dos drogas más	1.557	5,4%
Tres drogas más	331	1,1%
Cuatro o más drogas	83	0,3%

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.23.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2011.

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	29.014	10.350	11.612	22.848	6.008
Tratados por primera vez por alcohol (%)	52,9	–	–	52,7	53,3
Edad media (años)	44,2	45,0	43,5	44,1	44,8
Mujeres (%)	20,8	21,4	21,7	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,3	1,0	1,3	1,4	1,1
Enseñanza primaria	44,8	43,7	42,7	46,6	37,5
Enseñanzas secundarias	45,3	46,8	46,8	44,6	47,8
Estudios universitarios	7,6	7,6	7,8	6,4	12,1
Otros	1,1	1,0	1,4	0,9	1,6
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	37,0	33,6	39,9	37,8	34,0
Parado no habiendo trabajado	2,3	2,3	2,4	2,1	3,0
Parado habiendo trabajado	31,5	33,5	29,6	32,2	28,8
Otras	29,1	30,6	28,1	27,8	34,2
Nacidos fuera de España (%)	10,2	8,1	14,4	9,7	12,2

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	4,2	8,7	2,4	4,2	4,6
Médicos generales, atención primaria de salud	27,4	21,5	37,1	27,4	27,4
Hospitales u otros servicios de salud	11,5	11,5	13,3	10,8	14,0
Servicios sociales	5,4	5,8	5,5	4,8	7,9
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	1,4	1,2	1,2	1,7	0,3
Servicios legales o policiales	2,4	2,2	2,7	2,8	0,7
Empresas o empleadores	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
Familiares o amigos/as	14,6	11,5	12,6	14,7	14,1
Iniciativa propia	30,3	35,9	23,2	30,7	28,6
Otras	2,4	1,6	1,6	2,5	2,1
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	18,2	20,7	16,8	18,8	15,7
Únicamente con pareja	11,9	11,1	12,6	10,8	15,9
Únicamente con hijos	7,5	8,0	8,7	5,7	14,5
Con pareja e hijos/as	27,4	22,4	27,4	27,5	26,7
Con padres o familia de origen	24,4	24,4	24,5	26,1	17,9
Con amigos	2,5	2,9	2,9	2,5	2,4
Otros	8,1	10,6	7,2	8,5	6,8
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	90,2	87,7	91,1	89,3	93,3
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	1,9	2,0	1,6	2,2	0,8
Otras instituciones	1,8	2,6	1,6	1,9	1,4
Pensiones, hoteles, hostales	1,0	1,2	1,1	1,0	0,9
Alojamientos inestables/precarios	2,5	2,9	2,6	2,8	1,7
Otros lugares	2,6	3,6	1,8	2,7	1,9
Edad al inicio del consumo de alcohol (años)	19,2	18,6	19,6	18,3	22,3
Frecuencia de consumo de alcohol en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	60,7	60,6	60,6	61,2	58,5
4-6 días/semana	5,5	5,1	5,9	5,4	6,2
2-3 días/semana	10,1	8,6	11,5	9,9	10,8
1 día/semana	3,9	3,1	4,7	3,8	4,4
Menos de 1 día/semana	4,5	4,5	4,6	4,3	5,4
No consumió	15,2	18,2	12,7	15,3	14,8
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	4,8	6,4	3,4	5,0	3,8
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	1,5	1,7	1,3	1,6	1,3
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	1,0	1,6	0,9	1,0	1,0
Negativo (análisis últimos 6 meses)	13,5	19,1	15,9	13,3	14,5
Negativo (sin fecha de análisis)	14,8	23,7	15,2	14,3	16,7
Sin análisis o resultado desconocido	70,7	55,6	67,9	71,4	67,7

Nota: El número de casos con o sin tratamiento previo o el número de hombres más el número de mujeres pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en estas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.24

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según droga principal. España, 2011.

	Cocaína	Opioides	Heroína	Cánnabis	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Anfetaminas	Metadona	MDMA y der.	Alucinogenos	In. volátiles
Nº de casos	20.335	14.925	13.898	12.873	1.143	1.000	595	587	103	83	56
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	54,5	23,0	22,2	78,9	64,7	65,7	61,9	35	80,4	74,4	63,6
Edad media (años)	33,9	39,4	39,3	25,3	38,6	37,9	31,0	40,7	26,1	27,2	23,0
Mujeres (%)	14,7	16,2	15,6	14,7	38,1	39,0	20,0	21,2	12,6	26,5	10,7
Máximo nivel de estudios completado (%)											
Sin estudios	1,0	2,1	2,2	0,8	1,8	2,0	0,2	1,9	0,0	0,0	8,9
Enseñanza primaria	40,6	51,9	52,3	46,5	48,3	49,3	35,7	46,8	32,0	34,2	51,8
Enseñanzas secundarias	52,7	42,7	42,5	48,4	40,6	39,9	57,9	46,6	62,0	60,8	33,9
Estudios universitarios	5,3	2,7	2,6	4,0	8,4	7,9	5,8	4,4	6,0	3,8	3,6
Otros	0,5	0,5	0,5	0,4	0,9	0,9	0,3	0,4	0,0	1,3	1,8
Situación laboral principal (%)											
Trabajando	40,9	19,9	19,7	21,7	23,1	20,5	35,9	22,0	38,6	32,5	18,5
Parado no habiendo trabajado	3,6	6,7	6,8	9,0	7,3	8,3	4,4	5,5	2,0	5,0	14,8
Parado habiendo trabajado	39,6	50,0	50,7	32,7	37,2	39,7	41,8	42,0	32,7	22,5	14,8
Otras	16,0	23,4	22,9	36,6	32,4	31,5	17,9	30,5	26,7	40,0	51,9
Nacidos fuera de España (%)	7,7	8,9	8,8	9,6	7,4	7,6	4,8	10,7	3,0	7,5	45,5
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)											
Otros servicios tto. drogodependencias	10,8	20,6	20,6	5,2	11,4	8,7	8,4	20,8	1,3	11,0	10,6
Médicos generales, atención primaria salud	10,0	5,3	5,0	10,5	16,2	16,6	10,8	5,0	10,3	19,2	6,4
Hospitales u otros servicios de salud	5,7	6,9	6,1	5,2	12,0	12,9	13,2	19,2	7,7	4,1	4,3
Servicios sociales	5,6	3,2	3,1	6,6	9,7	7,8	4,5	2,5	1,3	13,7	12,8
Prisiones o centros de menores	7,0	12,9	13,2	7,0	6,7	6,7	2,8	8,2	5,1	13,7	14,9
Servicios legales o policiales	7,1	2,7	2,8	17,8	5,9	6,6	14,5	1,3	23,1	5,5	6,4
Empresas o empleadores	1,5	1,6	1,6	3,3	0,5	0,3	0,7	1,1	1,3	0,0	14,9
Familiares o amigos/as	14,5	6,3	6,4	17,5	10,7	11,8	19,3	5,2	21,8	15,1	8,5
Iniciativa propia	35,8	38,4	39,2	22,5	25,2	27	25,1	34,6	24,4	16,4	8,5
Otras	1,9	2,1	2,0	4,3	1,7	1,6	0,7	2,2	3,8	1,4	12,8
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Solo/a	11,7	16,7	16,7	7,2	17,1	16,8	15,3	17,2	6,3	11,0	5,4
Únicamente con pareja	12,1	11,1	10,8	6,4	10,6	10,8	8,8	14,2	10,5	3,7	1,8
Únicamente con hijos	6,3	4,5	4,4	7,0	9,7	7,9	5,3	4,3	1,1	20,7	7,1
Con pareja e hijos/as	19,9	13,4	13,1	9,7	18,1	19,5	9,0	15	7,4	7,3	7,1
Con padres o familia de origen	37,6	31,2	31,6	57,5	30,6	31,2	48,5	28,3	63,2	37,8	26,8
Con amigos	2,4	4,0	4,0	2,3	2,4	2,4	6,2	4,2	4,2	8,5	3,6
Otros	10,1	19,1	19,4	9,8	11,5	11,4	6,9	16,8	7,4	11,0	48,2

	Cocaína	Opioides	Heroína	Cánnabis	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Anfetaminas	Metadona	MDMA y der.	Alucinogenos	In. volátiles
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Casas, pisos, apartamentos	89,0	73,4	72,8	91,3	87,0	86,3	92,9	79,3	91,9	91,5	52,7
Prisiones, centros de internamiento...menores	5,7	12,2	12,8	3,5	5,0	5,5	2,0	7,2	3,0	4,9	21,8
Otras instituciones	1,7	3,3	3,3	2,3	1,1	1,0	1,4	1,8	2,0	1,2	9,1
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	1,0	1,0	0,3	0,9	0,7	0,0	1,6	1,0	0,0	0,0
Alojamientos inestables/precarios	1,3	6,0	6,1	0,9	2,8	3,0	2,0	6,2	1,0	1,2	5,5
Otros lugares	1,7	4,0	4,0	1,6	3,2	3,3	1,7	4,0	1,0	1,2	10,9
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)											
	20,7	21,2	20,8	15,5	25,8	26,0	19,5	29,3	18,5	19,7	16,1
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)											
Oral	1,8	6,0	1,3	2,6	96,7	96,5	22,8	91,1	83,0	37,7	3,7
Pulmonar	14,5	68,6	72,3	96,5	1,8	2,0	5,3	6,9	4,3	14,3	50,0
Intranasal	81,0	5,7	5,9	0,5	0,6	0,6	71,0	0,2	10,6	45,5	42,6
Parenteral	1,9	18,1	18,9	0,0	0,3	0,3	0,3	1,6	1,1	2,6	0,0
Otras	0,8	1,6	1,7	0,3	0,5	0,6	0,5	0,2	1,1	0,0	3,7
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Todos los días	21,4	49,4	47,4	65,7	77,0	79,7	26,8	81,7	10,3	35,2	36,4
4-6 días/semana	10,2	3,7	3,8	5,6	1,9	1,6	11,5	2,4	3,8	8,5	2,3
2-3 días/semana	22,6	5,2	5,5	9,4	4,7	4,3	26,0	1,0	23,1	23,9	20,5
1 día/semana	9,9	2,4	2,5	2,9	1,7	1,5	9,0	0,6	10,3	5,6	2,3
Menos de 1 día/semana	11,3	4,3	4,2	3,7	2,4	2,4	8,6	7,4	11,5	8,5	22,7
No consumió	24,5	35,0	36,7	12,6	12,4	10,6	18,0	6,8	41,0	18,3	15,9
Otras drogas consumidas en los 30 días previos a la admisión de tratamiento (%)											
1. Opiáceos	9,1	12,8	12,4	4,9	11,7	12,0	5,0	27,6	2,6	8,6	8,6
11. Heroína	7,2	0,8	-	3,0	7,0	7,3	3,1	24,4	2,6	6,9	2,9
12. Metadona	0,5	8,4	8,8	0,1	2,9	3,0	0,2	-	0,0	0,0	0,0
13. Otros opiáceos	1,7	3,7	3,8	1,9	2,9	2,8	1,7	3,9	0,0	1,7	5,7
2. Cocaína	0,3	55,5	56,7	36,3	33,3	32,1	36,9	26,6	50,0	36,2	25,7
21. Cocaína CIH	0,2	52,2	53,3	36,1	32,0	30,7	36,9	25,6	48,7	36,2	22,9
22. Base cocaína	0,2	3,5	3,5	0,2	1,3	1,4	0,0	1,0	1,3	0,0	2,9
3. Estimulantes	11,1	3,5	3,6	9,5	4,0	3,9	8,3	0,6	6,4	43,1	8,6
31. Anfetaminas	5,6	2,0	2,1	5,1	2,7	2,8	-	0,0	6,4	36,2	5,7
32. MDMA y derivados	6,1	1,4	1,5	4,6	1,3	1,2	7,1	0,3	-	8,6	2,9
33. Otros estimulantes	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	1,2	0,3	0,0	3,4	0,0
4. Hipnóticos y sedantes	6,7	20,5	20,4	6,1	1,4	0,4	1,7	20,5	5,1	3,4	8,6
41. Barbitúricos	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42. Benzodiazepinas	6,3	19,8	19,8	5,5	1,1	-	1,2	19,5	3,8	1,7	8,6
43. Otros hipnosedantes	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	1,0	1,3	1,7	0,0


	Cocaína	Opioides	Heroína	Cánnabis	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Anfetaminas	Metadona	MDMA y der.	Alucinógenos	In. volátiles
5. Alucinógenos	2,4	1,0	1,0	2,7	0,9	0,8	6,1	0,0	2,6	6,9	2,9
51. LSD	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	6,9	0,0
52. Otros alucinógenos	2,1	0,8	0,8	2,3	0,9	0,8	5,4	0,0	2,6	0,0	2,9
6. Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,1	0,4	0,9	0,8	0,2	0,0	1,3	0,0	-
7. Cannabis	50,3	45,7	45,6	-	57,6	58,7	62,6	48,7	66,7	62,1	65,7
8. Alcohol	74,0	36,9	36,6	79,2	52,0	53,3	57,4	39,0	59,0	55,2	57,1
9. Otras sustancias	0,9	1,3	1,4	1,6	0,7	0,8	0,2	0,0	2,6	1,7	0,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	6,2	44,0	44,5	3,0	10,1	10,9	3,9	41,4	2,9	8,4	1,8
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	2,7	16,0	16,3	1,0	2,2	2,3	1,2	10,1	1,0	7,2	0,0
Estado serológico frente al VIH (%)											
Positivo	2,0	15,7	15,9	0,8	5,7	5,7	0,8	14,3	0,0	2,4	0,0
Negativo (análisis últimos 6 meses)	25,2	24,4	24,8	14,1	15,8	16,2	20,5	17,7	19,4	19,3	26,8
Negativo (sin fecha de análisis)	20,8	26,6	26,8	13,5	18,1	18,6	22,0	26,4	15,7	15,7	12,5
Sin análisis o resultado desconocido	52,1	33,3	32,5	71,6	60,5	59,6	56,6	41,6	64,7	62,7	60,7

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Proporción (%) de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol según el número de “otras drogas” consumidas durante los 30 días previos a la admisión. España, 2011.



FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Prevalencia¹ de infección por VIH entre los inyectadores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (%). España, 2011.

	Inyección en 12 meses previos a la admisión			Inyección alguna vez en la vida		
	Total	Tratamiento previo		Total	Tratamiento previo	
		Sí	No		Sí	No
Total inyectadores (n°) ²	3.094	2.308	702	8.385	6.560	1.635
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	2.259	1.825	388	6.546	5.413	1.007
Prevalencia de infección por VIH (%)	28,7	30,4	19,1	33,0	34,4	24,9
Hombres inyectadores (n°)	2.609	1.945	590	7.140	5.570	1.406
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	1.903	1.540	321	5.550	4.578	861
Prevalencia de infección por VIH (%)	28,5	30,0	19,3	32,1	33,3	24,9
Mujeres inyectadoras (n°)	476	356	111	1.217	969	223
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	350	280	66	976	819	142
Prevalencia de infección por VIH (%)	30,0	32,5	18,2	38,2	40,2	26,1
Inyectadores < 25 años (n°)	217	90	111	276	113	146
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	99	49	48	127	64	61
Prevalencia de infección por VIH (%)	9,9	12,2	4,2	10,2	14,1	4,9
Inyectadores 25-34 años (n°)	919	629	269	1.585	1.144	406
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	619	472	137	1.124	887	217
Prevalencia de infección por VIH (%)	14,5	16,5	5,8	14,4	15,9	6,9
Inyectadores > 34 años (n°)	1.952	1.585	320	6.507	5.292	1.077
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	1.537	1.301	202	5.284	4.454	726
Prevalencia de infección por VIH (%)	35,6	36,0	31,7	37,5	38,3	32,0
Inyectadores < 2 años de uso de la droga principal (n°)	80	27	51	109	43	64
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	54	21	32	80	37	42
Prevalencia de infección por VIH (%)	16,6	14,3	15,6	21,2	18,9	21,4
Inyectadores ≥ 2 años de uso de la droga principal (n°)	2.422	1.930	445	5.993	5.009	885
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	1.908	1.600	275	4.987	4.310	605
Prevalencia de infección por VIH (%)	28,7	30,1	18,9	32,1	33,5	21,0
Inyectadores consumidores de opiáceos (n°) ³	2.555	2.022	474	7.034	5.812	1.080
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	1.958	1.626	293	5.653	4.846	705
Prevalencia de infección por VIH (%)	30,6	31,8	22,2	35,1	35,9	28,7
Inyectadores no consumidores de opiáceos (n°)	539	286	228	1.351	748	555
Conocen estado serológico frente a VIH (n°)	301	199	95	893	567	302
Prevalencia de infección por VIH (%)	15,9	18,6	9,5	19,6	21,2	16,2

1. Las prevalencias están calculadas sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las otras variables que se cruzan.

2. No se incluyen datos de algunas Comunidades Autónomas, debido a problemas de calidad de la variable "tiempo desde la última inyección de cualquier sustancia psicoactiva".


3. Se incluyen tanto los admitidos a tratamiento por dependencia de opiáceos como los admitidos por otras drogas psicoactivas que han consumido opiáceos en los 30 días previos a la admisión.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2011

2.2.1.

Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España*, 1996-2011.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Coca��na	19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	55,1	51,1	49,5	45,2
Alcohol	12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	37,3	40,2	36,3	40,4
C��nabis	6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	24,7	29,5	30,5	33,3
Hipnosedantes	23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	15,6	16,5	16,7	18,9
Hero��na	56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	17,2	17,1	17,8	14,2
Anfetaminas	2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	4,4	4,6	5,5	9,2
Otros opi��ceos	13,5	17,4	16,8	18,9	18,0	17,4	13,1	9,1	8,3	8,5	8,1	7,5	7,6	6,7	6,2
MDMA	1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	4,2	2,4	2,9	3,9
Otras sust.	4,1	3,2	4,9	1,3	0,8	1,6	1,8	8,7	3,3	4,9	6,0	1,8	1,2	1,8	2,2
Alucin��genos	2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	2,6	1,7	2,1
Sust. vol��tiles	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3

* Comunidades Aut  nomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2.

Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionados con el consumo de drogas. España*, 1996-2011.

	1996	1998	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Número de episodios	2.585	2.099	2.145	2.673	5.828	7.089	7.042	7.822	6.431	5.567	5.626	5.279
Edad media (años)	27,8	29,1	29,8	29,8	31,0	30,7	31,6	32,0	32,4	32,7	32,6	32,7
Sexo (% mujeres)	21,4	23,1	27,1	27,4	28,0	25,0	26,1	23,4	22,7	21,6	26,3	24,7
Detenidos (%)	14,4	11,7	5,7	5,2	4,1	4,9	3,7	3,8	4,4	5,2	4,2	3,7
Resolución de la urgencia												
Alta médica (%)	80,5	81,2	79,1	82,1	81,4	79,1	76,2	79,1	80,0	81,0	79,6	75,4
Alta voluntaria (%)	7,0	8,8	7,5	7,4	5,3	6,7	8,6	7,8	8,5	8,2	7,0	8,5
Ingreso hospitalario (%)	7,6	6,0	7,8	6,3	8,0	8,4	8,8	9,0	7,8	7,9	10,2	12,5
Muerte en urgencias (%)	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro (%)	4,8	3,9	5,4	4,0	5,3	5,7	6,3	4,1	3,7	2,8	3,2	3,6

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionados con el consumo de drogas, total, según sexo y según droga. España*, 2011.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cánnabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	MDMA y der.	Alucinógenos	S. volátiles
Número de episodios	5.279	3.959	1.281	2.165	1.937	1.597	906	678	441	299	185	99	13
Edad media (años)	32,7	33,1	31,4	33,0	33,1	29,1	34,5	36,3	29,3	37,5	27,1	27,9	29,8
Sexo (% mujeres)	24,4	-	-	25,5	24,1	23,9	27,8	25,8	29,6	27,4	28,7	24,2	13,0
Detenidos (%)	3,7	4,5	1,2	3,9	2,7	3,0	6,5	6,4	2,7	9,6	3,2	0,0	0,0
Resolución de la urgencia													
Alta médica (%)	75,4	74,5	78,4	79,8	78,7	81,6	74,0	75,2	80,4	78,6	80,0	79,7	100,0
Alta voluntaria (%)	8,5	8,8	7,5	7,2	7,4	4,9	7,9	7,7	5,7	6,6	10,5	7,2	0,0
Ingreso hospitalario (%)	12,5	13,2	10,5	9,9	10,6	10,5	12,8	13,5	10,6	11,4	6,7	11,6	0,0
Muerte en urgencias (%)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro (%)	3,6	3,6	3,6	3,2	3,3	3,0	5,2	3,7	2,9	3,3	2,9	1,4	0,0

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Vía de administración (número y porcentaje) en los episodios de urgencias hospitalarias relacionados con el consumo de drogas, según tipo de droga. España*, 2011.

Drogas relacionadas	Vía de administración	Número	Porcentaje
Heroína	Oral	12	3,2
	Pulmonar o fumada	95	25,2
	Intranasal o esnifada	22	5,8
	Inyectada	248	65,8
	Otra vía	0	0,0
Otros opiáceos	Oral	300	92,0
	Pulmonar o fumada	7	2,1
	Intranasal o esnifada	2	0,6
	Inyectada	13	4,0
	Otra vía	4	1,2
Cocaína	Oral	21	2,2
	Pulmonar o fumada	155	16,6
	Intranasal o esnifada	619	66,2
	Inyectada	139	14,9
	Otra vía	1	0,1
Anfetaminas	Oral	164	82,0
	Pulmonar o fumada	11	5,5
	Intranasal o esnifada	24	12,0
	Inyectada	0	0,0
	Otra vía	1	0,5
MDMA	Oral	119	97,5
	Pulmonar o fumada	0	0,0
	Intranasal o esnifada	2	1,6
	Inyectada	0	0,0
	Otra vía	1	0,8
Hipnosedantes	Oral	970	99,4
	Pulmonar o fumada	2	0,2
	Intranasal o esnifada	2	0,2
	Inyectada	2	0,2
	Otra vía	0	0,0
Cánnabis	Oral	63	5,9
	Pulmonar o fumada	998	93,0
	Intranasal o esnifada	8	0,7
	Inyectada	1	0,1
	Otra vía	3	0,3
Alucinógenos	Oral	28	80,0
	Pulmonar o fumada	4	11,4
	Intranasal o esnifada	3	8,6
	Inyectada	0	0,0
	Otra vía	0	0,0

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2011.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	45,1	46,1	41,7
Cánnabis	33,3	34,3	29,8
Heroína	14,1	14,4	12,9
Anfetaminas	9,2	9,1	9,6
Opiáceos (se excluye heroína)	6,2	6,0	6,8
MDMA y derivados	3,8	3,7	4,4
Alucinógenos	2,1	2,2	1,8
Sustancias volátiles	0,3	0,2	0,4

Nota: La suma no es 100% ya que puede existir más de una sustancia relacionada con la urgencia en un mismo episodio de urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1999- 2011

2.3.1.

Número de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas (Indicador Mortalidad¹ y seis ciudades²). España, 1983-2011³.



1. Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad (50% de la población de España).

2. Selección de seis ciudades correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

3. Hasta 1995, sólo se recogían las muertes por reacción aguda a opioides o cocaína.

Nota: En el gráfico se muestran los datos correspondientes a aquellos años que permiten obtener una visión general de las tendencias. La serie completa de datos se encuentra disponible en el Informe OED 2011 (<http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/observa/home.htm>) o Spanish National Report 2012 (<http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index214091EN.html>)

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.2.

Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2003-2011.


	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	408
Sexo (%)									
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2
Grupo de edad (años)									
15-19	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2
20-24	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0
25-29	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0
30-34	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2
35-39	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9
40-44	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4
>= 45	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0
Estado civil (%)									
Soltero/a	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6
Casado/a	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2
Separado/a-Divorciado/a	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2
Viudo/a	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0
Procedencia del cadáver (%)									
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9
Evidencias de consumo reciente (%)									
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1
Evidencia de suicidio (%)									
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6
Signos recientes venopunción (%)									
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)									
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8
Anticuerpos anti-VIH (%)									
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8

* Se incluyen los datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1983-2011.



2.3.4.

Número y proporción (%) de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 2003-2011.

	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opioides	376	76,7	349	74,9	356	78,2	338	78,7	340	72,8	324	77,7	346	81,0	409	79,1	318	78,1
Benzodiazepinas	234	47,8	225	48,3	241	53,0	203	48,7	212	45,4	186	44,6	180	42,2	292	56,5	258	63,4
Cocaína	305	62,2	280	60,1	315	69,2	250	60,0	313	67,0	251	60,2	247	57,8	297	57,4	213	52,3
Alcohol	191	39,0	167	35,8	150	33,0	143	34,3	130	27,8	108	25,9	120	28,1	149	28,8	136	33,4
Cánnabis	82	16,7	78	16,7	95	20,9	70	16,8	68	14,6	65	15,6	88	20,6	123	23,8	100	24,6
Anfetaminas	15	3,1	12	2,6	12	2,6	15	3,6	17	3,6	9	2,2	13	3,0	8	1,5	19	4,7
MDMA y derivados	8	1,6	9	1,9	2	0,4	7	1,7	5	1,1	6	1,4	4	0,9	4	0,8	7	1,7
Barbitúricos	1	0,2	2	0,4	5	1,1	4	1,0	0	0,0	0	0,0	2	0,5	2	0,4	4	1,0
S. volátiles	0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	0,2	7	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,7
Alucinógenos	2	0,4	5	1,1	0	0,0	1	0,2	2	0,4	3	0,7	0	0,0	2	0,4	2	0,5
Casos analizados	490	100,0	466	100,0	455	100,0	428	100,0	475	100,0	424	100,0	427	97,5	517	100,0	408	100,0

* Se incluyen los datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.
 FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.


2.3.5.

Proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína y no opioides, sólo cocaína, sólo cocaína y alcohol). España*, 1985-2011.



2.3.6.

Proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides con benzodiazepinas (BZD) y/o alcohol). España*, 1983-2011.



2.3.7.


Proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (metadona, sólo metadona, metadona y no otro opiáceo, sólo metadona y benzodiazepinas). España, 1996-2011.

Año	Sólo metadona	Metadona	Metadona y no otro opiáceo	Sólo metadona y benzodiazepinas
1996	1,5	–	–	–
1997	0,9	–	–	–
1998	0,9	–	–	–
1999	0,4	–	–	–
2000	1,2	–	–	–
2001	2,7	–	–	–
2002	1,8	–	–	–
2003	0,6	–	–	–
2004	0,4	–	–	–
2005	0,6	36,5	15,1	3,0
2006	2,8	39,8	27,4	3,3
2007	4,2	37,5	24,4	4,8
2008	2,4	30,0	20,6	4,2
2009	2,6	32,4	21,9	3,2
2010	2,7	47,4	30,7	4,6
2011	2,2	49,7	34,6	5,9

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.


2.3.8.

Evolución de la mortalidad* por consumo de sustancias psicoactivas según sexo. España, 1999-2011.




2.3.9.

Evolución del número de defunciones* por consumo de sustancias psicoactivas desagregado por edad. España, 1999-2011.



2.3.10.

Estimación del número total de defunciones por drogas ilegales. España, 1983-2011.



Información complementaria

Páginas web de interés

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

<http://www.msssi.gob.es/>

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<http://www.pnsd.msc.es/>

Encuesta Nacional de Salud

<https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/>

MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

Centro de Inteligencia contra el Crimen contra el Crimen Organizado (CICO)

<http://www.intelpage.info/centro-de-inteligencia-contra-el-crimen-organizado.html>

Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

<http://www.minhap.gob.es/>

Comisionado para el Mercado de Tabacos

<http://www.cmtabacos.es>

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

<http://www.mineco.gob.es/>

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

<http://www.isciii.es/>

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD) UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<http://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/>

Abuso de sustancias psicoactivas. Management of Substance Abuse

www.who.int/substance_abuse/en/

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS
EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)
THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS (HBSC)
HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISION EUROPEA. EUROBAROMETRO
EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

http://ec.europa.eu/public_opinion/