

# ESTADÍSTICAS 2020

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

## GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD)

Begoña BRIME. Luz María LEÓN, Noelia LLORENS. Marta MOLINA. Eva SÁNCHEZ. Silvia TORTAJADA.

## RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

### Andalucía

Rosario BALLESTA  
Izaskun BILBAO  
Pedro Manuel SEIJO

### Aragón

Carmen BARANGUAN  
Francisco Javier FALO  
Laura JOSÉ

### Asturias

José Antonio GONZÁLEZ  
José Ramón HEVIA  
Mario MARGOLLES

### Baleares

Francisca BIBILONI  
Rut SUÁREZ  
Juana María VANRELL

### Canarias

José Juan ALEMÁN  
Nicolás AMADOR  
Marcos GASPAR  
Luz Marina MORENO  
Nicolás PERDOMO  
Ángel RODRÍGUEZ  
María del Mar VELASCO

### Cantabria

Mª Carmen DIEGO  
Ángela HIGUERA  
Paloma NAVAS  
Antonia RUEDA

### Castilla-La Mancha

Carlos ALONSO  
Juan José CAMACHO  
Carmen DE PEDRO

### Castilla y León

Susana REDONDO  
Ana SÁNCHEZ  
Esperanza VÁZQUEZ  
Alexander VELÁZQUEZ

### Cataluña

Joan COLOM  
Mercè GOTSENS  
Xavier MAJO  
Regina MUÑOZ  
Josep M. OLLÉ

### Extremadura

Mercedes CORTÉS  
Mª Pilar MORCILLO  
José Antonio SANTOS

### Galicia

Sara CERDEIRA  
Mercedes LIJÓ  
María TAJES  
Sergio VEIGA  
Raquel ZUBIZARRETA

### Madrid

Carmen Yolanda FUENTES  
Mª Angeles GUTIÉRREZ  
Ana RUIZ

### Murcia

Mónica BALLESTA  
Mª Dolores CHIRLAQUE  
Juan Francisco CORREA  
Purificación ROS  
José Carlos VICENTE

### Navarra

Raquel GONZÁLEZ  
Miguel MARTÍNEZ  
Mª Ángeles NUIN

### País Vasco

Elena ALDASORO  
Juan José AURREKOETXEA  
Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

### La Rioja

Cristina NUEZ  
Enrique RAMALLE

### Comunidad Valenciana

Inmaculada CLEMENTE  
Ofelia GIMENO  
Mª Jesús MATEU  
Francesc J. VERDÚ

### Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA  
Cleopatra R'KAINA

### Melilla

Celia BUENO  
Luisa Fernanda HERMOSO

## AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, responsables en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas y Organizaciones No Gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

## CONTACTO

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@mscbs.es

Internet: <https://pnsd.sanidad.gob.es/>

## EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD  
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD  
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 133-20-109-2

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE): [hyyps://cpage.mpr.gos.es/](http://cpage.mpr.gos.es/)

*En estas páginas se presenta el documento de Estadísticas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones 2020. Es una herramienta que complementa el Informe del Observatorio de cada año, y que se ha mostrado fundamental para conocer la realidad relacionada con las drogas en nuestro país, no sólo sobre la oferta y demanda, sino también sobre los problemas derivados de su consumo.*

*Conocer la realidad es el primer paso para diseñar las políticas e intervenciones para transformarla, así como para evaluar su eficacia. Es por esto que consideramos este Informe una herramienta de ayuda para todos los actores implicados en la prevención y atención a este fenómeno.*

*Sus capítulos se construyen gracias a la información obtenida de diferentes fuentes y sistemas de información que se analizan en el marco del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.*

*En concreto, en esta edición se amplía la información sobre los resultados pormenorizados de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), en su edición 2018/19, junto con el análisis de los indicadores de admisiones a tratamiento, urgencias y mortalidad relacionada con las drogas, y sus tendencias hasta el año 2018. Todo esto complementa lo reflejado en el Informe anual del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones 2020.*

*Quiero mostrar mi reconocimiento a todas las personas e instituciones que, con su trabajo, contribuyen anualmente a esta publicación. Sin olvidar agradecer a todo el equipo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones su esfuerzo, que hace posible su edición.*

Joan R. Villalbí  
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones  
ESTADÍSTICAS 2020

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

# ÍNDICE

Presentación .....	3
Introducción .....	31
<b>1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas</b>	<b>32</b>
1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2019 .....	33
1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2018/2019 . . .	34
<b>Metodología: muestra</b>	
1.2.1 Evolución del tamaño de muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018 .....	34
1.2.2 Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018 .....	35
1.2.3 Error muestral de la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p=q=0,5$ ). España, 2018 .....	35
1.2.4 Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2018 .....	36
1.2.5 Distribución de los estudiantes de 14 a 18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2018 .....	37
1.2.6 Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2018 .....	38
<b>Prevalencia de consumo de drogas: España 2018; total, sexo, edad</b>	
1.2.7 Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2018 .....	39
1.2.8 Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018 .....	40
1.2.9 Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018 .....	41
1.2.10 Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018 .....	42

1.2.11	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018 .....	43
1.2.12	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	43
1.2.13	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	44
1.2.14	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	44
1.2.15	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	45
1.2.16	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2018 .....	45
1.2.17	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2018 .....	46
1.2.18	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2018 .....	46
1.2.19	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2018 .....	47
1.2.20	Edad media (años) de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2018 .....	47
1.2.21	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	48
1.2.22	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	49
1.2.23	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	50
1.2.24	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	51

#### **Prevalencia de consumo de drogas: evolución temporal**

---

1.2.25	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 .....	51
1.2.26	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 .....	52
1.2.27	Evolución de las prevalencias de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 .....	52
1.2.28	Evolución de las prevalencias de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 .....	53
1.2.29	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 .....	53
1.2.30	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 .....	55
1.2.31	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 .....	55

1.2.32	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 .....	56
1.2.33	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 .....	56
1.2.34	Evolución de la edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España, 1994-2018 .....	57
1.2.35	Evolución de la edad media de inicio en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España, 2000-2018 .....	57
1.2.36	Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, heroína y esteroides anabolizantes alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018 .....	58
1.2.37	Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, heroína y esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018 .....	59
1.2.38	Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, heroína y esteroides anabolizantes en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018 .....	60

#### **Prevalencia de consumo de drogas: comunidad/ciudad autónoma, 2018**

---

1.2.39	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	61
1.2.40	Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	62
1.2.41	Prevalencia de hacer botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	63
1.2.42	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	64
1.2.43	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	65
1.2.44	Prevalencia de consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	66
1.2.45	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	67
1.2.46	Prevalencia de binge drinking entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	68
1.2.47	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	69
1.2.48	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	70
1.2.49	Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2018 .....	71
1.2.50	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 .....	72

1.2.51	Valoración (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) por comunidad/ciudad autónoma. España, 2018 . . . . .	73
1.2.52	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	74
1.2.53	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	75
1.2.54	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	76
1.2.55	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	77
1.2.56	Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	78
1.2.57	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	79
1.2.58	Prevalencia de consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	80
1.2.59	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	81
1.2.60	Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine... por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (euros). España, 2018 . . . . .	82
1.2.61	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	83
1.2.62	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018 . . . . .	84

#### **Incidencia del consumo de drogas: evolución temporal**

1.2.63	Evolución de la incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2018 . . . . .	85
1.2.64	Evolución de la incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos). España, 2014-2018 . . . . .	85

#### **Consumo por tipo de droga: tabaco**

1.2.65	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (edad) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2018 . . . . .	86
1.2.66	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por edad (%). España, 2018 . . . . .	86
1.2.67	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	87
1.2.68	Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 . . . . .	87

1.2.69	Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2018 . . . . .	88
1.2.70	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2018 . . . . .	88
1.2.71	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2018 . . . . .	89
1.2.72	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2018 . . . . .	89
1.2.73	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	90
1.2.74	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2018 . . . . .	90
1.2.75	Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (nº cigarrillos). España, 1994-2018 . . . . .	91
1.2.76	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 . . . . .	91
1.2.77	Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco. España, 1994-2018 . . . . .	92
1.2.78	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y el riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	92
1.2.79	Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2018 . . . . .	93
1.2.80	Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España 2018 . . . . .	93
1.2.81	Evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2016-2018 . . . . .	94
1.2.82	Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado tabaco en los últimos 30 días y entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018 . . . . .	94
1.2.83	Evolución del porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro (%). España, 2014-2018 . . . . .	94
1.2.84	Evolución del porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2016-2018 . . . . .	95
1.2.85	Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fuman (%). España, 2018 . . . . .	95
1.2.86	Evolución de la prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan fumado tabaco o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2018 . . . . .	96

1.2.87	Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2018 . . . . .	96
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### **Consumo por tipo de droga: cigarrillos electrónicos**

---

1.2.88	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 . . . . .	97
1.2.89	Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tengan o no nicotina (%). España, 2016-2018 . . . . .	97
1.2.90	Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tengan o no nicotina y según sexo (%). España, 2016-2018 . . . . .	98
1.2.91	Evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2018 . . . . .	98
1.2.92	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos electrónicos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	99
1.2.93	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016-2018 . . . . .	99
1.2.94	Evolución de la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018 . . . . .	100
1.2.95	Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018 . . . . .	100
1.2.96	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	101
1.2.97	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años que han fumado cigarrillos electrónicos, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	101
1.2.98	Tipo de cartuchos de cigarrillos electrónicos utilizados, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cigarrillos electrónicos, según sexo y edad (%). España, 2018 . . . . .	101
1.2.99	Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2018 . . . . .	101
1.2.100	Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2018 . . . . .	102
1.2.101	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2018 . . . . .	102
1.2.102	Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2018 . . . . .	102

## Consumo por tipo de droga: bebidas alcohólicas

---

1.2.103 Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), edad media de inicio del consumo (años) y edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2018 .....	103
1.2.104 Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%) España, 1994-2018 .....	104
1.2.105 Prevalencia de binge drinking o consumo de alcohol en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2008-2018 .....	104
1.2.106 Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido alcohol, según sexo (%). España, 2014-2018 .....	105
1.2.107 Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 ..	105
1.2.108 Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	106
1.2.109 Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking, borracheras y consumo de riesgo de alcohol en la población de estudiantes de 14-18 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (%). España, 1994-2018 .....	106
1.2.110 Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 .....	107
1.2.111 Prevalencia de consumo diario de alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	108
1.2.112 Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	108
1.2.113 Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2018 .....	109
1.2.114 Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2018 .....	109
1.2.115 Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España 1994-2018 .....	110
1.2.116 Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2018 .....	111
1.2.117 Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 1994-2018 .....	111
1.2.118 Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2018 .....	112
1.2.119 Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	112
1.2.120 Evolución de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 .....	113

1.2.121	Prevalencia de borracheras, binge drinking y botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años, según sexo (%). España, 2018 .....	113
1.2.122	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según se hayan embrorrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2018 .....	114
1.2.123	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2018 .....	114
1.2.124	Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2018 .....	115
1.2.125	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	115
1.2.126	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en el último mes, según edad y sexo (%). España 2014-2018 .....	116
1.2.127	Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España 2014-2018 .....	116
1.2.128	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España 2014-2018 .....	116
1.2.129	Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	116
1.2.130	Prevalencia de botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	117
1.2.131	Evolución de la prevalencia de botellón en últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2018 .....	117
1.2.132	Prevalencia de borracheras y de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho o no botellón en los últimos 30 días y según sexo (%). España, 2018 .....	118
1.2.133	Prevalencia de borracheras (intoxicaciones etílicas agudas) en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2018 .....	118
1.2.134	Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2018 .....	118
1.2.135	Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2018 .....	119
1.2.136	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018 .....	119
1.2.137	Evolución de los lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018 .....	120
1.2.138	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018 .....	120

1.2.139	Evolución de los modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018 . . .	121
1.2.140	Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2018 . . . . .	121
1.2.141	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	122
1.2.142	Evolución de los modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018 . . .	122
1.2.143	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	123
1.2.144	Evolución de los lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018 . . . . .	123
1.2.145	Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2018 . . .	124
1.2.146	Prevalencia del consumo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de alcohol que hayan realizado sus padres (%). España, 2018 . . . . .	124
1.2.147	Motivos principales por los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años beben alcohol, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	125
1.2.148	Prevalencia de borracheras, binge drinking, botellón y consumo de alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según los motivos por los que beben alcohol (%). España, 2018 . . . . .	125
1.2.149	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014-2018 . . . . .	126
1.2.150	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018 . . . . .	126
1.2.151	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2018 . . . . .	127
1.2.152	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 . . . . .	127
1.2.153	Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido bebidas energéticas o bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2018 . . . . .	128

#### **Consumo por tipo de droga: hipnosedantes**

1.2.154	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018 . . . . .	128
1.2.155	Evolución de la prevalencia del consumo de hipnosedantes con o sin receta médica alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	129
1.2.156	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 . . . . .	129

1.2.157	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	130
1.2.158	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018 .....	130
1.2.159	Evolución de la prevalencia del consumo de hipnosedantes sin receta médica alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 .....	131
1.2.160	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	131
1.2.161	Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	132
1.2.162	Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2018 .....	132
1.2.163	Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 .....	132

#### **Consumo por tipo de droga: cannabis**

---

1.2.164	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%) y edad media de inicio del consumo (años). España, 1994-2018 .....	133
1.2.165	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	133
1.2.166	Evolución de la prevalencia del consumo de cannabis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 .....	134
1.2.167	Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días (%). España, 2018 .....	134
1.2.168	Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2018 .....	135
1.2.169	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018 .....	135
1.2.170	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 .....	136
1.2.171	Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 .....	136
1.2.172	Número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (número de porros). España, 2016-2018 .....	137
1.2.173	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido una cantidad media de porros al día por término medio en los últimos 30 días y número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (% y número de porros). España, 2016-2018 .....	137
1.2.174	Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días (%). España, 2016-2018 .....	137

1.2.175	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2016-2018 . . . . .	138
1.2.176	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2016-2018 . . . . .	138
1.2.177	Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco (%). España, 2002-2018 . . . . .	139
1.2.178	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal. España, 2016-2018 . . . . .	139
1.2.179	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal entre los estudiantes de 14 a 18 años que no lo han probado nunca. España, 2016-2018 . . . . .	140
1.2.180	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal, entre los estudiantes de 14 a 18 años que no lo han probado nunca, según sexo (%). España 2016-2018 . . . . .	140
1.2.181	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal en función de si han consumido tabaco alguna vez en la vida o no (%). España, 2018 .	141
1.2.182	Evolución del % de THC (tetrahidrocannabinol) presente en cannabis según el tipo de presentación analizada; THC contenido en la resina de cannabis y THC contenido en la hierba de cannabis o marihuana. España, 2002-2018 . . . . .	141
1.2.183	Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los estudiantes que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2018 . . . . .	142
1.2.184	Categorización de resultados de la escala CAST entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y edad (%). España, 2018 . . . . .	143
1.2.185	Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado la escala CAST del cuestionario ESTUDES en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2018 . . . . .	143
1.2.186	Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq 4$ ) entre los que han contestado la escala CAST del cuestionario ESTUDES y han consumido cannabis en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2018 . . . . .	144
1.2.187	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq 4$ ) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2006-2018	144
1.2.188	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq 4$ ) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad (%). España, 2012-2018	145
1.2.189	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST $\geq 4$ ), según sexo y edad (%). España, 2016-2018 . . . . .	145
1.2.190	Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses y número de drogas consumidas entre la población de estudiantes de 14 a 18 años y entre los consumidores problemáticos de cannabis (CAST $\geq 4$ ) (%). España, 2018 . . . . .	146
1.2.191	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2018 . . . . .	146

1.2.192	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST ≥4), según sexo y edad (%). España, 2016-2018 . . . . .	147
1.2.193	Porcentaje y estimación de consumidores problemáticos de cannabis (según escala CAST) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2018 . . . . .	147
1.2.194	Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2018 . . . . .	147

#### **Consumo por tipo de droga: cocaína**

---

1.2.195	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018 . . . . .	148
1.2.196	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España 2018 . . . . .	148
1.2.197	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España 1994-2018 . . . . .	149
1.2.198	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 . . . . .	149
1.2.199	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo de cocaína en polvo habitual y de la disponibilidad de cocaína en polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018 . . . . .	150
1.2.200	Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2018 . . . . .	150
1.2.201	Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	151
1.2.202	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2018 . . . . .	151
1.2.203	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2018 . . . . .	152

#### **Consumo por tipo de droga: éxtasis**

---

1.2.204	Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018 . . . . .	152
1.2.205	Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	153
1.2.206	Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018 . . . . .	153
1.2.207	Prevalencia del consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	154
1.2.208	Prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	154
1.2.209	Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 . . . . .	155
1.2.210	Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	155

## Consumo por tipo de droga: anfetaminas

---

1.2.211	Evolución de la prevalencia de anfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018 . . . . .	156
1.2.212	Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	156
1.2.213	Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018 . . . . .	157
1.2.214	Prevalencia del consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	157
1.2.215	Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 . . . . .	158
1.2.216	Prevalencia del consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	158
1.2.217	Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2018 . . . . .	159

## Consumo por tipo de droga: metanfetaminas

---

1.2.218	Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2010-2018 . . . . .	159
1.2.219	Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018 . . . . .	160
1.2.220	Prevalencia de consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 . . . . .	160
1.2.221	Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	161
1.2.222	Prevalencia del consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2018 . . . . .	161

## Consumo por tipo de droga: alucinógenos

---

1.2.223	Evolución de la prevalencia de alucinógenos (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018 . . . . .	162
1.2.224	Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	162
1.2.225	Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018 . . . . .	163
1.2.226	Prevalencia del consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 . . . . .	163
1.2.227	Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 . . . . .	164
1.2.228	Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2018 . . . . .	164

### **Consumo por tipo de droga: setas mágicas**

---

1.2.229	Evolución del consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2018 .....	165
1.2.230	Prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018 .....	165
1.2.231	Prevalencia de consumo de setas mágicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	166
1.2.232	Prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	166

### **Consumo por tipo de droga: heroína**

---

1.2.233	Evolución de la prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018 .....	167
1.2.234	Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018 .....	167
1.2.235	Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2018 .....	168
1.2.236	Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	168
1.2.237	Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	169
1.2.238	Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 .....	169

### **Consumo por tipo de droga: inhalables volátiles**

---

1.2.239	Evolución del consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018 .....	170
1.2.240	Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018 .....	170
1.2.241	Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	171
1.2.242	Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	171
1.2.243	Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 .....	172

### **Consumo por tipo de droga: GHB**

---

1.2.244	Evolución de la prevalencia de consumo de GHB (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2018 .....	172
1.2.245	Prevalencia de consumo de GHB entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2018 .....	173
1.2.246	Prevalencia de consumo de GHB en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	173
1.2.247	Prevalencia de consumo de GHB entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	174

## **Consumo por tipo de droga: esteroides anabolizantes**

---

1.2.248 Evolución de la prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes (%) y edad media de inicio (años) en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2012-2018 .....	174
1.2.249 Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2018 .....	175
1.2.250 Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	175
1.2.251 Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	176

## **Consumo por tipo de droga: sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio**

---

1.2.252 Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2016-2018 .....	176
1.2.253 Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	176
1.2.254 Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido estas sustancias alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018 .....	177
1.2.255 Modo de obtención de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias 14-18 años que han consumido sustancias estimulantes (%). España 2016-2018 .....	177
1.2.256 Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, borracheras, tabaco y consumo problemático de cannabis en los últimos 12 meses y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida y entre el total de los estudiantes de 14 a 18 años (%). España, 2018 .....	178

## **Consumo por tipo de droga: analgésicos opioides**

---

1.2.257 Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018 .....	178
1.2.258 Prevalencia de consumo de analgésicos opioides entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	179
1.2.259 Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 ..	179
1.2.260 Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	180

## **Consumo por tipo de droga: nuevas sustancias psicoactivas**

---

1.2.261 Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2018 .....	180
1.2.262 Evolución de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2018 .....	181
1.2.263 Evolución de la prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2018 .....	182

1.2.264	Evolución del porcentaje de personas que nunca han oido hablar de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 2014-2018 . . . . .	183
1.2.265	Prevalencias de consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias psicoactivas en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	183
1.2.266	Evolución de la forma de obtención de nuevas sustancias psicoactivas entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2018 . . . . .	184
1.2.267	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2012-2018 . . . . .	184
1.2.268	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido o no la sustancia alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018 . . . . .	185
1.2.269	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según hayan consumido o no la sustancia alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018 . . . . .	185
1.2.270	Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2018 . . . . .	186
1.2.271	Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2018 . . . . .	186
1.2.272	Evolución del desconocimiento de la existencia de determinadas nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2012-2018 . . . . .	187
1.2.273	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018 . . . . .	187
1.2.274	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 . . . . .	188
1.2.275	Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años(%). España, 2016-2018 . . . . .	188
1.2.276	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales alguna vez en la vida en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018 . . . . .	189

#### **Patrones de consumo de drogas: policonsumo**

1.2.277	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018 . . . . .	189
1.2.278	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2018 . . . . .	189
1.2.279	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2018 . . . . .	190

1.2.280	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018 .....	190
1.2.281	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2018 .....	191
1.2.282	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2018 .....	191
1.2.283	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2018 .....	191
1.2.284	Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad y sexo (%). España, 2018 .....	192
1.2.285	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) sin incluir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018 .....	192
1.2.286	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2018 .....	193
1.2.287	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) sin incluir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018 .....	193
1.2.288	Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2018 .....	194
1.2.289	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) sin incluir ni alcohol ni tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018 .....	194
1.2.290	Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, éxtasis, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2018 .....	195
1.2.291	Prevalencia de consumo de una, dos, tres o cuatro o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2018 .....	196
1.2.292	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2018 .....	196
1.2.293	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2018 .....	197
1.2.294	Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2008-2018 .....	197
1.2.295	Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2008-2018 .....	198
1.2.296	Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2012-2018 .....	199
1.2.297	Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días según sexo y edad (%). España, 2012-2018 .....	200

## Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

---

- 1.2.298 Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2018 ..... 201
- 1.2.299 Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2018 ..... 202
- 1.2.300 Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de cannabis y tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2018 ..... 202
- 1.2.301 Evolución del riesgo percibido del consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018 ..... 203
- 1.2.302 Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2018 ..... 203
- 1.2.303 Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2018 ..... 204
- 1.2.304 Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2018 ..... 204
- 1.2.305 Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, o el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2018 ..... 205
- 1.2.306 Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2006-2018 ..... 206
- 1.2.307 Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2018 ..... 207
- 1.2.308 Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2018 ..... 207

1.2.309	Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de cannabis (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2002-2018 .....	208
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

#### **Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad**

---

1.2.310	Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%)). España 1994-2018 .....	208
1.2.311	Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2018 .....	209
1.2.312	Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 2002-2018 .....	209
1.2.313	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2018 .....	210
1.2.314	Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (%). España, 2014-2018 .....	210
1.2.315	Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2014-2018 .....	211
1.2.316	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	212
1.2.317	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna de las siguientes drogas, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	212
1.2.318	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna droga ilegal, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	213
1.2.319	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna droga ilegal, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo y edad, según el consumo que tengan de otras drogas legales o ilegales (% de fila). España, 2018 .....	213

#### **Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: información y formación sobre drogas**

---

1.2.320	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y edad (%). España, 2018 ..	213
1.2.321	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y edad (%). España, 2018 ..	214
1.2.322	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo (%). España, 2014-2018 ..	214
1.2.323	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según sexo y edad (%). España, 2018 .....	215
1.2.324	Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones, según sexo (%). España, 2016-2018 .....	215

## **Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas**

---

1.2.325	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como "muy importante" la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo y edad (%). España 2012-2018 .....	215
1.2.326	Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2018 .....	216
1.2.327	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como "muy importante" la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2018 .....	217
1.2.328	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como "algo o muy importante" la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2018 .....	217

## **Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: relación con sus iguales**

---

1.2.329	Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opinan que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%) España, 2006-2018 .....	218
1.2.330	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2018 .....	218
1.2.331	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2018 .....	219
1.2.332	Prevalencia de consumo de cocaína en polvo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2018 .....	219
1.2.333	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2018 .....	220
1.2.334	Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2018 .....	220
1.2.335	Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2018 .....	221
1.2.336	Prevalencia de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2018 .....	221

## **Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: permisividad de los padres**

---

1.2.337	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2018 .....	222
1.2.338	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de tabaco según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan (% de columna). España, 2018 ..	222

1.2.339	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de alcohol según el consumo de alcohol que los estudiantes tengan. España, 2018 .....	222
1.2.340	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de cannabis según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (% de columna). España, 2018	223

#### **Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: ocio y entorno escolar**

---

1.2.341	Prevalencia de consumo de sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas (%). España, 2018 .	223
1.2.342	Frecuencia de actividades de ocio realizadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (%). España, 2018 .....	224
1.2.343	Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2018 .....	225
1.2.344	Prevalencia de experimentar ciertas situaciones entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2018 .....	226
1.2.345	Prevalencia de experimentar ciertas situaciones en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2018 .....	227
1.2.346	Evolución de la prevalencia de bullying (acoso) a través de internet o por otros medios (acoso directo o indirecto físico, verbal, psicológico, sexual o social) en los últimos 12 meses (%). España 2016-2018 .....	227
1.2.347	Evolución de la prevalencia de bullying (acoso) a través de internet (%). España 2014-2018 .....	228

#### **Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: salidas nocturnas y hora de regreso**

---

1.2.348	Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo y edad (%). España, 2018 .....	228
1.2.349	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 .....	228
1.2.350	Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST $\geq 4$ ) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 .....	229
1.2.351	Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2018 .....	229
1.2.352	Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 .....	230
1.2.353	Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 .....	231
1.2.354	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 .....	231
1.2.355	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 .....	232

1.2.356	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 . . . . .	232
1.2.357	Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 . . . . .	233
1.2.358	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 . . . . .	233
1.2.359	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 . . . . .	234
1.2.360	Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 . . . . .	234
1.2.361	Prevalencia de consumo de drogas legales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018 . . . . .	235
1.2.362	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y edad (%). España, 2018 . . . . .	235
1.2.363	Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2018 . . . . .	236
1.2.364	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018 . . . . .	236
1.2.365	Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018 . . . . .	236
1.2.366	Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018 . . . . .	237
1.2.367	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018 . . . . .	238

#### **Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: dinero disponible**

1.2.368	Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (euros). España, 2016-2018 . . . . .	238
1.2.369	Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso (euros). España, 2018 . . . . .	238
1.2.370	Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas (euros). España, 2018 . . . . .	239

1.2.371	Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de tipo de estudios, titularidad del centro y notas que sacan habitualmente (euros). España, 2018 . . . . .	239
1.2.372	Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los hobbies que practican (euros). España, 2018 . . . . .	240
1.2.373	Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (euros). España, 2018 . . . . .	240
1.2.374	Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (euros). España, 2018 . . . . .	241
1.2.375	Situación económica de la familia entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días. España, 2018 . . . . .	241

#### **Consumo de sustancias psicoactivas: consecuencias negativas del consumo**

---

1.2.376	Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2018 . . . . .	242
1.2.377	Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2018 . . . . .	242
1.2.378	Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor que conducía bajo los efectos del alcohol o alguna droga ilegal entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2018 . . . . .	243
1.2.379	Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido alcohol o alguna droga ilegal, según sexo (%). España, 2016-2018 . . . . .	243
1.2.380	Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (%). España, 2018 . . . . .	244

## **2. Problemas relacionados con las drogas** 245

### **2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2018 . . . . .** 246

#### **Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2018**

---

2.1.1	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2018 . . . . .	246
2.1.2	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2018 .	247
2.1.3	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2018 . . . . .	248
2.1.4	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2018	249
2.1.5	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2018 . . . . .	250
2.1.6	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2018 . . . . .	251

2.1.7	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2018 .....	251
2.1.8	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2018 .....	252
2.1.9	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2018 .....	253
2.1.10	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2018 .....	254
2.1.11	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2018 .....	255
2.1.12	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2018 .....	256
2.1.13	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2018 .....	257
2.1.14	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2018 .....	258
2.1.15	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2018 .....	259
2.1.16	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2018 .....	260
2.1.17	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2018 .....	261
2.1.18	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2018 .....	262
2.1.19	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2018 .....	263
2.1.20	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2018 .....	264
2.1.21	Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2018 .....	265
2.1.22	Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2018 .....	266
2.1.23	Prevalencia (%) de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2018 .....	267

#### **Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2018**

2.1.24	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2018 .....	268
2.1.25	Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal por sexo. España, 2018 .....	269
2.1.26	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2018 .....	270
2.1.27	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2018 .....	271
2.1.28	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2018 .....	272

2.1.29	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2018 .....	273
2.1.30	Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo (%). España, 2018 .....	274
2.1.31	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España 2013-2018 .....	276
2.1.32	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2018 .....	277
2.1.33	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2018 .....	279
2.1.34	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento por sexo. España, 2018 .....	282
<b>2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2018 .....</b>	<b>285</b>	
2.2.1	Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España, 1996-2018 .....	285
2.2.2	Evolución del número de urgencias relacionadas con analgésicos opioides. España, 2005-2018 ..	286
2.2.3	Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España, 1996-2018 .....	287
2.2.4	Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2018 .....	288

#### **Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas. Datos 2018**

---

2.2.5	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España, 2018 .....	289
2.2.6	Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España, 2018 ..	289
2.2.7	Evolución vía de administración (número y porcentaje) de los episodios de urgencias hospitalarias en consumidores de drogas, según tipo de droga. España, 2011-2018 .....	290
2.2.8	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2018 .....	291

#### **2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2018 .....** 292

#### **Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2018**

---

2.3.1	Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2018 .....	292
2.3.2	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2018 .....	293

#### **Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y Registro General de Mortalidad**

---

2.3.3	Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2018 .....	294
2.3.4	Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, por sexo. España, 2018 .....	295

2.3.5	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1996-2018 .....	296
2.3.6	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España, 2018 .....	297
2.3.7	Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España, 2005-2018 .....	298
2.3.8	Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España, 2003-2018 .....	299
2.3.9	Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide, aunque haya otras sustancias). España, 2005-2018 .....	299
2.3.10	Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 1985-2018 .....	300
2.3.11	Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España, 2018 .....	300
2.3.12	Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detectan opioides (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides y cocaína). España, 1984-2018 .....	301
2.3.13	Distribución de los fallecidos en los que se detectan opioides en función de otras sustancias detectadas (%). España, 2018 .....	302
2.3.14	Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide, aunque haya otras sustancias). España, 2005-2018 .....	302
2.3.15	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 2004-2018 .....	303
2.3.16	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 1999-2018 .....	303
2.3.17	Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2018 .....	304
2.3.18	Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de hipnosedantes. España, 2015-2018 .....	304
2.3.19	Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de cannabis. España, 2015-2018 .....	305
2.3.20	Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2018 .....	305
2.3.21	Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas. España, 2005-2018 .....	306
2.3.22	Evolución del índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad-Registro Específico). España, 2005-2018 .....	306
2.3.23	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas (estimación nacional). España, 1983-2018 .....	307
	<b>Información complementaria</b>	<b>308</b>
	Páginas web de interés .....	309

# INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, drogas ilegales y nuevas sustancias), otras adicciones y los problemas asociados en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

Este documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2020*, se publica junto con otro documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2020*, al que complementa con una selección de tablas y gráficos.

El presente documento se estructura en dos capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de los estudiantes de educación secundaria de 14 a 18 años ante las drogas y otras adicciones desde 1994 hasta 2018/2019. La fuente de información es la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), en sus sucesivas ediciones. ESTUDES se realiza de forma bienal y se promueve y financia directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

En el presente documento no se incluye información de EDADES, ya que los últimos datos disponibles, al cierre de este informe, corresponden al año 2017/2018 y ya han sido publicados en el Informe y Estadísticas 2019. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España.


En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2018. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”, así como información relativa al consumo problemático de drogas e información relacionada con las infecciones en consumidores de drogas.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los Ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información. Los indicadores sobre infecciones y consumo problemático proceden de varias fuentes, pero fundamentalmente de la DGPNED y de otras divisiones del Ministerio de Sanidad.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998.

<https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>

# Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas



# 1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2019

En 2019, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1995, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha llevado a cabo la decimotercera edición de la Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES). Esta encuesta se realiza en todo el territorio nacional, en la población general residente en hogares (15-64 años), y se realiza en el domicilio.

El objetivo general de la misma es conseguir información que permita diseñar, desarrollar y evaluar estrategias y políticas dirigidas a prevenir el consumo y a abordar las consecuencias negativas del uso de drogas, del mal uso de las tecnologías y de otras conductas relacionadas. Los objetivos concretos y comunes a toda la serie de encuestas son conocer:

- La prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
- Las características sociodemográficas de los consumidores.
- Los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
- La disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante diversas conductas de consumo.
- La visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
- La opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas para reducirlos.
  - La evolución temporal (desde 1995) de los aspectos antes expuestos.

Al cierre de este informe los resultados de EDADES 2019 no están disponibles por lo que serán publicados en el próximo informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

La metodología y los resultados, hasta el año 2017, pueden consultarse en la página web del Plan Nacional sobre Drogas: [https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemasInformacion/encuestas\\_EDADES.htm](https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemasInformacion/encuestas_EDADES.htm)

# 1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2018/2019

## 1.2.1.


Evolución del tamaño de muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.2.

Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.3.

Error muestral de la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de  $p=q=0,5$ ). España, 2018.

	Número de colegios			Número de alumnos			Error muestral (%)***
	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	
Andalucía	68	0	68	2.884	0	2.884	1,9%
Aragón	24	42	66	882	1.708	2.590	1,9%
Asturias	22	29	51	827	1.212	2.039	2,1%
Baleares	21	0	21	840	0	840	3,4%
Canarias	33	0	33	1.328	0	1.328	2,7%
Cantabria	15	36	51	600	1.360	1.960	2,1%
Castilla-La Mancha	31	20	51	1.219	817	2.036	2,2%
Castilla y León	31	34	65	1.260	1.278	2.538	2,0%
Cataluña	59	0	59	2.640	0	2.640	1,9%
C. Valenciana	50	39	89	1.985	1.643	3.628	1,6%
Extremadura	22	0	22	907	0	907	3,3%
Galicia	32	20	52	1.225	801	2.026	2,2%
Madrid	55	40	95	2.508	1.664	4.172	1,5%
Murcia	27	25	52	1.181	1.059	2.240	2,1%
Navarra	18	34	52	786	1.567	2.353	2,0%
País Vasco	32	0	32	1.314	0	1.314	2,7%
La Rioja	12	11	23	570	463	1.033	3,0%
Ceuta	7	10	17	286	382	668	3,5%
Melilla	8	10	18	358	456	814	3,1%
Total España	567	350	917	23.600	14.410	38.010	0,6%

\* Muestra financiada por la DGPNSD. \*\* Muestra financiada por las CCAA. \*\*\* Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y  $p=q=0,5$ .

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

#### 1.2.4.

Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
CCAA													
Andalucía	471.794	462.498	439.486	402.840	361.512	363.862	326.571	304.858	350.592	345.073	296.955	307.453	321.268
Aragón	69.699	64.548	58.208	49.597	45.599	44.849	40.860	38.581	44.414	45.224	39.471	40.463	43.406
Asturias	73.467	67.094	59.379	48.271	42.232	39.752	33.888	28.534	32.598	32.381	26.746	27.234	28.070
Baleares	39.271	37.441	36.613	34.923	34.408	34.804	31.333	30.164	33.985	35.788	31.203	32.753	36.250
Canarias	113.256	110.955	111.340	96.577	87.248	85.592	74.244	68.929	78.902	81.402	67.994	73.074	78.018
Cantabria	36.909	34.734	311.64	26.253	23.666	22.473	19.609	17.583	20.366	19.980	16.536	17.541	18.764
Castilla y León	160.256	151.635	137.270	117.058	105.092	102.177	89.776	78.471	88.990	87.789	73.070	74.887	76.182
C.-La Mancha	90.837	89.425	85.693	79.729	77.727	78.397	73.297	69.538	79.848	81.315	69.444	71.507	73.671
Cataluña	384.125	354.024	310.815	262.519	248.490	248.973	236.139	234.395	264.590	275.946	250.522	249.005	271.365
C. Valenciana	251.506	234.037	215.858	190.873	178.801	177.602	160.648	154.174	176.955	180.461	153.623	161.202	173.196
Extremadura	57.224	59.242	58.622	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254	44.111	38.292	38.332	39.436
Galicia	182.834	176.703	163.396	134.929	113.916	112.125	94.564	82.464	95.485	87.948	73.481	75.578	79.623
Madrid	347.417	322.791	292.702	251.754	229.324	231.045	207.926	191.834	224.210	227.068	199.999	211.462	230.278
Murcia	73.929	71.706	66.423	60.005	55.246	56.305	51.755	49.721	57.769	59.440	51.322	54.473	58.481
Navarra	32.758	30.589	26.977	22.174	21.103	20.626	19.640	19.061	22.096	22.524	21.251	21.858	23.789
País Vasco	151.581	136.827	112.596	90.058	82.048	78.790	67.592	63.000	72.145	72.410	64.174	68.202	75.229
La Rioja	17.809	16.224	14.249	11.940	10.928	10.723	9.755	9.080	10.567	10.976	9.628	10.262	11.006
Ceuta	3.379	3.565	3.724	3.611	3.303	3.433	2.797	2.680	3.224	3.209	2.715	3.230	3.616
Melilla	2.961	3.136	3.455	3.197	3.244	2.970	2.791	2.890	6.099	3.776	3.105	3.421	3.778
TITULARIDAD CENTRO													
Pública	1.911.828	1.769.080	1.626.084	1.362.588	1.225.988	1.241.521	1.093.906	1.004.590	1.154.668	1.189.700	1.014.070	1.056.289	1.123.968
Privada	649.184	658.094	601.886	577.880	549.325	5.237.68	496.036	482.570	553.421	527.121	475.461	485.648	521.458
TIPO DE ESTUDIOS													
ESO	237.115	515.206	886.542	953.021	935.678	937.280	891.860	845.306	828.331	826.153	826.260	850.831	867.852
Bachillerato	1.510.024	1.261.877	927.249	724.972	614.796	600.389	576.960	520.541	608.428	594.090	550.619	560.404	582.505
F. Profesional	813.873	650.091	414.179	262.475	224.839	227.620	121.122	121.313	271.330	296.578	112.652	130.702	195.069
TOTAL	2.561.012	2.427.174	2.227.970	1.940.468	1.775.313	1.765.289	1.589.942	1.487.160	1.708.089	1.716.821	1.489.531	1.541.937	1.645.426

FUENTES: Ministerio de Educación y Formación Profesional. OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.5.

Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2018.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
CCAA												
Andalucía	2.075	1.976	2.372	2.552	2.464	2.750	6.143	3724	2.378	4.636	2.970	2.884
Aragón	941	775	671	2.185	1.757	1.764	785	1377	2.464	2.710	2.781	2.590
Asturias	875	765	661	744	584	1.737	627	1155	2.024	1.890	1.898	2.039
Baleares	661	679	602	1.762	1.795	622	599	1203	806	859	913	840
Canarias	859	966	739	960	835	2.079	1.398	1815	1.155	3.592	3.214	1.328
Cantabria	575	722	1.244	1.169	1.478	1.376	352	906	1.923	1.885	1.859	1.960
Castilla y León	1.120	1.093	919	1.140	983	1.107	1.697	1865	1.151	2.284	1.220	2.538
Castilla-La Mancha	982	943	1.749	2.501	860	984	1.359	1818	1.721	1.941	2.133	2.036
Cataluña	1.881	1.681	1.552	1.885	2.831	2.177	4.628	3415	2.353	2.510	2.617	2.640
C. Valenciana	1.466	1.395	2.287	1.685	1.362	1.657	3.119	2.727	1.696	3.260	3.502	3.628
Extremadura	659	718	443	796	1.693	777	807	1.370	860	905	817	907
Galicia	1.436	1.333	1.170	2.108	1.245	2.244	1.799	1.945	2.022	2.102	2.089	2.026
Madrid	1.979	1.853	2.929	3.308	3.033	3.055	3.904	3.056	3.250	4.404	4.321	4.172
Murcia	818	813	727	1.394	1.468	1.601	998	1.551	1.054	1.085	1.259	2.240
Navarra	659	553	627	530	600	570	361	960	605	662	773	2.353
País Vasco	1.104	1.021	852	806	990	884	1.316	1.726	1.096	1.164	1.286	1.314
La Rioja	651	570	462	457	975	525	190	647	477	507	1.076	1.033
Ceuta	128	30	323	130	140	289	46	325	232	224	319	668
Melilla	97	199	121	464	428	256	57	382	236	866	322	814
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO												
Pública	13.716	12.766	10.421	14.445	14.889	13.050	20.720	22.081	18.848	25.976	24.383	25.402
Privada	5.250	5.319	10.029	12.131	10.632	13.404	9.463	9.886	8.655	11.510	10.986	12.608
TIPO DE ESTUDIOS												
ESO	5.129	9.560	13.664	14.400	14.415	15.983	15.671	17.816	14.953	21.278	20.219	21.224
Bachillerato	10.495	7.312	5.869	10.733	9.468	8.468	10.348	11.683	10.384	14.624	13.496	13.858
F. Profesional	3.342	1.213	917	1.443	1.638	2.003	4.164	2.468	2.166	1.584	1.654	2.928
TOTAL	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369	38.010

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.6.

Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
CENTROS													
Andalucía	45	45	45	54	60	64	70	77	62	63	110	68	68
Aragón*	19	18	18	17	35	32	33	49	63	68	69	69	66
Asturias*	19	18	18	17	18	16	29	48	63	59	55	53	51
Baleares	12	12	13	15	32	32	15	41	77	22	20	23	21
Canarias	22	23	22	21	23	22	33	57	30	32	92	80	33
Cantabria*	13	12	13	28	29	28	28	39	58	58	50	49	51
Castilla y León	18	19	27	25	30	27	32	35	29	33	61	32	65
C.-La Mancha*	25	24	17	44	58	22	25	31	29	43	52	53	51
Cataluña	44	38	39	37	43	70	53	56	53	55	58	59	59
C. Valenciana*	33	33	33	56	37	35	40	46	66	48	78	86	89
Extremadura	16	14	16	10	19	31	19	25	22	27	27	23	22
Galicia*	23	26	29	25	36	30	39	62	65	60	57	53	52
Madrid*	40	37	40	66	75	71	71	85	81	81	98	96	95
Murcia*	16	16	16	17	38	25	25	48	25	27	25	29	52
Navarra*	13	13	15	15	14	14	13	16	15	17	17	18	52
País Vasco	26	24	27	21	22	26	28	30	28	30	32	33	32
La Rioja*	11	12	12	12	12	17	12	25	37	12	11	25	23
Ceuta*	–	5	1	5	3	5	7	7	6	6	6	7	17
Melilla*	–	–	3	3	7	6	5	7	48	6	23	7	18
Total	395	389	404	488	591	573	577	784	857	747	941	863	917
AULAS													
Andalucía	92	92	90	108	119	128	139	154	125	126	218	136	127
Aragón*	38	36	38	31	101	95	92	98	128	136	138	137	127
Asturias*	42	36	36	30	35	32	84	96	125	125	106	106	99
Baleares	29	28	27	24	84	93	30	82	153	43	40	46	40
Canarias	44	46	44	41	46	44	98	114	60	66	182	160	59
Cantabria*	28	28	28	48	58	84	81	78	116	117	98	98	98
Castilla y León	38	40	40	47	58	54	64	70	60	71	121	64	126
C.-La Mancha*	54	55	55	69	116	44	50	62	63	96	104	106	100
Cataluña	88	78	78	74	87	140	103	112	111	115	116	118	117
C. Valenciana*	68	65	69	90	72	70	80	92	136	92	154	172	169
Extremadura	34	32	53	19	37	92	38	50	45	57	50	46	44
Galicia*	56	55	33	43	102	60	116	124	129	120	114	104	101
Madrid*	85	80	58	119	144	142	142	170	160	166	196	190	185
Murcia*	34	36	79	29	72	74	75	96	51	55	50	58	104
Navarra*	30	28	26	22	26	28	26	32	32	30	32	36	102
País Vasco	52	52	33	40	44	51	56	60	56	60	60	66	61
La Rioja*	25	29	29	20	22	50	24	50	74	24	22	50	44
Ceuta*	–	10	2	15	6	10	14	14	12	12	12	19	32
Melilla*	–	–	8	6	22	24	10	14	94	12	45	14	34
Total	837	826	826	875	1.251	1.315	1.322	1.568	1.730	1.523	1.858	1.726	1.769

\* Han ampliado muestra en el año 2018.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2018.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	41,3	35,0	26,7	3,0
Alcohol	77,9	75,9	58,5	9,8
Cannabis	33,0	27,5	19,3	1,2
Hipnosedantes*	18,4	12,5	6,4	1,0
Hipnosedantes**	8,6	6,1	2,9	2,3
Éxtasis	2,4	1,7	0,7	-
Alucinógenos	1,9	1,4	0,5	-
Anfetaminas	2,2	1,5	0,5	-
Cocaína polvo y/o base	2,9	2,4	0,9	-
Cocaína polvo	2,6	2,1	0,8	-
Cocaína base	2,6	1,9	0,7	-
Heroína	1,7	1,2	0,5	-
Analgésicos opioides***	1,7	1,1	0,5	-
Inhalables volátiles	1,6	1,1	0,5	-
GHB	1,5	1,0	0,4	-
Metanfetamina	1,2	1,0	0,4	-
Setas mágicas	0,8	0,5	0,3	-
Esteroides anabolizantes	0,7	0,5	0,2	-
Nuevas sustancias	0,6	0,4	0,2	-
Ketamina	0,6	0,4	0,2	-
Spice	0,4	0,3	0,2	-
Mefedrona	0,4	0,3	0,2	-
Salvia divinorum	0,4	0,3	0,1	-
Ayahuasca	0,4	0,3	0,1	-

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.


\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

\*\*\* Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.8.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018.



\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.


\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

\*\*\* Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.9.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018.



\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.


\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

\*\*\* Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.10.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018.



\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.


\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

\*\*\* Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.11.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018.



\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.12.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.




\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Cocaína polvo y/o base. \*\*\*\* Para colocarse.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.13.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Cocaína polvo y/o base. \*\*\*\* Para colocarse.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.14.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.




\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Cocaína polvo y/o base. \*\*\*\* Para colocarse.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.16.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2018.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	24,4	35,1	46,1	51,7	40,4	55,4
Alcohol	58,3	72,5	84,3	88,5	77,2	89,0
Hipnosedantes*	13,8	16,6	18,8	21,3	17,9	25,8
Hipnosedantes**	6,0	8,0	8,5	10,4	8,4	12,1
Cannabis	15,0	25,5	36,8	45,9	32,0	49,3
Éxtasis	1,1	2,2	2,7	3,4	2,4	4,6
Alucinógenos	1,0	1,8	2,2	2,3	1,9	2,9
Anfetaminas/speed	0,6	1,3	1,8	2,0	1,5	2,9
Cocaína polvo y/o base	1,4	2,3	3,0	3,8	2,7	5,4
Cocaína polvo	1,1	2,1	2,6	3,5	2,4	5,1
Cocaína base	0,8	1,0	1,2	1,6	1,2	2,1
Heroína	0,5	0,8	0,8	0,6	0,7	1,1
Analgésicos opioides***	1,0	2,1	2,5	2,8	2,2	3,2
Inhalables volátiles	1,4	1,6	1,6	2,2	1,7	1,3
GHB	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5
Metanfetamina	0,8	1,5	1,6	2,2	1,6	2,4
Setas mágicas	0,7	1,4	2,1	2,0	1,6	2,2
Esteroides anabolizantes	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.17.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2018.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	21,2	30,0	39,5	43,1	34,4	45,4
Alcohol	56,1	70,2	82,5	86,7	75,2	87,0
Hipnosedantes*	9,0	10,8	13,0	15,2	12,2	17,2
Hipnosedantes**	4,3	5,2	6,1	7,7	5,9	8,7
Cannabis	12,3	21,8	31,3	37,9	26,8	38,7
Éxtasis	0,7	1,6	2,1	2,6	1,8	3,1
Alucinógenos	0,7	1,3	1,7	1,5	1,3	2,1
Anfetaminas/speed	0,4	0,9	1,3	1,6	1,1	1,9
Cocaína polvo y/o base	1,1	1,9	2,6	3,2	2,3	4,8
Cocaína polvo	0,9	1,7	2,2	2,8	2,0	4,7
Cocaína base	0,7	0,9	1,0	1,4	1,0	1,6
Heroína	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6
Analgésicos opioides***	0,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,9
Inhalables volátiles	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	0,8
GHB	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Metanfetamina	0,6	1,2	1,1	1,7	1,2	1,9
Setas mágicas	0,6	1,0	1,4	1,2	1,1	1,4
Esteroides anabolizantes	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.18.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2018.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	14,4	21,9	30,7	33,6	25,9	38,0
Alcohol	36,0	49,9	65,3	72,9	57,5	74,7
Hipnosedantes*	4,7	5,9	6,4	7,6	6,3	9,5
Hipnosedantes**	2,2	2,5	2,9	3,6	2,8	4,3
Cannabis	8,7	15,4	22,1	26,3	18,8	27,9
Éxtasis	0,3	0,6	0,7	0,9	0,6	1,3
Alucinógenos	0,3	0,4	0,6	0,5	0,5	0,7
Anfetaminas/speed	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,9
Cocaína polvo y/o base	0,5	0,8	1,0	1,1	0,9	1,5
Cocaína polvo	0,4	0,6	0,8	0,9	0,7	1,4
Cocaína base	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
Heroína	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4
Analgésicos opioides***	0,3	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5
Inhalables volátiles	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,1
GHB	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Metanfetamina	0,3	0,5	0,4	0,7	0,5	0,5
Setas mágicas	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
Esteroides anabolizantes	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.19.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la edad (%). España, 2018.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	3,2	6,4	11,9	14,3	9,4	17,6
Alcohol	0,4	0,7	1,1	1,6	1,0	1,1
Hipnosedantes*	2,2	2,6	3,0	3,5	2,9	4,6
Hipnosedantes**	0,8	0,8	1,3	1,5	1,1	1,7
Cannabis	0,6	1,5	2,7	3,4	2,1	4,8

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.20.

Edad media (años) de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España 2018.

	Hombres	Mujeres	Total
Hipnosedantes*	14,0	13,6	14,2
Alcohol	14,0	14,0	14,1
Tabaco	14,1	14,1	14,2
Hipnosedantes**	14,3	14,1	14,3
GHB	14,4	14,1	14,8
Heroína	14,5	14,4	14,7
Inhalables volátiles	14,5	14,7	14,3
Esteroides anabolizantes	14,5	14,5	14,6
Tabaco (consumo diario)	14,7	14,7	14,6
Cannabis	14,9	14,9	15,0
Cocaína base	15,1	15,1	15,1
Alcohol (consumo semanal)	15,2	15,2	15,2
Alucinógenos	15,2	15,2	15,2
Setas mágicas	15,2	15,2	15,2
Cocaína polvo y/o base	15,2	15,2	15,3
Analgésicos opioides***	15,2	15,3	15,2
Metanfetamina	15,2	15,2	15,3
Cocaína en polvo	15,3	15,3	15,3
Anfetaminas	15,4	15,4	15,4
Éxtasis	15,4	15,6	15,3

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

\*\*\* Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.21.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	41,3	38,2	44,3	24,4	20,9	27,8	35,1	31,8	38,2	46,1	43,1	49,0	51,7	48,7	54,5	55,4	53,0	58,1
Tabaco en pipas de agua	47,3	46,6	48,0	30,5	29,1	31,8	40,2	38,8	41,4	52,6	53,0	52,3	57,8	57,2	58,4	61,7	60,3	63,2
Cigarrillos electrónicos	48,4	52,4	44,5	41,4	43,0	39,8	48,3	51,9	44,7	51,4	57,0	46,3	49,6	54,2	45,4	52,4	56,5	47,7
Cigarrillos electrónicos con nicotina	15,2	14,3	16,0	8,8	7,4	10,1	13,3	11,7	14,8	16,6	16,1	17,0	19,3	18,7	19,9	20,4	21,0	19,8
Cigarrillos electrónicos sin nicotina	41,0	45,5	36,7	36,9	39,1	34,8	42,3	46,5	38,1	43,6	49,9	37,9	40,0	44,8	35,6	41,5	45,8	36,6
Cigarrillos electrónicos de los 2 tipos	10,0	9,6	10,3	6,1	5,3	6,9	9,1	8,1	10,1	11,0	11,2	10,8	12,1	11,9	12,3	12,5	13,5	11,4
Bebidas alcohólicas	77,9	76,3	79,4	58,3	56,1	60,4	72,5	70,4	74,6	84,3	83,2	85,4	88,5	87,1	89,8	89,0	88,4	89,7
Borracheras	51,1	48,5	53,4	25,8	21,6	29,9	40,9	37,3	44,5	57,4	55,8	58,8	68,6	67,4	69,7	70,9	69,1	72,9
Hipnosedantes con o sin receta	18,4	15,1	21,5	13,8	11,5	16,1	16,6	14,7	18,5	18,8	15,6	21,8	21,3	16,4	25,8	25,8	19,9	32,3
Hipnosedantes sin receta	8,6	6,8	10,3	6,0	4,7	7,2	8,0	6,4	9,5	8,5	7,2	9,7	10,4	7,6	13,1	12,1	9,1	15,5
Cannabis	33,0	34,5	31,5	15,0	15,8	14,2	25,5	26,4	24,6	36,8	39,8	33,9	45,9	47,0	45,0	49,3	51,2	47,2
Cocaína polvo y/o base	2,9	3,9	1,9	1,4	1,9	1,0	2,3	3,1	1,4	3,0	4,4	1,7	3,8	4,9	2,9	5,4	6,4	4,2
Cocaína en polvo	2,6	3,5	1,7	1,1	1,5	0,8	2,1	3,0	1,2	2,6	3,9	1,5	3,5	4,4	2,6	5,1	6,0	4,2
Cocaína base	1,2	1,7	0,8	0,8	1,0	0,6	1,0	1,4	0,6	1,2	1,8	0,5	1,6	2,1	1,2	2,1	2,0	2,1
Éxtasis	2,6	3,1	2,1	1,1	1,3	0,8	2,2	2,2	2,1	2,7	3,9	1,7	3,4	3,7	3,1	4,6	5,4	3,7
Anfetaminas	1,5	2,0	1,1	0,6	0,8	0,4	1,3	1,7	0,8	1,8	2,5	1,0	2,0	2,3	1,7	2,9	3,6	2,1
Alucinógenos	1,9	2,7	1,2	1,0	1,4	0,7	1,8	2,3	1,2	2,2	3,2	1,2	2,3	3,2	1,5	2,9	3,4	2,4
Heroína	0,7	1,0	0,4	0,5	0,7	0,2	0,8	1,0	0,6	0,8	1,2	0,3	0,6	0,7	0,5	1,1	1,4	0,8
Analgésicos opioides para colocarse	2,2	3,0	1,5	1,0	1,3	0,7	2,1	2,8	1,5	2,5	3,6	1,5	2,8	3,7	2,0	3,2	4,1	2,3
Inhalables volátiles	1,7	1,9	1,5	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,6	2,4	0,8	2,2	2,3	2,1	1,3	1,5	1,1
GHB	0,6	0,7	0,4	0,5	0,8	0,3	0,5	0,6	0,5	0,6	0,9	0,4	0,6	0,6	0,7	0,5	0,8	0,2
Metanfetamina	1,6	1,9	1,3	0,8	0,9	0,7	1,5	1,7	1,3	1,6	2,3	1,0	2,2	2,2	2,2	2,4	3,2	1,5
Setas mágicas	1,7	2,4	1,0	0,7	1,2	0,3	1,4	2,1	0,8	2,1	3,2	1,1	2,0	2,6	1,4	2,2	3,2	1,1
Esteroides anabolizantes	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,7	0,2	0,5	0,7	0,3	0,3	0,5	0,1
Sustancias estimulantes																		
que mejoran rendimiento en el estudio	7,0	7,1	6,8	5,1	4,8	5,3	6,7	6,7	6,7	7,1	8,2	6,0	7,9	7,9	7,9	9,6	8,4	11,0
Metilfenidato	0,9	1,3	0,6	0,7	0,9	0,5	0,9	1,2	0,6	0,8	1,2	0,3	1,1	1,6	0,7	1,3	1,3	1,2
Elvanse, Adderall	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,8	0,2	0,8	1,0	0,5
Piracetam	0,5	0,6	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,3	0,6	0,8	0,5	0,5	0,9	0,1
Donepezilo	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,5	0,1
Modafinilo	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,1
Durvitan	0,3	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,4	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,0
Anfetaminas para estudiar	0,7	1,0	0,5	0,3	0,4	0,3	0,6	0,8	0,5	0,9	1,2	0,6	0,9	1,3	0,5	0,9	1,4	0,3
Cocaína para estudiar	1,1	1,5	0,8	0,5	0,6	0,4	1,1	1,3	0,9	1,1	1,7	0,7	1,4	2,0	0,9	2,2	1,9	2,5
Nuevas sustancias psicoactivas	2,4	2,9	1,9	1,4	1,4	1,5	2,6	2,9	2,4	2,5	3,4	1,7	2,5	3,1	2,0	3,5	4,6	2,3
Ketamina	0,6	0,9	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,8	0,4	0,6	0,9	0,2	0,8	1,1	0,6	0,8	1,4	0,1
Spice	0,8	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,9	1,1	0,6	0,9	1,4	0,5	0,8	0,9	0,7	1,1	1,8	0,3
Mefedrona	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,2	0,6	0,8	0,5
Salvia divinorum	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,2	0,5	0,7	0,2	0,4	0,6	0,1	0,5	0,6	0,3	0,3	0,5	0,2
Ayahuasca	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7	0,2	0,4	0,7	0,2	0,6	0,9	0,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.22.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	35,0	31,4	38,5	21,2	16,8	25,4	30,0	26,1	33,9	39,5	36,1	42,7	43,1	40,0	46,0	45,4	43,1	48,0
Cigarrillos electrónicos	37,8	41,9	33,9	34,0	35,2	32,8	38,6	42,0	35,2	40,3	46,1	34,9	37,1	41,9	32,6	38,5	44,3	32,1
Bebidas alcohólicas	75,9	74,1	77,5	56,1	53,5	58,5	70,2	67,7	72,6	82,5	81,3	83,5	86,7	85,4	88,0	86,9	86,0	88,0
Borracheras	44,5	42,3	46,5	22,2	18,1	25,9	35,6	32,2	38,9	50,6	49,1	52,0	59,9	59,7	60,0	60,3	59,2	61,6
Botellón	51,3	48,6	53,8	28,4	24,3	32,2	44,1	39,9	48,1	59,2	56,8	61,4	64,2	63,2	65,0	64,1	63,8	64,4
Bebidas alcohólicas y cannabis	17,5	18,8	16,3	6,5	6,2	6,8	13,8	14,1	13,5	20,1	22,2	18,2	24,7	27,0	22,5	25,9	28,8	22,7
Bebidas alcohólicas y cocaína en polvo y/o base	1,2	1,5	0,9	0,4	0,5	0,4	0,8	1,0	0,7	1,1	1,9	0,4	1,8	2,2	1,4	2,6	2,2	3,1
Hipnosedantes con o sin receta	12,5	9,8	15,1	9,0	7,4	10,6	10,8	9,3	12,3	13,0	10,4	15,4	15,2	10,7	19,3	17,2	12,5	22,4
Hipnosedantes sin receta	6,1	4,7	7,4	4,3	3,3	5,2	5,2	4,3	6,1	6,1	5,1	7,1	7,7	5,3	9,9	8,7	6,7	10,8
Cannabis	27,5	29,2	25,9	12,3	12,4	12,1	21,8	22,5	21,0	31,3	34,5	28,3	37,9	39,4	36,5	38,7	42,5	34,5
Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)	15,4	18,2	12,3	9,7	8,1	11,4	14,7	16,6	12,7	15,6	19,2	11,7	16,0	19,7	12,1	19,1	21,8	15,3
Cocaína polvo y/o base	2,4	3,2	1,7	1,1	1,5	0,8	1,9	2,7	1,2	2,6	3,8	1,4	3,2	4,0	2,5	4,8	5,6	3,9
Cocaína en polvo	2,1	2,9	1,4	0,9	1,3	0,5	1,7	2,4	1,1	2,2	3,2	1,2	2,8	3,5	2,2	4,7	5,4	3,9
Cocaína base	1,0	1,4	0,7	0,7	0,8	0,5	0,9	1,2	0,5	1,0	1,6	0,5	1,4	1,8	0,9	1,6	1,4	1,9
Éxtasis	1,9	2,4	1,4	0,7	1,0	0,5	1,6	1,8	1,3	2,1	3,2	1,2	2,6	2,9	2,2	3,1	4,2	1,9
Anfetaminas	1,1	1,5	0,8	0,4	0,5	0,4	0,9	1,2	0,6	1,3	2,0	0,7	1,6	1,9	1,3	1,9	2,9	0,9
Alucinógenos	1,4	2,0	0,8	0,7	1,1	0,4	1,3	1,8	0,9	1,7	2,7	0,7	1,5	2,0	0,9	2,1	2,7	1,5
Heroína	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,2	0,5	0,7	0,4	0,5	0,9	0,1	0,4	0,4	0,3	0,6	1,0	0,1
Analgésicos opioides para colocarte	1,5	2,2	0,8	0,7	0,9	0,6	1,6	2,3	0,9	1,7	2,7	0,7	1,6	2,4	0,9	1,9	2,7	0,9
Inhalables volátiles	1,0	1,3	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,7	0,4	1,2	1,3	1,1	0,8	1,1	0,6
GHB	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,7	0,1
Metanfetamina	1,2	1,6	0,8	0,6	0,7	0,5	1,2	1,5	0,9	1,1	1,8	0,5	1,7	1,9	1,5	1,9	2,9	0,7
Setas mágicas	1,1	1,7	0,6	0,6	0,9	0,2	1,0	1,5	0,5	1,4	2,2	0,8	1,2	1,6	0,7	1,4	2,4	0,3
Esteroides anabolizantes	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,1
Nuevas sustancias psicoactivas	1,7	2,1	1,3	0,9	0,9	0,9	2,1	2,2	2,1	1,8	2,4	1,2	1,7	2,3	1,2	2,5	3,6	1,3
Ketamina	0,4	0,7	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,2	0,6	0,9	0,2	0,6	1,1	0,1
Spice	0,5	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,5	0,5	0,8	0,3	0,5	0,5	0,5	0,7	1,2	0,1
Mefedrona	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,8	0,0
Salvia divinorum	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,0
Ayahuasca	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1	0,5	0,9	0,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.23.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	26,7	23,9	29,3	14,4	10,5	18,1	21,9	19,1	24,6	30,7	27,5	33,6	33,6	31,7	35,4	38,0	36,4	39,8
Cigarrillos de cajetilla	36,9	32,4	40,4	42,1	33,0	47,1	37,4	31,1	42,0	36,2	30,5	40,6	35,9	33,4	38,1	35,9	36,3	35,6
Tabaco de liar	14,1	14,2	14,1	10,8	13,6	9,3	9,9	9,9	9,9	14,7	15,8	13,8	16,9	15,1	18,4	15,4	15,2	15,5
Cigarrillos de cajetilla y tabaco de liar	49,0	53,4	45,5	47,1	53,4	43,6	52,7	58,9	48,1	49,1	53,7	45,6	47,2	51,5	43,6	48,7	48,5	48,9
Cigarrillos electrónicos	14,9	17,6	12,4	14,2	16,0	12,5	15,0	17,1	13,0	15,9	19,5	12,6	14,0	17,2	11,1	16,7	17,9	15,2
Bebidas alcohólicas	58,5	57,2	59,8	36,0	34,5	37,5	49,9	48,5	51,3	65,3	63,9	66,6	72,9	71,6	74,0	74,7	74,0	75,5
Borracheras	24,3	23,7	25,0	9,7	7,6	11,7	17,5	15,9	18,9	27,7	27,5	27,9	35,6	36,1	35,1	37,6	38,4	36,6
Binge drinking	32,3	32,2	32,3	15,1	12,9	17,1	25,2	23,7	26,7	36,6	37,9	35,4	44,0	45,3	42,7	47,1	47,4	46,8
Bebidas energéticas	40,2	49,7	31,1	36,9	45,0	29,3	40,4	49,4	31,5	40,7	51,6	30,6	40,8	51,0	31,5	44,9	52,2	36,7
Bebidas energéticas + alcohol	16,0	18,2	13,8	9,4	10,6	8,4	13,4	14,9	12,0	17,7	20,8	14,9	20,2	23,3	17,4	21,2	23,8	18,2
Hipnosedantes con o sin receta	6,4	5,1	7,7	4,7	4,0	5,3	5,9	5,1	6,7	6,4	5,3	7,5	7,6	5,3	9,6	9,5	6,8	12,6
Hipnosedantes sin receta	2,9	2,2	3,5	2,2	1,9	2,4	2,5	2,0	2,9	2,9	2,3	3,4	3,6	2,6	4,6	4,3	2,6	6,2
Cannabis	19,3	21,5	17,3	8,7	8,8	8,7	15,4	16,6	14,1	22,1	25,2	19,3	26,3	29,2	23,5	27,9	32,2	23,0
Principalmente marihuana	43,8	39,7	48,7	46,2	45,4	46,9	46,3	43,0	50,0	42,8	37,1	49,8	42,6	38,3	47,5	44,1	41,5	48,1
Principalmente hachís	19,3	19,7	18,7	17,3	18,5	16,0	16,0	15,2	17,0	20,5	20,9	20,1	20,6	22,0	19,0	18,7	18,0	19,8
Marihuana y hachís	37,0	40,6	32,6	36,6	36,1	37,0	37,7	41,8	32,9	36,7	42,0	30,1	36,8	39,7	33,5	37,2	40,5	32,1
En forma de porros o canutos	17,7	19,6	15,9	7,8	7,7	7,8	13,9	14,9	12,9	20,4	23,4	17,6	24,1	26,7	21,7	25,7	29,5	21,4
Usando pipas de agua	2,3	3,2	1,4	1,2	1,7	0,8	2,0	2,8	1,2	2,5	3,8	1,3	3,0	3,8	2,2	2,9	4,5	1,2
Usando cigarrillos electrónicos	0,4	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,5	0,3	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,2	0,3	0,6	0,0
Por vía oral	1,0	1,2	0,8	0,5	0,6	0,5	0,9	0,9	1,0	1,1	1,4	0,8	1,3	1,6	0,9	1,9	2,2	1,4
Cannabis mezclado con tabaco	15,1	16,5	13,8	5,8	5,7	6,0	11,9	12,6	11,2	17,7	20,1	15,5	20,9	22,9	19,0	22,6	25,2	19,6
Cocaína polvo y/o base	0,9	1,3	0,6	0,5	0,6	0,4	0,8	1,1	0,4	1,0	1,6	0,5	1,1	1,5	0,8	1,5	1,8	1,1
Cocaína en polvo	0,7	1,1	0,4	0,4	0,5	0,2	0,6	0,9	0,4	0,8	1,3	0,4	0,9	1,3	0,6	1,4	1,7	1,1
Cocaína base	0,4	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	0,1	0,5	0,8	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4	0,5	0,4
Éxtasis	0,7	0,9	0,4	0,3	0,4	0,2	0,6	0,7	0,4	0,7	1,1	0,4	0,9	1,2	0,6	1,3	1,9	0,5
Anfetaminas	0,5	0,7	0,3	0,2	0,4	0,1	0,4	0,6	0,3	0,5	0,8	0,2	0,6	0,8	0,4	0,9	1,2	0,5
Alucinógenos	0,5	0,7	0,3	0,3	0,4	0,1	0,4	0,6	0,2	0,6	0,9	0,3	0,5	0,8	0,3	0,7	0,9	0,5
Heroína	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,7	0,0
Analgésicos opioides para colocarte	0,5	0,7	0,2	0,3	0,4	0,3	0,6	1,0	0,2	0,4	0,8	0,1	0,5	0,7	0,3	0,5	0,6	0,3
Inhalables volátiles	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,4	0,5	0,8	0,2	0,6	0,7	0,6	0,1	0,3	0,0
GHB	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	0,1	
Metanfetamina	0,5	0,7	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,8	0,3	0,4	0,7	0,1	0,7	0,8	0,5	0,5	0,9	0,1
Setas mágicas	0,4	0,7	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,6	0,1	0,4	0,8	0,2	0,5	0,8	0,3	0,4	0,6	0,1
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0
Nuevas sustancias psicoactivas	0,8	1,0	0,6	0,5	0,6	0,4	0,9	1,0	0,8	0,7	1,0	0,5	0,9	1,2	0,6	1,0	1,5	0,4
Ketamina	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1
Spice	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1
Mefedrona	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0
Salvia divinorum	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	
Ayahuasca	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.24.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	9,8	9,4	10,3	3,2	2,5	3,8	6,4	6,2	6,6	11,9	11,2	12,5	14,3	13,8	14,9	17,6	17,5	17,7
Bebidas alcohólicas	1,0	1,3	0,7	0,4	0,6	0,2	0,7	0,8	0,5	1,1	1,2	1,0	1,6	2,2	1,1	1,1	1,4	0,7
Borracheras	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2
Binge drinking	0,6	0,8	0,4	0,4	0,3	0,5	0,6	1,0	0,3	0,7	1,0	0,3	0,7	0,9	0,5	0,6	1,0	0,2
Hipnosedantes con o sin receta	3,0	2,5	3,4	2,2	2,1	2,4	2,6	2,7	2,4	3,0	2,7	3,3	3,5	2,4	4,5	4,6	3,1	6,3
Hipnosedantes sin receta	1,2	1,0	1,3	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7	1,3	1,2	1,3	1,5	1,0	1,9	1,7	1,1	2,3
Cannabis	2,3	3,3	1,4	0,6	0,8	0,4	1,5	2,1	0,8	2,7	4,0	1,5	3,4	4,9	2,1	4,8	6,6	2,8

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.25.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3
Cannabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1	8,6
Hipnosedantes*	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9	33,0
Hipnosedantes**	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0	18,4
Cocaína polvo y/o base	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,4
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0	1,6
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4	0,8
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,8	1,4	1,2
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	2,2
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8	1,7
GHB	-	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	1,5
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5	0,7

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.26.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9
Tabaco	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7	35,0
Cannabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3	6,1
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6	27,5
Hipnosedantes**	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	12,5
Cocaína polvo y/o base	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,7
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,4
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,5
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9	1,1
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,1
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	1,2
GHB	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	1,0
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3	0,5

\* \* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.27.

Evolución de las prevalencias de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7
Cannabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3	2,9
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9	19,3
Hipnosedantes**	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6	6,4
Cocaína polvo y/o base	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0	0,9
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3
GHB	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,4
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2

\* \* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.28.

Evolución de las prevalencias de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Tabaco	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8	3,0
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	2,7	1,2
Cannabis	1,0	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8	2,0	2,3
Alcohol	-	-	-	-	-	-	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7	1,6	9,8
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	1,1	1,0

\* \* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.29.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida													
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9
Hipnosedantes*	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9	18,4
Hipnosedantes**	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0	8,6
Cannabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1	33,0
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,6
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5
Cocaína polvo y/o base	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8	0,7
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0	1,7
GHB	-	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5	0,4

### 1.2.29. (continuación)

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses														
Tabaco	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7	35,0	
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6	12,5	
Hipnosedantes**	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	6,1	
Cannabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3	27,5	
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,4	
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	
Cocaína polvo y/o base	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4	
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	
GHB	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2	
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9	1,1	
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3	
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días														
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7	
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9	6,4	
Hipnosedantes**	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6	2,9	
Cannabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3	19,3	
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7	
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5	
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	
Cocaína polvo y/o base	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0	0,9	
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	
GHB	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	
Prevalencia de consumo a diario en los últimos 30 días														
Tabaco	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8	9,8	
Alcohol	-	-	-	-	-	-	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7	1,6	1,0	
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	2,7	3,0	
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	1,1	1,2	
Cannabis	1,0	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8	2,0	2,3	

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.30.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018					
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
Tabaco	56,6	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7	38,2	44,3				
Alcohol	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2	76,3	79,4				
Hipnosed*	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5	15,1	21,5				
Hipnosed**	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8	6,8	10,3				
Cannabis	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9	34,5	31,5				
Éxtasis	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9	3,1	2,1				
Alucinógenos	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1	2,7	1,2				
Anfetaminas	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2	2,0	1,1				
Cocaína polvo y/o base					3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2	3,9	1,9
Heroína	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5	1,0	0,4				
I. volátiles	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9	1,9	1,5				
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8	1,3	0,8	0,8	0,4	0,7	0,4				
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,6	1,1	0,4	1,7	1,0	1,9	1,3			
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,4	1,8	0,8	2,0	0,8	2,4	1,0			
E. anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,3	1,0	0,3	0,8	0,2	0,6	0,2			

H = Hombres; M = Mujeres. \* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.31.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018					
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
Tabaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5	29,6	33,2	32,6	36,9	31,4	38,5				
Alcohol	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9	74,1	77,5				
Hipnosed*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9	7,7	13,8	8,8	14,4	9,8	15,1				
Hipnosed**	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7	4,7	7,4				
Cannabis	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4	29,2	25,9				
Éxtasis	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1	2,4	1,4				
Alucinógenos	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6	2,0	0,8				
Anfetaminas	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8				
Cocaína polvo y/o base					2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6	3,2	1,7
Heroína	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3				
I. volátiles	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,8				
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5	0,9	0,4	0,6	0,2	0,5	0,3				
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,4	0,8	0,3	1,3	0,7	1,6	0,8			
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	0,8	1,2	0,5	1,3	0,5	1,7	0,6			
E. anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,2	0,7	0,2	0,5	0,1	0,5	0,2			

H = Hombres; M = Mujeres. \* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.32.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0	23,9	29,3
Alcohol	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1	57,2	59,8
Hipnosed*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5	4,2	8,1	4,4	7,3	5,1	7,7
Hipnosed**	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3	2,2	3,5
Cannabis	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9	21,5	17,3
Éxtasis	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4
Alucinógenos	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2	0,7	0,3
Anfetaminas	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3
Cocaína polvo y/o base	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5	1,3	0,6
Heroína	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1	0,4	0,1
I. volátiles	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	0,6	0,2	0,7	0,3	
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,6	0,1	0,7	0,2	
E. anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.33.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,2	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,4	10,3
Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,0	3,8	2,0	7,8	4,3	3,3	2,0	2,2	1,3	1,9	1,3	1,3	0,7
Hipnosed*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	2,3	3,0	2,5	3,4
Hipnosed**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	1,0	1,2	1,0	1,3	
Cannabis	1,5	0,5	2,2	0,8	2,7	0,9	5,5	1,9	5,5	2,1	7,0	2,9	4,2	2,2	4,4	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3	3,3	1,4

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.34.

Evolución de la edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Éxtasis	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2	15,4
Anfetaminas	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1	15,4
Cocaína polvo	-	-	-	-	-	-	15,4	15,4	15,4	15,6	15,1	15,2	15,3
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	15,2
Analgésicos opioides***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2
Cocaína polvo y/o base	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,3	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1	15,2
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,2
Alucinógenos	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2	15,2
Alcohol (semanal)	-	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	15,6	14,8	15,1	15,0	15,1	15,2
Cocaína base	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8	14,6	15,1
Cannabis	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8	14,9
Borracheras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	14,8
Tabaco (diario)	-	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6	14,7
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	14,5
Inhalables volátiles	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8	14,5
Heroína	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0	14,5
GHB	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2	14,4
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	13,8	14,0	13,9	14,3	13,9	13,7	14,3
Tabaco	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1	14,1
Alcohol	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0	14,0
Hipnosedantes**	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,2	14,6	14,2	14,0	14,0

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.35.

Evolución de la edad media de inicio en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España, 2000-2018.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Éxtasis	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2	15,4
Alucinógenos	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2	15,3
Alcohol (consumo semanal)	14,9	15	15,1	14,9	15,6	14,8	15,1	15,0	15,1	15,2
Cocaína polvo y/o base	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1	15,2
Anfetaminas	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1	15,2
Cannabis	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8	15,2
Borracheras	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	15,1
Tabaco (consumo diario)	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6	14,9
Tabaco	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1	14,5
Heroína	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0	14,5
Hipnosedantes**	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,4	14,6	14,2	14,0	14,3
Alcohol	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0	14,1
Sustancias volátiles	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8	14,0
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	14,3	13,9	13,7	14,0

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.36.


Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, heroína y esteroides anabolizantes alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.37.

Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, heroína y esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,5	1,0	1,4
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9	1,2
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,1
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5
GHB	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.38.

Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB, heroína y esteroides anabolizantes en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.39.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.884	78,4	76,9	79,9	76,8	75,2	78,3	58,6	56,8	60,4
Aragón	2.590	81,7	80,2	83,2	80,0	78,5	81,5	64,0	62,1	65,8
Asturias	2.039	77,3	75,5	79,2	75,7	74,2	77,6	59,4	57,3	61,6
Baleares	840	80,8	78,1	83,5	79,3	77,8	82,0	63,6	60,4	66,9
Canarias	1.328	72,5	70,1	74,9	69,3	67,6	71,8	51,4	48,7	54,1
Cantabria	1.960	77,4	75,5	79,2	75,1	73,5	77,0	58,7	56,5	60,9
Castilla y León	2.538	81,9	80,4	83,4	80,0	78,5	81,5	61,9	60,0	63,8
Castilla-La Mancha	2.036	79,5	77,8	81,3	77,7	76,2	79,5	60,3	58,2	62,4
Cataluña	2.640	79,1	77,5	80,6	76,7	75,1	78,3	60,4	58,5	62,2
C. Valenciana	3.628	78,0	76,6	79,3	75,9	74,4	77,3	60,3	58,7	61,8
Extremadura	907	80,3	77,7	82,9	78,8	77,3	81,5	58,4	55,2	61,6
Galicia	2.026	72,5	70,5	74,4	70,2	68,5	72,2	50,9	48,8	53,1
Madrid	4.172	75,6	74,3	76,9	73,5	71,8	74,8	55,5	54,0	57,0
Murcia	2.240	74,9	73,2	76,7	73,0	71,4	74,9	58,0	56,0	60,1
Navarra	2.353	83,8	82,3	85,3	82,5	81,1	84,0	65,4	63,5	67,4
País Vasco	1.314	82,5	80,5	84,6	80,2	78,8	82,4	61,0	58,4	63,7
La Rioja	1.033	82,1	79,7	84,4	81,0	79,6	83,4	66,5	63,6	69,4
Ceuta	668	41,9	38,2	45,7	40,3	38,5	44,0	29,9	26,4	33,3
Melilla	814	48,1	44,7	51,5	46,2	44,4	49,7	35,0	31,8	38,3
Total	38.010	77,9	77,5	78,3	75,9	74,3	76,3	58,5	58,0	59,0

IC95% = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.40.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.884	50,5	48,7	52,3	44,1	42,2	45,9	23,8	22,2	25,4
Aragón	2.590	58,2	56,3	60,1	51,4	49,6	53,3	28,0	26,2	29,7
Asturias	2.039	49,2	47,1	51,4	42,9	41,1	45,0	22,5	20,7	24,4
Baleares	840	54,3	51,0	57,7	49,2	47,4	52,6	28,2	25,2	31,3
Canarias	1.328	40,3	37,7	43,0	33,4	31,6	35,9	17,7	15,6	19,7
Cantabria	1.960	48,9	46,7	51,1	42,6	40,8	44,7	23,1	21,3	25,0
Castilla y León	2.538	55,6	53,7	57,6	47,8	45,9	49,7	25,1	23,4	26,8
Castilla-La Mancha	2.036	55,6	53,4	57,7	48,1	46,2	50,2	26,5	24,5	28,4
Cataluña	2.640	53,0	51,1	54,9	47,2	45,3	49,1	28,5	26,8	30,2
C. Valenciana	3.628	52,2	50,6	53,8	45,6	43,8	47,2	25,8	24,4	27,2
Extremadura	907	53,5	50,3	56,8	46,0	44,2	49,2	20,7	18,0	23,3
Galicia	2.026	40,2	38,0	42,3	33,9	32,2	36,0	16,0	14,4	17,6
Madrid	4.172	50,1	48,5	51,6	42,8	41,0	44,3	22,3	21,0	23,5
Murcia	2.240	46,9	44,9	49,0	40,0	38,2	42,0	22,1	20,4	23,9
Navarra	2.353	60,2	58,3	62,2	54,0	52,2	56,0	30,3	28,5	32,2
País Vasco	1.314	56,3	53,6	59,0	50,0	48,2	52,7	26,8	24,4	29,2
La Rioja	1.033	60,6	57,7	63,6	54,6	52,7	57,6	30,4	27,5	33,2
Ceuta	668	18,0	15,1	21,0	15,1	13,8	17,8	7,5	5,5	9,5
Melilla	814	22,9	20,0	25,8	18,2	16,7	20,8	10,2	8,1	12,2
Total	38.010	51,1	50,5	51,6	44,5	42,6	45,0	24,3	23,9	24,8

IC95% = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.41.

Prevalencia de hacer botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Muestra	Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.884	54,5	52,6	56,3	25,7	24,1	27,3
Aragón	2.590	60,0	58,1	61,9	28,6	27,0	30,4
Asturias	2.039	48,9	46,7	51,1	18,9	17,5	20,6
Baleares	840	52,2	48,8	55,6	27,7	26,1	30,7
Canarias	1.328	30,1	27,6	32,5	11,0	9,8	12,6
Cantabria	1.960	54,8	52,6	57,0	31,5	29,8	33,6
Castilla y León	2.538	53,6	51,7	55,6	22,7	21,2	24,4
Castilla-La Mancha	2.036	56,3	54,1	58,4	28,2	26,6	30,2
Cataluña	2.640	54,1	52,2	56,0	21,5	20,0	23,1
C. Valenciana	3.628	49,6	47,9	51,2	23,5	22,0	24,9
Extremadura	907	66,5	63,5	69,6	31,2	29,5	34,2
Galicia	2.026	40,5	38,3	42,6	18,0	16,6	19,7
Madrid	4.172	46,8	45,3	48,3	17,4	16,0	18,6
Murcia	2.240	53,4	51,4	55,5	23,4	21,8	25,1
Navarra	2.353	48,9	46,9	50,9	19,2	17,8	20,8
País Vasco	1.314	58,2	55,5	60,9	26,7	25,1	29,1
La Rioja	1.033	57,3	54,3	60,3	26,4	24,8	29,1
Ceuta	668	22,5	19,3	25,6	13,8	12,5	16,4
Melilla	814	29,2	26,1	32,3	16,4	15,1	19,0
Total	38.010	51,3	50,8	51,8	22,6	21,0	23,0

IC95% = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.42.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Muestrar	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Últimos 30 días				
Andalucía	2.884	14,7	13,4	16,0
Aragón	2.590	17,6	16,2	19,1
Asturias	2.039	22,2	20,4	24,0
Baleares	840	26,0	23,0	28,9
Canarias	1.328	14,2	12,3	16,1
Cantabria	1.960	14,4	12,9	16,0
Castilla y León	2.538	12,2	10,9	13,4
Castilla-La Mancha	2.036	12,9	11,4	14,3
Cataluña	2.640	21,6	20,0	23,2
C. Valenciana	3.628	18,1	16,9	19,4
Extremadura	907	11,8	9,7	13,9
Galicia	2.026	12,2	10,8	13,6
Madrid	4.172	11,7	10,7	12,7
Murcia	2.240	15,2	13,7	16,7
Navarra	2.353	16,5	15,0	18,0
País Vasco	1.314	16,2	14,2	18,2
La Rioja	1.033	18,3	16,0	20,7
Ceuta	668	14,1	11,4	16,7
Melilla	814	19,4	16,7	22,1
Total	38.010	16,0	15,6	16,3

IC95% = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.43.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.884	52,3	50,4	54,1	42,2	40,4	44,1	18,6	17,2	20,1
Aragón	2.590	44,5	42,5	46,4	32,9	31,1	34,7	11,0	9,8	12,2
Asturias	2.039	40,8	38,7	42,9	32,1	30,1	34,2	10,8	9,4	12,1
Baleares	840	43,3	40,0	46,7	34,2	31,0	37,5	14,1	11,8	16,5
Canarias	1.328	46,5	43,8	49,2	35,0	32,5	37,6	15,9	14,0	17,9
Cantabria	1.960	39,1	36,9	41,2	28,2	26,2	30,2	8,5	7,3	9,8
Castilla y León	2.538	46,8	44,9	48,8	34,5	32,7	36,4	11,9	10,6	13,1
Castilla-La Mancha	2.036	50,5	48,3	52,7	40,0	37,8	42,1	15,3	13,8	16,9
Cataluña	2.640	50,1	48,2	52,0	38,7	36,8	40,5	14,3	12,9	15,6
C. Valenciana	3.628	46,3	44,7	47,9	37,0	35,4	38,6	13,9	12,7	15,0
Extremadura	907	49,9	46,6	53,1	37,5	34,4	40,7	13,9	11,7	16,2
Galicia	2.026	36,6	34,5	38,7	27,9	25,9	29,9	10,4	9,1	11,7
Madrid	4.172	52,8	51,3	54,3	41,4	39,9	42,9	17,1	16,0	18,3
Murcia	2.240	45,2	43,1	47,2	41,0	39,0	43,0	17,5	15,9	19,0
Navarra	2.353	41,1	39,2	43,1	30,4	28,6	32,3	10,2	9,0	11,4
País Vasco	1.314	46,3	43,6	49,0	31,4	28,9	33,9	10,6	8,9	12,2
La Rioja	1.033	39,0	36,0	41,9	27,7	24,9	30,4	8,7	7,0	10,4
Ceuta	668	42,4	38,7	46,2	29,2	25,8	32,7	14,2	11,6	16,9
Melilla	814	34,6	31,3	37,9	24,7	21,7	27,7	12,5	10,2	14,8
Total	38.010	48,4	47,9	48,9	37,8	37,3	38,2	14,9	14,6	15,3

IC95% = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.44.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.884	17,7	16,3	19,1	12,1	10,9	13,3	5,6	4,8	6,5
Aragón	2.590	16,9	15,5	18,4	11,4	10,2	12,6	5,6	4,7	6,5
Asturias	2.039	18,4	16,7	20,1	13,8	12,3	15,3	7,6	6,5	8,8
Baleares	840	19,8	17,1	22,5	14,0	11,7	16,4	7,0	5,3	8,7
Canarias	1.328	17,9	15,9	20,0	11,7	10,0	13,4	5,9	4,7	7,2
Cantabria	1.960	15,8	14,2	17,4	11,2	9,8	12,6	6,7	5,6	7,9
Castilla y León	2.538	13,7	12,3	15,0	9,1	7,9	10,2	4,5	3,7	5,3
Castilla-La Mancha	2.036	17,1	15,5	18,7	11,1	9,7	12,4	5,7	4,7	6,7
Cataluña	2.640	21,1	19,5	22,7	14,0	12,6	15,3	7,4	6,4	8,4
C. Valenciana	3.628	19,7	18,4	21,0	13,5	12,4	14,6	6,9	6,1	7,8
Extremadura	907	18,3	15,8	20,8	13,0	10,8	15,2	6,3	4,7	7,9
Galicia	2.026	16,1	14,5	17,7	11,3	9,9	12,7	6,3	5,2	7,3
Madrid	4.172	18,7	17,5	19,8	12,9	11,9	13,9	7,1	6,3	7,8
Murcia	2.240	19,6	18,0	21,3	13,9	12,5	15,3	6,8	5,7	7,8
Navarra	2.353	16,0	14,5	17,4	11,0	9,8	12,3	5,1	4,2	6,0
País Vasco	1.314	17,2	15,1	19,2	12,1	10,3	13,9	7,1	5,7	8,5
La Rioja	1.033	16,6	14,4	18,9	11,0	9,1	12,9	5,5	4,1	6,9
Ceuta	668	13,1	10,6	15,7	9,4	7,2	11,6	5,3	3,6	7,0
Melilla	814	18,7	16,1	21,4	12,6	10,3	14,9	6,5	4,8	8,2
Total	38.010	18,4	18,0	18,8	12,5	12,2	12,9	6,4	6,2	6,7

\* Hipnosedantes con y sin receta. IC95% = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.45.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			A diario últimos 30 días			
	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	
Andalucía	2.884	37,8	36,0	39,6	32,2	30,5	33,9	23,8	22,2	25,4	8,6	7,6	9,6
Aragón	2.590	46,1	44,2	48,0	38,1	36,3	40,0	29,4	27,6	31,1	13,4	12,1	14,7
Asturias	2.039	39,6	37,5	41,8	34,2	32,2	36,3	26,1	24,2	28,0	9,2	8,0	10,5
Baleares	840	42,9	39,5	46,2	36,2	33,0	39,5	29,3	26,2	32,4	7,4	5,6	9,2
Canarias	1.328	34,6	32,1	37,2	27,2	24,8	29,6	20,8	18,6	23,0	5,1	3,9	6,3
Cantabria	1.960	38,5	36,3	40,6	32,9	30,8	34,9	24,4	22,5	26,3	9,8	8,5	11,2
Castilla y León	2.538	40,2	38,3	42,1	34,2	32,4	36,1	26,3	24,6	28,0	10,7	9,5	11,9
Castilla-La Mancha	2.036	41,6	39,4	43,7	35,7	33,6	37,8	27,8	25,9	29,8	11,9	10,5	13,3
Cataluña	2.640	46,6	44,7	48,5	40,7	38,8	42,5	31,2	29,4	32,9	11,7	10,5	12,9
C. Valenciana	3.628	41,7	40,1	43,3	35,1	33,6	36,7	26,8	25,3	28,2	9,0	8,1	10,0
Extremadura	907	43,3	40,0	46,5	36,6	33,5	39,8	27,5	24,6	30,4	12,2	10,1	14,3
Galicia	2.026	35,9	33,8	38,0	31,2	29,2	33,2	22,9	21,1	24,7	7,4	6,3	8,5
Madrid	4.172	43,3	41,8	44,8	35,5	34,1	37,0	27,6	26,3	29,0	10,8	9,8	11,7
Murcia	2.240	37,9	35,9	39,9	31,7	29,8	33,6	23,6	21,8	25,3	7,7	6,6	8,8
Navarra	2.353	40,8	38,8	42,7	34,3	32,4	36,2	25,7	23,9	27,5	10,1	8,9	11,3
País Vasco	1.314	45,2	42,5	47,8	39,2	36,6	41,9	29,9	27,4	32,4	12,4	10,6	14,2
La Rioja	1.033	42,3	39,3	45,3	36,6	33,6	39,5	28,1	25,4	30,9	11,3	9,4	13,2
Ceuta	668	22,0	18,9	25,2	18,2	15,2	21,1	15,7	13,0	18,5	5,2	3,5	6,9
Melilla	814	19,9	17,2	22,7	14,3	11,9	16,7	10,6	8,5	12,7	3,8	2,5	5,1
Total	38.010	41,3	40,8	41,8	35,0	34,5	35,5	26,7	26,2	27,1	9,8	9,6	10,1

IC95% = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.46.

Prevalencia de binge drinking entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Muestrar	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Últimos 30 días				
Andalucía	2.884	32,7	31,0	34,4
Aragón	2.590	38,6	36,7	40,5
Asturias	2.039	31,0	29,0	33,1
Baleares	840	34,2	31,0	37,4
Canarias	1.328	27,3	24,9	29,7
Cantabria	1.960	31,1	29,0	33,1
Castilla y León	2.538	33,5	31,7	35,3
Castilla-La Mancha	2.036	35,2	33,2	37,3
Cataluña	2.640	32,5	30,7	34,3
C. Valenciana	3.628	34,1	32,6	35,7
Extremadura	907	35,4	32,3	38,5
Galicia	2.026	23,7	21,8	25,5
Madrid	4.172	29,2	27,8	30,6
Murcia	2.240	31,5	29,6	33,4
Navarra	2.353	41,9	39,9	43,9
País Vasco	1.314	37,2	34,6	39,8
La Rioja	1.033	40,0	37,0	43,0
Ceuta	668	12,8	10,2	15,3
Melilla	814	17,4	14,8	20,1
Total	38.010	32,3	31,8	32,7

IC95% = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.47.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.884	28,8	27,1	30,4	23,8	22,2	25,3	16,6	15,3	18,0
Aragón	2.590	34,9	33,0	36,7	28,3	26,6	30,1	18,8	17,3	20,3
Asturias	2.039	30,6	28,6	32,6	26,1	24,2	28,1	18,9	17,2	20,6
Baleares	840	35,9	32,7	39,1	30,4	27,2	33,5	21,9	19,1	24,7
Canarias	1.328	29,6	27,2	32,1	24,6	22,2	26,9	17,0	15,0	19,1
Cantabria	1.960	28,9	26,9	30,9	23,9	22,0	25,8	16,6	14,9	18,2
Castilla y León	2.538	31,1	29,3	32,9	25,7	24,0	27,4	17,1	15,6	18,6
Castilla-La Mancha	2.036	32,4	30,4	34,5	27,6	25,6	29,5	20,0	18,2	21,7
Cataluña	2.640	39,4	37,6	41,3	33,2	31,4	35,0	23,1	21,5	24,8
C. Valenciana	3.628	36,0	34,5	37,6	29,8	28,3	31,3	21,5	20,2	22,8
Extremadura	907	25,2	22,3	28,0	19,8	17,2	22,4	14,8	12,5	17,1
Galicia	2.026	25,7	23,8	27,6	22,4	20,6	24,3	15,9	14,3	17,5
Madrid	4.172	34,1	32,6	35,5	28,6	27,2	30,0	20,1	18,9	21,3
Murcia	2.240	27,9	26,0	29,7	22,4	20,7	24,1	15,5	14,0	17,0
Navarra	2.353	33,6	31,7	35,5	28,6	26,8	30,4	20,1	18,5	21,8
País Vasco	1.314	39,6	36,9	42,2	33,0	30,5	35,6	23,8	21,5	26,1
La Rioja	1.033	33,9	31,0	36,8	27,5	24,8	30,2	19,6	17,2	22,0
Ceuta	668	19,9	16,9	23,0	14,5	11,9	17,2	11,1	8,7	13,5
Melilla	814	15,0	12,5	17,4	10,2	8,2	12,3	8,4	6,5	10,3
Total	38.010	33,0	32,5	33,5	27,5	27,1	28,0	19,3	19,0	19,7

IC95% = Intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.48.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Tamaño muestra	Edad media inicio en el consumo de tabaco	Edad media inicio en el consumo de tabaco diario	Edad media inicio en el consumo de alcohol	Edad media inicio en el consumo de cannabis
Andalucía	2.884	14,3	14,8	14,2	15,1
Aragón	2.590	13,9	14,5	13,6	14,9
Asturias	2.039	14,3	14,6	14,0	14,9
Baleares	840	14,3	14,7	14,0	14,8
Canarias	1.328	14,0	14,5	14,1	14,6
Cantabria	1.960	14,1	14,4	13,9	14,9
Castilla y León	2.538	14,1	14,6	14,0	15,0
Castilla-La Mancha	2.036	14,2	14,6	14,0	15,1
Cataluña	2.640	14,0	14,7	14,0	14,8
C. Valenciana	3.628	14,2	14,7	13,9	14,9
Extremadura	907	14,0	14,4	13,8	14,9
Galicia	2.026	14,4	14,8	14,3	15,0
Madrid	4.172	14,1	14,8	14,1	15,0
Murcia	2.240	14,1	14,6	14,1	14,9
Navarra	2.353	14,1	14,5	13,8	14,8
País Vasco	1.314	14,1	14,5	13,8	14,7
La Rioja	1.033	14,2	14,6	13,9	15,0
Ceuta	668	14,4	15,4	14,6	15,3
Melilla	814	14,5	14,8	14,8	15,2
Total	38.010	14,1	14,7	14,0	14,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.49.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2018.

		Información con respecto al tema de las drogas	
	Tamaño de muestra	Perfectamente informado	Mal informado
Andalucía	2884	24,9	7,4
Aragón	2590	27,1	5,8
Asturias	2039	31,1	5,3
Baleares	840	28,2	6,2
Canarias	1328	31,2	7,2
Cantabria	1960	33,1	7,1
Castilla y León	2538	27,3	5,6
Castilla-La Mancha	2036	25,3	7,2
Cataluña	2640	21,6	6,3
C. Valenciana	3628	28,4	6,8
Extremadura	907	24,8	7,7
Galicia	2026	30,5	7,0
Madrid	4172	26,5	7,2
Murcia	2240	32,3	7,3
Navarra	2353	24,2	8,9
País Vasco	1314	18,7	11,9
La Rioja	1033	29,9	6,0
Ceuta	668	30,8	9,9
Melilla	814	37,0	14,6
Total	38010	26,0	7,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.50.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Disponibilidad de sustancias psicoactivas												
	Muestra	Tabaco	Alcohol	Hipnosedantes	Cannabis	Cocaína polvo	Cocaína base	Éxtasis	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Heroína	GHB	Metanfetamina
Andalucía	2.884	92,2	94,7	41,9	62,9	29,9	18,9	17,5	18,2	21,9	19,0	11,1	15,4
Aragón	2.590	94,6	95,5	47,2	71,2	37,7	23,8	25,1	32,3	25,0	20,1	13,1	19,5
Asturias	2.039	93,2	95,1	52,0	72,9	42,6	27,6	28,7	32,8	30,8	26,9	16,8	23,3
Baleares	840	90,2	94,1	42,6	65,7	25,6	15,8	18,5	15,9	18,0	14,5	7,7	13,8
Canarias	1.328	88,9	91,3	43,1	64,4	31,8	22,2	21,8	22,1	22,0	21,7	12,9	20,6
Cantabria	1.960	93,4	95,9	45,4	67,2	36,6	24,5	23,8	28,5	25,5	20,6	14,6	21,6
Castilla y León	2.538	94,4	95,7	45,3	72,6	35,6	24,9	23,6	28,9	28,0	21,4	12,5	19,7
Castilla-La Mancha	2.036	94,0	95,9	45,4	71,0	38,6	26,1	22,7	24,8	27,4	23,7	13,2	18,8
Cataluña	2.640	93,5	94,9	50,2	69,8	30,2	20,5	20,0	19,7	22,8	19,3	12,8	17,9
C. Valenciana	3.628	92,7	94,6	48,9	70,2	35,8	25,1	24,0	25,7	26,3	21,7	14,5	20,2
Extremadura	907	93,5	95,3	45,3	69,7	36,8	21,9	20,5	26,7	23,1	22,2	14,3	18,4
Galicia	2.026	92,2	94,0	46,4	65,5	34,3	21,2	19,8	20,7	23,7	21,4	12,8	17,9
Madrid	4.172	94,4	95,8	48,8	66,7	29,7	20,8	21,0	21,5	24,5	18,8	11,9	19,4
Murcia	2.240	92,1	93,5	48,5	64,6	32,8	22,5	20,0	21,8	23,7	21,4	11,8	18,3
Navarra	2.353	93,0	96,1	49,6	75,1	38,8	25,0	25,7	36,8	26,1	21,7	13,0	23,0
País Vasco	1.314	95,4	96,3	64,0	79,7	41,8	24,9	23,3	32,6	26,7	20,8	14,1	21,2
La Rioja	1.033	94,8	96,8	46,5	76,2	39,0	26,5	25,7	35,3	27,8	23,7	14,9	22,4
Ceuta	668	87,2	85,1	45,8	57,8	24,8	19,8	25,1	19,3	24,1	19,8	11,8	18,0
Melilla	814	82,2	83,9	44,7	46,5	23,4	17,0	14,4	15,0	16,6	18,5	12,4	15,0
Total	38.010	93,1	94,9	47,4	68,1	32,8	21,8	21,0	22,8	24,1	20,2	12,6	18,5

% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc. Se excluyen de la base los casos que no contestan o no saben.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.51.

Valoración (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%)\* por comunidad/ciudad autónoma. España, 2018.

	Campañas publicitarias	Educación en las escuelas	Tratamiento voluntario a consumidores	Tratamiento obligatorio a consumidores	Administración médica de metadona	Administración médica de heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas contra las drogas	Legalización de cannabis	Legalización de todas las drogas
Andalucía	90,0	96,9	95,0	92,7	89,7	82,0	94,1	89,2	49,2	29,0
Aragón	88,6	95,9	95,1	90,0	89,2	81,1	91,9	86,7	53,0	29,6
Asturias	89,0	96,6	95,0	90,0	89,1	79,3	92,6	86,6	55,5	29,
Baleares	92,1	95,9	95,3	91,9	89,2	83,6	93,9	88,2	61,5	41,0
Canarias	90,0	95,7	94,8	89,7	89,1	80,3	92,5	87,8	54,6	32,0
Cantabria	89,2	95,6	95,5	90,7	88,7	81,0	92,9	87,5	51,1	30,9
Castilla y León	91,1	96,9	96,1	90,6	88,2	78,2	92,6	86,5	49,0	26,1
Castilla-La Mancha	90,1	97,0	95,8	90,7	89,6	79,4	93,2	87,3	49,3	27,8
Cataluña	93,3	97,0	96,4	93,0	91,3	87,6	93,5	89,4	66,6	41,4
C. Valenciana	89,4	96,3	94,9	91,0	89,4	81,9	92,6	87,4	57,6	33,7
Extremadura	89,2	97,0	94,1	91,7	85,5	78,8	93,7	92,3	51,9	35,0
Galicia	89,4	96,6	95,3	89,7	89,4	78,0	92,4	86,7	47,5	25,0
Madrid	90,1	96,4	95,2	89,7	87,4	79,4	92,2	85,6	49,9	27,2
Murcia	88,6	95,5	95,0	90,8	88,5	80,7	93,6	87,6	50,9	31,4
Navarra	87,5	94,0	92,0	87,5	86,0	80,7	86,3	82,1	54,9	32,2
País Vasco	83,4	89,4	88,5	85,1	83,7	80,2	85,2	80,5	59,0	37,8
La Rioja	89,9	96,5	95,4	88,7	88,3	81,2	91,2	85,4	52,3	27,5
Ceuta	88,3	95,6	93,2	89,1	88,9	81,1	93,6	90,6	46,5	32,3
Melilla	88,4	92,6	91,0	88,4	89,7	81,1	92,3	88,5	53,5	45,0
Total	90,1	96,2	95,0	91,0	89,0	81,7	92,6	87,5	54,3	31,9


\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.52.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

Bebidas alcohólicas últimos 30 días			
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	58,6	56,8	60,4
Aragón	64,0	62,1	65,8
Asturias	59,4	57,3	61,6
Baleares	63,6	60,4	66,9
Canarias	51,4	48,7	54,1
Cantabria	58,7	56,5	60,9
Castilla y León	61,9	60,0	63,8
Castilla-La Mancha	60,3	58,2	62,4
Cataluña	60,4	58,5	62,2
C. Valenciana	60,3	58,7	61,8
Extremadura	58,4	55,2	61,6
Galicia	50,9	48,8	53,1
Madrid	55,5	54,0	57,0
Murcia	58,0	56,0	60,1
Navarra	65,4	63,5	67,4
País Vasco	61,0	58,4	63,7
La Rioja	66,5	63,6	69,4
Ceuta	29,9	26,4	33,3
Melilla	35,0	31,8	38,3
Total	58,5	58,0	59,0




IC95% = intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.53.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Borracheras últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	23,8	22,2	25,4
Aragón	28,0	26,2	29,7
Asturias	22,5	20,7	24,4
Baleares	28,2	25,2	31,3
Canarias	17,7	15,6	19,7
Cantabria	23,1	21,3	25,0
Castilla y León	25,1	23,4	26,8
Castilla-La Mancha	26,5	24,5	28,4
Cataluña	28,5	26,8	30,2
C. Valenciana	25,8	24,4	27,2
Extremadura	20,7	18,0	23,3
Galicia	16,0	14,4	17,6
Madrid	22,3	21,0	23,5
Murcia	22,1	20,4	23,9
Navarra	30,3	28,5	32,2
País Vasco	26,8	24,4	29,2
La Rioja	30,4	27,5	33,2
Ceuta	7,5	5,5	9,5
Melilla	10,2	8,1	12,2
Total	24,3	23,9	24,8



## 1.2.54.

Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.


	Binge drinking últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	32,7	31,0	34,4
Aragón	38,6	36,7	40,5
Asturias	31,0	29,0	33,1
Baleares	34,2	31,0	37,4
Canarias	27,3	24,9	29,7
Cantabria	31,1	29,0	33,1
Castilla y León	33,5	31,7	35,3
Castilla-La Mancha	35,2	33,2	37,3
Cataluña	32,5	30,7	34,3
C. Valenciana	34,1	32,6	35,7
Extremadura	35,4	32,3	38,5
Galicia	23,7	21,8	25,5
Madrid	29,2	27,8	30,6
Murcia	31,5	29,6	33,4
Navarra	41,9	39,9	43,9
País Vasco	37,2	34,6	39,8
La Rioja	40,0	37,0	43,0
Ceuta	12,8	10,2	15,3
Melilla	17,4	14,8	20,1
Total	32,3	31,8	32,7



## 1.2.55.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Botellón últimos 12 meses		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	54,5	52,6	56,3
Aragón	60,0	58,1	61,9
Asturias	48,9	46,7	51,1
Baleares	52,2	48,8	55,6
Canarias	30,1	27,6	32,5
Cantabria	54,8	52,6	57,0
Castilla y León	53,6	51,7	55,6
Castilla-La Mancha	56,3	54,1	58,4
Cataluña	54,1	52,2	56,0
C. Valenciana	49,6	47,9	51,2
Extremadura	66,5	63,5	69,6
Galicia	40,5	38,3	42,6
Madrid	46,8	45,3	48,3
Murcia	53,4	51,4	55,5
Navarra	48,9	46,9	50,9
País Vasco	58,2	55,5	60,9
La Rioja	57,3	54,3	60,3
Ceuta	22,5	19,3	25,6
Melilla	29,2	26,1	32,3
Total	51,3	50,8	51,8



## 1.2.56.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Tabaco diario últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	8,6	7,6	9,6
Aragón	13,4	12,1	14,7
Asturias	9,2	8,0	10,5
Baleares	7,4	5,6	9,2
Canarias	5,1	3,9	6,3
Cantabria	9,8	8,5	11,2
Castilla y León	10,7	9,5	11,9
Castilla-La Mancha	11,9	10,5	13,3
Cataluña	11,7	10,5	12,9
C. Valenciana	9,0	8,1	10,0
Extremadura	12,2	10,1	14,3
Galicia	7,4	6,3	8,5
Madrid	10,8	9,8	11,7
Murcia	7,7	6,6	8,8
Navarra	10,1	8,9	11,3
País Vasco	12,4	10,6	14,2
La Rioja	11,3	9,4	13,2
Ceuta	5,2	3,5	6,9
Melilla	3,8	2,5	5,1
Total	9,8	9,6	10,1

TABACO DIARIO ÚLTIMOS 30 DÍAS

■ < media España

■ > media España

□ = media España




IC95% = intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.57.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.


	Cigarrillos electrónicos últimos 12 meses		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	42,2	40,4	44,1
Aragón	32,9	31,1	34,7
Asturias	32,1	30,1	34,2
Baleares	34,2	31,0	37,5
Canarias	35,0	32,5	37,6
Cantabria	28,2	26,2	30,2
Castilla y León	34,5	32,7	36,4
Castilla-La Mancha	40,0	37,8	42,1
Cataluña	38,7	36,8	40,5
C. Valenciana	37,0	35,4	38,6
Extremadura	37,5	34,4	40,7
Galicia	27,9	25,9	29,9
Madrid	41,4	39,9	42,9
Murcia	41,0	39,0	43,0
Navarra	30,4	28,6	32,3
País Vasco	31,4	28,9	33,9
La Rioja	27,7	24,9	30,4
Ceuta	29,2	25,8	32,7
Melilla	24,7	21,7	27,7
Total	37,8	37,3	38,2



## 1.2.58.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Hipnosedantes últimos 12 meses		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	12,1	10,9	13,3
Aragón	11,4	10,2	12,6
Asturias	13,8	12,3	15,3
Baleares	14,0	11,7	16,4
Canarias	11,7	10,0	13,4
Cantabria	11,2	9,8	12,6
Castilla y León	9,1	7,9	10,2
Castilla-La Mancha	11,1	9,7	12,4
Cataluña	14,0	12,6	15,3
C. Valenciana	13,5	12,4	14,6
Extremadura	13,0	10,8	15,2
Galicia	11,3	9,9	12,7
Madrid	12,9	11,9	13,9
Murcia	13,9	12,5	15,3
Navarra	11,0	9,8	12,3
País Vasco	12,1	10,3	13,9
La Rioja	11,0	9,1	12,9
Ceuta	9,4	7,2	11,6
Melilla	12,6	10,3	14,9
Total	12,5	12,2	12,9



### 1.2.59.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Cannabis últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	16,6	15,3	18,0
Aragón	18,8	17,3	20,3
Asturias	18,9	17,2	20,6
Baleares	21,9	19,1	24,7
Canarias	17,0	15,0	19,1
Cantabria	16,6	14,9	18,2
Castilla y León	17,1	15,6	18,6
Castilla-La Mancha	20,0	18,2	21,7
Cataluña	23,1	21,5	24,8
C. Valenciana	21,5	20,2	22,8
Extremadura	14,8	12,5	17,1
Galicia	15,9	14,3	17,5
Madrid	20,1	18,9	21,3
Murcia	15,5	14,0	17,0
Navarra	20,1	18,5	21,8
País Vasco	23,8	21,5	26,1
La Rioja	19,6	17,2	22,0
Ceuta	11,1	8,7	13,5
Melilla	8,4	6,5	10,3
Total	19,3	19,0	19,7

#### CANNABIS ÚLTIMOS 30 DÍAS

■ < media España

■ > media España

□ = media España



IC95% = intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.60.

Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine... por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (euros). España, 2018.

	Dinero gastado a la semana		
	Cantidad media	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	14,4	13,2	15,7
Aragón	14,9	13,6	16,3
Asturias	16,0	14,4	17,6
Baleares	19,0	16,4	21,7
Canarias	16,1	14,2	18,1
Cantabria	14,7	13,1	16,3
Castilla y León	11,8	10,6	13,1
Castilla-La Mancha	12,4	11,0	13,9
Cataluña	15,1	13,7	16,4
C. Valenciana	14,7	13,5	15,8
Extremadura	10,7	8,7	12,7
Galicia	14,3	12,8	15,8
Madrid	13,6	12,5	14,6
Murcia	13,8	12,4	15,2
Navarra	14,5	13,1	16,0
País Vasco	12,3	10,6	14,1
La Rioja	14,3	12,2	16,5
Ceuta	18,5	15,5	21,4
Melilla	17,8	15,1	20,4
Total	14,2	13,9	14,6

### DINERO GASTADO A LA SEMANA



IC95% = intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.61.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

	Legalización del cannabis		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	49,2	47,4	51,0
Aragón	53,0	51,1	55,0
Asturias	55,5	53,3	57,6
Baleares	61,5	58,2	64,8
Canarias	54,6	51,9	57,2
Cantabria	51,1	48,9	53,3
Castilla y León	49,0	47,1	51,0
Castilla-La Mancha	49,3	47,2	51,5
Cataluña	66,6	64,8	68,4
C. Valenciana	57,6	56,0	59,3
Extremadura	51,9	48,6	55,1
Galicia	47,5	45,3	49,6
Madrid	49,9	48,3	51,4
Murcia	50,9	48,8	53,0
Navarra	54,9	52,9	56,9
País Vasco	59,0	56,3	61,7
La Rioja	52,3	49,2	55,3
Ceuta	46,5	42,7	50,3
Melilla	53,5	50,1	56,9
Total	54,3	53,8	54,8

LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS

■ < media España

■ > media España

□ = media España



IC95% = intervalo de confianza del 95%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.62.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2018.

Legalización de todas las drogas			
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	29,0	27,4	30,7
Aragón	29,6	27,9	31,4
Asturias	29,0	27,0	30,9
Baleares	41,0	37,7	44,3
Canarias	32,0	29,5	34,5
Cantabria	30,9	28,9	33,0
Castilla y León	26,1	24,3	27,8
Castilla-La Mancha	27,8	25,9	29,8
Cataluña	41,4	39,5	43,2
C. Valenciana	33,7	32,1	35,2
Extremadura	35,0	31,9	38,1
Galicia	25,0	23,1	26,9
Madrid	27,2	25,8	28,5
Murcia	31,4	29,5	33,3
Navarra	32,2	30,3	34,0
País Vasco	37,8	35,2	40,4
La Rioja	27,5	24,8	30,3
Ceuta	32,3	28,8	35,9
Melilla	45,0	41,5	48,4
Total	31,9	31,4	32,4



### 1.2.63.

Evolución de la incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2018.

	2014			2016			2018		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	12,9	11,3	14,5	16,3	15,0	17,7	17,6	15,3	20,0
Alcohol	46,3	42,9	49,6	47,7	47,0	48,4	48,9	46,5	51,3
Cannabis	12,0	12,3	11,7	13,9	14,7	13,1	16,9	17,4	16,4
Cocaína en polvo	1,0	1,1	0,8	1,2	1,5	0,9	1,2	1,6	0,8
Cocaína base	1,1	1,2	1,0	0,7	0,8	0,5	0,5	0,6	0,3
Cocaína polvo y/o base	1,7	1,9	1,5	1,4	1,8	1,0	1,4	1,8	0,9

T = Total, H = Hombres, M = Mujeres.

Notas:

Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2018. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

En ESTUDES no se dispone de la desagregación poblacional de estudiantes según sexo y edad, por eso la tabla se ha calculado utilizando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.64.

Evolución de la incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos). España, 2014-2018.

	2014			2016			2018		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	137.183	60.518	76.485	184.607	87.682	96.924	205.578	89.300	116.278
Alcohol	286.034	131.070	154.587	323.876	167.430	156.445	346.595	164.982	181.613
Cannabis	146.271	72.384	73.828	169.967	88.907	81.060	222.195	109.618	112.578
Cocaína en polvo	14.313	8.157	6.166	17.660	11.045	6.615	18.813	12.422	6.391
Cocaína base	16.312	8.580	7.726	10.181	6.107	4.073	7.760	5.050	2.710
Cocaína polvo y/o base	24.671	13.820	10.889	21.472	13.684	7.788	21.816	14.153	7.664

T = Total, H = Hombres, M = Mujeres.

Notas:

Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2018. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

En ESTUDES no se dispone de la desagregación poblacional de estudiantes según sexo y edad, por eso la tabla se ha calculado utilizando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.65.


Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.66.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.67.


Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.68.


Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.69.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.70.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.71.


Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.72.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.73.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.74.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.75.


Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (nº cigarrillos). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.76.


Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.77.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.78.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y el riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.79.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018		
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.886	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	
Edad media inicio consumo (años)*	13,7	14,1	13,1	13,5	13,0	13,4	12,9	13,2	13,0	13,1	13,1	13,2	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,1	14,1	
Edad media inicio consumo diario (años)*	—	—	14,5	14,6	14,6	14,5	14,4	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,3	14,4	14,3	14,6	14,5	14,6	14,7	14,6	14,7	14,6	
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	56,0	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	54,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7	38,2	44,3	
Prevalencia (%) últimos 30 días	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0	23,9	29,3	
Prevalencia (%) consumo diario	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,4	10,3	
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº)	1-5	37,7	47,3	41,8	50,3	43,8	49,5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0	56,1	58,3	65,0	68,5	54,7	57,0	60,6	66,1	56,6	63,5	56,6	67,0
6-10	33,8	36,8	33,9	34,8	35,2	34,9	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2	28,0	30,1	23,3	23,9	32,4	32,9	30,7	26,5	32,9	28,3	30,9	25,5	
>10	28,5	15,9	24,3	14,8	20,9	15,6	20,8	15,8	21,8	17,5	22,7	20,0	15,3	9,8	15,9	11,6	11,7	7,6	12,9	10,1	8,7	7,4	10,5	8,1	12,5	7,5	
Media de cigarrillos/día	9,1	7,2	8,3	6,9	7,9	7,0	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3	5,1	5,0	5,7	4,8	6,4	6,0	5,8	5,4	6,1	5,5	6,5	5,5	

H = Hombres; M = Mujeres.

\* En fumadores actuales y exfumadores.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.80.

Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Total	36,9	14,1	49,0
Hombre	32,4	14,2	53,4
Mujer	40,4	14,1	45,5
14 años	42,1	10,8	47,1
15 años	37,4	9,9	52,7
16 años	36,2	14,7	49,1
17 años	35,9	16,9	47,2
18 años	35,9	15,4	48,7
14-17 años	37,0	14,0	49,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.81.

Evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2016-2018.

	2016			2018		
	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Total	45,6	10,2	44,2	36,9	14,1	49,0
Hombre	37,7	12,6	49,7	32,4	14,2	53,4
Mujer	52,5	8,1	39,3	40,4	14,1	45,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.82.

Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado tabaco en los últimos 30 días y entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018.

	2016			2018		
	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Han fumado tabaco en los últimos 30 días						
	45,6	10,2	44,2	36,9	14,1	49,0
Han consumido cannabis en los últimos 30 días						
	36,1	10,8	53,1	28,4	14,7	56,8

Se lee: entre los que han fumado tabaco, han usado cigarrillos de cajetilla o de liar o de los 2 tipos el X%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.83.

Evolución del porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro (%). España, 2014-2018.

	2014			2016			2018		
	Profesores	Estudiantes	Otros*	Profesores	Estudiantes	Otros	Profesores	Estudiantes	Otros
Total	54,3	73,9	58,4	42,7	65,8	35,7	43,5	64,7	36,2
Centros públicos	59,5	79,4	62,2	46,9	70,2	38,9	46,9	67,5	39,2
Centros privados	43,1	62,0	50,4	33,5	56,1	29,0	36,1	58,6	30,0

\* En 2014 no se especificaba que las otras personas fueran del centro.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.84.

Evolución del porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2016-2018.

	2016			2018		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado						
	40,2	37,7	42,5	40,6	38,3	42,5
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado						
	30,1	29,8	30,4	30,7	31,0	30,4
No se han planteado dejar de fumar						
	29,7	32,6	27,1	28,7	30,6	27,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.85.

Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fuman (%). España, 2018.

	Total de estudiantes	Estudiantes que han fumado alguna vez en la vida	Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses	Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días	Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado					
	11,9	41,2	40,6	38,8	40,0
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado					
	8,7	30,0	30,7	32,6	39,7
No se han planteado dejar de fumar					
	8,3	28,9	28,7	28,7	20,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.86.


Evolución de la prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan fumado tabaco o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.87.


Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.88.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.89.

Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tengan o no nicotina (%). España, 2016-2018.




CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.90.

Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tengan o no nicotina y según sexo (%). España, 2016-2018.



CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.91.


Evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.92.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.93.


Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.94.

Evolución de la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018.




CE = cigarrillos electrónicos. Se lee: entre los que han fumado tabaco alguna vez han consumido CE alguna vez el X%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.95.

Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018.



CE = cigarrillos electrónicos. Se lee: entre los que han consumido CE alguna vez han fumado tabaco alguna vez el X%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.96.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo (%). España, 2018.

	Total	Hombres	Mujeres
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar	4,4	5,0	3,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.97.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años que han fumado cigarrillos electrónicos, según sexo (%). España, 2018.

	Total	Hombres	Mujeres
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar entre los que fuman cigarrillos electrónicos	9,7	10,2	9,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.98.

Tipo de cartuchos de cigarrillos electrónicos utilizados, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cigarrillos electrónicos, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Cartuchos con nicotina	11,3	9,4	13,5	6,7	9,0	11,4	15,3	16,0
Cartuchos sin nicotina	67,1	71,5	62,2	77,8	71,4	66,3	59,0	58,7
De los 2 tipos	21,6	19,1	24,3	15,5	19,7	22,2	25,7	25,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.99.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2018.

	Consumo de tabaco alguna vez en la vida		Consumo de tabaco en los últimos 12 meses		Consumo de tabaco en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido CE con nicotina	32,6	3,3	35,8	4,4	40,3	6,4
No ha consumido CE con nicotina	67,4	96,7	64,2	95,6	59,7	93,6
Ha consumido CE sin nicotina	64,8	24,8	66,0	27,9	66,9	31,8
No ha consumido CE sin nicotina	35,2	75,2	34,0	72,1	33,1	68,2

CE = Cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.100.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2018.

	Consumo de cannabis alguna vez en la vida		Consumo de cannabis en los últimos 12 meses		Consumo de cannabis en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido CE alguna vez en la vida	78,5	33,5	81,2	35,7	84,4	39,7
Nunca ha consumido CE	21,5	66,5	18,8	64,3	15,6	60,3

CE = Cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.101.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2018.

	Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
	Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	Muchos/bastantes problemas	92,1
Fumar hachís/marihuana (cannabis) alguna vez (una vez al mes o menos)	Muchos/bastantes problemas	43,7
Fumar hachís/marihuana (cannabis) habitualmente	Muchos/bastantes problemas	82,4
Fumar cigarrillos electrónicos alguna vez (una vez al mes o menos)	Muchos/bastantes problemas	12,1
		24,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.102.


Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2018.

	Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
	Sí	No
Disponibilidad percibida del tabaco	Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	96,0
Disponibilidad percibida del cannabis	Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	78,5
		55,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.103.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Alguna vez en la vida	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9
Últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9
Últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5
Borracheras últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3
Binge drinking últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7	32,3
Edad media de inicio consumo	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0	14,0
Edad media de consumo semanal	-	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	14,8	14,8	15,1	15,0	15,1	15,2
Edad primera borrachera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	14,6	14,7	14,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.104.


Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.105.

Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.106.

Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido alcohol, según sexo (%). España, 2014-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.107.

Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.108.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.109.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking, borracheras y consumo de riesgo de alcohol en la población de estudiantes de 14-18 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (%). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Binge drinking últimos 30 días													
	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7
Borracheras últimos 30 días													
	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3
Borracheras últimos 12 meses													
	-	-	-	-	-	-	-	47,1	52,9	52,0	42,6	42,4	44,5
Botellón últimos 30 días													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	24,1	22,6
Botellón últimos 12 meses													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,6	52,0	51,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.110.


Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.111.

Prevalencia de consumo diario de alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.112.


Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.113.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.114.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2018.



	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Vermú/jerez/fino	1,8	0,9	1,7	1,9	2,4	2,9	1,8
Vino	7,1	3,8	6,0	6,9	10,5	10,1	6,9
Licores de frutas	7,4	4,2	6,3	9,0	8,8	9,6	7,2
Licores fuertes	14,3	7,1	11,1	16,5	19,7	21,6	13,9
Cerveza	24,2	7,5	15,7	27,6	38,8	42,1	23,1
Combinados/cubatas	29,0	12,0	20,7	35,1	41,7	43,7	28,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.115.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo y edad. España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida													
Total	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9
Sexo													
Hombre	84,3	84,3	85,5	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9	77,8	75,7	76,3
Mujer	84,0	84,1	86,4	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9	80,1	78,2	79,4
Edad													
14 años	69,6	67,6	71,5	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9	60,1	57,1	58,3
15 años	81,8	81,7	82,5	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7	73,7	75,4	72,5
16 años	88,0	88,7	89,7	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2	84,1	83,1	84,3
17 años	91,9	91,3	92,8	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8	90,6	89,9	88,5
18 años	92,5	93,4	96,2	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6	92,4	91,9	89,0
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses													
Total	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9
Sexo													
Hombre	82,8	82,3	83,0	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3	74,3	74,1
Mujer	82,7	82,5	84,5	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2	76,9	77,5
Edad													
14 años	67,7	64,3	67,9	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1	57,4	55,3	56,1
15 años	80,4	79,7	80,5	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3	71,2	73,9	70,2
16 años	86,7	87,4	88,0	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2	82,2	82,1	82,5
17 años	90,7	89,9	90,9	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2	88,7	88,7	86,7
18 años	91,1	92,4	94,1	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3	90,7	90,6	86,9
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días													
Total 75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	
Sexo													
Hombre	75,3	66,8	67,5	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9	65,9	57,2
Mujer	74,9	66,7	68,5	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5	68,1	59,8
Edad													
14 años	56,7	40,1	43,2	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2	48,4	46,1	36,0
15 años	71,8	60,1	62,2	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0	61,3	64,6	49,9
16 años	80,0	74,1	73,4	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6	74,0	73,1	65,3
17 años	85,1	79,4	81,1	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4	80,8	81,2	72,9
18 años	86,2	84,1	85,0	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4	84,8	84,5	74,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.116.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Combinados																					
o cubatas	29,0	28,6	29,4	12,0	11,2	12,8	20,7	20,1	21,3	35,1	35,0	35,2	41,7	41,9	41,5	28,1	27,8	28,4	43,7	41,7	46,0
Cerveza/ sidra	24,2	26,1	22,3	7,5	8,5	6,5	15,7	17,4	14,0	27,6	30,0	25,1	38,8	40,7	37,0	23,1	24,8	21,3	42,1	45,0	38,8
Licores fuertes	14,3	14,6	14,1	7,1	6,8	7,4	11,1	10,8	11,4	16,5	15,8	17,1	19,7	21,7	17,6	13,9	14,1	13,7	21,6	22,4	20,6
Licores de frutas	7,4	7,7	7,0	4,2	4,5	4,0	6,3	6,4	6,1	9,0	9,2	8,9	8,8	9,7	7,8	7,2	7,6	6,8	9,6	9,7	9,5
Vino/champán	7,1	7,2	7,1	3,8	3,7	3,9	6,0	5,9	6,0	6,9	7,5	6,4	10,5	10,3	10,7	6,9	7,0	6,9	10,1	9,4	10,8
Cualquier bebida																					
alcohólica	7,1	7,2	7,1	3,8	3,7	3,9	6,0	5,9	6,0	6,9	7,5	6,4	10,5	10,3	10,7	6,9	7,0	6,9	10,1	9,4	10,8
Vermú/jerez/fino	1,8	2,2	1,4	0,9	1,2	0,6	1,7	2,3	1,0	1,9	2,3	1,5	2,4	2,7	2,1	1,8	2,2	1,3	2,9	3,2	2,6

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.117.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	
Últimos 12 meses														
Hombres	82,8	82,3	83,0	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3	74,3	74,1	
Mujeres	82,7	82,5	84,5	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2	76,9	77,5	
Últimos 30 días														
Hombres	75,3	66,8	67,5	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9	65,9	57,2	
Mujeres	74,9	66,7	68,5	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5	68,1	59,8	

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.118

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2018.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521
Edad media de inicio del consumo (años)	13,1	13,8	13,5	14,0	13,5	14,0	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8	13,6	13,8	13,7	13,7	13,8	13,9	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	-	-	15,0	15,0	15,0	15,1	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	15,1	15,0	15,1	14,9	15,1	15,1	15,2	15,2
Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2	76,3	79,4
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9	74,1	77,5
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1	57,2	59,8

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.119.

Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.


	14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	58,3	56,1	60,4	72,5	70,4	74,6	84,3	83,2	85,4	88,5	87,1	89,8	89,0	88,4	89,7	77,2	75,5	78,8
Últimos 12 meses	56,1	53,5	58,5	70,2	67,7	72,6	82,5	81,3	83,5	86,7	85,4	88,0	86,9	86,0	88,0	75,2	73,3	76,9
Últimos 30 días	36,0	34,5	37,5	49,9	48,5	51,3	65,3	63,9	66,6	72,9	71,6	74,0	74,7	74,0	75,5	57,5	56,0	58,9
Diario en los últimos 30 días	0,4	0,6	0,2	0,7	0,8	0,5	1,1	1,2	1,0	1,6	2,2	1,1	1,1	1,4	0,7	1,0	1,3	0,7
Nunca	41,7	43,9	39,6	27,5	29,6	25,4	15,7	16,8	14,6	11,5	12,9	10,2	11,0	11,6	10,3	22,8	24,5	21,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.120.


Evolución de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.121.

Prevalencia de borracheras, binge drinking y botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años, según sexo (%). España, 2018.




	Total	Hombre	Mujer
Borracheras en los últimos 30 días	23,5	22,7	24,3
Botellón en los últimos 30 días	21,9	21,3	22,5
Binge drinking en los últimos 30 días	31,3	31,1	31,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.122.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según se hayan embrorrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.123.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2018.

	Alguna vez en la vida						Últimos 12 meses						Últimos 30 días					
	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Total	56,2	58,8	60,7	50,1	48,9	51,1	47,1	52,9	52,0	42,6	42,4	44,5	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3
Sexo																		
Hombres	54,8	58,0	59,9	48,7	46,4	48,5	46,5	52,2	51,7	41,5	40,1	42,3	29,4	36,4	31,3	22,3	21,2	23,7
Mujeres	57,5	59,5	61,5	51,4	51,4	53,4	47,7	53,5	52,3	43,7	44,8	46,5	28,7	34,8	30,3	22,1	22,3	25,0
Edad																		
14 años	30,4	27,8	31,5	23,2	23,1	25,8	24,5	24,6	26,1	19,0	18,8	22,2	13,4	16,0	12,7	7,6	7,9	9,7
15 años	48,5	52,2	47,4	39,8	42,4	40,9	41,0	47,3	40,2	33,6	36,1	35,6	24,2	32,0	21,3	14,9	15,8	17,5
16 años	62,2	66,2	62,3	56,5	55,9	57,4	53,0	59,8	53,4	48,8	49,3	50,6	31,7	38,8	30,9	26,4	25,6	27,7
17 años	72,6	76,8	73,1	69,1	69,7	68,6	59,7	69,1	62,6	59,0	61,5	59,9	39,0	46,6	38,8	33,1	33,9	35,6
18 años	76,9	77,8	80,4	74,1	74,7	70,9	65,8	69,8	70,5	63,4	65,4	60,3	45,2	52,8	46,5	37,5	40,4	37,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.124.

Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2018.


	2016		2018	
	Más de una vez al mes*	Menos frecuentemente	Más de una vez al mes*	Menos frecuentemente
Total	8,7	91,3	10,0	90,0
Sexo				
Hombres	9,6	90,4	10,4	89,6
Mujeres	7,9	92,1	9,7	90,3
Edad				
14 años	1,3	98,7	2,4	97,6
15 años	5,1	94,9	5,4	94,6
16 años	9,7	90,3	11,3	88,7
17 años	16,4	83,6	16,8	83,2
18 años	20,6	79,4	20,0	80,0

\* Se ha emborrachado 10 días o más al año.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.125.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.126.

Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en el último mes, según edad y sexo (%). España 2014-2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Binge drinking 2014	47,3	50,1	44,7	29,4	29,6	29,3	40,3	41,4	39,3	50,3	52,1	48,7	54,9	58,7	51,0	59,8	64,3	54,3
Binge drinking 2016	47,6	49,3	45,9	30,6	30,2	31,0	41,2	41,1	41,3	49,4	51,6	47,3	55,6	59,0	52,3	67,2	69,3	64,8
Binge drinking 2018	55,5	56,7	54,3	42,3	38,0	46,0	50,9	49,4	52,4	56,4	59,8	53,4	60,6	63,6	58,0	63,5	64,6	62,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.127.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España 2014-2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Borracheras 2014	56,0	55,8	56,3	33,6	29,6	36,9	47,8	46,9	48,6	59,8	58,5	61,1	66,8	67,4	66,2	70,1	71,9	67,9
Borracheras 2016	57,0	55,0	58,9	34,9	29,4	40,2	49,8	47,4	52,1	60,8	59,3	62,1	69,8	69,1	70,5	72,7	72,3	73,2
Borracheras 2018	59,3	58,0	60,5	40,3	34,7	45,1	51,5	48,5	54,1	62,0	61,2	62,8	69,5	70,5	68,6	69,8	69,3	70,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.128.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España 2014-2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Borracheras 2014	33,1	34,1	32,3	16,2	13,8	18,1	24,8	24,7	24,9	36,2	36,5	36,0	41,3	42,9	39,8	44,6	47,3	41,5
Borracheras 2016	33,4	33,2	33,5	17,8	15,5	20,1	25,3	23,8	26,8	35,8	35,6	35,9	42,3	44,3	40,4	48,4	48,0	48,7
Borracheras 2018	42,6	42,6	42,6	28,1	23,1	32,4	35,9	34,0	37,7	43,4	44,3	42,6	49,6	51,3	48,1	51,0	52,7	49,1

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.129.

Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.

	HOMBRES						MUJERES					
	14	15	16	17	14-17	18	14	15	16	17	14-17	18
Borracheras alguna vez en la vida	21,6	37,3	55,8	67,4	47,1	69,1	29,9	44,5	58,8	69,7	52,3	72,9
Borracheras últimos 12 meses	18,1	32,2	49,1	59,7	41,2	59,2	25,9	38,9	52,0	60,0	45,6	61,6
Borracheras últimos 30 días	7,6	15,9	27,5	36,1	22,7	38,4	11,7	18,9	27,9	35,1	24,3	36,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.130.

Prevalencia de botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.131.

Evolución de la prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2018.

	2016		2018	
	Botellón últimos 12 meses	Botellón últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Botellón últimos 30 días
Total	52,0	24,1	51,3	22,6
Sexo				
Hombre	50,3	23,3	48,6	22,1
Mujer	53,8	25,0	53,8	23,0
Edad				
14 años	28,0	9,7	28,4	9,8
15 años	47,7	20,5	44,1	16,9
16 años	61,1	27,9	59,2	26,9
17 años	68,9	35,7	64,2	30,8
18 años	68,1	39,1	64,1	32,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.132.

Prevalencia de borracheras y de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho o no botellón en los últimos 30 días y según sexo (%). España, 2018.

	TOTAL		HOMBRE		MUJER	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?					
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Borracheras últimos 30 días	60,3	14,1	61,1	13,3	59,5	14,8
Binge drinking últimos 30 días	72,8	20,4	74,3	20,2	71,5	20,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.133.

Prevalencia de borracheras (intoxicaciones etílicas agudas) en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2018.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		14-17 años		18 años	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?													
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	60,3	14,1	51,3	5,4	53,1	10,4	60,0	16,0	64,9	22,5	59,7	13,5	66,4	24,1
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	72,8	20,4	64,1	9,7	70,4	16,0	72,1	23,6	76,1	29,6	72,5	19,7	76,1	33,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.134.

Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2018.

	TOTAL		HOMBRE		MUJER	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?					
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Tabaco últimos 12 meses	55,7	13,2	52,0	11,8	58,8	14,6
Hipnosedantes últimos 12 meses	15,4	9,5	12,0	7,7	18,3	11,3
Cannabis últimos 12 meses	45,6	8,4	49,6	9,7	42,1	7,0
Cocaína últimos 12 meses	4,0	0,8	5,6	1,0	2,6	0,5
Éxtasis últimos 12 meses	3,3	0,4	4,4	0,6	2,4	0,2
Anfetaminas últimos 12 meses	1,9	0,3	2,7	0,4	1,3	0,2
Alucinógenos últimos 12 meses	2,3	0,4	3,4	0,7	1,4	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.135.


Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2018.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		14-17 años		18 años	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?													
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Tabaco	55,7	13,2	52,5	8,6	53,2	11,8	56,2	15,0	56,9	18,5	55,3	12,9	60,2	19,0
Hipnosedantes	15,4	9,5	13,1	7,4	13,4	8,8	14,6	10,6	17,2	11,4	15,1	9,3	19,8	12,5
Cannabis	45,6	8,4	34,1	3,5	40,9	6,7	45,3	10,6	51,2	13,9	45,1	8,0	51,9	15,6
Cocaína	4,0	0,8	3,2	0,3	3,9	0,4	3,5	1,2	4,2	1,4	3,8	0,7	6,7	1,5
Éxtasis	3,3	0,4	2,1	0,2	3,3	0,3	3,2	0,5	3,6	0,7	3,2	0,4	4,4	0,9
Anfetaminas	1,9	0,3	1,1	0,2	1,8	0,1	1,8	0,5	2,2	0,4	1,9	0,3	2,8	0,5
Alucinógenos	2,3	0,4	1,8	0,3	2,6	0,3	2,5	0,5	2,0	0,5	2,3	0,4	2,9	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.136.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018.



	Total	Hombre	Mujer
Supermercados	54,0	54,0	53,9
Bares o pubs	54,0	52,8	55,1
Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas	49,9	51,8	48,2
Discotecas	43,6	42,2	44,7
Casa de otras personas	30,4	29,4	31,2
Hipermercados	21,9	24,8	19,4
Casa donde vives	22,0	23,6	20,6
Venta ambulante	4,4	5,8	3,1
Internet o venta telefónica	1,2	1,8	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.137.


Evolución de los lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018.

	2016			2018		
	Total	14-17 años	18 años	Total	14-17 años	18 años
Supermercados	58,0	56,2	73,7	54,0	52,4	71,4
Bares o pubs	54,1	52,2	70,5	54,0	52,5	70,4
Tiendas de barrio, chinos, quioscos, bodegas	53,9	55,1	43,3	49,9	50,8	39,0
Discotecas	43,1	40,6	65,6	43,6	42,0	61,0
Casa de otras personas	29,1	29,4	26,3	30,4	30,6	28,4
Hipermercados	27,2	25,5	41,9	21,9	21,0	32,6
Casa donde vives	20,4	19,7	26,6	22,0	21,4	28,2
Venta ambulante	5,3	5,5	4,0	4,4	4,4	3,4
Internet	1,1	1,1	0,8	1,2	1,2	1,3
Espacios públicos abiertos (calles, plazas, parques, playas...)	-	-	-	-	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.138.

Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018.




	Total	Hombre	Mujer
Tú directamente	31,4	32,2	30,6
A través de otras personas de 18 años o mayores	26,4	21,4	31,1
A través de otras personas menores de 18 años	8,1	7,1	9,1
De otra forma	3,7	4,0	3,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.139.

Evolución de los modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.140.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2018.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tú directamente	31,4	32,2	30,6	11,9	10,5	13,1	21,5	21,5	21,6	34,6	35,9	33,3	44,1	46,9	41,6	29,2	29,9	28,5	65,9	65,8	66
A través de otras personas de 18 años o mayores	26,4	21,4	31,1	14,6	12	17,1	21,2	17,1	25,3	31,9	25,4	38	38	31,8	43,7	27,3	22,2	32,2	11,7	9,9	13,7
A través de otras personas menores de 18 años	8,1	7,1	9,1	7	5,6	8,4	9,7	7,8	11,5	10	9,3	10,6	7	6,6	7,3	8,5	7,5	9,5	2,1	2,3	1,9
De otra forma	3,7	4	3,4	3,5	3,7	3,2	3,7	4	3,4	3,9	4,6	3,3	3,9	4	3,9	3,8	4,1	3,5	1,9	1,9	1,9

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.141.


Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.142.

Evolución de los modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.143.


Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.144.

Evolución de los lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.145.

Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2018.

	Comprado/Conseguido			Consumido		
	Total	14-17 años	18 años	Total	14-17 años	18 años
Bares o pubs	54,0	52,5	70,4	54,8	53,2	73,4
Supermercados	54,0	52,4	71,4	-	-	-
Tiendas de barrio, chinos, quioscos, bodegas	49,9	50,8	39,0	-	-	-
Discotecas	43,6	42,0	61,0	47,8	46,4	63,6
Casa de otras personas	30,4	30,6	28,4	43,5	43,6	41,9
Casa donde vives	22,0	21,4	28,2	24,8	23,9	34,6
Hipermercados	21,9	21,0	32,6	-	-	-
Venta ambulante	4,4	4,4	3,4	-	-	-
Internet	1,2	1,2	1,3	-	-	-
Espacios públicos abiertos (calles, plazas, parques, playas...)	-	-	-	50,9	51,6	43,1

Nota: Estos datos se calculan sobre los que contestan la pregunta

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.146.

Prevalencia de consumo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias según el consumo de alcohol que hayan realizado sus padres (%) España, 2018.

	Alcohol alguna vez en la vida	Alcohol últimos 12 meses	Borracheras últimos 12 meses	Botellón últimos 12 meses	Binge últimos 30 días
<b>Padre</b>					
No ha bebido ningún día	74,1	72,0	42,3	48,9	29,3
Ha bebido algún día aislado	80,6	78,6	47,3	54,4	34,1
Ha bebido sólo los fines de semana	81,2	79,3	45,8	55,0	35,0
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	80,9	79,0	49,1	55,2	35,3
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	92,1	90,4	59,6	61,2	55,7
<b>Madre</b>					
No ha bebido ningún día	71,6	69,4	39,6	46,2	27,2
Ha bebido algún día aislado	79,3	77,5	46,8	53,6	33,9
Ha bebido sólo los fines de semana	81,3	79,5	46,3	55,8	35,2
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	81,1	78,7	48,0	53,9	33,6
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	88,2	86,1	56,7	65,4	47,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.147.

Motivos principales por los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años beben alcohol, según sexo (%). España, 2018.

	Total		Hombre		Mujer	
	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Es saludable	96,6	3,4	94,7	5,3	98,2	1,8
Para encajar en un grupo o para no sentirte excluido	93,3	6,7	92,4	7,6	94,0	6,0
Para emborracharte	89,4	10,6	89,0	11,0	89,8	10,2
Para desinhibirte o ligar más	80,5	19,5	77,2	22,8	83,2	16,8
Te ayuda cuando te sientes deprimido	75,7	24,3	79,8	20,2	72,4	27,6
Te gusta cómo te sientes	61,5	38,5	60,9	39,1	62,0	38,0
Es divertido o anima las fiestas	30,4	69,6	31,2	68,8	29,6	70,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.148.

Prevalencia de borracheras, binge drinking, botellón y consumo de alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según los motivos por los que beben alcohol (%). España, 2018.

	Alcohol	Borracheras	Binge drinking	Botellón
Es saludable	3,7	3,7	4,2	4,3
Para encajar en un grupo	6,5	6,1	6,3	6,5
Para emborracharte	11,6	17,4	14,6	15,9
Para ligar más	21,5	27,7	24,7	25,4
Te ayuda cuando estás deprimido	26,3	32,1	30,6	32,3
Te gusta cómo te sientes	42,1	54,9	48,5	49,2
Por diversión	73,4	86,4	80,1	82,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.149.


Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.150.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.151.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2018.



T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.152.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014-2018.



T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.153.

Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido bebidas energéticas o bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2018.

	Éxtasis	Cocaína**	Hipnosedantes*	Cannabis	Tabaco	Alcohol
Ha consumido bebidas energéticas	1,3	1,8	8,3	31,3	40,0	74,4
Ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol	2,7	3,4	10,9	47,7	58,4	100,0
Total estudiantes 14-18 años	0,7	0,9	6,4	19,4	26,7	58,5


\* Con o sin receta.

\*\* Polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.154.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Alguna vez en la vida	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9	18,4
Últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6	12,5
Últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9	6,4
Diariamente	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	2,7	3,0
Edad media inicio consumo	-	-	-	-	-	-	13,8	14,0	13,8	14,3	13,9	13,7	14,0

\* En 2016 se cambió la manera de preguntar el consumo de hipnosedantes.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.155

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.




H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.156.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.157.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	18,4	15,1	21,5	13,8	11,5	16,1	16,6	14,7	18,5	18,8	15,6	21,8	21,3	16,4	25,8	17,9	14,7	20,9	25,8	19,9	32,3
Último año	12,5	9,8	15,1	9,0	7,4	10,6	10,8	9,3	12,3	13,0	10,4	15,4	15,2	10,7	19,3	12,2	9,6	14,7	17,2	12,5	22,4
Último mes	6,4	5,1	7,7	4,7	4,0	5,3	5,9	5,1	6,7	6,4	5,3	7,5	7,6	5,3	9,6	6,3	5,0	7,4	9,5	6,8	12,6

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.158.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0	8,6
Últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	6,1
Últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6	2,9
Edad media inicio consumo	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,4	14,3	14,2	14,6	14,2	14,0	14,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.159.

Evolución de la prevalencia del consumo de hipnosedantes sin receta médica alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.




\* En 2016 se cambió la manera de preguntar el consumo de hipnosedantes.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.160.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	3,3	4,3	5,1	5,3	6,7
Mujeres	5,2	6,1	7,1	9,9	10,8
Total	4,3	5,2	6,1	7,7	8,7

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.161.

Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	8,6	6,8	10,3	6,0	4,7	7,2	8,0	6,4	9,5	8,5	7,2	9,7	10,4	7,6	13,1	12,1	9,1	15,5	8,4	6,6	10,0
Último año	6,1	4,7	7,4	4,3	3,3	5,2	5,2	4,3	6,1	6,1	5,1	7,1	7,7	5,3	9,9	8,7	6,7	10,8	5,9	4,6	7,2
Último mes	2,9	2,2	3,5	2,2	1,9	2,4	2,5	2,0	2,9	2,9	2,3	3,4	3,6	2,6	4,6	4,3	2,6	6,2	2,8	2,2	3,4
Diariamente	1,2	1,0	1,3	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7	1,3	1,2	1,3	1,5	1,0	1,9	1,7	1,1	2,3	1,1	1,0	1,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.162.

Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2018.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)																										
	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8	13,8	14,5	13,5	14,2	14,1	14,3
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida																										
	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8	6,8	10,3
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses																										
	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7	4,7	7,4
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días																										
	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3	2,2	3,5

H = Hombres; M = Mujeres. Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.163.

Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	
	Encuestados (nº)	21.094	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369	38.010
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	14,6	14,2	14,0	14,0	
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0	8,6	
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	6,1	
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3	3,4	3,0	2,6	2,9	

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.164.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) y edad media de inicio del consumo (años). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.165.


Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.166.


Evolución de la prevalencia del consumo de cannabis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.167.


Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.168.


Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.169.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.170.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.171.

Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521
Edad media de inicio de consumo (años)																										
	15,1	15,2	15,1	15,2	14,9	15,1	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8	14,8	15,0	14,8	14,9	14,8	14,9	14,9	15,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida																										
	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9	34,5	31,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses																										
	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	26,8	23,3	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4	29,2	25,9
Prevalencia (%) últimos 30 días																										
	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	18,6	14,6	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9	21,5	17,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																										
Nunca	84,9	90,2	81,6	86,8	79,7	85,5	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0	74,7	82,5	80,3	84,7	81,1	86,7	83,1	87,9	84,2	88,2	82,3	86,6
1 a 2 días	6,9	5,1	7,3	7,2	8,4	7,4	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4	7,9	7,1	6,9	6,8	7,1	6,2	6,5	6,0	5,7	5,5	7,0	6,5
3 a 5 días	3,0	2,1	4,1	2,7	3,8	3,0	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8	5,0	4,6	3,9	3,7	3,9	3,0	3,9	2,8	3,6	2,7	3,8	3,1
6 a 9 días	2,1	1,4	2,9	1,3	3,2	1,9	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8	2,6	1,8	2,2	1,4	2,1	1,3	2,0	1,1	1,8	1,3	1,5	1,2
10 a 19 días	1,5	0,6	2,0	1,0	2,1	1,3	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8	3,6	2,0	2,5	1,6	2,0	1,3	1,9	1,2	1,9	1,1	2,1	1,2
20 a 29 días	1,5	0,6	2,2	0,9	2,8	1,0	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2	4,5	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3	3,3	1,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.172.

Número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (número de porros). España, 2016-2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2016	3,4	3,8	3,0	3,5	3,8	3,3	3,6	4,0	3,1	3,4	3,7	3,0	3,4	3,7	2,9	3,4	3,8	3,0	3,3	3,8	2,7
2018	3,4	3,8	2,9	3,1	3,8	2,5	3,5	4,1	2,7	3,6	4,1	3,0	3,5	3,6	3,2	3,5	3,9	3,0	2,9	3,2	2,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.173.


Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido una cantidad media de porros al día por término medio en los últimos 30 días y número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (% y número de porros). España, 2016-2018.

	2016			2018		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
De 1 a 2 porros	58,0	54,2	63,0	62,6	57,1	69,2
De 3 a 4 porros	21,2	21,7	20,6	18,7	20,1	17,1
> 5 porros	20,8	24,2	16,4	18,7	22,8	13,7
Número medio de porros	3,4	3,8	3,0	3,4	3,8	2,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.174.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días (%). España, 2016-2018.



	Total población	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)
2016	8,8	1,0	29,7	35,4	67,4
2018	9,8	1,4	30,3	35,2	66,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.175.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2016-2018.

	2016	2018	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tipo de consumo de cannabis									
Principalmente marihuana (herba)	51,1	43,8	39,7	48,7	46,2	46,3	42,8	42,6	44,1
Principalmente hachís (resina, chocolate)	12,2	19,3	19,7	18,7	17,3	16,0	20,5	20,6	18,7
De los 2 tipos	36,7	37,0	40,6	32,6	36,6	37,7	36,7	36,8	37,2
Mezcla de cannabis con tabaco									
Sí	82,4	87,1	85,4	89,2	78,5	86,6	88,0	88,6	87,7
No	17,6	12,9	14,6	10,8	21,5	13,4	12,0	11,4	12,3
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis									
	3,4	3,4	3,8	2,9	3,1	3,5	3,6	3,5	2,9

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.176.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2016-2018.

	2016	2018	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
En forma de porro o canuto	97,7	98,9	99,1	98,6	99,2	99,0	98,8	98,7	98,9
Usando pipas de agua, bongs, cachimbas, shishas	17,0	11,9	15,1	8,1	14,4	13,0	11,5	11,3	10,6
Por vía oral: pasteles, galletas...	5,7	2,0	2,5	1,4	3,1	2,6	2,1	1,5	1,1
Usando cigarrillos electrónicos	1,8	5,4	5,8	4,9	6,0	6,1	4,8	4,9	6,7

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.177.

Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco (%). España, 2002-2018.




Nota: Se debe clasificar a cada una de las personas que han iniciado el consumo de tabaco y cannabis, en función de que: hayan iniciado primero el cannabis (edad más temprana); hayan iniciado primero el tabaco (edad más tardía); hayan iniciado con la misma edad las dos sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.178.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal. España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.179.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal entre los estudiantes de 14 a 18 años que no lo han probado nunca. España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.180.


Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal, entre los estudiantes de 14 a 18 años que no lo han probado nunca, según sexo (%). España 2016-2018.

Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?		
	Sí	NO
2016		
Total	12,5	87,5
2018		
Total	15,4	84,6
Hombres	15,8	84,2
Mujeres	15,2	84,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.181.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal en función de si han consumido tabaco alguna vez en la vida o no (%). España, 2018.



% de columna. Eliminando los que ya la han probado

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.182.


Evolución del % de THC (tetrahidrocannabinol) presente en cannabis según el tipo de presentación analizada; THC contenido en la resina de cannabis y THC contenido en la hierba de cannabis o marihuana. España, 2002-2018.



FUENTE: CITCO.

### 1.2.183.

Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los estudiantes que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%).  
España, 2006-2018.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Puntuación CAST 0-1	66,0	67,1	64,8	65,2	69,5	69,5	65,4
Puntuación CAST 2-3	20,7	18,6	19,9	18,7	16,7	17,2	19,2
Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático)	13,3	14,3	15,3	16,1	13,8	13,3	15,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.184.

Categorización de resultados de la escala CAST entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y edad (%). España, 2018.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.185.

Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado la escala CAST del cuestionario ESTUDES en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2018.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

\* Punto de corte utilizado por algunos investigadores como por ejemplo en la encuesta ESPAD.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.186.

Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST  $\geq 4$ ) entre los que han contestado la escala CAST del cuestionario ESTUDES y han consumido cannabis en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2018.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.187.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST  $\geq 4$ ) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2006-2018.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.188.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST  $\geq 4$ ) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad (%). España, 2012-2018.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.189.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST, $\geq 4$ ), según sexo y edad (%). España, 2016-2018.

	2016	2018	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
En forma de porro o canuto	93,8	92,2	92,3	91,9	96,5	90,3	88,9	95,1	92,4
Usando pipas de agua, bongs, cachimbas, shishas	25,4	21,2	26,2	13,0	28,3	24,1	18,4	22,0	17,8
Por vía oral: pasteles, galletas...	9,5	3,5	4,3	2,1	8,9	5,4	2,5	3,0	2,2
Usando cigarrillos electrónicos	4,1	8,8	9,8	7,2	10,7	10,7	8,4	6,9	12,4


H = Hombres; M = Mujeres.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.190.

Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses y número de drogas consumidas entre la población de estudiantes de 14 a 18 años y entre los consumidores problemáticos de cannabis (CAST  $\geq 4$ ) (%). España, 2018.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.191.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2018.

	Total población 14-18 años	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq 4$ )
Alcohol	75,9	65,6	98,1	98,2	98,8
Tabaco	35,0	14,7	82,5	85,4	94,6
Hipnosedantes*	12,5	9,4	19,8	21,1	32,1
Hipnosedantes**	6,1	4,2	10,8	11,9	21,8
Analgésicos opioides	1,5	0,2	4,7	5,9	15,4
Inhalables volátiles	1,0	0,3	2,9	3,7	8,6
Otras drogas ilegales***	4,3	0,7	13,3	16,8	39,1
Nuevas sustancias	1,7	0,3	5,5	7,0	17,8

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

\*\*\* Otras drogas ilegales: Cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.192.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST  $\geq 4$ ), según sexo y edad (%). España, 2016-2018.

	2016	2018	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tipo de consumo de cannabis									
Principalmente marihuana (herba)	30,7	23,2	21,4	26,1	29,4	22,6	21,3	25,5	18,2
Principalmente hachís (resina, chocolate)	11,2	19,7	20,0	19,1	13,7	19,4	17,6	22,1	20,5
De los 2 tipos	52,9	57,1	58,6	54,8	56,9	58,0	61,1	52,4	61,3
Mezcla de cannabis con tabaco									
Sí	90,6	87,1	86,6	88,0	86,8	86,2	84,6	88,4	92,0
No	9,4	12,9	13,4	12,0	13,2	13,8	15,4	11,6	8,0
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis									
	5,4	5,8	6,1	5,4	4,5	5,9	6,3	6,1	3,9

H = Hombres; M = Mujeres.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.193.

Porcentaje y estimación de consumidores problemáticos de cannabis (según escala CAST) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2018.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Población de estudiantes de 14 a 18 años (en miles)							
con puntuación CAST $\geq 4$ (consumo problemático)	52.468	55.025	78.572	65.239	37.238	43.844	55.387
Porcentaje entre la totalidad							
de individuos estudiantes de 14 a 18 años	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5	2,8	3,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.194.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2018.

	Total alumnos	Consumidores de cannabis (CAST<4)	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq 4$ )	Han consumido cannabis en los últimos 12 meses
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días				
Sí	9,8	25,6	66,5	30,3
No	90,2	74,4	33,5	69,7

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.195.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.196.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.197.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España 1994-2018.



H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.198.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.199.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo de cocaína en polvo habitual y de la disponibilidad de cocaína en polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.200.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.201.

Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521
Edad media inicio consumo (años)	15,7	15,5	15,9	15,9	15,9	15,7	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	14,7	15,0	15,5	15,5	14,9	15,1	15,1	15,0	15,2	15,3
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2	3,9	1,9
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6	3,2	1,7
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5	1,3	0,6

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.202.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2018.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Alguna vez en la vida	5,1	4,3	3,2	2,9	2,3	2,6	2,6
Últimos 12 meses	3,6	3,1	2,0	2,0	1,8	2,1	2,1
Últimos 30 días	2,0	1,6	1,2	1,1	1,2	0,8	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.203.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.204.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.205.


Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.206.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.207.

Prevalencia del consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.208.

Prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.209.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.210.

Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Número de encuestados													
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	14.951
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,6	15,7	15,5	15,5	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,5
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.211.


Evolución de la prevalencia de anfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.212.


Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.213.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.214.

Prevalencia del consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.215.


Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.216.

Prevalencia del consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.217.

Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521
Edad media de inicio de consumo (años)	15,5	15,4	15,7	15,7	15,7	15,5	15,7	15,3	15,6	15,5	15,8	15,6	15,6	15,5	15,4	15,5	15,6	15,6	15,2	15,1	15,4	15,1	15,0	15,4	15,4	
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,6	2,8	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2	2,0	1,1
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,0	1,9	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,5	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,7	0,7	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.218.

Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2010-2018.




	2010	2012	2014	2016	2018
Alguna vez en la vida	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6
Últimos 12 meses	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2
Últimos 30 días	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5
Edad media de inicio en el consumo	-	-	-	15,1	15,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.219.


Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.220.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,7	1,5	1,8	1,9	2,9
Mujeres	0,5	0,9	0,5	1,5	0,7
Total	0,6	1,2	1,1	1,7	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.221.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.222.


Prevalencia del consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.223.


Evolución de la prevalencia de alucinógenos (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.224.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	2,7	2,0	0,7
Mujer	1,2	0,8	0,3
Total	1,9	1,4	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.225.


Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.226.

Prevalencia del consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.227.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.228.

Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	
Edad media de inicio de consumo (años)														
	15,4	15,4	15,6	15,6	15,5	15,4	15,6	15,3	15,6	15,4	15,8	15,7	15,5	15,5
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7
Prevalencia (%) últimos 12 meses	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	1,7	0,7

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.229.

Evolución del consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.230.


Prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.231.

Prevalencia de consumo de setas mágicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.232.

Prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.233.


Evolución de la prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.234.


Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.235.


Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.236.


Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.237.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.238.

Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598
Edad media de inicio de consumo (años)	14,4	14,1	14,6	15,1	14,0	15,1	15,5	15,1	14,9	14,8	14,2	15,0	14,5
Prevalencia(%) alguna vez en la vida	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2
Prevalencia (%) últimos 30 días	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.239.


Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.240.


Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.241.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.242.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.243.

Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521
Edad media de inicio de consumo (años)	13,8	12,4	13,9	13,3	13,7	13,0	14,0	13,7	14,3	14,2	13,9	14,1	13,8	13,4	13,6	14,2	13,1	13,2	13,8	12,6	13,9	14,0	13,9	13,7	14,7	14,3
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,2	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9	1,9	1,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,7	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,8
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.244.

Evolución de la prevalencia de consumo de GHB (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2018.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Alguna vez en la vida	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6
Últimos 12 meses	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4
Últimos 30 días	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2
Edad media inicio consumo	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2	14,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.245.


Prevalencia de consumo de GHB entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.246.


Prevalencia de consumo de GHB en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.247.

Prevalencia de consumo de GHB entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.248.


Evolución de la prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes (%) y edad media de inicio (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2012-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.249.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.250.


Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.251.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.252.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2016-2018.

	2016			2018*		
	Total	H	M	Total	H	M
Nº casos	9.476	5.178	4.298	2.530	1.284	1.246
Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio	27,2	29,5	24,9	7,0	7,1	6,8

\* En 2018 ha habido un cambio de pregunta y se les ha pedido que no incluyan: refrescos de cola, café, té, complejos vitamínicos, bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...), productos que contienen: Ginkgo Biloba, Guaraná, Ácidos grasos Omega 3, Jalea real, Acetil L-carnitina (ALC), fosfatidilserina...).

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.253.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.


Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
7,0	7,1	6,8	5,1	4,8	5,3	6,7	6,7	6,7	7,1	8,2	6,0	7,9	7,9	7,9	9,6	8,4	11,0	6,8	7,1	6,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.254.


Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido estas sustancias alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.255.

Modo de obtención de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 que han consumido sustancias estimulantes (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.256.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales\*, borracheras, tabaco y consumo problemático de cannabis en los últimos 12 meses y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida y entre el total de los estudiantes de 14 a 18 años (%). España, 2018.

	Total estudiantes 14-18 años	Estudiantes que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio
Sustancias psicoactivas legales últimos 12 meses	78,6	93,9
Borracheras últimos 12 meses	44,5	66,6
Binge drinking últimos 30 días	32,3	56,1
Tabaco últimos 12 meses	35,0	62,8
Sustancias psicoactivas ilegales últimos 12 meses	3,4	65,2
Consumo problemático cannabis (CAST≥4)	3,4	14,3


\* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes.

\* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.257.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2018.



	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	2,2	1,0	2,1	2,5	2,8	3,2
Últimos 12 meses	1,5	0,7	1,6	1,7	1,6	1,9
Últimos 30 días	0,5	0,3	0,6	0,4	0,5	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.258.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	2,2	3,0	1,5	1,0	1,3	0,7	2,1	2,8	1,5	2,5	3,6	1,5	2,8	3,7	2,0	2,2	2,9	1,5	3,2	4,1	2,3
Último año	1,5	2,2	0,8	0,7	0,9	0,6	1,6	2,3	0,9	1,7	2,7	0,7	1,6	2,4	0,9	1,5	2,2	0,8	1,9	2,7	0,9
Último mes	0,5	0,7	0,2	0,3	0,4	0,3	0,6	1,0	0,2	0,4	0,8	0,1	0,5	0,7	0,3	0,5	0,8	0,2	0,5	0,6	0,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.259.


Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.260.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.261.

Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2018.

	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida					Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses					Prevalencia de consumo en los últimos 30 días				
	2010	2012	2014	2016	2018	2010	2012	2014	2016	2018	2010	2012	2014	2016	2018
NPS*	-	-	4,0	4,5	2,4	-	-	2,8	3,1	1,7	-	-	1,6	1,7	0,8
Ketamina	1,1	1,1	0,7	0,6	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2
Spice	1,1	1,4	0,8	0,9	0,8	0,8	1,0	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,3	0,3	0,2
Mefedrona	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Salvia	-	0,8	0,7	0,6	0,4	-	0,5	0,4	0,4	0,3	-	0,3	0,3	0,2	0,1
Ayahuasca	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,2

\* NPS = Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... Estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Esta prevalencia se obtiene de la pregunta directa y general, sin especificar sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.262.

Evolución de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.263.


Evolución de la prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.264.

Evolución del porcentaje de personas que nunca han oido hablar de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 2014- 2018.



T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.265.

Prevalencias de consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias psicoactivas en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.266.

Evolución de la forma de obtención de nuevas sustancias psicoactivas entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2018.


	2014	2016	2018
Me la ofreció un amigo	55,0	53,7	54,8
A través de un vendedor (camello)	45,0	34,5	46,7
Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar	23,1	27,3	29,4
A través de internet	6,2	5,3	12,1
Las compré en una tienda especializada (Smart shop o head shop)	8,0	6,4	9,1
Otros sitios	15,9	5,8	5,9

\* Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.267.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez\* de nuevas sustancias psicoactivas\*\* (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2012-2018.



	2012	2014	2016	2018
Ketamina	68,2	82,2	77,2	74,5
Spice	72,4	82,7	77,7	74,8
Mefedrona	74,8	83,0	75,9	72,9
Salvia divinorum	71,2	78,8	71,5	69,8
Ayahuasca	-	-	-	69,0

\* Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

\*\* Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.268.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez\* de nuevas sustancias psicoactivas\*\* (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido o no la sustancia alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018.

	2016		2018	
	Riesgo percibido		Riesgo percibido	
	Consumen esa sustancia		Consumen esa sustancia	
	Sí	No	Sí	No
Consumir ketamina alguna vez	46,3	77,7	48,0	75,2
Consumir spice alguna vez	46,0	78,7	47,9	75,8
Consumir mefedrona alguna vez	55,3	76,3	56,7	73,3
Consumir salvia divinorum alguna vez	54,8	76,2	56,2	70,2
Consumir ayahuasca alguna vez	-	-	42,8	69,6

\* Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

\*\* Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

Nota: Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.269.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según hayan consumido o no la sustancia alguna vez en la vida (%). España, 2016-2018.

	2016		2018	
	Desconocimiento problemas de salud		Desconocimiento problemas de salud	
	Consumen esa sustancia		Consumen esa sustancia	
	Sí	No	Sí	No
Consumir ketamina alguna vez	32,5	16,3	42,2	14,9
Consumir spice alguna vez	30,4	16,0	41,4	14,3
Consumir mefedrona alguna vez	41,8	15,4	31,5	14,8
Consumir salvia divinorum alguna vez	23,9	15,9	36,2	16,4
Consumir ayahuasca alguna vez	-	-	40,3	17,2

\* Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

\*\* Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

Nota: Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.270.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.271.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2018.

	Sí consumen esa sustancia					NO consumen esa sustancia				
	2010	2012	2014	2016	2018	2010	2012	2014	2016	2018
Ketamina	83,6	74,4	76,8	75,0	72,0	39,4	41,0	38,2	51,0	54,4
Spice	79,1	73,4	78,9	86,5	85,6	39	41,4	40,6	52,6	54,3
Mefedrona	78,2	66,2	69,7	73,7	75,2	30,5	33,8	35,0	45,6	47,0
Salvia divinorum	-	75,4	78,4	86,4	76,6	-	36,4	36,9	47,6	44,7
Ayahuasca	-	-	-	-	78,6	-	-	-	-	44,7

Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, mieu, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.272.

Evolución del desconocimiento de la existencia de determinadas nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2012-2018.

	Nunca he oido hablar de esta droga			
	2012	2014	2016	2018
Ketamina	42,3	42,7	58,1	63,8
Spice	44,7	42,3	58,3	64,2
Mefedrona	51,6	44,0	62,2	68,0
Salvia divinorum	51,4	43,6	62,3	69,3
Ayahuasca	-	-	-	68,4

Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

No se excluye ninguna categoría de respuesta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.273.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018.


	Consumo nuevas sustancias psicoactivas
Antes de las 12 de la noche	1,4
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	1,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	1,9
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	2,1
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	2,1
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	3,4
Después de las 8 de la mañana	8,7

Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.274.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas\* alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.



\* Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.275.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas\* entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas\*\* alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2018.

	2016	2018
Ninguna sustancia	3,6	3,9
Una sola sustancia	8,5	5,0
Dos sustancias	8,5	5,4
Tres sustancias	32,6	22,4
Cuatro o más sustancias	46,9	63,4

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

\*\* Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.276.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales\* alguna vez en la vida en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas (NPS)\*\* alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2018.

	Sustancias psicoactivas legales	Sustancias psicoactivas ilegales	Ninguna sustancia psicoactiva legal o ilegal
Ha consumido NPS alguna vez en la vida	96,2	88,3	3,5
No ha consumido NPS alguna vez en la vida	80,9	32,4	18,2

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB

\*\* Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, mieu miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.277.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018.

	2016			2018		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0
Una sola sustancia	32,9	36,7	39,2	31,5	35,7	32,5
Dos sustancias	19,4	18,1	16,3	18,8	17,7	15,5
Tres sustancias	19,5	17,5	12,3	20,9	18,2	12,6
Cuatro o más sustancias	9,3	6,0	2,2	10,5	6,9	2,4

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.278.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2018.

	2012	2014	2016	2018
Ninguna sustancia	16,8	21,0	21,7	21,5
Una sola sustancia	38,9	39,1	36,7	35,7
Dos sustancias	20,1	17,7	18,1	17,7
Tres sustancias	17,5	16,7	17,5	18,2
Cuatro sustancias o más sustancias	6,7	5,5	6,1	6,9

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.279

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2018.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Ninguna sustancia	20,0	16,7	23,6	19,6	38,6	35,5
Una sola sustancia	32,7	30,5	36,7	34,8	32,7	32,3
Dos sustancias	16,7	20,7	15,5	19,8	13,6	17,3
Tres sustancias	20,6	21,3	17,4	18,9	12,5	12,6
Cuatro o más sustancias	10,1	10,8	6,9	6,8	2,6	2,3

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.280.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018.

	2016			2018		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	68,3	73,8	82,2	66,7	72,3	80,8
Una sola sustancia	27,4	23,2	16,8	28,6	24,2	18,0
Dos sustancias	2,2	1,4	0,4	2,6	1,8	0,6
Tres sustancias	0,8	0,6	0,3	0,9	0,7	0,2
Cuatro sustancias o más	1,3	1,0	0,3	1,3	0,9	0,3

\* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.281.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2018.

	2012	2014	2016	2018
Ninguna sustancia	73,2	74,1	73,8	72,3
Una sola sustancia	22,7	22,9	23,2	24,2
Dos sustancias	1,6	1,5	1,4	1,8
Tres sustancias	0,8	0,7	0,6	0,7
Cuatro o más sustancias	1,7	0,8	1,0	0,9

\* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.282.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2018.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Ninguna sustancia	65,0	68,4	70,5	74,0	78,7	82,8
Una sola sustancia	29,2	28,0	25,0	23,5	19,6	16,5
Dos sustancias	3,1	2,1	2,2	1,4	0,9	0,4
Tres sustancias	1,1	0,6	1,0	0,5	0,3	0,1
Cuatro o más sustancias	1,7	0,9	1,3	0,6	0,5	0,2

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.283.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2018.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Ninguna sustancia	39,9	26,5	15,6	11,5	22,2	11,1
Una sola sustancia	35,7	37,7	36,4	34,0	36,0	31,9
Dos sustancias	12,2	15,7	19,6	21,0	17,5	21,0
Tres sustancias	9,1	14,7	20,7	24,1	17,7	24,9
Cuatro o más sustancias	3,0	5,3	7,7	9,4	6,6	11,1

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.284.

Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad y sexo (%). España, 2018.



\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.285.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* sin incluir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018.


	2016			2018		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Sólo alcohol	29,3	34,1	36,3	28,3	33,3	28,8
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0
Una sola sustancia	22,5	20,4	18,8	21,5	19,8	18,2
Dos sustancias	19,9	17,8	12,8	21,4	18,5	13,5
Tres sustancias	6,4	4,2	1,6	7,3	4,7	1,8
Cuatro sustancias o más	3,0	1,9	0,6	3,2	2,2	0,7

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.286.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* consumidas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2018.



	2016	2018
Ninguna sustancia	30,0	37,0
Una sola sustancia	39,2	32,5
Dos sustancias	16,3	15,5
Tres sustancias	12,3	12,6
Cuatro o más sustancias	2,2	2,4

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.287.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* sin incluir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018.

	2016			2018		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Sólo tabaco	0,7	0,7	1,2	0,6	0,5	1,4
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0
Una sola sustancia	42,2	46,7	49,2	41,1	45,3	41,5
Dos sustancias	27,8	24,3	17,2	28,5	25,0	17,3
Tres sustancias	7,4	4,7	1,8	8,2	5,3	2,2
Cuatro sustancias	3,0	1,9	0,7	3,3	2,4	0,7

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.288.

Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%) España, 2018.



\* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.289.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* sin incluir ni alcohol ni tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2018.

	2016			2018		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Sólo alcohol y/o tabaco	39,6	45,2	48,3	38,7	43,6	39,5
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0
Una sola sustancia	30,8	26,3	19,2	31,4	27,1	20,5
Dos sustancias	7,6	4,8	1,9	8,4	5,4	2,3
Tres sustancias	1,5	0,8	0,3	1,5	1,1	0,3
Cuatro sustancias	1,6	1,1	0,4	1,8	1,3	0,4

\* Drogas legales e ilegales: tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

**1.2.290.**

Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, éxtasis, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2018.

	Alcohol	Tabaco	Cigarrillos electrónicos	Cannabis	Hipnosedantes sin receta	Hipnosedantes con o sin receta	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	45,0	46,4	35,7	7,2	14,3	2,8	1,4	3,2	1,5	1,8	2,5	0,6	1,3	0,5
Tabaco	97,3	100,0	63,6	64,9	9,9	18,6	5,1	2,4	5,7	2,8	3,4	4,9	1,0	2,2	0,9
Cigarrillos electrónicos															
	93,8	60,5	100,0	49,0	8,7	16,8	4,1	2,1	4,7	2,2	2,8	4,0	0,9	1,9	0,7
Cannabis	98,1	82,5	65,7	100,0	10,8	19,8	7,0	3,4	7,8	3,7	4,6	6,4	1,4	2,9	1,2
Hipnosedantes sin receta															
	90,0	56,8	53,2	48,6	100,0	100,0	10,6	6,5	11,8	7,4	8,8	11,6	3,4	4,9	2,9
Hipnosedantes con o sin receta															
	86,3	51,9	49,8	43,3	49,2	100,0	6,9	4,2	7,8	4,5	5,6	7,3	2,0	3,2	1,7
Cocaína polvo	98,4	84,4	71,7	89,6	30,1	40,7	100,0	36,2	100,0	33,6	30,8	42,0	14,9	19,4	11,1
Cocaína base	99,0	82,6	74,8	87,6	38,6	51,0	74,5	100,0	100,0	39,3	38,5	46,5	26,5	24,6	19,5
Cocaína polvo y/o base															
	98,2	82,7	72,0	87,8	29,6	40,5	89,1	43,7	100,0	31,9	28,8	39,2	13,8	18,0	10,4
Anfetaminas/speed															
	97,2	87,5	73,6	89,9	40,2	50,7	64,2	36,2	68,1	100,0	48,1	66,3	23,3	29,4	20,7
Alucinógenos	98,4	85,9	75,8	91,6	38,7	50,9	47,5	29,0	50,0	39,9	100,0	47,6	20,2	27,6	17,7
Éxtasis	98,6	90,4	77,7	91,7	36,9	48,1	46,3	25,3	48,9	39,4	34,3	100,0	15,8	21,7	13,8
Heroína	96,7	80,6	74,7	82,9	45,6	54,9	68,3	59,3	72,6	56,5	60,0	65,1	100,0	39,7	43,9
Inhalables volátiles															
	94,7	75,1	68,1	75,7	28,4	39,2	39,9	24,1	41,7	31,5	35,7	39,4	17,2	100,0	18,8
GHB	96,3	84,3	80,5	87,6	48,1	60,3	65,3	54,6	69,0	60,9	63,6	69,0	53,2	52,4	100,0

Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.291.

Prevalencia de consumo de una, dos, tres o cuatro o más sustancias psicoactivas\* según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2018.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Alcohol	35,5	23,5	27,3	13,7
Tabaco	1,0	22,0	50,0	27,0
Cannabis	0,4	9,1	56,5	34,0
Hipnosedantes sin receta	7,8	23,6	18,5	50,1
Hipnosedantes con o sin receta	10,8	25,7	18,0	45,5
Cocaína en polvo	0,5	0,9	4,5	94,0
Cocaína base	0,7	1,1	3,2	95,0
Cocaína polvo y/o base	0,8	1,3	5,3	92,7
Éxtasis	0,5	2,3	2,0	95,2
Anfetaminas	0,7	1,5	3,2	94,5
Alucinógenos	0,2	1,0	2,2	96,7
Heroína	3,0	2,6	5,4	89,0
Inhalables volátiles	2,6	9,4	8,5	79,4
GHB	4,0	0,7	3,0	92,3

\* Drogas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.292.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2018.

	Ha hecho binge drinking	No ha hecho binge drinking
Consumo de cannabis	40,5	9,2
Consumo de cocaína polvo y/o base	2,2	0,3
Consumo de éxtasis	1,8	0,1
Consumo de anfetaminas o speed	1,2	0,2
Consumo de alucinógenos	1,2	0,1
Consumo de heroína	0,7	0,1
Consumo de inhalables volátiles	1,1	0,3
Consumo de GHB	0,5	0,1

Se lee: entre los que han hecho binge un X% ha consumido cannabis

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.293.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2018.

	Se han emborrachado en los últimos 30 días	No se han emborrachado en los últimos 30 días
Consumo de cannabis	45,5	10,3
Consumo de cocaína polvo y/o base	2,4	0,3
Consumo de éxtasis	2,1	0,2
Consumo de anfetaminas o speed	1,3	0,2
Consumo de alucinógenos	1,1	0,2
Consumo de heroína	0,7	0,1
Consumo de inhalables volátiles	1,2	0,3
Consumo de GHB	0,6	0,1

Se lee: entre los que se han emborrachado un X% ha consumido cannabis.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.294.

Prevalencia de consumo conjunto\* de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2008-2018.




\* Consumo de alcohol y cannabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.295.

Prevalencia de consumo conjunto\* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2008-2018.




\* Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.296.

Prevalencia de consumo conjunto\* de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2012-2018.




\* Se obtiene de cruzar a las personas que han consumido ambas sustancias en el mismo periodo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

**1.2.297.**

Prevalencia de consumo conjunto\* de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días según sexo y edad (%). España, 2012-2018.




\* Se obtiene de cruzar a las personas que han consumido ambas sustancias en el mismo periodo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.298.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2018.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Heroína	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4	97,3
Cocaína en polvo	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9	96,4	97,1
Éxtasis	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9	96,2	96,9
Tabaco (un paquete diario)	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8	93,8
Hipnosedantes	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6	87,7	90,7
Cannabis	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7	87,5
Tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3	56,1	76,8
Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8	52,9	56,4



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.299.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.300.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de cannabis y tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.301.

Evolución del riesgo percibido del consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2018.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2018	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521
Fumar un paquete de tabaco diario	74,7	79,1	72,8	77,4	75,7	79,9	75,1	79,5	76,7	80,8	78,2	82,3	84,9	89,3	86,5	91,0	88,9	91,7	89,6	93,1	88,1	91,1	91,0	92,7	93,1	94,4
Tomarse 5 o 6 cañas de bebidas alcohólicas en fin de semana	39,8	47,7	40,6	49,4	40,3	48,7	41,5	48,3	41,1	48,1	36,8	45,7	48,7	53,6	45,1	49,2	44,2	49,5	44,7	50,3	52,6	57,7	55,7	56,5	73,8	79,4
Tomarse 1 o 2 cañas de bebidas alcohólicas a diario	46,3	54,6	43,7	52,9	41,7	49,4	39,4	48,4	38,7	47,9	36,8	45,7	52,3	61,9	52,7	62,9	56,7	62,6	55,1	64,1	53,3	62,0	48,7	56,9	52,6	59,8
Fumar cannabis habitualmente	89,8	93,9	84,9	90,2	82,4	88,8	79,4	86,1	77,5	85,4	81,1	86,2	85,7	91,7	84,5	91,8	85,5	91,6	84,3	91,7	85,4	91,9	88,0	93,2	83,7	90,9
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,9	91,3	87,8	89,4	87,5	89,2	86,9	87,9	88,3	89,1	89,8	89,6	86,1	88,6	84,6	88,4	83,8	87,0	88,7	90,3	88,3	89,0	87,2	88,1	89,7	91,6
Consumir éxtasis habitualmente	96,6	97,9	96,2	97,9	96,3	97,5	95,0	95,9	96,4	97,1	97,1	97,3	95,8	98,0	94,1	97,8	94,6	97,1	95,2	97,8	95,9	97,8	95,5	97,0	95,8	97,9
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98,1	99,0	96,9	98,3	96,7	98,0	96,3	97,5	96,9	97,8	97,5	98,1	95,6	97,9	94,0	97,8	95,0	97,3	95,4	97,9	96,0	97,7	95,7	97,1	96,3	97,8
Consumir heroína habitualmente	98,4	99,3	97,4	98,8	97,5	98,7	97,6	98,8	98,4	98,8	98,5	99,1	95,8	98,1	94,3	98,0	95,0	97,5	95,7	98,0	96,4	98,4	95,6	97,1	96,3	98,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.302.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total	Sexo		Edad				
		Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Fumar un paquete de tabaco diario	93,8	93,1	94,4	93,4	93,7	93,5	94,3	94,5
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	73,0	73,4	72,7	75,9	74,6	71,2	72,3	69,8
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	76,8	73,8	79,4	78,9	77,8	75,7	76,0	74,4
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	56,4	52,6	59,8	57,9	57,3	55,1	56,4	54,5
Tomar hipnosedantes habitualmente	90,7	89,7	91,6	90,1	89,5	91,5	91,0	92,3
Fumar cannabis habitualmente	87,5	83,7	90,9	91,5	89,3	86,1	85,5	83,5
Consumir cocaína en polvo habitualmente	97,1	96,3	97,8	96,5	97,0	97,2	97,4	97,2
Consumir éxtasis habitualmente	96,9	95,8	97,9	96,5	96,7	97,1	97,1	97,2
Consumir heroína habitualmente	97,3	96,3	98,1	96,7	97,0	97,4	97,6	97,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.303.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal\* (%). España, 2018.

	Han consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	No han consumido ninguna droga ilegal en los últimos 12 meses
Fumar un paquete de tabaco diario	91,2	94,9
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	61,5	77,9
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	71,9	78,8
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	51,9	58,4
Tomar hipnosedantes habitualmente	90,6	90,7
Fumar cannabis habitualmente	73,6	93,3
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,4	97,4
Consumir éxtasis habitualmente	96,0	97,3
Consumir heroína habitualmente	96,6	97,6

\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.304.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2018.

	Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días		Consumo de alcohol en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	87,4	94,6	-	-
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	41,2	76,7	-	-
Fumar cigarrillos electrónicos	15,9	18,5	-	-
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	-	-	72,9	82,5
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	-	-	53,0	61,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.305.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, o el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2018.


	Total estudiantes E. Secundarias de 14 a 18 años	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	CAST ≥4 (consumo problemático de cannabis)
Fumar un paquete de tabaco diario	93,8	91,2	92,5	87,8
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	73,0	63,3	63,9	47,0
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	76,8	69,1	70,3	69,2
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	56,4	50,7	52,1	47,0
Tomar hipnosedantes habitualmente	90,7	90,7	90,9	86,6
Fumar cannabis habitualmente	87,5	81,7	79,9	50,6
Consumir cocaína en polvo habitualmente	97,1	96,4	97,0	93,6
Consumir éxtasis habitualmente	96,9	96,2	96,5	94,0
Consumir heroína habitualmente	97,3	96,5	97,0	94,7
Fumar cigarrillos electrónicos	18,3	14,7	13,6	14,8
Fumar cannabis alguna vez	51,9	41,2	36,3	21,3
Consumir cocaína en polvo alguna vez	81,3	79,8	80,2	71,5
Consumir cocaína base alguna vez	84,8	84,2	85,7	79,7
Consumir éxtasis alguna vez	83,7	82,1	82,9	71,7
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	84,7	83,3	84,1	73,3
Consumir alucinógenos alguna vez	82,1	79,3	79,1	65,7
Consumir heroína alguna vez	86,8	86,0	87,5	81,8
Inyectarse drogas alguna vez	89,6	89,0	90,3	85,8
Consumir GHB alguna vez	88,1	87,5	88,7	81,7
Consumir metanfetamina alguna vez	87,0	86,2	87,2	80,4

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.306.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2006-2018.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Fumar cannabis alguna vez	70,2	54,8	50,4	52,6	54,9	54,1	51,9
Fumar cigarrillos electrónicos	-	-	-	-	-	34,2	18,3
Consumir cocaína en polvo alguna vez	90,8	81,4	79,6	81,4	86,1	78,1	81,3
Consumir cocaína base alguna vez	90,5	86,0	82,3	83,3	85,6	82,8	84,8
Consumir éxtasis alguna vez	91,3	85,0	82,6	84,9	87,1	80,3	83,7
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	91,0	85,1	82,6	84,9	87,3	80,4	84,7
Consumir alucinógenos alguna vez	90,3	84,8	80,5	82,6	86,5	80,3	82,1
Consumir heroína alguna vez	92,0	86,8	84,9	87,2	88,7	82,3	86,8
Inyectarse drogas alguna vez	92,9	88,9	87,7	90,7	94,0	88,7	89,6
Consumir GHB alguna vez	91,9	86,1	83,7	85,8	87,8	88,1	88,1
Consumir metanfetamina alguna vez	-	-	-	-	-	85,9	87,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.307.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total	Sexo		Edad					
		Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Fumar cannabis alguna vez	51,9	50,1	53,6	64,9	56,9	49,1	43,3	43,4	52,4
Fumar cigarrillos electrónicos	18,3	17,9	18,7	18,8	17,7	17,5	18,7	20,6	18,1
Consumir cocaína en polvo alguna vez	81,3	81,6	80,9	79,6	81,5	81,5	81,6	82,7	81,2
Consumir cocaína base alguna vez	84,8	85,4	84,3	82,3	84,2	85,5	86,1	86,5	84,7
Consumir éxtasis alguna vez	83,7	83,2	84,1	82,4	83,0	84,0	84,5	85,0	83,6
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	84,7	84,5	84,8	82,6	84,6	85,0	85,5	85,6	84,6
Consumir alucinógenos alguna vez	82,1	80,6	83,5	82,1	82,6	82,2	81,4	82,8	82,1
Consumir heroína alguna vez	86,8	86,7	86,8	84,3	86,2	87,4	87,8	88,9	86,6
Inyectarse drogas alguna vez	89,6	89,5	89,8	87,9	89,1	90,0	90,6	90,9	89,5
Consumir GHB alguna vez	88,1	87,7	88,4	86,1	87,5	88,3	89,4	89,7	88,0
Consumir metanfetamina alguna vez	87,0	86,6	87,4	85,1	86,0	87,4	88,3	88,6	86,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.308.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal\* (%). España, 2018.

	Han consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	No han consumido ninguna droga ilegal en los últimos 12 meses
Fumar cannabis alguna vez	25,9	63,4
Fumar cigarrillos electrónicos	13,5	20,5
Consumir cocaína en polvo alguna vez	79,0	82,2
Consumir cocaína base alguna vez	84,7	84,9
Consumir éxtasis alguna vez	81,3	84,8
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	83,1	85,4
Consumir alucinógenos alguna vez	76,7	84,5
Consumir heroína alguna vez	86,8	86,8
Inyectarse drogas alguna vez	90,0	89,6
Consumir GHB alguna vez	87,8	88,3
Consumir metanfetamina alguna vez	86,2	87,4

Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.309.


Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de cannabis (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2002-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.310.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.311.

Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base\* percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2018.




\* Desde 1994 hasta 2010 los datos de disponibilidad se refieren sólo a cocaína polvo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.312.


Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 2000-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.313.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.314.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (%). España, 2014-2018.

	2014			2016					2018				
	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	0,6	0,5	0,9	13,8	1,3	0,5	0,6	1,0	15,8	1,4	0,6	0,7	1,2
A través de un vendedor (camello)	0,7	0,8	1,0	10,8	1,4	0,8	0,8	1,0	12,6	1,5	0,8	0,9	1,1
En una zona de ocio (festival, concierto...)	0,3	0,4	0,5	3,1	0,6	0,3	0,4	0,5	4,1	0,7	0,5	0,5	0,5
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	0,1	0,1	0,2	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9	0,2	0,2	0,2	0,4
A través de internet	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,3	0,2	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3	0,4


FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.315.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2014-2018.

	2014				2016				2018				
	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas
<b>A través de un familiar/amigo/conocido</b>													
	52,2	35,9	47,2	74,4	54,8	41,1	41,5	51,6	47,0	33,9	20,3	21,2	39,0
<b>A través de un vendedor (camello)</b>													
	54,4	69,4	51,7	58,2	59,1	59,1	61,6	56,1	37,7	33,9	28,1	23,2	32,1
<b>En una zona de ocio (festival, concierto...)</b>													
	32,4	30,2	25,4	16,6	22,8	24,3	25,5	19,6	12,1	16,5	12,7	11,9	14,4
<b>A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)</b>													
	9,4	11,8	11,7	6,7	7,6	15,8	6,2	10,7	5,4	4,0	6,1	4,9	10,3
<b>A través de internet</b>													
	14,6	12,4	11,7	2,6	7,9	14,1	10,7	10,2	1,9	4,1	6,1	5,5	8,5

CANNABIS 2018



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.316.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total	Sexo		Edad				
		Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Bebidas alcohólicas	94,9	94,4	95,3	88,9	93,7	96,0	97,8	98,6
Tabaco	93,1	92,7	93,4	86,2	91,6	94,6	96,2	97,3
Cannabis	68,1	70,6	65,8	44,7	60,8	73,1	80,1	83,9
Hipnosedantes	47,4	47,3	47,6	33,7	42,8	47,5	58,0	62,1
Cocaína en polvo	32,8	35,1	30,7	18,9	25,9	34,5	43,8	50,3
Alucinógenos	24,1	28,0	20,2	14,5	18,2	25,2	33,2	35,8
Anfetaminas o speed	22,8	25,8	19,9	13,4	17,9	23,8	31,0	34,4
Cocaína base	21,8	24,5	19,3	13,6	18,3	22,3	28,6	33,4
Éxtasis	21,0	23,6	18,4	12,9	17,4	20,6	28,3	32,3
Heroína	20,2	22,0	18,6	15,7	18,1	20,3	24,4	27,2
Metanfetamina	18,5	21,3	15,7	12,9	16,3	19,0	22,9	24,8
GHB	12,6	15,3	9,9	9,3	11,1	13,0	15,5	16,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.317.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna de las siguientes drogas, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total	Sexo		Edad				
		Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Cannabis	42,0	43,4	40,7	22,2	35,5	46,8	54,9	56,2
Cocaína en polvo	8,5	10,4	6,8	4,0	5,8	8,8	12,7	15,2
Alucinógenos	4,9	6,0	3,8	2,0	3,5	5,6	6,7	8,5
Anfetaminas o speed	4,1	5,3	3,1	1,7	2,8	4,4	6,1	8,0
Éxtasis	3,9	4,7	3,0	1,6	3,1	3,8	5,5	7,6
Cocaína base	3,3	4,2	2,5	2,0	2,7	3,3	4,3	6,0
Heroína	2,7	3,2	2,2	2,0	2,6	2,6	3,0	3,9
Metanfetamina	2,6	3,3	1,9	1,5	2,1	2,5	3,5	4,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.318.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna droga ilegal\*, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Sexo			Edad				
	Total	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Te han ofrecido alguna droga ilegal	42,7	44,2	41,3	23,1	36,1	47,5	55,6	56,9
Te han ofrecido alguna droga ilegal que no sea cannabis	12,1	14,1	10,3	6,1	8,9	12,9	17,1	20,0

\* Alguna droga ilegal: cannabis, cocaína en polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína y metanfetaminas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.319.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna droga ilegal\*, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo y edad, según el consumo que tengan de otras drogas legales o ilegales (% de fila). España, 2018.

	Total		Borracheras		Binge drinking		Tabaco		Cannabis		Cannabis		D. ilegales	
	14-18 años		U12M		U30D		U12M		U12M		(CAST≥4)		U12M	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Te han ofrecido alguna droga ilegal	42,7	57,3	68,5	31,5	69,0	31,0	73,4	26,6	88,2	11,8	97,1	2,9	87,2	12,8
Te han ofrecido alguna droga ilegal que no sea cannabis	12,1	87,9	21,3	78,7	23,8	76,2	24,0	76,0	30,2	69,8	62,2	37,8	30,2	69,8

Notas:

Alguna droga ilegal: cannabis, cocaína en polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína y metanfetaminas.

Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

U12M: últimos 12 meses; U30D: últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.320.


Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Sí, perfectamente	Sí, lo suficiente	Sólo a medias	No, estoy mal informado
Total	26,0	40,9	26,0	7,1
Hombre	32,0	40,8	20,2	7,1
Mujer	20,4	41,0	31,5	7,2
14 años	25,7	39,9	26,0	8,5
15 años	26,8	40,2	26,2	6,8
16 años	25,7	41,0	26,4	6,9
17 años	25,6	42,0	25,6	6,8
18 años	27,0	41,8	24,5	6,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.321.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y edad (%). España, 2018.




	Perfectamente informado		Mal informado	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
14 años	30,0	21,7	8,8	8,1
15 años	32,8	21,0	6,7	6,9
16 años	32,6	19,5	6,8	7,0
17 años	32,9	18,9	6,8	6,7
18 años	28,8	24,9	6,0	7,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.322.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo (%). España, 2014-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.323.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total	Sexo		Edad					
		Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
He recibido información en el centro educativo	81,7	79,7	83,7	77,7	81,6	83,6	82,6	81,6	83,1
He recibido información en mi familia	68,6	68,6	68,5	65,6	68,3	70	69,3	68,5	69,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.324.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones, según sexo (%). España, 2016-2018.

		2016			2018		
		Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Efectos y problemas asociados a drogas legales	71,1	69,8	72,4	76,9	74,7	79,0	
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales	65,7	65,8	65,6	69,4	69,8	69,2	
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías	68,9	66,5	71,4	74,8	71,6	78,0	
Efectos y problemas asociados al juego on line, apuestas	26,9	29,4	24,4	38,8	42,3	35,5	

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.325.


Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo y edad (%). España 2012-2018.

	Legalización del cannabis				Legalización de todas las drogas			
	2012	2014	2016	2018	2012	2014	2016	2018
Total	37,7	40,3	36,4	34,2	27,0	29,6	26,8	20,8
Sexo								
Hombre	39,3	40,9	36,7	35,7	25,7	27,5	25,3	20,4
Mujer	35,9	39,8	36,1	32,8	28,4	31,8	28,4	21,3
Edad								
14 años	35,8	40,2	35,7	31,1	32,7	36,8	32,7	24,9
15 años	36,3	39,2	35,5	32,1	28,9	31,5	28,7	21,2
16 años	36,9	41,4	35,5	34,1	26,0	28,8	24,3	20,4
17 años	38,4	39,7	36,8	36,7	24,4	24,1	22,1	18,2
14-17 años	37,0	40,1	35,9	33,8	27,2	29,8	26,9	20,9
18 años	41,1	42,7	43,1	40,4	25,7	27,0	26,1	20,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.326.

Evolución de la valoración\* de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2018.




\* Algo importante o muy importante.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.327.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2018.




CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

Incluyendo los NS/NC.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.328.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal\* en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2018.




\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.329.


Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%) España, 2006-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.330.


Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.331.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.332.


Prevalencia de consumo de cocaína en polvo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.333.


Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.334.


Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.335.


Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.336.

Prevalencia de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.337.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2018.

	Total		Sexo		Edad					
	2016	2018	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
<b>Madre permisiva frente al consumo de</b>										
Tabaco	10,8	10,5	10,1	10,9	3,2	5,8	10,9	17,0	9,7	23,6
Bebidas alcohólicas	37,3	34,0	32,7	35,1	11,8	23,0	36,5	52,7	32,4	58,8
Cannabis	1,6	6,2	6,2	6,1	2,7	4,5	6,8	8,6	5,9	11,1
<b>Padre permisivo frente al consumo de</b>										
Tabaco	10,1	13,2	13,3	13,2	4,9	8,4	13,7	20,5	12,3	27,4
Bebidas alcohólicas	36,5	31,8	32,6	31,1	11,6	21,2	34,7	49,4	30,4	54,4
Cannabis	1,8	2,0	2,5	1,5	0,6	1,1	2,3	2,9	1,9	4,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.338.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de tabaco según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan (% de columna). España, 2018.

	Total alumnos	Tabaco		Tabaco		Cigarrillos electrónicos	
		últimos 12 meses	Sí	No	últimos 30 días	Sí	No
			Sí	No		Sí	No
Madre permisiva frente al consumo de tabaco	10,5	22,3	4,2	26,8	4,6	15,8	7,5
Padre permisivo frente al consumo de tabaco	13,2	23,4	7,8	27,1	8,3	18,2	10,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.339.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de alcohol según el consumo de alcohol que los estudiantes tengan. España, 2018.

	Total alumnos	Bebidas alcohólicas		Borracheras		Botellón		Binge drinking		B. energéticas*	
		últimos 30 días	Sí	últimos 30 días	Sí	últimos 12 meses	No	últimos 30 días	Sí	No	últimos 30 días
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>Madre permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas</b>											
	34,0	46,2	16,9	54,9	27,1	47,1	20,1	52,7	25,1	48,6	31,2
<b>Padre permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas</b>											
	31,8	43,1	16,1	51,1	25,4	43,7	19,2	48,9	23,7	44,6	29,5

\* Bebidas energéticas + alcohol.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.340.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de cannabis según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (% de columna). España, 2018.

	Total alumnos	Cannabis últimos 12 meses	Cannabis últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis*
	Sí	No	Sí	No
Madre permisiva frente al consumo de cannabis	6,2	10,9	4,4	12,1
Padre permisivo frente al consumo de cannabis	2,0	5,4	0,8	6,6
				1,0
				17,5
				1,5

\* Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4). CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.341.

Prevalencia de consumo de sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas (%). España, 2018.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
Ha practicado algún deporte	76,2	34,2	27,1	2,3
No ha practicado ningún deporte	74,1	40,9	30,9	3,1
Ha leído libros para divertirse	72,6	30,8	23,4	1,7
No ha leído libros para divertirse	81,7	41,9	34,2	3,7
Ha salido con amigos por las noches	84,0	40,1	31,7	2,7
No ha salido con amigos por las noches	37,4	10,7	7,1	0,8
Ha salido con amigos por las tardes	76,8	35,6	28,0	2,4
No ha salido con amigos por las tardes	56,1	21,7	15,2	2,7
Tiene otros hobbies	74,3	32,6	25,3	2,1
No tiene otros hobbies	78,7	38,8	30,9	2,9
Ha usado Internet para divertirse	76,0	34,9	27,4	2,3
No ha usado Internet para divertirse	72,9	38,5	32,0	8,1
Ha visitado páginas sólo para adultos	81,5	39,3	35,1	3,4
No ha visitado páginas sólo para adultos	70,9	30,9	20,3	1,5
Realiza compras en internet	78,5	36,4	28,5	2,5
No realiza compras en internet	59,1	24,8	20,1	2,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.342.

Frecuencia de actividades de ocio realizadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (%). España, 2018.

		Total	Hombres	Mujeres
Practicar algún deporte	Nunca	11,0	6,8	15,1
	Anualmente	5,2	3,0	7,4
	Mensualmente	13,9	10,1	17,5
	Semanalmente	69,9	80,1	60,1
Leer libros por diversión	Nunca	37,3	47,3	27,9
	Anualmente	21,6	21,7	21,4
	Mensualmente	21,3	18,4	24,0
	Semanalmente	19,8	12,6	26,6
Salir con amigos por las noches	Nunca	17,3	17,9	16,7
	Anualmente	15,8	15,5	16,2
	Mensualmente	41,1	39,1	43,0
	Semanalmente	25,8	27,6	24,2
Salir con amigos por las tardes	Nunca	4,2	5,2	3,2
	Anualmente	5,1	5,6	4,7
	Mensualmente	27,7	26,5	28,8
	Semanalmente	63,1	62,7	63,3
Tener otros hobbies	Nunca	38,9	43,4	34,7
	Anualmente	8,9	8,6	9,2
	Mensualmente	15,5	14,4	16,5
	Semanalmente	36,7	33,5	39,6
Usar internet por diversión	Nunca	1,0	1,0	0,9
	Anualmente	0,9	0,9	0,9
	Mensualmente	2,7	3,2	2,3
	Semanalmente	95,4	94,9	95,9
Visitar páginas para adultos en internet	Nunca	51,5	24,5	77,0
	Anualmente	8,5	7,6	9,4
	Mensualmente	14,1	20,3	8,1
	Semanalmente	25,9	47,5	5,5
Realizar compras a través de internet	Nunca	12,7	15,9	9,6
	Anualmente	23,8	25,1	22,6
	Mensualmente	53,3	50,3	56,2
	Semanalmente	10,1	8,7	11,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

**1.2.343.**

Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2018.

	Notas saca habitualmente	Notas		Repetido curso	
				alguna vez	
		Sobresaliente/notable	Aprobado/bien	Suspenso	Sí
TOTAL ALUMNOS		45,2	47,9	7,0	24,2 75,8
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días		40,7	51,2	8,1	28,0 72,0
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días		51,6	43,0	5,4	18,7 81,3
Se ha emborrachado en los últimos 30 días		38,4	52,4	9,2	30,7 69,3
No se ha emborrachado en los últimos 30 días		47,9	46,0	6,1	21,4 78,6
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días		36,9	54,0	9,1	32,1 67,9
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días		49,2	44,9	5,9	20,3 79,7
Ha hecho botellón en el último año		37,7	53,0	9,3	32,9 67,1
No ha hecho botellón en el último año		47,4	46,3	6,3	21,5 78,5
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días		24,7	60,0	15,3	49,3 50,7
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días		47,5	46,5	6,0	21,2 78,8
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días		30,1	57,4	12,6	38,2 61,8
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días		48,9	45,5	5,6	20,6 79,4
Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)		21,4	58,8	19,8	53,1 46,9
Consumo de cannabis (CAST<4)		35,3	55,5	9,3	30,2 69,8

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.344.

Prevalencia de experimentar ciertas situaciones entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2018.

	Últimos 30 días ha hecho pellás	Últimos 12 meses no ha podido concentrarse en el colegio al día siguiente de salir	Últimos 12 meses ha sido expulsado del centro educativo
TOTAL ALUMNOS	24,4	16,9	6,0
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	33,2	24,5	8,0
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	11,9	6,3	3,1
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	43,1	33,9	11,4
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	17,8	11,0	4,0
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	40,9	31,4	10,2
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	16,3	9,9	3,9
Ha hecho botellón en los últimos 30 días	43,3	33,6	11,8
No ha hecho botellón en los últimos 30 días	18,8	12,0	4,2
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	57,6	38,9	19,8
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	16,8	11,1	4,4
Ha consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	38,0	30,6	11,6
No han consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	23,3	15,9	5,5
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	49,6	34,1	14,9
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	18,2	12,8	3,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.345.

Prevalencia de experimentar ciertas situaciones en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2018.

	Discusión familiar	Peleas o agresiones	No recordar noche anterior	Rel. sexuales sin preservativo	Rel. sexuales arrepentido	Sufrir bullying
TOTAL ALUMNOS	39,1	6,3	20,7	15,8	6,7	9,4
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	45,6	10,0	31,5	22,6	9,8	9,7
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	30,2	1,0	5,6	6,2	2,4	9,1
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	50,8	16,9	49,3	30,6	13,9	9,8
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	35,2	2,6	11,1	10,6	4,2	9,2
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	49,0	14,9	43,1	28,8	13,3	9,9
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	34,4	2,1	10,0	9,5	3,6	9,2
Ha hecho botellón en los últimos 30 días	50,0	17,5	45,4	30,7	14,4	9,9
No ha hecho botellón en los últimos 30 días	36,0	3,0	13,5	11,4	4,5	9,3
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	59,5	24,5	45,0	44,6	19,2	13,1
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	36,8	4,2	18,0	12,5	5,4	9,1
Ha consumido hipnosedantes en últimos 30 días	59,2	14,4	29,7	26,8	14,2	19,0
No ha consumido hipnosedantes en últimos 30 días	37,7	5,7	20,0	15,0	6,2	8,8
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	54,3	19,4	42,3	36,1	15,8	11,0
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	35,6	3,2	15,6	10,9	4,6	9,1
Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)	71,4	38,5	49,8	54,8	25,0	12,8
Consumo de cannabis (CAST<4)	50,9	14,2	40,9	31,1	13,1	9,6
Ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	60,4	39,0	47,7	52,9	29,1	15,8
No ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	38,6	5,4	20,0	14,8	6,1	9,3

Las definiciones completas son las siguientes: Ha tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos. Ha sufrido una pelea habiendo consumido alcohol u otras drogas. No ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior después de haber salido. Ha tenido relaciones sexuales sin preservativo. Ha tenido relaciones sexuales de las que se ha arrepentido. Has sufrido bullying (acoso) a través de internet o por otros medios.

\*CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.346.

Evolución de la prevalencia de bulling (acoso) a través de internet o por otros medios (acoso directo o indirecto físico, verbal, psicológico, sexual o social) en los últimos 12 meses (%). España 2016-2018.

	Total	Hombre	Mujer
2016	7,2	5,3	9,1
2018	9,4	7,5	11,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.347.

Evolución de la prevalencia de bulling (acoso) a través de internet (%). España 2014-2018.

	Total	Hombre	Mujer
2014	9,7	10,3	9,2
2016	6,7	5,0	8,5
2018	8,7	7,7	9,6

\* Alguna vez + a menudo + muy frecuentemente

\* Esta pregunta no tiene referencia temporal

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.348.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total	Sexo		Edad				
		Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Nunca	10,1	10,2	10,0	17,1	12,4	7,7	6,6	6,3
Menos de una noche al mes	19,6	18,2	21,0	23,9	22,8	17,4	16,5	17,5
De 1 a 3 noches al mes	30,3	28,5	32,0	26,7	27,7	32,3	32,3	33,5
1 noche a la semana	16,1	17,1	15,0	12,9	14,8	17,0	18,6	16,2
2 noches a la semana	16,8	18,0	15,7	13,3	15,4	17,8	19,0	19,3
3-4 noches a la semana	4,2	4,7	3,7	3,4	4,1	4,6	4,4	4,6
Más de 4 noches a la semana	2,9	3,3	2,5	2,7	2,8	3,3	2,7	2,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.349.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
Nunca	29,2	8,5	5,5	0,7
Menos de una noche al mes	68,3	22,2	16,3	0,8
De 1 a 3 noches al mes	84,1	37,3	28,6	1,9
1 noche a la semana	85,9	42,0	33,8	2,5
2 noches a la semana	90,7	51,7	42,7	4,0
3-4 noches a la semana	90,4	57,0	47,6	7,0
Más de 4 noches a la semana	92,0	61,7	51,2	10,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.350.

Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST  $\geq 4$ ) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.

	Binge drinking	Borracheras últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq 4$ )
Nunca	3,2	1,4	4,5	0,5
Menos de una noche al mes	15,4	10,6	34,4	1,3
De 1 a 3 noches al mes	35,8	27,7	60,2	2,4
1 noche a la semana	42,5	32,9	64,0	3,3
2 noches a la semana	51,8	39,7	72,6	6,9
3-4 noches a la semana	53,7	42,7	74,2	10,3
Más de 4 noches a la semana	56,0	44,1	77,2	10,8


\*CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.351.

Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2018.


	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Nunca	11,8	10,7	11,8	7,2	8,7	8,7	10,1
Menos de una noche al mes	11,7	11,0	12,7	15,1	17,7	17,6	19,6
De 1 a 3 noches al mes	23,6	22,1	26,2	28,8	30,1	28,7	30,3
1 noche a la semana	18,5	17,3	18,4	17,9	17,0	17,2	16,1
2 noches a la semana	24,5	26,7	22,1	19,9	18,6	19,3	16,8
3-4 noches a la semana	5,9	6,8	4,7	4,8	4,7	5,2	4,2
Más de 4 noches a la semana	3,9	5,3	3,6	3,2	3,3	3,3	2,9



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.352.

Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales\* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.




	Una	Dos	Tres	Cuatro o más
Nunca	25,1	6,5	3,6	1,1
Menos de una noche al mes	41,7	15,7	10,7	3,4
De 1 a 3 noches al mes	39,3	20,7	19,5	6,3
1 noche a la semana	36,4	20,2	23,1	8,2
2 noches a la semana	31,4	21,0	27,8	11,9
3-4 noches a la semana	25,8	21,4	28,5	15,6
Más de 4 noches a la semana	27,4	16,9	30,9	18,7

\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.353.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.




\* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.354.


Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.355.


Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.356.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.357.


Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.358.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.359.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.




\* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.360.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST  $\geq 4$ )\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.




\* Consumo problemático de cannabis (CAST  $\geq 4$ ). CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.361.

Prevalencia de consumo de drogas legales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.362.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total	Sexo		Edad				
		Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Antes de las 12 de la noche	19,3	18,7	19,8	40,4	26,6	12,9	8,0	6,8
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	16,5	17,0	16,1	21,1	22,0	16,1	10,9	7,7
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	11,3	12,4	10,2	11,5	12,8	12,2	9,8	6,9
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	11,1	11,2	11,1	9,1	10,8	12,2	12,0	9,8
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	13,5	12,4	14,4	7,9	11,5	15,8	16,1	15,6
Entre las 4 y las 8 de la mañana	22,2	20,9	23,4	7,5	12,5	24,0	34,7	40,7
Después de las 8 de la mañana	6,2	7,5	5,0	2,5	3,9	6,8	8,6	12,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.363.

Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2018.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Antes de las 12 de la noche	16,1	14,5	16,5	14,6	17,1	20,2	19,3
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	15,1	15,7	16,4	14,0	17,1	18,0	16,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	13,9	13,8	13,8	11,3	12,7	12,5	11,3
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	13,8	14,6	13,0	11,4	12,3	12,0	11,1
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	15,3	15,3	15,6	14,9	14,0	12,7	13,5
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,6	20,3	19,6	25,2	21,0	19,0	22,2
Después de las 8 de la mañana	5,2	5,9	5,1	8,6	5,8	5,6	6,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.364.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
No ha salido	29,8	8,2	5,4	0,7
Antes de las 12 de la noche	54,2	17,9	11,0	0,6
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	73,8	25,6	18,3	1,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	80,6	32,3	24,3	1,8
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	87,0	38,9	29,7	1,9
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	91,9	44,0	36,1	2,3
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	95,9	57,0	47,5	4,1
Después de las 8 de la mañana	96,5	61,7	55,2	11,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.365.

Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST  $\geq 4$ )\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018.

	Total estudiantes 14-18 años	Binge drinking últimos 30 días	Borrachera últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq 4$ )
Antes de las 12 de la noche	19,3	10,8	6,1	22,6	8,1
Entre las 12 y la 1	16,5	20,9	14,4	42,9	9,8
Entre la 1 y las 2	11,3	28,4	19,5	52,4	11,9
Entre las 2 y las 3	11,1	34,5	25,2	61,3	14,4
Entre las 3 y las 4	13,5	44,9	34,1	69,8	13,1
Entre las 4 y las 8 de la mañana	22,2	58,1	48,2	80,9	16,0
Después de las 8 de la mañana	6,2	65,9	53,5	81,4	29,4

Consumo problemático de cannabis (CAST  $\geq 4$ ). CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.366.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales\*) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018.




\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables, GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.367.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales\* e ilegales\*\*) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2018.



\* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes.

\*\* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.368.

Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (euros). España, 2016-2018.

	Total			Sexo				Edad			
	2014*	2016*	2018	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Dinero gastado para salir	15,08	18,03	14,25	15,48	13,13	11,77	13,19	14,43	15,84	13,98	18,37

\* Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.369.

Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso (euros). España, 2018.

Dinero gastado para salir		
Total alumnos	14,25	
Faltar a clase (hacer pellas)	18,41	
Sí	12,81	
No	17,90	
Repetir curso	13,12	
Sí		
No		

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.370.

Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas (euros). España, 2018.

	Dinero gastado para salir
Total alumnos	14,25
Total alumnos que no consumen nada	10,61
Drogas legales*	14,91
Drogas ilegales**	17,58
Alcohol últimos 12 meses	15,07
Borracheras últimos 12 meses	16,34
Binge drinking últimos 30 días	17,99
Tabaco últimos 12 meses	17,18
Tabaco diariamente últimos 30 días	22,42
Cigarrillos electrónicos AVV	16,17
Hipnosedantes últimos 12 meses	16,97
Bebidas energéticas últimos 30 días	16,48
Cannabis últimos 12 meses	18,11
Consumo problemático cannabis (CAST≥4)	26,17
Cocaína últimos 12 meses	31,58

\*\* Drogas legales: Alcohol, tabaco, hipnosedantes e inhalables volátiles

\*\* Drogas ilegales: Cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.371.

Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de tipo de estudios, titularidad del centro y notas que sacan habitualmente (euros). España, 2018.

	Dinero gastado para salir
Total alumnos	14,25
Titularidad del centro	Público
	14,05
Tipo de estudios	Privado
	14,65
Notas que sacan	ESO
	13,12
	Bachillerato
	FPB
	14,06
	FPGM
	22,61
	18,58
	Sobresaliente-notable
	12,98
	Bien-aprobado
	15,00
	Suspensos
	17,26

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.372.

Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los hobbies que practican (euros). España, 2018.

		Dinero gastado para salir
Total alumnos		14,25
Practico algún deporte	Poco	14,31
	Mucho	14,23
Leo libros	Poco	15,27
	Mucho	12,68
Salgo con amigos por las noches	Poco	10,94
	Mucho	15,52
Salgo con amigos por las tardes	Poco	13,90
	Mucho	14,21
Otros hobbies (toco un instrumento...)	Poco	15,22
	Mucho	13,28
Uso internet para divertirme	Poco	17,34
	Mucho	14,19
Visito páginas sólo para adultos	Poco	13,39
	Mucho	15,41
Voy de compras o compro a través de internet	Poco	11,84
	Mucho	15,45


\* Poco: (de 1 a 3 días al año o nunca)

\*\* Mucho: (diariamente o casi diariamente)

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.373.


Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (euros). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.374.

Dinero gastado a la semana para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (euros). España, 2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.375


Situación económica de la familia entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según consumo de sustancias en los últimos 30 días. España, 2018.

	Total estudiantes	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína
Por encima de la media	13,5	14,0	15,0	15,0	23,3
Más o menos como la media	82,0	81,5	79,4	79,0	64,5
Por debajo de la media	4,4	4,5	5,6	5,9	12,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.376.


Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.377.

Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.378.

Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor que conducía bajo los efectos del alcohol o alguna droga ilegal entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2018.

	Total	Hombres	Mujeres
<b>2016</b>			
Accidente sin especificar consumo	1,7	2,6	0,8
Alcohol	0,4	0,6	0,2
Cannabis	0,3	0,5	0,1
<b>2018</b>			
Accidente bajo los efectos del alcohol u otra droga	0,6	0,8	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.379.

Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido alcohol o alguna droga ilegal, según sexo (%). España, 2016-2018.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.380.

Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (%). España, 2018.

	Total	Sexo			Edad				
	2018	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
<b>He conducido un vehículo de motor</b>									
bajo los efectos del alcohol	2,7	4,0	1,5	0,8	1,7	3,0	4,1	6,2	2,5
<b>He conducido un vehículo de motor</b>									
bajo los efectos de hachís o marihuana	1,9	3,0	0,9	0,5	1,3	2,2	2,7	4,4	1,7
<b>He conducido un vehículo de motor</b>									
bajo los efectos de cocaína	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3
<b>He viajado como pasajero</b>									
de un vehículo de motor conducido por alguien									
bajo los efectos del alcohol	18,9	17,2	20,5	10,9	14,1	19,9	25,6	30,6	18,1
<b>He viajado como pasajero</b>									
de un vehículo de motor conducido por alguien									
bajo los efectos de hachís o marihuana	9,4	9,8	9,0	2,9	5,9	10,6	14,2	19,0	8,8
<b>He viajado como pasajero</b>									
de un vehículo de motor conducido por alguien									
bajo los efectos de cocaína	1,9	2,1	1,7	0,6	1,0	1,9	3,1	4,0	1,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



# Problemas relacionados con las drogas

## 2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2018

### 2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2018.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.2.

### Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2018.




Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2018.



	Primeros	Con tratamiento	Total	Primeros	Con tratamiento	Total
	tratamientos	previo		tratamientos	previo	
1991	681	262	–	2005	15.258	7.562
1992	932	367	–	2006	13.463	8.036
1993	1.146	431	–	2007	13.429	8.753
1994	1.265	491	–	2008	12.847	10.786
1995	1.415	516	–	2009	12.142	9.107
1996	1.892	932	–	2010	12.130	9.095
1997	3.129	1.402	–	2011	10.637	8.889
1998	4.174	1.838	–	2012	10.142	8.855
1999	6.126	2.576	–	2013	10.734	8.726
2000	5.499	2.773	–	2014*	9.683	8.182
2001	5.977	3.046	–	2015	8.445	7.248
2002	7.125	3.893	11.904	2016	9.052	7.678
2003	11.851	5.893	18.359	2017	10.393	9.025
2004	14.126	6.747	21.646	2018	10.871	9.226


Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2018.



	Primeros	Con tratamiento	Total		Primeros	Con tratamiento	Total	
	tratamientos	previo			tratamientos	previo		
1996	1.300	230	–		2008	5.058	2.055	7.419
1997	1.768	387	–		2009	7.273	1.705	9.503
1998	2.412	407	–		2010	8.639	2.101	11.192
1999	2.335	418	–		2011	9.736	2.603	12.873
2000	2.487	408	–		2012	10.982	3.402	14.869
2001	2.966	540	–		2013	12.912	3.585	16.914
2002	3.972	665	4.772		2014*	12.968	3.510	16.478
2003	4.613	871	5.711		2015	11.185	3.448	15.676
2004	5.319	928	6.500		2016	9.278	3.208	13.304
2005	4.426	844	5.524		2017	9.122	3.314	12.932
2006	4.125	941	5.304		2018	9.485	3.386	13.459
2007	4.619	1.114	5.936					


Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2018.



	Primeros	Con tratamiento		Primeros	Con tratamiento		Total
	tratamientos	previo	Total		tratamientos	previo	
1996	109	77	–	2008	463	352	845
1997	144	111	–	2009	598	312	963
1998	197	143	–	2010	580	323	944
1999	165	147	–	2011	709	386	1.143
2000	214	154	–	2012	648	421	1.083
2001	299	170	–	2013	787	374	1.175
2002	350	242	–	2014*	871	321	1.192
2003	382	225	–	2015	742	256	1.068
2004	441	224	693	2016	772	282	1.105
2005	383	209	618	2017	721	269	1.032
2006	466	223	717	2018	744	261	1.050
2007	503	261	795				

Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.6.


Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2018.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.7.


Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2018.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2018.



Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.9.


Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2018.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.10.

Número\* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2018.




\* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

\*\* En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.11.

Número\* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2018.




\* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

\*\* En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2018.



	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7		2003	33,9
1988	25,4	19,8		2004	35,4
1989	25,7	19,8		2005	35,6
1990	26,2	20,0		2006	36,4
1991	26,4	20,3		2007	36,8
1992	26,6	20,3		2008	37,5
1993	27,2	20,3		2009	37,9
1994	27,8	20,6		2010	38,4
1995	28,5	20,6		2011	39,3
1996	29,3	20,6		2012	40,4
1997	30,0	20,7		2013	40,8
1998	30,7	20,6		2014	40,9
1999	31,3	20,8		2015	41,3
2000	32,0	20,6		2016	41,6
2001	32,0	20,8		2017	42,6
2002	33,6	20,9		2018	43,0

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2018.




Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2018.



	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9		2003	29,8
1988	26,1	21,3		2004	30,0
1989	26,2	21,2		2005	30,5
1990	26,5	21,4		2006	31,2
1991	27,0	21,9		2007	31,7
1992	27,6	22,1		2008	32,1
1993	27,9	22,0		2009	32,5
1994	28,5	22,0		2010	33,3
1995	29,1	22,5		2011	33,9
1996	29,3	22,3		2012	34,5
1997	29,1	22,2		2013	35,0
1998	29,1	22,1		2014	35,3
1999	28,6	21,7		2015	36,0
2000	29,1	21,5		2016	36,0
2001	29,8	21,6		2017	36,6
2002	29,8	21,9		2018	36,6

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.15.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2018.



Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.16.


Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2018.



Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.  
FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.17.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2018.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada		Pulmonar	Inyectada	Esnifada	
1991	43,4	50,3	5,8		2006	73,8	15,5	9,6
1992	50,0	42,9	6,4		2007	77,4	12,8	8,9
1993	56,1	38,1	5,3		2008	78,5	12,4	7,7
1994	59,2	35,0	5,3		2009	79,7	11,3	7,5
1995	64,5	29,1	5,9		2010	82,0	10,6	5,9
1996	67,0	27,5	4,3		2011	77,7	12,8	7,1
1997	67,2	23,8	7,0		2012	78,3	11,6	6,7
1998	68,3	21,8	7,9		2013	79,6	11,0	6,8
1999	69,3	19,4	9,5		2014	80,6	7,4	6,0
2000	74,1	17,7	6,7		2015	83,7	7,6	6,6
2001	74,9	17,5	6,5		2016	84,7	7,9	6,2
2002	71,8	18,1	8,1		2016	84,7	7,9	6,2
2003	69,3	18,5	9,5		2017	83,0	9,3	6,5
2004	68,0	16,4	9,0		2018	85,8	6,4	5,8

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.18.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2018.




Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2018.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada		Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2	2005	80,6	11,5	5,2
1992	62,7	22,5	13,9	2006	86,0	12,5	0,8
1993	60,8	27,7	10,7	2007	88,0	10,0	1,0
1994	67,4	22,5	9,2	2008	86,9	10,7	1,0
1995	66,5	25,8	6,7	2009	87,7	9,7	1,2
1996	71,7	22,6	4,5	2010	86,8	10,5	1,4
1997	71,0	24,2	3,3	2011	85,5	11,7	0,9
1998	74,8	20,8	3,3	2012	88,3	8,3	1,0
1999	79,5	17,4	2,1	2013	83,8	12,3	1,2
2000	75,2	21,7	1,9	2014	82,6	12,0	0,7
2001	75,2	21,9	1,6	2015	83,5	12,9	0,4
2002	77,0	19,2	2,1	2016	83,9	12,3	0,4
2003	83,0	11,2	4,4	2017	84,3	12,6	0,3
2004	80,9	13,3	4,8	2018	83,6	13,3	0,4

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.20.


Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2018.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.21.

Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2018.




EL 74,5% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 25,5% restante (n= 6.585) que ha consumido otras sustancias (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.22.

Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2018.




Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015, 30% en 2016, 26,4% en 2017 y 24,6% en 2018.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.23.

Prevalencia (%) de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2018.



Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015, 30% en 2016, 26,4% en 2017 y 24,6% en 2018.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.24.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2018.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	20.981	28,4
Cocaína polvo	18.240	24,7
Cocaína base	2.732	3,7
Opioides	11.354	15,4
Heroína	10.086	13,7
Metadona (mal uso)	452	0,6
Otros opioides	817	1,1
Cannabis	13.459	18,2
Hipnosedantes	1.050	1,4
Estimulantes	941	1,3
Anfetaminas/metanfetamina	755	1,0
Éxtasis y derivados	72	0,1
Otros estimulantes	114	0,2
Alucinógenos	76	0,1
Inhalantes volátiles	26	0,0
Otras drogas ilegales	85	0,1
Alcohol	25.796	35,0
Total drogas ilegales	47.972	—
Total drogas ilegales y alcohol	73.768	—

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.25.

Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal por sexo. España, 2018.


	Hombres		Mujeres	
	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	18.029	30,2	2.933	21,0
Cocaína polvo	15.739	26,4	2.486	17,8
Cocaína base	2.282	3,8	446	3,2
Opioides	9.595	16,1	1.745	12,5
Heroína	8.677	14,5	1.396	10,0
Metadona (mal uso)	358	0,6	94	0,7
Otros opioides	560	0,9	255	1,8
Cannabis	10.781	18,1	2.670	19,1
Hipnosedantes	574	1,0	476	3,4
Estimulantes	760	1,3	181	1,3
Anfetaminas/metanfetamina	603	0,9	152	1,0
Éxtasis y derivados	56	0,1	16	0,1
Otros estimulantes	101	0,3	13	0,2
Alucinógenos	71	0,1	5	0,0
Inhalantes volátiles	25	0,0	1	0,0
Otras drogas ilegales	59	0,1	26	0,2
Alcohol	19.822	33,2	5.943	42,5
Total drogas ilegales	39.894		8.037	
Total drogas ilegales y alcohol	59.716		13.980	

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.26.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años\* y nacidos fuera de España) (%). España, 2018.



\* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede o no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.27.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años\* y nacidos fuera de España) (%). España, 2018.



\* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede o no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.28.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años\* y nacidos fuera de España) (%). España, 2018.




\* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.29.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2018.



Tasas brutas. Población de cada CCAA a 1 de enero de 2018 (Datos INE).

FUENTE: OEDA. Índicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.30.

**Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2018.**

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Total	47.972	21.382	24.663	39.894	8.037
Tratamiento previo (%)					
Sí	46,4	100,0	0,0	47,6	40,5
No	53,6	0,0	100,0	52,4	59,5
Edad media (años)	35,5	38,9	32,5	35,5	35,5
Sexo					
Hombre	83,2	85,5	81,5	100,0	0,0
Mujer	16,8	14,5	18,5	0,0	100,0
Máximo nivel de estudios* (%)					
Sin estudios	0,9	0,8	0,9	0,9	0,7
Primaria	54,7	56,7	53,6	55,9	48,8
Secundaria	39,8	38,4	40,6	39,0	43,9
Ha finalizado estudios superiores ISCED 5 a 8	4,6	4,0	4,8	4,1	6,6
Situación laboral (%)					
Trabajo	34,7	32,3	36,5	36,3	26,9
Parado no trabajado antes	6,2	5,8	6,6	5,9	7,6
Parado habiendo trabajado antes	38,2	43,6	33,9	37,5	41,4
Otras	20,9	18,5	23,0	20,3	24,1
Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	5,5	9,9	1,8	5,3	6,4
Médico general, Atención Primaria de Salud	11,3	7,6	14,4	11,0	12,8
Hospitales u otros servicios de salud	7,9	5,8	9,7	6,8	13,1
Servicios Sociales	3,4	2,3	4,4	2,5	7,7
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	6,5	8,8	4,3	7,2	3,1
Servicios legales o policiales	6,1	4,7	7,4	6,4	4,4
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Familiares y amigos	12,1	7,4	16,4	12,5	10,2
Iniciativa propia	44,9	52,0	38,6	46,0	39,6
Servicios de educación	0,5	0,2	0,7	0,4	0,5
Otra	1,7	1,3	2,1	1,6	2,1
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	14,6	17,4	12,3	14,8	14,0
Únicamente con pareja	12,2	12,7	11,7	11,5	15,9
Únicamente con hijos/as	2,6	2,4	2,7	1,4	8,2
Con la pareja e hijos/as	16,9	16,2	17,6	17,1	15,9
Con padres o familia de origen	39,2	34,4	43,6	40,2	34,2
Con amigos/as	3,5	3,9	3,0	3,4	3,9
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	6,1	7,3	4,8	6,8	2,4
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,9	3,4	2,5	2,8	3,4
Otros	2,1	2,3	2,0	2,0	2,2

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	86,6	83,1	89,9	86,0	89,7
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	6,4	7,9	4,8	7,2	2,5
Otras instituciones	2,7	3,3	2,2	2,5	3,3
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4
Alojamiento inestable/precario	2,8	3,9	1,8	2,8	2,9
Otros lugares	1,1	1,2	1,0	1,1	1,1
Español o extranjero					
Español	88,5	90,5	86,9	88,4	89,2
Extranjero	11,5	9,5	13,1	11,6	10,8
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	23,8	38,1	11,7	24,2	21,7
Heroína	21,2	35,5	9,0	21,9	17,4
Metadona	0,9	1,0	1,0	0,9	1,2
Otros opioides	1,7	1,6	1,7	1,4	3,2
Cocaína	43,6	43	44,0	45,1	36,4
CLH Cocaína	37,9	36,7	38,7	39,4	30,9
Cocaína base	5,7	6,2	5,3	5,7	5,5
Cocaína otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estimulantes sin cocaína	2,0	1,6	2,2	1,9	2,2
Anfetaminas	1,4	1,3	1,4	1,3	1,8
Metanfetaminas	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1
MDMA y derivados	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2
Otros estimulantes	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
Hipnosedantes	2,2	1,3	3,0	1,5	5,9
Alucinógenos	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Cannabis	28,0	15,8	38,4	26,9	33,3
Alcohol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras sustancias	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,9	19,6	20,1	19,5	21,8
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	46,7	43,1	49,6	45,8	50,7
4-6 días/semana	8,3	7,3	9,2	8,6	6,8
2-3 días/semana	14,6	13,0	16,1	15,1	12,3
1 día/semana	5,4	5,2	5,7	5,5	5,1
Menos de 1 día/semana	6,6	7,0	6,1	6,7	6,1
No consumió	18,3	24,4	13,3	18,2	19,0

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,0	4,5	7,3	5,0	11,2
Pulmonar	51,5	51,1	52,1	51,1	53,4
Intranasal	38,6	37,8	39,0	39,9	32,3
Parenteral	3,3	5,9	1,0	3,5	2,2
Otras	0,6	0,7	0,6	0,6	1,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	12,6	21,6	4,7	13,0	10,4
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	5,2	8,9	1,8	5,4	4,0
Prevalencia mínima VIH	3,6	5,9	1,6	3,5	3,9
Prevalencia máxima VIH	8,8	11,0	5,4	8,7	9,4
Prevalencia mínima Hepatitis C	6,5	11,7	2,1	6,6	6,0
Prevalencia máxima Hepatitis C	16,6	22,5	7,0	17,0	14,9
Prevalencia mínima Hepatitis B	0,6	0,8	0,4	0,6	0,4
Prevalencia máxima Hepatitis B	2,6	3,0	2,1	2,7	2,0

\* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido).

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en Hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, mas no inmune).

Nota: Debido al redondeo algunos totales no suman.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.31.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España 2013-2018.

	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Han consumido sólo alcohol	21.264	74,2	21.264	76,9	21.041	76,6	20.251	76,0	19.361	75,2	19.211	74,5
Han consumido alcohol y otras drogas	7.388	25,8	6.394	23,1	6.428	23,4	6.404	24,0	6.392	24,8	6.585	25,5
Una droga más	5.134	17,9	4.725	17,1	4.729	17,2	4.733	17,8	4.695	18,2	4.870	18,9
Dos drogas más	1.781	6,2	1.379	5,0	1.424	5,2	1.411	5,3	1.403	5,4	1.452	5,6
Tres o más drogas	473	1,7	290	1,0	275	1,0	260	0,9	294	1,1	263	1,0

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.32.

**Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2018.**

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	25.796	19.822	5.943	11.224	13.243
Tratamiento previo (%)					
Sí	45,9	46,0	45,6	100,0	0,0
No	54,1	54,0	54,4	0,0	100,0
Edad media (años)	46,8	46,7	47,2	47,8	45,9
Sexo (%)					
Hombre	76,9	100,0	0,0	77,1	76,9
Mujer	23,1	0,0	100,0	22,9	23,1
Máximo nivel de estudios (%)					
Sin estudios	0,8	0,9	0,5	0,7	0,9
Primaria	47,1	49,7	38,5	49,1	45,9
Secundaria	42,9	42,0	46,1	42,1	43,4
Ha finalizado estudios superiores	9,2	7,5	14,9	8,1	9,9
Situación laboral principal (%)					
Trabajo	42,4	43,9	37,2	37,3	46,6
Parado no trabajado antes	2,5	2,3	3,3	2,6	2,4
Parado habiendo trabajado antes	34,2	33,1	37,9	37,6	31,5
Otras	20,9	20,7	21,6	22,6	19,5
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	3,1	3,0	3,4	5,0	1,3
Médico general, Atención Primaria de Salud	25,8	25,9	25,6	19,9	31,0
Hospitales u otros servicios de salud	14,9	14,2	17,3	12,6	17,0
Servicios Sociales	4,9	4,3	7,1	5,0	5,0
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	2,0	2,5	0,5	2,2	1,7
Servicios legales o policiales	1,9	2,2	1,0	1,9	2,0
Empresas o empleador	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3
Familiares y amigos	11,1	11,6	9,4	9,2	13,0
Iniciativa propia	34,2	34,3	34,2	42,2	26,9
Servicios de educación	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Otra	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	21,4	21,5	21,3	23,8	19,6
Únicamente con pareja	16,6	15,9	18,8	15,9	16,9
Únicamente con hijos/as	5,4	3,1	13,2	4,7	5,9
Con la pareja e hijos/as	24,3	24,6	23,1	21,3	27,0
Con padres o familia de origen	22,9	24,8	16,7	23,3	22,7
Con amigos/as	3,2	3,1	3,5	3,3	3,0
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	2,2	2,7	0,5	2,2	1,9
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,7	2,9	1,9	3,8	1,8
Otros	1,3	1,4	1,0	1,6	1,2

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,4	90,3	95,3	89,4	93,6
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	2,1	2,6	0,5	2,2	1,9
Otras instituciones	2,2	2,3	1,8	3,1	1,5
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,6	0,5	0,7	0,5
Alojamieto inestable/precarios	2,6	2,9	1,5	3,2	1,9
Otros lugares	1,1	1,2	0,5	1,5	0,7
Nacidos fuera de España (%)	13,7	12,6	17,3	10,7	16,1
Otras sustancias consumidas en los últimos 30 días (%)					
Opioides	4,1%	4,3%	3,5%	4,3%	3,2%
Cocaína	64,5%	64,0%	64,1%	66,0%	56,5%
Estimulantes sin cocaína	3,9%	3,4%	3,9%	3,7%	4,9%
Hipnosedantes	6,3%	7,1%	5,3%	4,9%	13,5%
Alucinógenos	0,7%	0,4%	0,8%	0,6%	1,1%
Sustancias volátiles	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
Cannabis	50,0%	49,2%	50,6%	50,6%	47,0%
Otras sustancias psicoactivas	0,7%	0,4%	0,6%	0,6%	0,7%
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	18,1	17,8	18,3	17,3	21,0
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	58,3%	56,1%	60,1%	59,1%	55,7%
4-6 días a la semana	6,9%	6,3%	7,5%	6,7%	7,7%
2-3 días a la semana	11,1%	9,8%	12,3%	10,9%	11,7%
1 día a la semana	4,1%	3,7%	4,6%	4,0%	4,6%
Menos de 1 día a la semana	5,1%	5,7%	4,6%	4,9%	5,6%
No consumió	14,4%	18,5%	10,9%	14,3%	14,6%
Inyección alguna vez en la vida	3,1%	3,8%	2,4%	3,4%	2,1%
Inyección últimos 12 meses	0,6%	0,7%	0,4%	0,6%	0,4%
Inyección últimos 30 días	0,4%	0,5%	0,3%	0,4%	0,3%
Prevalencia de VIH mínima	1,1%	1,3%	1,0%	1,2%	0,9%
Prevalencia de Hepatitis C mínima	2,4%	3,3%	1,8%	2,5%	2,1%
Prevalencia Hepatitis B mínima	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%

\* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.33.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2018.

	Alcohol	CLH Cocaína	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes*	Otros opioides	Metadona	Alucinógenos	Sust. volátiles
Total	25.796	18.240	13.459	10.086	2.732	1.050	941	816	452	76	26
Tratamiento previo											
Si	45,9	45,2	26,3	77,2	50,5	26,0	39,0	45,7	46,8	36,8	19,2
No	54,1	54,8	73,7	22,8	49,5	74,0	61,0	54,3	53,2	63,2	80,8
Sexo											
Hombre	76,9	86,4	80,2	86,1	83,7	54,7	80,8	68,7	79,2	93,4	96,2
Mujer	23,1	13,6	19,8	13,9	16,3	45,3	19,2	31,3	20,8	6,6	3,8
Edad calculada	46,8	36,5	26,6	43,0	37,6	43,1	35,2	44,7	45,7	32,3	28,0
Máximo nivel de estudios											
Sin estudios	0,8	0,5	0,8	1,6	0,8	1,3	0,2	0,8	1,9	0,0	8,3
Primaria	47,1	49,5	54,7	65,3	57,5	52,6	38,7	53,1	69,6	30,1	62,5
Secundaria	42,9	44,5	40,8	30,4	38,2	34,7	49,0	38,3	24,9	61,6	29,2
Estudios superiores	9,2	5,5	3,7	2,6	3,5	11,5	12,0	7,8	3,5	8,2	0,0
Situación laboral											
Trabajando	42,4	50,4	25,4	21,5	28,4	26,4	44,3	22,9	23,1	54,1	16,0
Parado, no habiendo trabajado antes	2,5	3,4	9,3	7,0	6,8	7,6	5,6	5,5	9,0	5,4	4,0
Parado, habiendo trabajado antes	34,2	36,1	29,0	50,6	49,9	41,4	38,3	38,2	46,2	29,7	32,0
Otras situaciones	20,9	10,1	36,4	20,9	14,9	24,6	11,9	33,5	21,7	10,8	48,0
Extranjero											
Español	86,3	90,8	85,9	88,2	88,8	89,5	84,4	88,1	90,4	86,5	38,5
Extranjero	13,7	9,2	14,1	11,8	11,2	10,5	15,6	11,9	9,6	13,5	61,5
Fuente de referencia principal											
Otros servicios tto. drogodep.	3,1	3,9	2,0	12,2	6,0	2,5	6,0	12,3	17,6	2,7	3,8
Médico general, At. Primaria	25,8	13,3	12,4	4,6	9,8	24,1	14,1	20,7	5,3	10,8	7,7
Hospitales/ otros serv. salud	14,9	6,9	11,6	2,7	5,0	20,6	13,9	17,9	4,5	9,5	11,5
Servicios Sociales	4,9	2,4	6,5	1,5	3,1	2,5	4,1	1,5	1,3	0,0	19,2
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	2,0	4,1	5,7	12,5	7,7	4,9	5,7	3,5	6,2	8,1	7,7
Servicios legales o policiales	1,9	4,4	11,8	2,3	5,7	2,4	7,3	2,7	1,3	2,7	3,8
Empresas o empleador	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
Familiares y amigos	11,1	13,6	16,1	5,6	11,6	8,7	14,1	4,5	2,7	9,5	0,0
Iniciativa propia	34,2	50,1	29,6	57,2	49,8	32,7	33,4	35,0	59,5	55,4	15,4
Servicios de educación	0,1	0,1	1,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0
Otra	1,6	1,2	2,9	1,4	1,3	1,6	1,2	1,4	1,1	1,4	30,8

	Alcohol	CLH Cocaína	Cannabis	Heroína	Cocaina base	Hipnosedantes	Estimulantes*	Otros opioides	Metadona	Alucinógenos	Sust. volátiles
Nº hijos	1,3	1,0	0,5	1,1	1,0	1,1	0,5	1,2	1,2	0,3	0,3
Convivencia											
Solo/a	21,4	14,0	9,4	20,7	16,5	20,0	21,4	17,3	20,3	20,5	10,5
Únicamente con pareja	16,6	14,3	8,5	12,6	11,3	13,9	13,4	17,2	19,4	17,8	10,5
Únicamente con hijos/as	5,4	3,2	1,6	2,0	2,3	6,3	3,0	4,8	4,1	1,4	0,0
Con la pareja e hijos/as	24,3	24,1	10,3	13,4	14,9	19,5	8,4	22,1	17,8	6,8	5,3
Con padres o familia origen	22,9	34,4	56,5	28,9	36,1	29,2	37,3	23,0	24,6	31,5	21,1
Con amigos/as	3,2	2,7	2,8	5,2	4,3	2,6	6,9	4,6	2,7	15,1	5,3
Detenido (ej. centro penitenciario o inserción social)	2,2	4,6	4,2	10,9	9,1	4,9	4,7	4,0	5,9	5,5	5,3
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,7	1,5	4,2	3,3	3,2	2,5	4,2	5,6	1,1	0,0	31,6
Otros	1,3	1,4	2,3	3,0	2,3	1,1	0,8	1,4	4,1	1,4	10,5
Lugar vive											
Casas, pisos, apartamentos	91,4	91,4	88,9	76,3	80,5	89,3	86,4	87,0	83,5	93,3	40,0
Prisión, centro reforma o internamiento para menores	2,1	4,8	4,5	11,2	9,9	4,5	5,5	3,6	7,7	6,7	8,0
Otras instituciones	2,2	1,4	3,8	3,3	2,6	2,0	3,2	4,3	2,0	0,0	32,0
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,3	0,3	0,8	0,6	0,4	0,4	1,0	0,7	0,0	4,0
Alojamieto inestable/precarios	2,6	1,4	1,5	6,6	4,6	2,9	2,7	2,9	3,8	0,0	12,0
Otros lugares	1,1	0,6	1,0	1,7	1,8	0,9	1,8	1,3	2,3	0,0	4,0
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días											
Opioides	4,1	3,1	2,8	9,8	24,6	11,4	1,1	10,2	23,2	0,0	0,0
Cocaína	64,5	0,3	39,5	46,7	2,9	33,8	28,2	44,4	21,9	47,8	0,0
Estimulantes sin cocaína	3,9	5,1	9,5	1,4	4,7	5,5	8,3	2,0	1,3	17,4	28,6
Hipnosedantes	6,3	4,5	5,5	12,8	12,5	0,0	7,5	15,1	17,9	2,2	0,0
Alucinógenos	0,7	0,9	1,7	0,3	1,0	0,3	6,0	0,7	0,9	0,0	0,0
Sustancias volátiles	0,1	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0
Cannabis	50,0	50,1	0,0	51,8	57,3	55,4	50,8	44,7	52,2	63,0	85,7
Alcohol	0,0	71,3	71,5	32,4	50,8	48,7	49,1	30,6	40,6	30,4	28,6
Otras sustancias psicoactivas	0,7	0,4	0,7	0,2	0,9	0,6	1,3	0,7	0,0	2,2	0,0

	Alcohol	CLH Cocaína	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes*	Otros opioides	Metadona	Alucinógenos	Sust. volátiles
Edad de inicio droga principal	18,1	20,7	15,4	21,7	20,9	29,4	22,6	30,7	28,6	21,7	20,4
Frecuencia de consumo de la droga principal											
Todos los días	58,3	24,3	68,2	53,9	40,2	84,6	31,8	68,5	85,8	31,3	33,3
4-6 días a la semana	6,9	12,3	5,6	5,2	11,0	2,1	9,5	3,4	1,4	10,4	0,0
2-3 días a la semana	11,1	24,3	7,5	7,8	18,3	3,0	20,4	3,0	2,1	25,4	33,3
1 día a la semana	4,1	9,9	2,3	2,6	4,8	1,3	7,2	0,9	1,4	4,5	8,3
Menos de 1 día a la semana	5,1	10,9	3,3	3,6	7,3	1,4	11,4	1,7	1,6	10,4	16,7
No consumió	14,4	18,3	13,1	26,9	18,4	7,5	19,7	22,5	7,8	17,9	8,3
Vía de administración droga principal											
Oral	99,5	2,8	1,5	0,6	0,1	98,8	22,7	43,2	91,8	36,8	0,0
Pulmonar o fumada	0,3	2,6	97,9	79,2	94,6	0,6	11,4	33,0	5,8	3,9	54,2
Intranasal o esnifada	0,1	93,0	0,5	6,4	4,9	0,5	61,8	7,3	0,9	57,9	41,7
Inyectada o parenteral	0,0	0,9	0,0	12,8	0,3	0,1	3,9	9,9	1,6	1,3	0,0
Otras	0,1	0,6	0,2	1,0	0,1	0,1	0,2	6,5	0,0	0,0	4,2
Inyección drogas											
Alguna vez en la vida	3,1	3,3	2,2	42,0	11,5	6,0	9,7	29,0	34,2	5,9	0,0
Últimos 12 meses	0,6	1,5	0,5	18,0	3,4	1,1	6,7	14,2	7,1	2,0	0,0
Últimos 30 días	0,4	1,4	0,3	16,0	2,2	0,8	5,4	12,3	4,1	2,0	0,0
Prevalencia máxima VIH	3,0	3,5	3,6	17,8	6,1	10,2	18,6	15,7	19,7	15,2	25,0
Prevalencia máxima Hepatitis C	6,8	4,8	4,4	38,6	13,4	12,5	14,1	27,2	31,6	0,0	12,5
Prevalencia máxima Hepatitis B	2,5	1,3	1,8	5,1	2,7	1,3	1,7	3,4	4,2	5,6	0,0
Prevalencia mínima VIH	1,1	1,4	1,0	10,1	2,9	3,8	8,3	7,2	9,3	6,6	7,7
Prevalencia mínima Hepatitis C	2,4	1,8	1,2	21,5	6,1	4,5	5,5	12,3	14,6	0,0	3,8
Prevalencia mínima Hepatitis B	1,6	0,8	0,9	4,1	2,1	0,8	1,1	2,5	3,4	5,0	0,0

\* Estimulantes sin cocaína.

Notas:

- Prevalencia mínima: positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocidos).
- Prevalencia máxima: positivos entre los casos con información (incluye positivos y negativos); en Hepatitis B, portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune.
- El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.34.

**Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento por sexo. España, 2018.**

	Alcohol		CLH Cocaína		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Total	19.822	5.943	15.739	2.486	10.781	2.670	8.677	1.396	2.282	446	574	476	760	181
<b>Tratamiento previo</b>														
Sí	46,0	45,6	45,9	40,9	26,9	23,8	77,3	76,5	51,0	47,4	29,9	21,1	38,3	42,0
No	54,0	54,4	54,1	59,1	73,1	76,2	22,7	23,5	49,0	52,6	70,1	78,9	61,7	58,0
Edad calculada	46,7	47,2	36,3	37,2	26,6	26,6	43,3	41,6	37,6	37,6	39,2	47,8	35,4	34,7
<b>Máximo nivel de estudios</b>														
Sin estudios	0,9	0,5	0,5	0,6	0,9	0,3	1,7	1,5	0,8	0,9	1,8	0,6	0,1	0,6
Primaria	49,7	38,5	50,3	44,2	56,0	49,4	66,8	56,0	58,5	52,0	55,8	48,7	39,2	37,0
Secundaria	42,0	46,1	44,0	48,2	40,0	44,2	29,1	38,5	37,2	43,2	33,3	36,3	48,2	52,6
Estudios superiores	7,5	14,9	5,2	7,1	3,1	6,1	2,4	4,0	3,5	3,9	9,1	14,4	12,6	9,8
<b>Situación laboral</b>														
Trabajando	43,9	37,2	52,5	37,4	26,0	22,8	22,1	17,5	29,8	21,4	25,2	27,9	46,1	36,9
Parado, no habiendo trabajado antes	2,3	3,3	3,2	4,6	9,4	8,8	6,3	10,7	6,0	10,7	9,2	5,7	5,5	6,1
Parado, habiendo trabajado antes	33,1	37,9	34,7	44,8	28,3	31,7	50,2	53,1	49,4	52,6	44,1	38,1	37,8	40,2
Otras situaciones	20,7	21,6	9,6	13,2	36,3	36,7	21,3	18,7	14,8	15,3	21,5	28,3	10,7	16,8
<b>Extranjero</b>														
Español	87,4	82,7	91,1	88,8	85,0	89,5	88,1	88,3	88,9	88,6	87,3	92,1	83,8	86,7
Extranjero	12,6	17,3	8,9	11,2	15,0	10,5	11,9	11,7	11,1	11,4	12,7	7,9	16,2	13,3
<b>Fuente de referencia principal</b>														
Otros servicios tto. drogodep.	3,0	3,4	3,8	4,5	2,0	1,8	11,2	18,7	5,8	7,4	3,5	1,3	5,5	7,8
Médico general, At. Primaria	25,9	25,6	13,2	13,5	12,1	13,5	4,6	4,1	9,7	10,1	21,5	27,3	14,0	14,5
Hospitales/otros serv. salud	14,2	17,3	6,0	12,2	10,5	16,1	2,5	4,1	4,9	5,4	17,7	24,2	13,1	17,3
Servicios Sociales	4,3	7,1	1,4	8,7	5,4	10,8	1,3	3,1	2,2	7,6	2,1	3,0	3,3	7,3
Prisión, centro reforma o de internamiento menores	2,5	0,5	4,4	1,7	6,3	3,2	13,5	6,2	8,1	5,2	7,7	1,5	6,6	1,7
Servicios legales o policiales	2,2	1,0	4,6	3,2	12,7	8,0	2,4	2,1	6,2	2,7	3,5	1,1	7,4	6,7
Empresas o empleador	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Familiares y amigos	11,6	9,4	14,2	9,8	16,8	13,3	5,6	4,9	11,3	12,8	7,3	10,4	13,9	15,1
Iniciativa propia	34,3	34,2	51,0	44,6	29,8	28,7	57,5	55,3	50,5	46,5	34,8	30,1	34,7	27,9
Servicios de educación	0,1	0,1	0,1	0,1	1,4	1,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Otra	1,7	1,4	1,1	1,5	2,8	3,2	1,4	1,5	1,1	2,2	1,9	1,3	1,1	1,7

	Alcohol		CLH Cocaína		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº hijos	1,2	1,4	0,9	1,3	0,5	0,7	1,0	1,5	0,9	1,5	0,9	1,5	0,4	0,7
Convivencia														
Solo/a	21,5	21,3	13,9	14,1	9,3	9,7	20,9	19,3	16,5	16,4	21,2	18,5	21,6	20,3
Únicamente con pareja	15,9	18,8	14,1	15,2	7,7	11,5	11,0	22,5	10,3	16,4	10,5	18,0	12,8	15,7
Únicamente con hijos/as	3,1	13,2	1,9	11,6	0,7	5,2	1,4	6,2	1,3	7,4	2,0	11,5	1,8	8,1
Con la pareja e hijos/as	24,6	23,1	24,4	21,9	10,1	11,1	13,7	11,5	15,9	9,9	15,7	24,1	8,4	8,7
Con padres o familia origen	24,8	16,7	35,2	28,8	57,9	50,8	30,2	20,9	36,8	32,3	35,1	22,0	37,5	36,6
Con amigos/as	3,1	3,5	2,5	4,0	2,8	3,0	5,1	5,8	4,0	6,2	3,4	1,7	7,6	4,1
Detenido (ej. centro penitenciario o inserción social)	2,7	0,5	5,1	1,2	4,9	1,5	11,7	6,1	9,9	5,1	7,5	1,7	5,4	1,7
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,9	1,9	1,4	1,8	4,1	4,7	3,1	4,2	3,0	4,4	3,6	1,3	4,3	3,5
Otros	1,4	1,0	1,4	1,5	2,3	2,5	2,9	3,5	2,4	1,8	1,1	1,1	0,7	1,2
Lugar vive														
Casas, pisos, apartamentos	90,3	95,3	91,1	93,6	88,1	92,0	76,0	78,3	80,4	81,1	83,6	96,2	85,8	88,8
Prisión, centro de reforma o internamiento menores	2,6	0,5	5,4	1,6	5,3	1,6	12,1	6,0	10,6	6,1	7,4	1,1	6,6	0,6
Otras instituciones	2,3	1,8	1,3	2,2	3,7	4,2	3,1	4,4	2,4	3,6	2,6	1,3	2,8	5,1
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,8	0,8	0,6	0,7	0,4	0,4	0,5	0,0
Alojamiento inestable/precario	2,9	1,5	1,3	1,6	1,6	1,1	6,4	8,2	4,1	7,2	4,4	1,1	2,7	2,8
Otros lugares	1,2	0,5	0,6	0,6	1,0	1,1	1,6	2,3	1,9	1,4	1,6	0,0	1,6	2,8
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días														
Opioides	4,3	3,2	2,9	4,5	2,9	2,1	9,5	11,9	23,6	30,7	14,1	3,4	1,4	0,0
Cocaína	66,0	56,5	0,3	0,7	40,3	35,9	45,7	53,3	2,8	3,6	39,5	17,2	27,7	30,8
Estimulantes sin cocaína	3,7	4,9	5,0	5,7	9,3	11,0	1,3	1,9	4,9	3,6	6,3	3,4	9,3	3,3
Hipnosedantes	4,9	13,5	4,1	7,3	5,7	4,9	12,7	13,2	13,0	8,8	0,0	0,0	8,6	2,2
Alucinógenos	0,6	1,1	0,9	0,5	1,6	2,3	0,3	0,1	1,0	0,8	0,4	0,0	5,9	6,6
Sustancias volátiles	0,1	0,0	0,0	0,1	0,7	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
Cannabis	50,6	47,0	50,8	44,9	0,0	0,0	52,7	45,3	58,6	49,4	61,7	36,8	52,4	42,9
Alcohol	0,0	0,0	72,0	66,2	71,9	69,6	34,0	21,8	51,7	45,4	46,9	54,0	47,6	56,0
Otras sustancias psicoactivas	0,6	0,7	0,4	0,2	0,7	0,6	0,2	0,1	1,0	0,0	0,0	2,3	1,6	0,0

	Alcohol		CLH Cocaína		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Edad de inicio droga principal	17,3	21,0	20,3	23,0	15,3	16,1	21,5	23,2	20,6	22,8	26,2	33,3	22,7	22,0
Frecuencia de consumo de la droga principal														
Todos los días	59,1	55,7	24,2	24,8	68,6	66,5	54,4	50,8	39,5	44,4	82,2	87,4	31,5	32,8
4-6 días a la semana	6,7	7,7	12,7	10,3	5,8	5,0	5,1	5,5	11,1	10,5	2,8	1,3	9,5	9,6
2-3 días a la semana	10,9	11,7	24,5	23,1	7,5	7,4	8,1	5,8	18,6	16,7	2,8	3,2	20,7	19,2
1 día a la semana	4,0	4,6	9,8	10,3	2,2	2,5	2,6	2,9	4,6	5,5	1,8	0,9	7,5	5,6
Menos de 1 día a la semana	4,9	5,6	10,8	11,5	3,2	3,8	3,5	3,8	7,8	4,6	1,9	0,9	11,3	11,9
No consumió	14,3	14,6	18,0	20,0	12,7	14,7	26,2	31,3	18,5	18,3	8,5	6,4	19,5	20,9
Vía de administración droga principal														
Oral	99,5	99,6	2,8	3,1	1,4	1,6	0,6	0,6	0,1	0,0	98,4	99,2	22,6	23,2
Pulmonar o fumada	0,3	0,2	2,6	2,7	97,9	97,6	79,1	80,5	94,8	93,3	0,9	0,2	12,7	6,1
Intranasal o esnifada	0,1	0,1	93,1	92,4	0,5	0,5	6,2	8,0	4,6	6,3	0,5	0,4	59,8	70,2
Inyectada o parenteral	0,0	0,0	0,9	0,7	0,1	0,0	13,2	9,9	0,3	0,4	0,2	0,0	4,8	0,0
Otras	0,0	0,1	0,6	1,1	0,2	0,2	0,9	1,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,6
Inyección drogas														
Alguna vez en la vida	3,4	2,1	3,2	3,8	2,3	1,5	42,5	38,9	11,2	13,0	9,1	2,2	10,7	5,4
Últimos 12 meses	0,6	0,4	1,5	1,6	0,5	0,2	18,4	15,4	3,2	4,3	2,0	0,0	8,0	1,3
Últimos 30 días	0,4	0,3	1,4	1,4	0,3	0,2	16,5	13,2	2,1	3,3	1,4	0,0	6,5	0,7
Prevalencia máxima de VIH	3,2	2,5	3,4	3,9	3,5	3,8	17,1	22,2	6,1	6,3	13,6	4,7	21,6	6,9
Prevalencia máxima Hepatitis C	7,1	5,8	4,8	4,7	4,5	4,1	38,8	38,0	12,7	16,9	15,2	7,9	15,8	7,7
Prevalencia máxima Hepatitis B	2,5	2,6	1,2	1,6	1,8	1,8	5,2	4,3	3,1	0,0	2,0	0,0	1,7	1,9
Prevalencia mínima VIH	1,2	0,9	1,3	1,7	0,9	1,2	9,6	13,5	2,9	2,9	5,7	1,5	9,5	3,3
Prevalencia mínima Hepatitis C	2,5	2,1	1,7	1,9	1,2	1,2	21,3	22,5	5,9	7,6	6,3	2,3	6,1	3,3
Prevalencia mínima Hepatitis B	1,6	1,7	0,7	1,1	0,9	1,0	4,2	3,5	2,4	0,0	1,4	0,0	1,1	1,2

\* Estimulantes sin cocaína.

Notas:

– Prevalencia mínima: positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocidos). En Hepatitis B, portador crónico entre el total (incluye portador crónico, inmune, no inmune, pendiente de resultado y desconocidos).

– Prevalencia máxima: positivos entre los casos con información (incluye positivos y negativos); en Hepatitis B, portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune.

– El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.


– El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2018

### 2.2.1.

Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España\*, 1996-2018.




\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias. \*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.2.

### Evolución del número de urgencias relacionadas con analgésicos opioides. España, 2005-2018.



#### Urgencias relacionadas

#### con analgésicos opioides

Año	Número de urgencias
2005	50
2006	46
2007	55
2008	59
2009	44
2010	53
2011	64
2012	62
2013	76
2014	73
2015	76
2016	59
2017	88
2018	115

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.2.3.

Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España\*, 1996-2018.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol**	Cannabis	Hipnóticos y sedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y derivados	Alucinógenos	Sustancias volátiles
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4
2014	6.441	43,7	38,7	35,5	18,5	10,3	8,6	7,6	4,5	2,5	0,3
2015	5.238	43,5	39,8	42,2	18,2	11,2	8,0	7,4	3,7	1,6	0,3
2016	4.565	42,5	43,9	40,1	20,5	8,6	7,5	7,7	3,2	1,5	0,3
2017	4.293	50,2	37,1	50,3	16,9	9,0	8,7	10,3	2,8	1,5	0,5
2018	5.027	52,0	39,0	49,4	17,9	7,4	7,6	10,1	3,4	1,4	0,5

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.4.

### Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España\*, 1996-2018.

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NÚMERO DE EPISODIOS																					
2.585 1.932 2.099 2.141 2.328 2.145 2.673 5.828 7.089 7.042 7.822 6.431 5.567 5.626 5.279 5.999 5.715 6.441 5.238 4.565 4.293 5.027																					
EDAD MEDIA (años)																					
27,8	28,1	29,1	29,4	30,3	29,8	29,8	31,0	30,7	31,6	32,0	32,4	33,0	32,6	32,7	32,8	33,0	33,2	34,1	34,3	34,6	34,8
SEXO (%)																					
Mujeres																					
21,4	20,8	23,1	23,5	27,4	27,1	27,4	28,0	25,0	26,1	23,4	22,7	21,6	26,3	24,7	26,1	26,1	24,5	22,6	22,6	22,7	25,3
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS RELACIONADAS <sup>1</sup> (%)																					
Heroína																					
56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	17,2	17,1	17,8	14,2	13,0	11,9	10,3	11,2	8,6	9,0	7,4
Otros opiodes																					
13,5	17,4	16,8	18,9	18,0	17,4	13,1	9,1	8,3	8,5	8,1	7,5	7,6	6,7	6,2	6,1	5,7	7,6	7,4	7,7	10,3	10,1
Cocaína																					
19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	55,1	51,1	49,5	45,2	46,0	44,9	43,7	43,5	42,5	50,2	52,0
Anfetaminas																					
2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	4,4	4,6	5,5	9,2	8,9	9,0	8,6	8,0	7,5	8,7	7,6
MDMA y derivados																					
1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	4,2	2,4	2,9	3,9	4,6	4,8	4,5	3,7	3,2	2,8	3,4
Hipnosedantes																					
23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	15,6	16,5	16,7	18,9	18,3	17,8	18,5	18,1	20,5	16,9	17,9
Cannabis																					
6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	24,7	29,5	30,5	33,3	33,0	34,6	35,5	42,2	40,1	50,3	49,4
Alucinógenos																					
2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	2,6	1,7	2,1	2,5	2,6	2,5	1,6	1,5	1,5	1,4
Inhalables volátiles																					
0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Alcohol*																					
12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	37,3	40,2	36,3	40,4	39,0	38,7	38,7	39,8	43,9	37,1	39,0
CONDICIÓN LEGAL (%)																					
Detenido																					
14,4	22,4	11,7	9,4	6,4	5,7	5,2	4,1	4,9	3,7	3,8	4,4	4,9	4,2	3,7	4,1	3,8	4,3	2,7	3,7	3,4	3,4
RESOLUCIÓN URGENCIA (%)																					
Alta médica																					
80,5	82,0	81,2	80,9	78,7	79,1	82,1	81,4	79,1	76,2	79,1	80,0	80,9	79,6	75,4	75,9	72,8	69,8	72,2	71,6	71,1	72,7
Alta voluntaria																					
7,0	6,7	8,8	8,6	8,5	7,5	7,4	5,3	6,7	8,6	7,8	8,5	8,2	7,0	8,5	8,2	9,4	9,9	8,2	8,2	8,3	8,4
Ingreso hospitalario																					
7,6	7,2	6,0	6,5	8,3	7,8	6,3	8,0	8,4	8,8	9,0	7,8	8,1	10,2	12,5	12,5	14,8	15,9	16,0	17,0	17,1	15,2
Muerte en urgencias																					
0,1	0,1	0,0	0,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Traslado a otro centro																					
4,8	4,1	3,9	3,9	3,7	5,4	4,0	5,3	5,7	6,3	4,1	3,7	2,8	3,2	3,6	3,3	2,9	4,2	3,6	3,1	3,5	3,7

1. Incluye las sustancias para las que el médico expresa en la historia clínica una relación directa con la urgencia.

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.5.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España\*, 2018.

	Total	Según sexo					Según droga						
		Hombres	Mujeres	Cocaina	Alcohol**	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Número de episodios	5.027	3.747	1.266	2.448	1.835	2.323	840	349	357	473	161	65	23
Edad media (años)	34,8	34,9	34,5	36,4	35,4	31,1	37,5	40,2	31,8	42,5	28,3	31,7	30,9
Sexo (%) mujeres	25,3			21,8	22,8	22,7	27,7	17,2	25,6	29,6	21,9	27,7	34,8
Detenidos (%)	3,4	3,8	2,3	3,3	3,8	3,8	2,8	3,8	4,1	4,5	4,8	2,0	5,0
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	72,7	73,0	72,3	73,6	74,6	71,9	70,5	69,0	72,7	68,9	80,4	70,3	65,2
Alta voluntaria	8,4	8,9	7,0	8,6	8,8	7,6	7,7	8,7	7,3	8,7	10,8	15,6	4,3
Ingreso hospitalario	15,2	14,7	16,4	13,8	12,8	16,6	16,6	19,1	16,1	18,3	6,3	4,7	21,7
Muerte en urgencias	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	3,7	3,4	4,2	4,1	3,8	3,9	5,2	3,2	3,9	4,1	2,5	9,4	8,7


\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.6.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España\*, 2018.



## 2.2.7.

**Evolución vía de administración (número y porcentaje) de los episodios de urgencias hospitalarias en consumidores de drogas, según tipo de droga. España\*, 2011-2018.**

Drogas y vía de administración	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>HEROÍNA</b>								
Oral	1,6	0,8	0,2	1,5	1,5	2,2	2,7	9,0
Pulmonar o fumada	35,4	25,4	30,6	25,7	26,0	50,0	61,0	50,7
Intranasal o esnifada	6,8	8,9	9,5	5,2	5,3	6,7	5,1	11,9
Parenteral o inyectada	56,3	64,9	59,6	67,7	68,5	41,1	30,7	27,9
Otra vía	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>OTROS OPIODES</b>								
Oral	94,5	96,8	98,7	89,3	85,0	91,3	95,1	95,9
Pulmonar o fumada	1,1	0,8	0,4	1,8	3,2	1,7	1,4	0,8
Intranasal o esnifada	1,8	1,0	0,1	0,0	2,4	0,4	0,0	0,6
Parenteral o inyectada	1,9	0,8	0,5	7,7	7,3	6,1	1,6	1,1
Otra vía	0,7	0,6	0,2	1,2	2,0	0,4	1,9	1,6
<b>COCAÍNA</b>								
Oral	1,4	1,0	0,5	2,3	2,0	3,3	2,5	1,6
Pulmonar o fumada	20,8	18,2	18,5	10,4	18,4	17,9	11,1	11,8
Intranasal o esnifada	61,9	57,5	61,2	72,7	71,6	73,5	85,6	85,1
Parenteral o inyectada	15,8	23,1	19,6	14,4	10,0	8,6	3,3	1,5
Otra vía	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
<b>ANFETAMINAS</b>								
Oral	81,6	78,0	69,9	71,9	68,2	65,9	72,3	75,0
Pulmonar o fumada	5,3	5,9	10,6	4,5	7,1	4,8	9,9	2,4
Intranasal o esnifada	12,5	16,1	18,7	21,9	24,7	27,8	17,7	22,6
Parenteral o inyectada	0,3	0,0	0,4	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0
Otra vía	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MDMA</b>								
Oral	97,3	97,4	98,6	95,3	92,1	98,1	100,0	96,2
Pulmonar o fumada	1,4	1,1	0,0	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0
Intranasal o esnifada	0,9	1,6	0,0	2,4	4,8	1,9	0,0	3,8
Parenteral o inyectada	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Otra vía	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>HIPNOSEDANTES</b>								
Oral	99,5	99,3	99,5	98,8	99,3	99,5	98,5	99,1
Pulmonar o fumada	0,1	0,2	0,2	0,8	0,2	0,3	0,7	0,6
Intranasal o esnifada	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,0
Parenteral o inyectada	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3
Otra vía	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0

Drogas y vía de administración	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>CANNABIS</b>								
Oral	2,6	2,4	2,2	5,3	4,3	5,1	1,8	4,8
Pulmonar o fumada	96,6	97,3	97,3	93,5	95,5	94,8	98,1	94,8
Intranasal o esnifada	0,6	0,3	0,4	0,7	0,2	0,1	0,0	0,2
Parenteral o inyectada	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Otra vía	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
<b>ALUCINÓGENOS</b>								
Oral	72,9	73,3	54,8	37,1	76,1	82,8	77,8	86,6
Pulmonar o fumada	15,3	2,7	11,3	2,2	13,0	3,4	0,0	6,7
Intranasal o esnifada	11,9	14,7	17,7	16,9	2,2	13,8	22,2	6,7
Parenteral o inyectada	0,0	6,7	16,1	43,8	8,7	0,0	0,0	0,0
Otra vía	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.8.

**Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España\*, 2018.**

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	52,0	53,9	46,3
Cannabis	49,4	50,6	45,7
Alcohol**	39,0	39,9	36,3
Hipnosedantes	17,9	17,0	20,1
Otros opioides	10,1	9,3	12,1
Anfetaminas	7,6	7,5	7,9
Heroína	7,4	8,1	5,2
MDMA y derivados	3,4	3,5	3,0
Alucinógenos	1,4	1,3	1,6
Inhalables volátiles	0,5	0,4	0,7

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.


\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2018. Mortalidad relacionada con drogas

### 2.3.1.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2018.



Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

### 2.3.2.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2018.

	Estimación nacional	Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	Registro General de Mortalidad	Selección B EMCDDA
1983	266	–	82	–	–
1984	440	–	139	–	–
1985	453	–	143	–	–
1986	516	–	163	–	–
1987	741	–	234	–	–
1988	1.067	–	337	–	–
1989	1.440	–	455	–	–
1990	1.440	–	455	–	–
1991	1.833	–	579	–	–
1992	1.760	–	558	–	–
1993	1.399	–	444	–	–
1994	1.067	–	388	–	–
1995	1.051	–	395	–	–
1996	1.310	–	421	–	–
1997	1.127	–	339	–	–
1998	1.049	–	306	–	–
1999	972	–	291	752	–
2000	1.012	444	284	691	–
2001	923	496	268	650	–
2002	1.079	496	229	652	–
2003	900	493	270	633	–
2004	796	468	212	659	–
2005	1.004	455	242	636	316
2006	820	428	218	489	204
2007	703	475	188	519	217
2008	773	424	139	540	165
2009	739	438	181	442	160
2010	706	517	182	393	163
2011	736	408	181	361	150
2012	707	519	195	383	144
2013	727	489	196	403	114
2014	767	556	172	455	117
2015	936	600	171	390	105
2016	866	613	194	483	154
2017	782	696	189	437	107
2018	777	732	177	450	118

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican: Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas: Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

### 2.3.3.

**Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España\*, 2003-2018.**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632	657
Sexo (%)																
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7	80,9	80,6	83,4	78,1	81,6
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3	19,1	19,4	16,6	21,9	18,4
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42,0	42,7	44,3	43,6	44,1	44,5	44,9
Grupo de edad (años)																
15-19 años	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,5	0,0	0,3
20-24 años	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4	1,5	2,7	1,8	1,0	2,2
25-29 años	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6	4,7	4,7	5,4	5,5	4,4
30-34 años	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1	10,4	9,3	8,3	8,3	7,8
35-39 años	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7	13,8	18,3	14,0	15,9	13,0
40-44 años	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6	17,7	16,5	19,4	16,7	16,5
≥45 años	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3	51,2	47,7	50,6	52,6	55,8
Estado civil (%)																
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3	59,3	64,8	64,2	63,3	62,9
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9	14,5	17,8	17,8	20,9	17,2
Separado/Divorciado	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9	23,1	16,5	15,6	13,9	17,8
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,0	3,1	0,9	2,5	1,9	2,1
Procedencia del cadáver (%)																
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7	74,4	72,6	68,5	71,9	68,7
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1	2,4	3,3	3,8	4,0	2,6
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1	10,1	8,2	8,2	6,1	7,5
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5	0,9	2,1	2,1	3,0	2,6
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6	5,5	5,9	8,4	7,7	6,6
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1	1,5	3,1	3,3	2,7	5,6
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0	5,1	4,7	5,6	4,6	6,5
Evidencias de consumo reciente (%)																
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8	81,8	84,9	82,0	88,1	80,4
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2	18,2	15,1	18,0	11,9	19,6
Evidencia de suicidio (%)																
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1	20,3	26,4	20,6	22,9	18,4
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9	79,7	73,6	79,4	77,1	81,6
Signos recientes venopunción (%)																
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2	12,5	13,5	13,0	13,3	11,3
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8	87,5	86,5	87,0	86,7	88,7
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)																
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0	35,4	27,0	31,5	38,2	31,0
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0	64,6	73,0	68,5	61,8	69,0
Anticuerpos anti-VIH (%)																
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5	27,2	26,2	21,4	22,1	25,8
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5	72,8	73,8	78,6	77,9	74,2

\* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.Registro Específico de Mortalidad.

#### 2.3.4.

**Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, por sexo. España\*, 2018.**

	Hombres	Mujeres
Número de fallecidos	595	134
Edad media (años)	44,6	46,3
Grupo de edad (años)		
15-19 años	0,2	0,0
20-24 años	2,0	3,0
25-29 años	4,7	3,0
30-34 años	8,3	6,0
35-39 años	14,2	8,2
40-44 años	15,9	18,7
≥45 años	54,7	61,2
Estado civil (%)		
Soltero	68,7	44,0
Casado	17,3	16,0
Separado/Divorciado	13,3	33,3
Viudo	0,8	6,7
Procedencia del cadáver (%)		
Domicilio	65,2	84,1
Hotel-Pensión	2,7	2,3
Calle	8,6	2,3
Local público	2,9	1,5
Hospital	7,3	3,8
Cárcel	7,0	0,0
Otra	6,4	6,1
Evidencias de consumo reciente (%)		
Sí	77,6	92,2
No	22,4	7,8
Evidencia de suicidio (%)		
Sí	14,7	33,3
No	85,3	66,7
Signos recientes venopunción (%)		
Sí	12,8	4,7
No	87,2	95,3
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)		
Sí	32,1	27,7
No	67,9	72,3
Anticuerpos anti-VIH (%)		
Positivo	28,2	17,2
Negativo	71,8	82,8

\* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.5.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España\*, 1996-2018.




\* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.6.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España\*, 2018.



	Hombres	Mujeres	Total
Opioides	60,7	50,0	58,6
Cocaína	65,4	46,0	61,6
Hipnosedantes	60,7	74,2	63,2
Anfetaminas	5,5	7,3	5,8
Cannabis	26,8	16,9	24,8
Extasis	4,2	4,8	4,3
Alcohol**	47,3	47,6	47,5

\* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.7.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España\*, 2005-2018.

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo sólo cocaína)													
14,5	13,8	17,3	12,5	11,0	12,2	13,7	12,3	12,1	13,1	13,5	16,8	22,0	21,3
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye sólo cocaína)													
20,4	18,5	25,1	18,9	16,4	18,0	17,2	19,0	19,7	17,7	18,0	20,0	25,5	26,8
Sólo cocaína													
5,9	4,7	7,8	6,4	5,4	5,8	3,4	6,7	7,6	4,6	4,4	3,2	3,5	5,5
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo sólo opioides)													
25,7	32,0	22,9	28,5	31,4	33,3	38,7	35,1	38,2	26,9	32,0	30,1	27,4	21,9
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides)													
29,7	36,7	30,7	35,8	39,6	39,7	42,9	37,9	42,8	30,0	33,8	32,1	30,4	23,7
Sólo opioides													
4,0	4,7	7,8	7,3	8,2	6,4	4,2	2,7	4,6	3,1	1,7	2,0	3,0	1,8
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides y cocaína)													
48,8	40,0	40,8	40,3	41,5	39,5	35,0	39,5	34,3	34,0	30,9	33,7	27,7	34,9
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, sin sólo opioides y cocaína)													
39,6	29,4	29,3	26,4	31,9	33,5	31,1	34,7	29,3	29,0	27,2	29,3	24,2	30,7
Sólo opioides y cocaína													
9,2	10,5	11,6	13,9	9,6	6,0	3,9	4,8	5,0	5,0	3,7	4,4	3,5	4,1
Número de defunciones con información toxicológica													
455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632	657
Número total de fallecidos													
455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.8.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España\*, 2003-2018.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Opioides	376	349	356	338	340	324	346	409
Cocaína	305	280	315	250	313	251	247	297
Benzodiazepinas	234	225	241	203	212	186	180	292
Anfetaminas	15	12	12	15	17	9	13	8
Cannabis	82	78	95	70	68	65	88	123
Alcohol	191	167	150	143	130	108	120	149
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opioides	318	366	337	333	335	320	367	385
Cocaína	213	280	236	269	253	269	336	405
Benzodiazepinas	258	291	265	327	336	319	403	410
Anfetaminas	19	18	27	41	23	31	37	38
Cannabis	100	107	94	86	121	117	131	163
Alcohol	136	138	136	212	206	215	278	312
Casos analizados	408	478	437	520	518	501	632	657

\* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

En 2011, 45 casos de Galicia sin información.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro específico de Mortalidad.

### 2.3.9.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide, aunque haya otras sustancias). España\*, 2005-2018.




\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.10.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España\*, 1985-2018.



\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.


\*\* Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye sólo cocaína).

\*\*\* Sólo cocaína (sin ninguna otra sustancia).

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.11.

Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España\*, 2018.




\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.12.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detectan opioides (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides y cocaína). España\*, 1984-2018.



	Opioides y no cocaína**	Sólo opioides***	Opioides y cocaína****		Opioides y no cocaína**	Sólo opioides***	Opioides y cocaína****
1984	49,6	28,1	-	2002	40,5	7,1	-
1985	49,7	25,2	-	2003	30,8	5,9	-
1986	49,2	20,2	-	2004	29,7	6,4	-
1987	47,0	23,9	-	2005	29,7	4,0	48,8
1988	42,4	20,8	-	2006	36,8	4,7	40,0
1989	35,2	14,1	-	2007	30,7	7,8	40,8
1990	46,6	20,6	-	2008	34,3	7,3	40,3
1991	31,3	11,5	-	2009	37,8	8,2	41,5
1992	35,4	14,2	-	2010	39,8	6,4	39,5
1993	44,0	18,1	-	2011	42,9	4,2	35,0
1994	55,8	13,1	-	2012	37,9	2,7	39,5
1995	59,8	9,0	-	2013	42,8	4,6	34,3
1996	55,1	17,7	-	2014	30,0	3,1	34,0
1997	45,4	12,6	-	2015	33,8	1,7	30,9
1998	41,7	10,8	-	2016	32,1	2,0	33,7
1999	31,5	7,6	-	2017	30,4	3	27,7
2000	40,3	9,2	-	2018	23,7	1,8	34,9
2001	41,7	8,7	-				

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

\*\* Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides).


\*\*\* Sólo opioides (ninguna otra sustancia).

\*\*\*\* Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides y cocaína).

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.13.

Distribución de los fallecidos en los que se detectan opioides en función de otras sustancias detectadas. España\*, 2018.



### 2.3.14.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide, aunque haya otras sustancias). España\*, 2005-2018.

	Sólo metadona	Metadona	Metadona y no otro opioide
2005	0,6	36,5	15,1
2006	2,8	39,8	27,4
2007	4,2	37,5	24,4
2008	2,4	30,0	20,6
2009	2,6	32,4	21,9
2010	2,7	47,4	30,7
2011	2,2	49,7	34,6
2012	1,1	52,2	40,2
2013	2,1	47,8	34,8
2014	1,5	36,9	20,0
2015	0,6	32,4	16,4
2016	1,0	36,3	19,2
2017	0,9	30,2	18,4
2018	0,8	32,4	19,2

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad..

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.15.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 2004-2018.



RE: Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican: Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.)

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

### 2.3.16.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 1999-2018.



H = Hombres; M = Mujeres; T = Total.

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

### 2.3.17.

Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2018.



Nota: se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

### 2.3.18.

Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de hipnosedantes. España\*, 2015-2018.

	2015	2016	2017	2018
	Nº de casos**	Nº de casos**	Nº de casos**	Nº de casos**
Sólo hipnosedantes	11	3	11	19
Hipnosedantes y cocaína (independientemente de otras sustancias)	133	152	198	226
Hipnosedantes y opiáceos (independientemente de otras sustancias)	249	230	278	282
Hipnosedantes y alcohol (independiente de otras sustancias)	120	137	189	192
Sólo hipnosedantes y alcohol	17	9	23	32
Sólo hipnosedantes y opioides	37	30	33	38
Sólo hipnosedantes y cocaína	7	11	17	17

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

\*\* La suma de casos puede ser superior al número total de fallecidos por hipnosedantes, porque algunas de las opciones no son excluyentes.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.19.

Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de cannabis. España\*, 2015-2018.

Sustancia detectada	2015	2016	2017	2018
	Nº de casos**	Nº de casos**	Nº de casos**	Nº de casos**
Sólo cannabis y opioides	5	5	2	4
Sólo cannabis y cocaína	2	4	5	12
Sólo cannabis	2	1	0	4
Cannabis y opioides (independiente de otras sustancias)	88	87	86	111
Cannabis y cocaína (independiente de otras sustancias)	55	68	86	102
Cannabis y alcohol (independiente de otras sustancias)	50	42	50	67
Cannabis e hipnosedantes (independiente de otras sustancias)	86	82	93	107

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

\*\* La suma de casos puede ser superior al número total de fallecidos por cannabis, porque algunas de las opciones no son excluyentes.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.20.

Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2018.



\* Independientemente de la aparición o no de otras sustancias.

Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.21.

#### Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas\*. España, 2005-2018.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15-19 años	3	3	1	0	2	0	2	1	1	0	0	3	0	0
20-24 años	17	7	8	9	8	4	5	7	1	0	3	5	2	4
25-29 años	31	25	24	15	12	12	11	10	17	9	6	12	11	7
30-34 años	40	42	30	22	35	21	14	21	24	23	10	14	18	14
35-39 años	66	43	32	23	26	48	40	29	32	20	35	29	31	18
40-44 años	52	44	39	23	49	39	41	45	31	28	27	40	29	28
45-49 años	19	27	23	26	35	39	34	37	42	38	24	29	30	41
50-54 años	5	13	6	15	12	13	18	30	30	32	39	29	31	30
55-59 años	1	5	0	4	2	2	6	12	14	13	17	20	26	21
60-64 años	1	1	2	2	0	3	5	3	4	7	10	13	11	10
≥65 años	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Desconocida	2	0	23	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	3
Total fallecidos	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177

\* Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Índicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Índicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.22.


#### Evolución del índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad-Registro Específico). España, 2005-2018.

Año	Índice de Infranotificación	Año	Índice de Infranotificación
2005	1,58	2012	1,85
2006	1,68	2013	1,80
2007	1,35	2014	1,69
2008	1,43	2015	2,40
2009	1,67	2016	1,79
2010	1,80	2017	1,79
2011	2,04	2018	1,76

FUENTE: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

### 2.3.23.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas (estimación nacional). España, 1983-2018.



Número de defunciones		Número de defunciones	
1983	266	2001	923
1984	440	2002	1.079
1985	453	2003	900
1986	516	2004	796
1987	741	2005	1.004
1988	1.067	2006	820
1989	1.440	2007	703
1990	1.440	2008	773
1991	1.833	2009	739
1992	1.760	2010	706
1993	1.399	2011	736
1994	1.067	2012	707
1995	1.051	2013	727
1996	1.310	2014	767
1997	1.127	2015	936
1998	1.049	2016	866
1999	972	2017	782
2000	1.012	2018	777

FUENTE: Estimación del Observatorio Español de la Droga y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y datos del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

# Información complementaria

# Páginas web de interés

## MINISTERIO DE SANIDAD

<https://www.mscbs.gob.es/>

### Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<https://pnsd.sanidad.gob.es/>

### Encuesta Nacional de Salud

<https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm>

## MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

### Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

## MINISTERIO DE HACIENDA

<http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx>

### Comisionado para el Mercado de Tabacos

<http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/CMTabacos/paginas/Default.aspx>

## MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

<http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/>

### Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

<http://www.isciii.es/>

## OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

Abuso de sustancias psicoactivas. Management of Substance Abuse

[http://www.who.int/substance\\_abuse/en/](http://www.who.int/substance_abuse/en/)

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE)

INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD (INCB)

<https://www.incb.org/incb/es/about.html>

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)

THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

REDUCING ALCOHOL RELATED HARMs (RARHA)

REDUCCIÓN DE DAÑOS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL

<http://www.rarha.eu/>

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS (HBSC)

HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO

EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

<https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index>

CONSEJO EUROPEO. GRUPO POMPIDOU

COUNCIL OF EUROPE. POMPIDOU GROUP

MedNET. MedSPAD SURVEYS

MedNET. ENCUESTAS MedSPAD

<https://www.coe.int/en/web/pompidou/mednet/medspad>