

# **ENCUESTA ESTATAL SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS (ESTUDES) 2010, ESPAÑA**

**DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL  
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS**

**MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA  
SOCIAL E IGUALDAD**



**MINISTERIO  
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL  
E IGUALDAD**



plan nacional sobre drogas

# CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE ESTUDES 2010

## → Antecedentes:

- Desde 1994, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, cada dos años, una Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años de toda España (ESTUDES).

## → Muestra:

- En 2010: 31.967 estudiantes de 857 centros educativos públicos y privados y 1730 aulas.

## → Objetivos:


- Conocer la situación y las tendencias de los consumos de drogas, los patrones de consumo, los factores asociados y las opiniones y actitudes ante las drogas de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años y
- Orientar el desarrollo y evaluación de intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados.

# Evolución del tamaño de muestra ESTUDES, 1994-2010

España cuenta con una de las mayores encuestas escolares a nivel mundial

## Valor añadido ESTUDES:

1. Muestra
2. Serie histórica dilatada y bienal
3. Flexibilidad: Módulos específicos




# Proporción de consumidores de drogas en el último año (%)


## ESTUDES, 2010

→ Las drogas consumidas por un mayor porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años siguen siendo **el alcohol, el tabaco y el cannabis**.

→ En 2010, se observa una reducción del consumo de la mayoría de las sustancias, más acusado en el caso del **tabaco, del cannabis y de la cocaína**.




# Proporción de consumidores de drogas en el último año SEGÚN SEXO (%). ESTUDES, 2010



# Edad media de inicio en el consumo de drogas


## ESTUDES, 2010

La edad media de inicio en el consumo de drogas se mantiene estable



# Evolución de la prevalencia de consumo de BEBIDAS ALCOHÓLICAS y prevalencia de borracheras (últimos 30 días) (%). ESTUDES, 1994-2010

- Extensión del consumo se mantiene estable
- Consumo intensivo (borracheras) aumenta (3 de cada 10 se emborrachan)
- Prevalencia de consumo en mujeres aumenta




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010
■ Consumo alcohol alguna vez	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1
◆ Consumo alcohol últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6
■ Consumo alcohol últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63
◆ Borracheras últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28	25,6	29,1	35,6


# Tipo de BEBIDA ALCOHÓLICA consumida según el día de la semana

## ESTUDES, 2010

- ➔ En los últimos 30 días, el 66,3% de los consumidores había bebido en bares o pubs, un 64,1% en espacios abiertos y un 57,5% en discotecas.
- ➔ Los lugares donde los estudiantes consiguieron con más frecuencia bebidas alcohólicas fueron bares o pubs (52,1%), discotecas (43,5%) y supermercados (49,3%).



**FIN DE SEMANA**



**DÍA LABORABLE**




## Consumo de TABACO ESTUDES, 2010

- El 39,8% de los estudiantes de 14-18 años fumó tabaco alguna vez en la vida, el 32,4% en los últimos 12 meses y el 12,3% (25,2% entre los de 18 años) lo hizo diariamente en los últimos 30 días.
- El consumo medio de cigarrillos diarios es 5,17, inferior al de 2004 (7,7) y 2006 (5,5).
- En 2010, se confirma la tendencia descendente del consumo de tabaco, iniciada en 2004 y que coincidió con el debate social suscitado por la elaboración de la Ley 28/2005 del “Tabaco”. En 2004, el 21,5% de estudiantes fumaba diariamente, frente a un 14,8% en 2006 y 2008, y un 12,3% en 2010.
- La percepción de riesgo ante el consumo diario de tabaco sigue aumentando y la CASI TOTALIDAD (>90%) de los jóvenes opinan que puede producir muchos problemas de salud.

# Evolución de la prevalencia de consumo diario de TABACO, SEGÚN SEXO (%). ESTUDES, 1994-2010

→ El consumo está mas extendido entre las mujeres (13,6% fuma diariamente) que entre los hombres (11%).


Debate social  
Ley 28/2005



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010
■ Hombres	17,8	19,0	17,9	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11
◆ Mujeres	25,4	28,1	27,5	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6
▲ percepción del riesgo de fumar un paquete diario	76,9	75,2	78	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4


# Evolución de la proporción de consumidores de HIPNOSEDANTES sin receta, (%). ESTUDES, 1994-2010

El consumo de hipnosedantes es más elevado en las mujeres (6,7% en el último año) que en los hombres (4,4% en el último año).



# Evolución de la proporción de consumidores de CANNABIS (%). ESTUDES, 1994-2010


- Se confirma **tendencia descendente** iniciada en **2004**
- La **prevalencia de consumo diario** es de un **3%** (4,3% en chicos y 1,8% en chicas): España participa en un **proyecto Europeo de CONSUMO PROBLEMÁTICO DE CANNABIS (OEDT\*)**



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010
Alguna vez en la vida	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33
Últimos 12 meses	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4
Últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2

# Evolución de la prevalencia de consumo de COCAÍNA (general) (%) ESTUDES, 1994-2010


→ Se confirma la **tendencia descendente** del consumo de cocaína, iniciada en 2004. Las prevalencias de consumo, en 2010, son inferiores a las de 1998.



◆ Alguna vez en la vida	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9
■ Últimos 12 meses	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6
▲ Últimos 30 días	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2	1,5

# Evolución de la prevalencia de consumo de ANFETAMINAS, ÉXTASIS y ALUCINÓGENOS en el último año (%). ESTUDES, 1994-2010


→ Se consolida la tendencia descendente iniciada en 2000 para todos los consumos en ambos sexos. Son las cifras más bajas desde el comienzo de las encuestas



## Consumo de HEROÍNA ESTUDES, 2010

- La heroína es la droga menos consumida por los estudiantes de 14 a 18 años. En el 2010 un 1% la había probado alguna vez, un 0,6% la había consumido en el último año y un 0,5 % en el último mes previo a la encuesta.
- La edad media de inicio en el consumo de heroína (**14,4 años**) continúa siendo más temprana que la de otras drogas (cocaína, éxtasis, anfetaminas o alucinógenos).

# Evolución del RIESGO PERCIBIDO por los estudiantes de 14-18 años ante el consumo habitual\* de drogas. ESTUDES, 1994-2010



El alcohol es la sustancia que se percibe menos peligrosa.  
El tabaco se considera más peligroso que el cannabis.


\*Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: ESTUDES 1994-2010. Observatorio Español sobre Drogas. DGPNSD. MSPSI.



# INFORMACIÓN RECIBIDA sobre las drogas y los efectos y problemas asociados. ESTUDES, 2010.

¿Te sientes suficientemente informado con respecto al tema de las drogas? (%)



- Suficiente o perfectamente informados
- Informados a medias o mal informados

→ Las principales vías por las que los estudiantes RECIBEN información son: las **madres** (67,3%) y **padres** (61,1%), los **profesores** (61,4%), las **charlas/cursos** (67,5%) y los **medios de comunicación** (61%).

→ La vías por las que los jóvenes PREFERIRÍAN RECIBIR información sobre drogas son: los **profesionales sanitarios** (50,2%) y las **charlas/cursos** (49,9%) . A uno de cada cuatro jóvenes le gustaría obtenerla por **internet**.

## Consumo de DROGAS EMERGENTES ESTUDES, 2010

- Se ha introducido, por primera vez, un módulo específico sobre este tipo de sustancias, en la Encuesta ESTUDES 2010. Novedoso en la Unión Europea.
- En España, **las sustancias de este tipo más consumidas son las setas mágicas (2,1%), el Spice (1,1%) y la ketamina (1,1%)** para el indicador de consumo alguna vez en la vida.
- Casi **la mitad de los encuestados** desconocen los problemas de salud que puede ocasionar la sustancia por la que se les pregunta. **La tercera parte de los que las consumen** tampoco conocen los problemas que ocasionan sobre su salud.
- Las sustancias que los estudiantes consideran **más fácilmente accesibles** son las **setas mágicas (50,3%)**, la **ketamina (40,2%)** y el **spice (39,8%)**.
- Las **más difíciles de conseguir** son el **nexus**, la **mefedrona** y las **piperazinas**.