



Problemas relacionados con las drogas


ÍNDICE

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2013 . . .	166
2.2.1. Porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España, 1996-2013	166
2.2.2. Número total y porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España, 1996-2013	167
2.2.3. Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2013	168
2.2.4. Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España, 2012	169
2.2.5. Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España, 2013	169
2.2.6. Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2012 . .	170
2.2.7. Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2013 . .	170
2.2.8. Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España, 2012	170
2.2.9. Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España, 2013	171
2.2.10. Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según tipo de sustancia psicoactiva (total, hombres y mujeres). España, 2013	171

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2013

2.2.1.

Porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España*, 1996-2013.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cocaína	19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	55,1	51,1	49,5	45,2	46,0	44,9
Alcohol	12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	37,3	40,2	36,3	40,4	39,0	38,7
Cannabis	6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	24,7	29,5	30,5	33,3	33,0	34,6
Hipnosedantes	23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	15,6	16,5	16,7	18,9	18,3	17,8
Heroína	56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	17,2	17,1	17,8	14,2	13,0	11,9
Anfetaminas	2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	4,4	4,6	5,5	9,2	8,9	9,0
Éxtasis y der.	1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	4,2	2,4	2,9	3,9	4,6	4,8
Alucinógenos	2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	2,6	1,7	2,1	2,5	2,6
I. volátiles	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4

Nota: El porcentaje se calcula dividiendo el número de episodios en los que se relaciona cada sustancia con la urgencia entre el total de episodios de urgencias relacionadas con drogas.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2

Número total y porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España*, 1996-2013.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y derivados	Alucinógenos	Inhalables volátiles	Otras sustancias
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2	4,1
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1	3,2
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3	4,9
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1	1,3
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3	0,8
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9	1,6
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2	1,8
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6	8,7
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5	3,3
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4	4,9
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5	6,0
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5	1,8
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5	1,2
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4	1,8
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3	2,2
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5	3,3
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4	2,5

Nota: El porcentaje se calcula dividiendo el número de episodios en los que se relaciona cada sustancia con la urgencia entre el total de episodios de urgencias relacionadas con drogas. El sumatorio puede no ser del 100% debido a que no se presentan todas las drogas y algunas drogas pueden aparecer en más de un episodio.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1996-2013.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nº episodios	2.585	1.932	2.099	2.141	2.328	2.145	2.673	5.828	7.089	7.042	7.822	6.431	5.567	5.626	5.279	5.999	5.715
Edad media (años)	27,8	29,1	30,3	29,8	31,0	31,6	32,4	33,0	32,6	32,7	32,8	33,0	27,8	29,1	30,3	29,8	31,0
Sexo (%)																	
Mujeres	21,4	20,8	23,1	23,5	27,4	27,1	27,4	28,0	25,0	26,1	23,4	22,7	21,6	26,3	24,7	26,1	26,1
Condición legal (%)																	
Detenido	14,4	22,4	11,7	9,4	6,4	5,7	5,2	4,1	4,9	3,7	3,8	4,4	4,9	4,2	3,7	4,1	3,8
Resolución urgencia (%)																	
Alta médica	80,5	82,0	81,2	80,9	78,7	79,1	82,1	81,4	79,1	76,2	79,1	80,0	80,9	79,6	75,4	75,9	72,8
Alta voluntaria	7,0	6,7	8,8	8,6	8,5	7,5	7,4	5,3	6,7	8,6	7,8	8,5	8,2	7,0	8,5	8,2	9,4
Ingreso hospitalario	7,6	7,2	6,0	6,5	8,3	7,8	6,3	8,0	8,4	8,8	9,0	7,8	8,1	10,2	12,5	12,5	14,8
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Traslado a otro centro	4,8	4,1	3,9	3,9	3,7	5,4	4,0	5,3	5,7	6,3	4,1	3,7	2,8	3,2	3,6	3,3	2,9

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España*, 2012.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cánnabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	Éxtasis y der.	Alucinogenos	I. volátiles
Número de episodios	5.999	4.419	1.557	2.452	2.082	1.760	976	695	476	327	245	136	29
Edad media (años)	32,8	33,2	31,7	34,0	34,2	30,1	36,0	37,3	29,2	38,2	27,0	28,0	28,7
Sexo (% mujeres)	26,1	-	-	22,7	22,3	20,2	28,9	23,6	26,5	27,0	23,3	25,0	37,9
Detenidos (%)	4,1	5,0	1,6	3,5	2,4	4,6	5,3	5,5	1,7	6,2	1,2	2,2	10,3
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	75,9	74,8	78,9	75,1	75,2	74,8	68,4	69,8	77,3	71,7	74,0	76,2	75,0
Alta voluntaria	8,2	8,7	7,0	8,1	8,8	6,0	9,4	9,3	6,9	7,9	17,2	11,9	8,3
Ingreso hospitalario	12,5	13,0	11,3	12,8	12,5	15,3	16,5	18,2	12,9	15,0	7,7	8,9	16,7
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,0	1,0	0,0
Traslado a otro centro	3,2	3,4	2,8	4,0	3,3	3,9	5,7	2,5	2,6	5,0	1,2	2,0	0,0

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España*, 2013.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cánnabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	Éxtasis y der.	Alucinogenos	I. volátiles
Número de episodios	5.715	4.219	1.490	2.490	2.143	1.919	985	659	500	316	265	145	21
Edad media (años)	33,0	33,4	31,9	33,9	34,2	29,5	35,6	37,4	29,3	39,2	27,3	27,8	30,4
Sexo (% mujeres)	26,1	-	-	24,6	24,6	24,6	29,5	21,9	26,2	28,5	28,0	22,9	33,3
Detenidos (%)	3,8	4,4	2,0	4,2	3,4	4,5	4,6	3,8	2,6	6,7	3,4	3,4	0,0
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	72,8	72,6	73,3	71,4	74,2	74,5	65,6	62,4	77,5	65,7	78,4	63,1	63,2
Alta voluntaria	9,4	9,6	8,8	9,8	10,3	6,7	10,6	8,8	8,1	11,2	11,6	16,5	5,3
Ingreso hospitalario	14,8	14,9	14,4	15,4	12,8	15,4	20,3	24,2	11,3	19,8	8,0	17,5	15,8
Muerte en urgencias	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	2,9	2,8	3,3	3,4	2,6	3,4	3,4	4,0	2,8	3,3	2,0	2,9	15,8

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España* 2012.

Vía de administración	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y der.	Alucinógenos
Oral	2,1	6,4	99,1	1,5	79,1	93,8	96,1	67,3
Pulmonar o fumada	12,0	93,1	0,4	19,4	5,5	1,2	1,6	4,1
Intranasal o esnifada	66,3	0,5	0,1	8,0	14,1	0,3	2,4	18,4
Parenteral o inyectada	19,4	0,0	0,4	70,9	1,2	3,0	0,0	8,2
Otra vía	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	1,8	0,0	2,0

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.7.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España* 2013.

Vía de administración	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y der.	Alucinógenos
Oral	0,5	2,2	99,5	0,2	69,9	98,7	98,6	54,8
Pulmonar o fumada	18,5	97,3	0,2	30,6	10,6	0,4	0,0	11,3
Intranasal o esnifada	61,2	0,4	0,0	9,5	18,7	0,1	0,0	17,7
Parenteral o inyectada	19,6	0,1	0,3	59,6	0,4	0,5	0,7	16,1
Otra vía	0,2	0,1	0,0	0,1	0,4	0,2	0,7	0,0

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.8.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España* 2012.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	46,0	47,0	42,5
Alcohol	39,0	40,1	35,5
Cannabis	33,3	34,9	27,2
Hipnosedantes	18,3	17,2	21,6
Heroína	13,0	13,2	12,5
Anfetaminas	8,9	8,7	9,7
Otros opioides	6,1	5,9	6,8
Éxtasis y derivados	4,6	4,7	4,4
Otras sustancias	3,3	2,6	5,4
Alucinógenos	2,5	2,5	2,6
Inhalables volátiles	0,5	0,4	0,8

Nota: La suma puede superar el 100% porque existen episodios en los que se relaciona más de una sustancia.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.9.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España*, 2013.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	44,9	45,9	42,3
Alcohol	38,7	39,4	36,3
Cannabis	34,6	35,3	32,6
Hipnosedantes	17,8	17,0	20,1
Heroína	11,9	12,6	10,0
Anfetaminas	9,0	9,0	9,1
Otros opioides	5,7	5,5	6,2
Éxtasis y derivados	4,8	4,6	5,1
Otras sustancias	2,5	2,1	3,7
Alucinógenos	2,6	2,7	2,3
Inhalables volátiles	0,4	0,3	0,5


Nota: La suma puede superar el 100% porque existen episodios en los que se relaciona más de una sustancia.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.10.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según tipo de sustancia psicoactiva (total, hombres y mujeres). España*, 2013.



	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Total	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	4,8	2,6	0,4
Hombres	45,9	39,4	35,3	17,0	12,6	9,0	4,6	2,7	0,3
Mujeres	42,3	36,3	32,6	20,1	10,0	9,1	5,1	2,3	0,5

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.