

Consumo,  
percepciones  
y opiniones  
ante las drogas



# ÍNDICE

## 1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas 19

### 1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2013 20

#### Metodología

1.1.1.	Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2013	20
1.1.2.	Características sociodemográficas de la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	21
1.1.3.	Con quién vive actualmente la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	21
1.1.4.	Distribución de la muestra (nº de entrevistas) de la encuesta EDADES 2013, y errores muestrales, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2013	22

#### Prevalencia de consumo de drogas 1995-2013: evolución temporal. Edad y sexo

1.1.5.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	23
1.1.6.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	24
1.1.7.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	25
1.1.8.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	25
1.1.9.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013	26
1.1.10.	Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013	26
1.1.11.	Edad media (años) de inicio de consumo de sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2013	27
1.1.12.	Edad media de inicio de consumo de sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 1995-2013	27
1.1.13.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	28
1.1.14.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	29
1.1.15.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	30

1.1.16.	Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	31
1.1.17.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (número estimado). España, 2013 . . . . .	31
1.1.18.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (tasa por mil habitantes) España, 2013 . . . . .	31
1.1.19.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (número estimado). España, 2013 . . . . .	32
1.1.20.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (tasa por mil habitantes) España, 2013 . . . . .	32
1.1.21.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	32
1.1.22.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	33
1.1.23.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1997-2013 . . . . .	33
1.1.24.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	34
1.1.25.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1997-2013 . . . . .	35

#### **Prevalencia de consumo de drogas 2013: Comunidad/Ciudad Autónoma**

---

1.1.26.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (años). España, 2013 . . . . .	36
1.1.27.	Prevalencias de consumo de alcohol entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013 . . . . .	37
1.1.28.	Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013 . . . . .	37
1.1.29.	Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013 . . . . .	38
1.1.30.	Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	38
1.1.31.	Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013 . . . . .	39
1.1.32.	Prevalencias de borracheras en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	40
1.1.33.	Prevalencias de binge drinking en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	41
1.1.34.	Prevalencias de hacer botellón en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	42
1.1.35.	Prevalencias de hacer botellón y consumir alcohol en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	43
1.1.36.	Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013 . . . . .	44
1.1.37.	Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013 . . . . .	44

1.1.38.	Prevalencias de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013 . . . . .	45
1.1.39.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013 . . . . .	45
1.1.40.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013 . . . . .	46

#### Consumo por tipo de drogas: bebidas alcohólicas

---

1.1.41.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas y edad media de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013 . .	46
1.1.42.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	47
1.1.43.	Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	47
1.1.44.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los que han consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, según grupo de edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2013 . . . . .	48
1.1.45.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2013 . .	48
1.1.46.	Prevalencia de consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	49
1.1.47.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013 . . . . .	49
1.1.48.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2013 . .	50
1.1.49.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2013 . . . . .	50
1.1.50.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que se han emborrachado en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	51
1.1.51.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	51
1.1.52.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en atracón (binge drinking) y de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 1999-2013 . . . . .	52
1.1.53.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013 . . . . .	52
1.1.54.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	53
1.1.55.	Prevalencia de hacer botellón y del consumo de bebidas alcohólicas en botellones, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	53
1.1.56.	Prevalencia de hacer botellón y del consumo de bebidas alcohólicas en botellones, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	54
1.1.57.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho botellón en el último año o no. España, 2013 . . . . .	54

1.1.58.	Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre la población según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2013 . . . . .	55
1.1.59.	Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT ≥20), entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	55
1.1.60.	Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT ≥20), entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	56
1.1.61.	Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses, borracheras en los últimos 30 días y binge drinking en los últimos 30 días entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8) (porcentajes) entre la población de 15 a 64 años. España, 2013 . . . . .	56
1.1.62.	Riesgo percibido ante el consumo de drogas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8) (porcentajes). España, 2013 . . . . .	57
1.1.63.	Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje que se encuentra frecuente o muy frecuente cada situación en el lugar donde vive), en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8), (porcentajes). España, 2013 . . . . .	58
1.1.64.	Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8) (porcentajes). España, 2013 . . . . .	58
1.1.65.	Características de la población de 15 a 64 años que ha que ha consumido alcohol en el último año según tenga un consumo de riesgo (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8) (porcentajes). España, 2013 . . . . .	59
1.1.66.	Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	60
1.1.67.	Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	60

#### Consumo por tipo de drogas: tabaco

---

1.1.68.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013 . . . . .	61
1.1.69.	Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	61
1.1.70.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2013 . . . . .	62

#### Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

---

1.1.71.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2013 . . . . .	62
1.1.72.	Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	63
1.1.73.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	63

1.1.74.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en últimos 12 meses y últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013 . . . . .	64
1.1.75.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	64
1.1.76.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	65
1.1.77.	Continuidad en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2013 . . . . .	65
1.1.78.	Evolución de las prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años. España, 2005-2013 . . . . .	66
1.1.79.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	66
1.1.80.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	67
1.1.81.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años según haya consumido hipnosedantes sin receta o no en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013 . . . . .	67

#### Consumo por tipo de drogas: cannabis

---

1.1.82.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis y edad media de inicio en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	68
1.1.83.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	68
1.1.84.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	69
1.1.85.	Continuidad en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013 . . . . .	69
1.1.86.	Prevalencia de personas que han consumido tabaco y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013 . . . . .	70
1.1.87.	Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013 . . . . .	70
1.1.88.	Categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado la escala. España, 2013 . . . . .	70
1.1.89.	Prevalencia de consumo de riesgo, consumo de bajo riesgo y consumo no problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según sexo y edad (%). España, 2013 . . . . .	71
1.1.90.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general (porcentajes). España, 2013 . . . . .	71
1.1.91.	Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general. España, 2013 . . . . .	72
1.1.92.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general (porcentajes). España, 2013 . . . . .	73
1.1.93.	Características de la población de 15 a 64 años de edad que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST ≥4) o no (CAST <4) y entre la población general (porcentajes). España, 2013 . . . . .	74

## Consumo por tipo de drogas: cocaína

---

1.1.94. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	75
1.1.95. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 1999-2013 . . . . .	75
1.1.96. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad. España, 1999-2013 . . . . .	76
1.1.97. Continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013 . . . . .	76
1.1.98. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	77
1.1.99. Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo y/o base) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013 . . . . .	77
1.1.100. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	78

## Consumo por tipo de drogas: éxtasis

---

1.1.101. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	78
1.1.102. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	79
1.1.103. Prevalencia de consumo de éxtasis entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	79

## Consumo por tipo de drogas: anfetaminas

---

1.1.104. Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	80
1.1.105. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	80
1.1.106. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	81

## Consumo por tipo de drogas: alucinógenos

---

1.1.107. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	81
1.1.108. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	82
1.1.109. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	82

## Consumo por tipo de drogas: heroína e inhalables volátiles

---

1.1.110. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	83
1.1.111. Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	83
1.1.112. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	84
1.1.113. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013 . . . . .	84

## Patrones de consumo de drogas: policonsumo y uso inyectado

---

1.1.114. Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013 . . . . .	85
1.1.115. Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) alguna vez en la vida (porcentajes) en la población de 15-64 años. España, 2013 . . . . .	85
1.1.116. Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) alguna vez en la vida (porcentajes) en la población de 15-64 años. España, 2013 . . . . .	86
1.1.117. Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses, según edad y sexo en la población de 15-64 años. España, 2013 . . . . .	86
1.1.118. Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses, según edad y sexo (porcentajes) entre la población de 15-64 años que ha consumido alguna sustancia psicoactiva. España, 2013 . . . . .	87
1.1.119. Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes) entre la población de 15-64 años que ha consumido alguna sustancia psicoactiva. España, 2013 . . . . .	87
1.1.120. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes de columna) entre la población de 15-64 años. España, 2013 . . . . .	88
1.1.121. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	88
1.1.122. Proporción (% en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes, cocaína, anfetaminas/speed y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2013 . . . . .	89
1.1.123. Proporción (% en filas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes, cocaína, anfetaminas/speed y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2013 . . . . .	89
1.1.124. Estado civil, nivel de estudios y percepción del estado de salud entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013 . . . . .	90
1.1.125. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de heroína, cocaína u otras sustancias psicoactivas ilegales a través de inyección en la población de 15-64 años, según sexo y grupo de edad (porcentajes). España, 2013 . . . . .	90

## Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad y de riesgo

---

1.1.126. Percepción de riesgo (porcentaje que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013 . . . . .	91
1.1.127. Percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013 . . . . .	92
1.1.128. Proporción de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas (porcentajes). España, 2013 . . . . .	92
1.1.129. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013 . . . . .	93
1.1.130. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013 . . . . .	94

1.1.131. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013 . . . . .	95
1.1.132. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo una vez o menos al mes de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013 . . . . .	95
1.1.133. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez por semana o más). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según sexo y edad. España, 2013 . . . . .	96
1.1.134. Evolución de la prevalencia de consumo de un paquete de tabaco diario en los últimos 30 días y riesgo percibido ante el consumo diario de tabaco (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013 . . . . .	96
1.1.135. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez al mes o menos). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según sexo. España, 2013 . . . . .	97
1.1.136. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez a la semana o más). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según edad. España, 2013 . . . . .	97
1.1.137. Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	98
1.1.138. Evolución de la percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2013 . . . . .	98

**Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: relación entre riesgo percibido, percepción de disponibilidad y prevalencia de consumo**

---

1.1.139. Prevalencia de consumo de cannabis (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013 . . .	99
1.1.140. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013 . . . . .	99
1.1.141. Prevalencia de consumo de éxtasis (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013 . . .	100

**Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción sobre la importancia del problema del consumo de drogas y visibilidad del problema**

---

1.1.142. Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las sustancias psicoactivas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2013 . . . . .	100
1.1.143. Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2013 . . . .	101
1.1.144. Visibilidad en el entorno cercano de personas fumando porros o haciendo botellón (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 2013 . . . . .	102

## Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: vías de información sobre drogas

---

- 1.1.145. Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre drogas y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2013 ..... 102

## Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

---

- 1.1.146. Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 ..... 103
- 1.1.147. Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995, 2003 y 2013 ..... 104
- 1.1.148. Valoración de la legalización del hachís y la marihuana como “muy importante” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 ..... 104

## Percepción del estado de salud en consumidores de drogas

---

- 1.1.149. Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 2013 ..... 105
- 1.1.150. Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año según tenga consumo de riesgo (AUDIT  $\geq 8$ ) o no (AUDIT  $< 8$ ), por sexo. España, 2013 ..... 105
- 1.1.151. Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año según tenga consumo de riesgo (AUDIT  $\geq 8$ ) o no (AUDIT  $< 8$ ), por edad. España, 2013 ..... 106
- 1.1.152. Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST  $\geq 4$ ) o no (CAST  $< 4$ ), por sexo (%). España, 2013 ..... 106
- 1.1.153. Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST  $\geq 4$ ) o no (CAST  $< 4$ ), por edad (%). España, 2013 ..... 107
- 1.1.154. Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años según hayan consumido cocaína (polvo y/o base) en el último año o no, según sexo (%). España, 2013 ..... 107
- 1.1.155. Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años según hayan consumido cocaína (polvo y/o base) en el último año o no, según edad (%). España, 2013 ..... 108

## Nuevas sustancias psicoactivas

---


- 1.1.156. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 ..... 108
- 1.1.157. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2013 ..... 109
- 1.1.158. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 ..... 109
- 1.1.159. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, (porcentajes). España, 2011 y 2013 ..... 110
- 1.1.160. Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 2013 ..... 110
- 1.1.161. Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-18 años (porcentajes). España, 2011 y 2013 ..... 111
- 1.1.162. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013 ..... 111
- 1.1.163. Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2011 y 2013 ..... 112

1.1.164. Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 2011 y 2013 .....	112
1.1.165. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013 .....	113
1.1.166. Disponibilidad percibida de nuevas sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 .....	113
1.1.167. Lugar de obtención de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013 .....	114
1.1.168. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre las personas de 15-64 años que han consumido ketamina, GHB, spice, metanfetamina, setas mágicas y salvia alguna vez en la vida (porcentaje de columna). España, 2013 .....	114
1.1.169. Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2013 .....	115
1.1.170. Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad. España, 2013 .....	115
1.1.171. Estado civil y nivel de estudios de la población de 25 a 34 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (porcentajes). España, 2013 .....	116
1.1.172. Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 25-34 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (porcentajes). España, 2013 .....	116

# 1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2013

## 1.1.1.

Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2013.



Año	Tamaño de la muestra
1995	8.888
1997	12.304
1999	12.234
2001	14.113
2003	12.033
2005	27.934
2007	23.715
2009	20.109
2011	22.128
2013	23.136

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.2.

Características sociodemográficas de la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.

		Porcentaje
SEXO	Hombre	50,4
	Mujer	49,6
EDAD	15 a 24 años	14,7
	25 a 34 años	21,1
	35 a 44 años	24,7
	45 a 54 años	22,2
	55 a 64 años	17,3
ESTADO CIVIL	Soltero/a	38,7
	Casado/a	52,3
	Separado/a - Divorciado/a	6,9
	Viudo/a	2,1
NIVEL DE ESTUDIOS	Sin estudios / estudios primarios	15,9
	Estudios secundarios	65,5
	Estudios universitarios	18,6
NACIONALIDAD	Española	87,5
	Extranjera	12,5

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.3.

Con quién vive actualmente la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.

	Porcentaje
Solo	9,9
Cónyuge / pareja	59,2
Padre	17,5
Madre	23,0
Hijos	42,6
Hermanos	12,6
Abuelos	1,3

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

#### 1.1.4.

Distribución de la muestra (nº de entrevistas) de la encuesta EDADES 2013, y errores muestrales, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2013.

CCAA	DGPNSD <sup>1</sup>	Ampliación <sup>2</sup>	Muestra final <sup>3</sup>	Error muestral <sup>4</sup>
Andalucía	2.155	–	2.155	2,1%
Aragón	858	–	858	3,3%
Asturias	778	–	778	3,5%
Baleares	812	–	812	3,4%
Canarias	1.084	813	1.897	2,3%
Cantabria	576	408	984	3,1%
Castilla-La Mancha	1.071	516	1.587	2,5%
Castilla y León	1.181	–	1.181	2,9%
Cataluña	2.019	–	2.019	2,2%
C. Valenciana	1.699	798	2.497	2,0%
Extremadura	788	–	788	3,5%
Galicia	1.236	754	1.990	2,2%
Madrid	1.930	–	1.930	2,2%
Murcia	911	–	911	3,2%
Navarra	604	–	604	4,0%
País Vasco	1.108	–	1.108	2,9%
La Rioja	420	–	420	4,8%
Ceuta	218	–	218	6,6%
Melilla	211	188	399	4,9%
<b>Total</b>	<b>19.659</b>	<b>3.477</b>	<b>23.136</b>	<b>0,6%</b>

1. Número de entrevistas financiadas por la DGPNSD.

2. Número de entrevistas financiadas por las CCAA/CA.


3. Muestra final. Número de entrevistas realizadas.

4. Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95% y  $p=q=0,5$ .

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.5.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.




Sustancia psicoactiva	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)
Alcohol	93,1
Tabaco	73,1
Cannabis	30,4
Hipnosedantes (con o sin receta)	22,2
Cocaína (polvo y/o base)	10,3
Éxtasis	4,3
Alucinógenos	3,8
Anfetaminas/speed	3,8
Nuevas sustancias	3,0
Hipnosedantes (sin receta)	2,7
Setas mágicas	1,9
Ketamina	0,8
Heroína	0,7
Inhalables volátiles	0,6
GHB	0,6
Spice	0,5
Salvia	0,5
Metanfetamina	0,5
Nexus	0,2
Esteroides anabolizantes	0,2
Research chemicals	0,1
Mefedrona	0,1
Piperazinas	0,0
Legal highs	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.6.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.



Sustancia psicoactiva	Prevalencia de consumo últimos 12 meses (%)
Alcohol	78,3
Tabaco	40,7
Hipnosedantes (con o sin receta)	12,2
Cannabis	9,2
Cocaína (polvo y/o base)	2,2
Hipnosedantes (sin receta)	1,2
Nuevas sustancias	0,7
Éxtasis	0,7
Anfetaminas/speed	0,6
Alucinógenos	0,3
Setas mágicas	0,2
Ketamina	0,1
Spice	0,1
Salvia	0,1
Metanfetamina	0,1
GHB	0,1
Heroína	0,1
Inhalables volátiles	0,1
Nexus	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0
Mefedrona	0,0
Piperazinas	0,0
Research chemicals	0,0
Legal highs	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.7.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	–	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1
Alcohol	–	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1
Cannabis	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8
Anfetaminas/speed	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3	3,8
Cocaína en polvo	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2
Cocaína base	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9	1,0
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	8,3	10,2	8,8	10,3
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8	0,6
Tranquilizantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	7,0	13,0	11,0	17,1	20,1
Somníferos (con o sin receta)	–	–	–	–	–	4,6	6,0	6,3	7,9	9,6
Hipnosedantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.8.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	–	46,8	44,7	46	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7
Alcohol	68,5	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3
Cannabis	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,1	0,8	0,7	0,7
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
Anfetaminas/speed	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6
Cocaína en polvo	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	3,1	2,7	2,3	2,2
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Tranquilizantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	3,9	6,9	5,5	9,8	10,6
Tranquilizantes (sin receta)	–	–	–	–	–	0,9	0,9	1,6	0,9	0,9
Somníferos (con o sin receta)	–	–	–	–	–	2,7	3,8	3,6	4,4	5,5
Somníferos (sin receta)	–	–	–	–	–	0,8	0,8	1,1	0,6	0,6
Hipnosedantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2
Hipnosedantes (sin receta)	12,3	2,3	2,3	2,8	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.9.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3
Alcohol	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4
Cannabis	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6
Éxtasis	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2
Alucinógenos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Anfetaminas/speed	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Cocaína en polvo	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	1,0
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tranquilizantes (con o sin receta)	-	-	-	-	2,7	4,7	4,0	6,9	7,7
Somníferos (con o sin receta)	-	-	-	-	2,0	2,5	2,7	3,4	4,0
Hipnosedantes (con o sin receta)	-	-	-	-	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.10.

Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.


	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8
Alcohol	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8
Cannabis	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,6	2,0	1,7	1,9
Tranquilizantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	2,6	2,3	4,0	5,9
Somníferos (con o sin receta)	-	-	-	-	-	1,1	1,4	1,7	3,1
Hipnosedantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	3,1	2,7	4,6	6,8

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.11.

Edad media (años) de inicio de consumo de sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2013.



### 1.1.12.

Edad media de inicio de consumo de sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 1995-2013.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	15,9	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4
Bebidas alcohólicas	–	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7
Cannabis	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7	18,6
Inhalables volátiles	17,7	19	18,1	17,5	17,5	17,8	19,7	19,2	19,7	19,4
Anfetaminas	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2	20,8
Alucinógenos	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5	20,9
Éxtasis	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8	21,1
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	–	20,9	21,0	21,3
Cocaína en polvo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0	21,3
Heroína	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5
Cocaína base	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	21,4	23,1	22,4	23,2
Hipnosedantes (sin receta)	35,2	28,7	29,2	29,5	30,0	–	29,1	29,5	27,8	31,3
Hipnosedantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	–	33,8	34,5	34,5	35,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.13.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Alcohol	93,1	95,0	91,3	89,9	93,8	93,4	94,2	93,3	75,2	93,7	92,2	93,7
Tabaco	73,1	77,5	68,6	61,5	73,4	74,6	78,5	73,4	42,9	74,0	68,5	75,6
Tranquilizantes (con o sin receta)	20,1	15,1	25,3	7,5	15,7	20,6	25,9	28,2	3,4	20,6	12,3	24,5
Somníferos (con o sin receta)	9,6	7,1	12,3	2,6	6,7	10,4	12,3	14,6	1,1	9,9	5,1	12,2
Hipnosedantes (con o sin receta)	22,2	16,8	27,6	8,2	17,0	22,8	28,3	31,5	3,6	22,7	13,4	27,0
Tranquilizantes (sin receta)	2,2	2,1	2,2	1,2	2,3	2,6	2,2	2,1	0,8	2,2	1,9	2,3
Somníferos (sin receta)	1,5	1,5	1,5	0,6	1,3	2,0	1,3	1,8	0,1	1,5	1,0	1,7
Hipnosedantes (sin receta)	2,7	2,6	2,8	1,5	2,9	3,2	2,6	2,7	0,8	2,7	2,3	2,8
Cannabis	30,4	37,9	22,7	38,0	41,7	32,6	25,5	13,3	19,6	30,7	40,2	25,0
Cocaína en polvo	10,2	14,9	5,4	6,4	15,2	14,5	8,1	3,7	1,4	10,5	11,6	9,4
Cocaína base	1,0	1,7	0,3	0,5	1,1	1,5	1,1	0,5	0,5	1,0	0,9	1,1
Cocaína (polvo y/o base)	10,3	15,0	5,4	6,6	15,3	14,6	8,2	3,8	1,6	10,5	11,7	9,5
Éxtasis	4,3	6,3	2,2	3,8	7,8	6,3	1,9	0,6	1,1	4,4	6,2	3,2
Anfetaminas/speed	3,8	5,7	1,8	2,9	6,2	5,1	2,6	1,3	0,9	3,9	4,9	3,2
Alucinógenos	3,8	5,8	1,8	3,0	6,3	5,4	2,3	0,9	1,3	3,9	5,0	3,1
Heroína	0,7	1,2	0,2	0,2	0,4	1,2	1,1	0,2	0,0	0,7	0,3	0,9
Inhalables volátiles	0,6	0,9	0,3	0,3	1,0	0,9	0,5	0,0	0,1	0,6	0,7	0,5
Nuevas sustancias	3,0	4,6	1,3	3,6	5,8	3,3	1,3	0,6	1,3	3,0	4,9	1,9
Ketamina	0,8	1,4	0,3	1,0	1,6	1,2	0,2	0,2	0,8	0,8	1,3	0,6
GHB	0,6	0,9	0,2	0,2	1,0	0,9	0,3	0,1	0,0	0,6	0,7	0,5
Spice	0,5	0,9	0,2	0,4	1,0	0,8	0,3	0,1	0,1	0,6	0,7	0,4
Piperazinas	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Nexus	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1
Metanfetamina	0,5	0,8	0,1	0,5	0,9	0,7	0,2	0,1	0,3	0,5	0,7	0,4
Setas mágicas	1,9	2,9	0,8	2,2	3,8	2,1	0,7	0,3	0,7	1,9	3,2	1,1
Research chemicals	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Salvia	0,5	0,8	0,2	0,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,5	0,8	0,3
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.14.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Alcohol	78,3	83,2	73,4	81,3	81,3	78,1	77,3	73,9	66,2	78,7	81,3	76,7
Tabaco	40,7	44,2	37,2	40,7	45,3	41,2	43,7	30,7	28,3	41,1	43,4	39,2
Hacer botellón	12,6	14,4	10,7	52,2	17,4	3,3	1,4	0,9	44,7	11,7	31,6	2,0
Hacer botellón y beber alcohol	11,1	12,9	9,3	48,6	15,7	2,5	0,5	0,3	40,8	10,3	29,1	1,2
Borracheras	19,1	25,4	12,6	41,4	29,7	16,3	8,9	4,0	26,3	18,8	34,5	10,4
Tranquilizantes (con o sin receta)	10,6	7,3	14,0	3,8	6,9	9,7	14,5	17,4	1,9	10,9	5,6	13,4
Somníferos (con o sin receta)	5,5	3,7	7,3	1,5	3,0	5,2	7,1	9,9	1,0	5,6	2,4	7,1
Hipnosedantes (con o sin receta)	12,2	8,5	16,0	4,4	7,8	11,1	16,6	20,5	2,1	12,5	6,4	15,5
Tranquilizantes (sin receta)	0,9	0,8	1,0	0,6	1,0	1,1	0,9	1,0	0,6	0,9	0,8	1,0
Somníferos (sin receta)	0,6	0,6	0,7	0,3	0,6	0,9	0,6	0,7	0,1	0,7	0,5	0,7
Hipnosedantes (sin receta)	1,2	1,1	1,3	0,6	1,4	1,5	1,1	1,3	0,6	1,2	1,1	1,3
Cannabis	9,2	12,9	5,4	21,0	14,3	7,2	4,5	1,8	14,5	9,1	17,0	4,8
Cocaína en polvo	2,1	3,3	0,9	2,6	3,6	2,7	1,1	0,4	0,8	2,2	3,2	1,5
Cocaína base	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	2,2	3,3	1,0	2,7	3,7	2,7	1,1	0,4	1,0	2,2	3,3	1,5
Éxtasis	0,7	1,0	0,3	1,6	1,4	0,4	0,1	0,1	0,5	0,7	1,5	0,2
Anfetaminas/speed	0,6	0,8	0,4	1,5	1,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,6	1,2	0,3
Alucinógenos	0,3	0,5	0,1	1,1	0,5	0,2	0,0	0,0	1,1	0,3	0,8	0,1
Heroína	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Nuevas sustancias	0,7	1,1	0,3	1,7	1,2	0,6	0,1	0,1	0,9	0,7	1,4	0,3
Ketamina	0,1	0,2	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,3	0,0
GHB	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Spice	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Piperazinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Nexus	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Metanfetamina	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0
Setas mágicas	0,2	0,3	0,1	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	0,1
Research chemicals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

## 1.1.15.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Alcohol	64,4	73,4	55,3	64,5	66,0	64,4	64,6	62,2	41,3	65,1	65,4	63,9
Tabaco	38,3	41,7	34,8	36,5	42,7	38,9	41,9	28,9	21,2	38,8	40,2	37,2
Binge drinking	15,5	20,8	10,0	25,0	21,3	13,6	11,1	8,2	13,3	15,5	22,8	11,3
Borracheras	7,0	9,5	4,5	18,1	11,1	4,9	2,7	1,3	10,7	6,9	14,0	3,1
Tranquilizantes (con o sin receta)	7,7	5,1	10,4	1,9	3,6	6,8	11,2	14,5	1,6	7,9	2,9	10,4
Somníferos (con o sin receta)	4,0	2,6	5,5	0,8	1,8	3,5	5,6	8,2	0,6	4,1	1,4	5,5
Hipnosedantes (con o sin receta)	8,9	5,8	12,1	2,2	4,2	7,7	12,7	17,2	1,8	9,1	3,4	12,0
Tranquilizantes (sin receta)	0,5	0,5	0,4	0,2	0,3	0,5	0,5	0,7	0,3	0,5	0,3	0,5
Somníferos (sin receta)	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,3
Hipnosedantes (sin receta)	0,6	0,6	0,5	0,3	0,5	0,7	0,5	0,7	0,3	0,6	0,4	0,6
Cannabis	6,6	9,8	3,4	14,7	10,5	5,4	3,3	1,2	7,7	6,6	12,2	3,5
Cocaína en polvo	1,0	1,7	0,4	0,8	1,5	1,5	0,8	0,2	0,2	1,0	1,2	0,9
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	1,0	1,7	0,4	0,8	1,5	1,5	0,8	0,2	0,2	1,0	1,2	0,9
Éxtasis	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1
Anfetaminas/speed	0,3	0,4	0,1	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,5	0,1
Alucinógenos	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Nuevas sustancias	0,3	0,5	0,2	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	0,2	0,3	0,6	0,2
Ketamina	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
GHB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spice	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Piperazinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nexus	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Setas mágicas	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0
Research chemicals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.16.

Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Alcohol	9,8	15,0	4,5	0,9	4,5	8,0	15,4	19,3	0,2	10,1	3,0	13,6
Tabaco	30,8	33,6	28,0	25,8	34,2	31,8	35,2	23,9	11,7	31,4	30,7	30,8
Tranquilizantes (con o sin receta)	5,9	3,7	8,1	1,2	2,3	5,0	8,9	11,6	0,9	6,0	1,9	8,1
Somníferos (con o sin receta)	3,1	1,9	4,3	0,5	1,1	2,5	4,7	6,3	0,4	3,2	0,9	4,3
Hipnosedantes (con o sin receta)	6,8	4,3	9,4	1,4	2,6	5,6	10,2	13,8	1,1	7,0	2,1	9,4
Cannabis	1,9	3,0	0,9	3,6	3,4	1,7	1,0	0,4	2,0	1,9	3,5	1,1

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.17.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (número estimado). España, 2013.

	Total	Hombres	Mujeres
Tabaco	142.282	76.539	65.743
Cannabis	168.677	83.932	84.745
Cocaína (polvo)	38.551	21.784	16.767

Incidencia = número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.18.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (tasa por mil habitantes) España, 2013.

	Total	Hombres	Mujeres
Tabaco	4,4	4,7	4,2
Cannabis	5,3	5,2	5,4
Cocaína ( polvo)	1,2	1,3	1,1

Tasa = número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses (total y por sexo) DIVIDIDO entre la población (total y por sexo) del padrón continuo (INE) a 1 enero 2012 MULTIPLICADO por 1.000.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.19.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (número estimado). España, 2013.

	Total	Menores edad	Mayores edad
	(15-64 años)	(15-17 años)	(18-64 años)
Tabaco	142.282	80.925	61.357
Cannabis	168.677	61.085	107.592
Cocaína ( polvo)	38.551	3.442	35.109

Incidencia = número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.20.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (tasa por mil habitantes) España, 2013.

	Total	Menores edad	Mayores edad					
	(15-64)	(15-17)	(18-64)	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Tabaco	4,4	62,3	2,1	27,5	1,0	0,7	0,0	0,0
Cannabis	5,3	47,0	3,6	30,5	1,6	1,2	0,3	0,1
Cocaína (polvo)	1,2	2,6	1,1	6,5	1,0	0,1	0,0	0,0

Tasa = número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses (total y por edad) DIVIDIDO entre la población (total y por edad del padrón continuo (INE) a 1 enero 2012 MULTIPLICADO por 1.000.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.21.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	72,7	66,9	65,2	64,7	69,4	67,6	69,2	68,7	67,9	70,7	66,6	69,8	70,1	78,3	67,8	74,2	68,5	75,6
Alcohol	-	-	91,4	89,9	87,4	87,2	89,3	88,8	88,9	88,3	93,2	94,1	87,7	88,3	92,2	95,5	89,5	91,7	92,2	93,7
Cannabis	22,9	6,1	32,4	14,4	28,1	12,3	34,3	15,3	39,0	21,0	39,4	20,4	37,5	20,2	42,4	25,2	36,9	21,6	40,2	25,0
Éxtasis	3,5	0,5	4,8	0,4	4,4	0,7	7,7	1,0	8,3	1,6	7,6	1,9	7,2	2,2	8,4	2,6	5,7	2,3	6,2	3,2
Alucinógenos	3,3	0,9	4,7	1,3	2,9	1,0	4,6	1,3	4,7	1,6	5,4	1,9	5,9	2,3	5,7	2,4	4,4	2,0	5,0	3,1
Anfetaminas/speed	3,7	1,0	4,2	1,3	3,1	1,3	4,6	1,5	4,7	1,9	5,2	2,0	5,6	2,6	5,7	2,4	4,6	2,4	4,9	3,2
Cocaína en polvo	5,4	1,4	5,5	1,6	4,7	1,8	7,7	2,4	8,9	3,6	10,4	4,4	11,4	5,5	13,5	7,9	11,0	7,4	12,0	9,4
Cocaína base	0,5	0,1	0,7	0,2	0,6	0,2	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,6	2,3	1,5	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1
Heroína	1,4	0,2	0,9	0,3	0,6	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3	0,9
Inhalables volátiles	1,1	0,3	1,3	0,3	0,9	0,4	1,5	0,2	1,7	0,5	1,2	0,5	1,7	0,8	1,0	0,4	1,1	0,6	0,7	0,5
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	8,4	8,8	16,0	7,1	13,8	10,7	21,0	12,3	24,0
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,8	3,7	7,6	4,0	8,0	3,9	10,3	5,1	12,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.22.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	54,5	39,9	49,5	40,6	52,0	41,2	52,8	43,8	47,3	38,8	46,2	38,8	45,3	41,1	43,8	37,9	43,4	39,2
Alcohol	72,9	64,1	82,5	74,9	79,0	71,8	81,5	75,2	79,5	74,2	79,4	74,7	76,9	71,1	80,1	77,7	79,1	75,1	81,3	76,7
Cannabis	12,7	2,3	14,2	1,8	12,6	2,2	16,7	3,3	20,1	4,2	19,8	4,7	18,9	3,9	19,4	4,6	17,0	5,1	17,0	4,8
Éxtasis	2,4	0,1	1,8	0,0	1,6	0,1	3,7	0,2	2,9	0,1	2,4	0,4	2,4	0,4	1,8	0,2	1,4	0,2	1,5	0,2
Alucinógenos	1,3	0,2	1,8	0,1	1,2	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,5	0,1	1,4	0,1	1,1	0,1	0,9	0,1	0,8	0,1
Anfetaminas/speed	1,8	0,2	1,8	0,1	1,3	0,2	2,2	0,2	1,6	0,2	1,9	0,3	1,7	0,2	1,4	0,1	1,1	0,3	1,2	0,3
Cocaína en polvo	3,1	0,5	2,9	0,5	2,8	0,5	4,5	0,9	4,8	0,9	5,2	1,3	5,3	1,3	4,3	1,5	3,5	1,4	3,2	1,5
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0
Heroína	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,8	4,4	8,4	3,1	7,1	5,5	12,4	5,6	13,4
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	1,8	4,6	1,9	4,7	2,0	5,9	2,4	7,1
Tranquilizantes (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	1,1	0,8	1,6	1,5	1,0	0,9	0,8	1,0
Somníferos (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,9	0,7	0,7	1,0	1,1	0,5	0,7	0,5	0,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.23.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1997-2013.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	49,6	36,9	43,7	36,9	46,3	37,5	47,2	39,5	42,3	35,5	42,2	36,3	40,9	38,4	40,4	35,9	40,2	37,2
Alcohol	66,7	61,6	64,4	59,4	65,7	62,1	65,8	62,7	66,3	63,4	61,7	59,4	63,1	63,3	63,7	61,5	65,4	63,9
Cannabis	8,5	1,1	7,9	1,5	11,5	2,3	13,4	2,9	15,4	3,6	13,5	2,8	14,1	3,2	12,5	3,7	12,2	3,5
Éxtasis	0,6	0,0	0,5	0,0	1,5	0,2	0,7	0,0	1,1	0,2	0,8	0,2	0,8	0,1	0,6	0,1	0,4	0,1
Alucinógenos	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0
Anfetaminas/speed	0,5	0,0	0,5	0,1	1,1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1
Cocaína en polvo	1,6	0,2	1,5	0,3	2,4	0,5	1,9	0,4	2,8	0,7	2,9	0,7	2,0	0,7	1,7	0,8	1,2	0,9
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,5	2,5	6,2	1,8	5,5	2,8	9,5	2,9	10,4
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,9	1,0	3,6	1,2	3,7	1,3	4,7	1,4	5,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.24.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	55,0	38,7	50,3	39,2	51,5	40,5	53,0	42,6	47,2	37,5	46,0	37,6	48,4	37,0	44,2	36,0	44,2	37,2
Alcohol	79,3	58,0	86,4	70,5	83,2	67,2	85,2	70,9	84,5	68,4	84,0	69,2	80,4	66,4	84,4	72,7	83,2	69,9	83,2	73,4
Cannabis	10,7	4,4	10,7	4,7	9,6	4,3	13,0	5,5	16,2	6,3	15,7	6,6	13,6	6,6	14,8	6,2	13,6	5,5	12,9	5,4
Éxtasis	1,9	0,7	1,2	0,5	1,2	0,5	2,8	0,7	2,0	0,8	1,8	0,6	1,6	0,5	1,4	0,3	1,0	0,4	1,0	0,3
Alucinógenos	1,1	0,4	1,4	0,4	0,8	0,4	1,2	0,2	0,9	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2	0,5	0,1
Anfetaminas/speed	1,3	0,7	1,4	0,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,1	0,5	1,4	0,5	1,3	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,4
Cocaína en polvo	2,7	1,0	2,6	0,6	2,3	0,8	3,8	1,3	4,1	1,2	4,6	1,3	4,4	1,5	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	0,9
Cocaína base	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1,6	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	1,0
Heroína	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Tranquilizantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,2	4,7	9,1	3,4	7,6	6,4	13,2	7,3	14,0
Tranquilizantes (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,0	0,9	0,9	1,5	1,7	0,9	1,0	0,8	1,0
Somníferos (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	2,8	4,3	2,6	4,6	3,1	5,9	3,7	7,3
Somníferos (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	0,6	0,8	1,1	1,0	0,5	0,7	0,6	0,7
Hipnosedantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,7	6,8	11,5	4,6	9,3	7,6	15,3	8,5	16,0
Hipnosedantes (sin receta)	8,2	1,6	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	3,1	2,9	3,3	1,1	1,3	1,2	1,4	1,9	1,9	1,1	1,2	1,1	1,3

H = Hombres; M = Mujeres.

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.25.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1997-2013.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	51,4	34,4	45,0	35,2	46,5	36,3	47,9	37,9	43,1	33,6	42,6	34,7	44,7	34,0	41,4	33,7	41,7	34,8
Alcohol	75,8	52,1	74,4	49,1	76,4	50,9	75,8	52,1	76,0	52,9	71,4	49,0	74,0	52,2	73,2	51,2	73,4	55,3
Cannabis	6,7	2,5	6,2	2,8	9,4	3,4	11,3	3,9	12,5	4,7	10,0	4,2	11,0	4,0	10,2	3,8	9,8	3,4
Éxtasis	0,5	0,1	0,3	0,2	1,3	0,3	0,5	0,2	0,9	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1
Alucinógenos	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
Anfetaminas/speed	0,4	0,1	0,4	0,2	0,9	0,2	0,4	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1
Cocaína en polvo	1,5	0,2	1,3	0,4	2,2	0,5	1,6	0,5	2,5	0,7	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Tranquilizantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,7	3,3	6,3	2,4	5,7	4,4	9,6	5,1	10,4
Somníferos (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,8	2,0	3,0	1,9	3,5	2,1	4,7	2,6	5,5
Hipnosedantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,1	4,3	7,6	3,2	7,0	5,2	11,4	5,8	12,1

H = Hombres; M = Mujeres.

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.26.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (años). España, 2013.

	Edad media inicio en consumo de tabaco	Edad media inicio en consumo de tabaco diario	Edad media inicio en consumo de alcohol	Edad media inicio en consumo de cannabis
Andalucía	16,3	19,0	16,8	18,6
Aragón	16,2	18,2	16,2	19,1
Asturias	16,0	18,3	16,5	18,5
Baleares	16,6	18,2	16,7	18,7
Canarias	16,5	18,3	17,1	18,6
Cantabria	15,9	18,0	16,4	18,4
Castilla-La Mancha	16,6	18,5	16,7	18,4
Castilla y León	16,1	18,3	16,1	19,5
Cataluña	16,5	18,3	16,7	18,5
C. Valenciana	16,3	18,6	16,4	18,5
Extremadura	15,8	18,3	16,5	18,0
Galicia	16,3	19,2	16,2	18,6
Madrid	16,6	18,7	17,2	18,3
Murcia	16,3	17,5	16,5	18,7
Navarra	16,5	19,9	16,3	18,8
País Vasco	16,3	18,6	16,6	18,7
La Rioja	16,2	18,8	16,5	19,1
Ceuta	18,0	21,5	17,8	20,5
Melilla	16,6	19,0	17,3	19,0
<b>Media España</b>	<b>16,4</b>	<b>18,6</b>	<b>16,7</b>	<b>18,6</b>

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.27.

Prevalencias de consumo de alcohol entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Andalucía	92,3	79,4	65,3
Aragón	95,0	84,3	68,6
Asturias	97,3	87,0	71,9
Baleares	93,1	80,6	65,5
Canarias	91,6	72,3	55,6
Cantabria	93,3	74,8	48,4
Castilla-La Mancha	90,8	66,8	53,8
Castilla y León	95,4	78,7	62,9
Cataluña	91,3	77,9	65,8
C. Valenciana	94,7	81,2	65,6
Extremadura	94,3	74,1	56,0
Galicia	95,5	79,9	66,9
Madrid	93,9	77,7	65,6
Murcia	89,2	73,1	65,5
Navarra	92,1	81,9	65,2
País Vasco	96,9	84,9	69,8
La Rioja	89,2	81,7	69,9
Ceuta	70,0	45,7	35,7
Melilla	65,5	46,0	37,0
Media España	93,1	78,3	64,4

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.28.

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.29.

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.30.

Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013.


	TOTAL últimos 12 meses	HOMBRES últimos 12 meses	MUJERES últimos 12 meses
Andalucía	21,9	29,2	14,6
Aragón	19,7	24,4	14,7
Asturias	14,8	22,2	7,6
Baleares	18,1	22,0	14,0
Canarias	17,5	24,3	10,5
Cantabria	16,3	22,2	10,4
Castilla-La Mancha	11,4	15,1	7,4
Castilla y León	14,7	18,3	10,8
Cataluña	18,7	24,4	12,8
C. Valenciana	18,7	25,1	12,2
Extremadura	22,0	32,2	11,4
Galicia	21,9	30,7	13,2
Madrid	17,0	23,3	10,9
Murcia	21,7	27,6	15,4
Navarra	32,9	39,2	26,4
País Vasco	22,1	29,9	14,2
La Rioja	24,0	32,3	15,4
Ceuta	11,8	17,5	5,5
Melilla	12,3	16,3	7,8
Media España	19,1	25,4	12,6

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.31.

Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.


	Últimos 12 meses
Andalucía	21,9
Aragón	19,7
Asturias	14,8
Baleares	18,1
Canarias	17,5
Cantabria	16,3
Castilla-La Mancha	11,4
Castilla y León	14,7
Cataluña	18,7
C. Valenciana	18,7
Extremadura	22,0
Galicia	21,9
Madrid	17,0
Murcia	21,7
Navarra	32,9
Pais Vasco	22,1
La Rioja	24,0
Ceuta	11,8
Melilla	12,3
Media España	19,1



1.1.32.

Prevalencias de borracheras en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL últimos 30 días	HOMBRES últimos 30 días	MUJERES últimos 30 días
Andalucía	7,7	10,6	4,7
Aragón	7,4	8,2	6,5
Asturias	4,5	6,5	2,4
Baleares	7,0	8,2	5,8
Canarias	6,9	10,0	3,7
Cantabria	8,2	10,8	5,5
Castilla-La Mancha	5,3	6,7	3,7
Castilla y León	6,7	8,1	5,2
Cataluña	7,4	10,2	4,5
C. Valenciana	5,1	7,0	3,3
Extremadura	7,9	11,3	4,2
Galicia	8,2	11,9	4,6
Madrid	6,5	8,6	4,6
Murcia	8,4	10,5	6,2
Navarra	11,3	15,3	7,1
País Vasco	7,3	10,9	3,7
La Rioja	9,8	15,2	4,2
Ceuta	3,7	5,7	1,6
Melilla	4,2	4,6	3,6
Media España	7,0	9,5	4,5






1.1.34.

Prevalencias de hacer botellón en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL últimos 12 meses	HOMBRES últimos 12 meses	MUJERES últimos 12 meses
Andalucía	16,4	18,6	14,2
Aragón	13,0	14,0	12,0
Asturias	8,0	9,2	6,9
Baleares	8,3	9,8	6,8
Canarias	11,1	13,5	8,7
Cantabria	9,4	11,9	6,8
Castilla-La Mancha	12,5	13,3	11,7
Castilla y León	11,3	13,4	9,2
Cataluña	11,0	12,4	9,5
C. Valenciana	11,2	13,5	8,8
Extremadura	24,3	25,7	22,8
Galicia	10,5	13,1	7,9
Madrid	11,2	12,8	9,7
Murcia	18,8	21,9	15,6
Navarra	10,6	10,1	11,1
País Vasco	10,8	12,0	9,5
La Rioja	14,1	18,9	9,0
Ceuta	11,7	14,0	9,0
Melilla	9,5	12,1	6,5
<b>Media España</b>	<b>12,6</b>	<b>14,4</b>	<b>10,7</b>



### 1.1.35.


Prevalencias de hacer botellón y consumir alcohol en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL últimos 12 meses	HOMBRES últimos 12 meses	MUJERES últimos 12 meses
Andalucía	14,8	17,0	12,5
Aragón	10,4	11,2	9,4
Asturias	7,9	9,1	6,7
Baleares	7,7	8,8	6,6
Canarias	9,8	11,8	7,8
Cantabria	9,0	11,4	6,5
Castilla-La Mancha	10,0	11,3	8,6
Castilla y León	10,3	11,7	8,9
Cataluña	9,1	10,4	7,8
C. Valenciana	10,4	12,6	8,1
Extremadura	21,1	23,8	18,2
Galicia	9,8	12,2	7,5
Madrid	9,8	11,4	8,3
Murcia	16,8	19,7	13,7
Navarra	10,5	9,8	11,1
País Vasco	10,0	11,0	9,0
La Rioja	13,5	17,6	9,0
Ceuta	11,0	12,7	9,0
Melilla	8,3	10,3	6,0
<b>Media España</b>	<b>11,1</b>	<b>12,9</b>	<b>9,3</b>

Media nacional 11,1%

■ < media España


■ > media España



FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.36.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.37.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.38.


Prevalencias de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Andalucía	25,1	8,0	5,5
Aragón	29,2	7,7	5,3
Asturias	27,9	5,4	3,3
Baleares	32,4	12,9	10,7
Canarias	33,8	9,3	6,8
Cantabria	36,2	6,0	4,5
Castilla-La Mancha	23,5	6,4	4,6
Castilla y León	25,3	6,1	3,2
Cataluña	35,1	11,9	8,9
C. Valenciana	34,6	10,8	7,7
Extremadura	29,9	8,4	5,5
Galicia	30,5	8,4	6,1
Madrid	30,1	9,1	7,0
Murcia	26,6	9,4	7,5
Navarra	31,2	10,3	7,4
País Vasco	36,9	10,3	7,2
La Rioja	34,6	11,1	6,6
Ceuta	16,2	3,7	3,4
Melilla	16,0	5,8	4,2
Media España	30,4	9,2	6,6

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.39.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.40.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.41.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas y edad media de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.42.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alguna vez en la vida	91,0	88,8	95,2	92,3	94,1	92,7	96,2	92,3	97,8	88,7
Últimos 12 meses	83,1	79,4	86,5	75,9	82,3	73,5	82,5	72,5	81,1	66,6
Últimos 30 días	68,0	60,8	74,8	57,0	72,9	55,2	75,2	54,5	74,5	49,8
Diariamente en los últimos 30 días	1,3	0,5	7,2	1,7	11,9	3,8	23,9	7,3	29,7	8,7
Nunca	9,0	11,2	4,8	7,7	5,9	7,3	3,8	7,7	2,2	11,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.43.

Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.44.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los que han consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, según grupo de edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2013.

	15 - 64 años			15 - 34 años			35 - 64 años		
	Días laborables	Jueves	Fin de semana	Días laborables	Jueves	Fin de semana	Días laborables	Jueves	Fin de semana
Vino/champán	20,7	20,3	39,0	6,9	6,8	20,0	27,9	27,5	49,8
Cerveza/sidra	32,3	34,5	69,5	25,5	29,6	68,3	35,9	37,0	70,3
Aperitivos/vermut	0,5	0,5	3,3	0,4	0,4	2,1	0,5	0,6	4,0
Combinados/cubatas	1,2	2,7	35,7	1,4	4,6	59,9	1,2	1,7	21,9
Licores de frutas	0,3	0,4	2,7	0,3	0,6	3,2	0,2	0,2	2,3
Licores fuertes	0,9	1,0	5,9	0,4	0,7	6,5	1,1	1,2	5,6
Cualquier bebida alcohólica	45,7	47,9	99,1	29,9	34,6	99,3	53,9	54,9	99,0

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES)

### 1.1.45.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.46.

Prevalencia de consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.47.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.48.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.49.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2013.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	
Borracheras																			
últimos 30 días	10,9	13,0	8,1	28,2	32,6	23,0	16,9	21,0	11,4	7,6	9,1	5,4	4,1	5,6	2,3	2,1	2,7	1,1	

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.50.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que se han emborrachado en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.51.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.




1.1.52.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en atracón (binge drinking) y de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 1999-2013.




1.1.53.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.



1.1.54.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.55.

Prevalencia de hacer botellón y del consumo de bebidas alcohólicas en botellones, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-18 años		
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M
Hacer botellón	52,2	56,2	47,9	17,4	21,3	13,4	3,3	4,3	2,2	1,4	1,3	1,5	0,9	1,2	0,5	51,4	53,7	49,0
Hacer botellón y beber alcohol	48,6	52,2	44,7	15,7	19,9	11,4	2,5	3,3	1,6	0,5	0,4	0,5	0,3	0,5	0,1	47,6	49,4	45,8

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.56.

Prevalencia de hacer botellón y del consumo de bebidas alcohólicas en botellones, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.57.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas)\*, según haya hecho botellón en el último año o no. España, 2013.

	15-64 años		15-24 años	
	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	29,4	45,3	30,3	51,4
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	87,8	91,1	89,2	92,4

\* Eliminando los casos que han contestado Ns/Nc

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.58.

Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses entre la población según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2013.

	15-64 años		15-24 años	
	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Ninguna sustancia	1,2	14,4	0,9	26,4
Una sustancia	37,8	45,6	39,9	45,3
Dos sustancias	32,6	30,3	31,1	19,1
Tres sustancias	20,2	7,9	21,1	7,9
Cuatro sustancias	4,7	1,4	3,7	0,9
Cinco o más sustancias	3,5	0,5	3,2	0,4

\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.59.

Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT  $\geq 8$ ) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT  $\geq 20$ ), entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M
Consumo riesgo																		
(AUDIT $\geq 8$ )	6,4	9,7	2,6	11,8	16,0	7,1	7,5	11,7	2,4	5,1	8,0	1,6	4,6	6,8	2,1	4,3	7,5	0,3
Posible dependencia																		
(AUDIT $\geq 20$ )	0,5	0,8	0,1	0,6	0,9	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,6	0,0	0,7	1,1	0,1	0,5	0,9	0,0

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.60.

Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT  $\geq 8$ ) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT  $\geq 20$ ), entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.61.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses, borracheras en los últimos 30 días y binge drinking en los últimos 30 días entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT  $\geq 8$ ) o no (AUDIT  $< 8$ ) (porcentajes) entre la población de 15 a 64 años. España, 2013.

	Consumidores de riesgo	No consumidores de riesgo
	(AUDIT $\geq 8$ )	(AUDIT $< 8$ )
Borracheras últimos 12 meses	77,8	21,0
Binge drinking últimos 30 días	87,5	15,5
Borracheras últimos 30 días	53,1	6,1

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.62.

Riesgo percibido ante el consumo de drogas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT  $\geq$ 8) o no (AUDIT <8) (porcentajes). España, 2013.

	Consumidores de riesgo	No consumidores de riesgo
	(AUDIT $\geq$ 8)	(AUDIT <8)
Fumar un paquete de tabaco diario	82,2	88,7
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	20,3	39,2
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	74,2	90,9
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	33,3	58,4
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	56,7	81,9
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes	50,8	54,8
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez por semana o más	72,3	77,6
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	57,8	72,5
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	86,1	95,1
Consumir éxtasis una vez por semana o más	97,1	99,1
Probar cocaína una o dos veces en su vida	52,6	70,2
Consumir cocaína una vez o menos al mes	81,1	93,8
Consumir cocaína una vez por semana o más	96,4	99,1
Consumir heroína una vez o menos al mes	94,5	97,2
Consumir heroína una vez por semana o más	98,5	99,6
Consumir alucinógenos (ácidos, tripsis, LSD) una vez o menos al mes	86,0	94,3
Probar cocaína en forma de base o crack 1 ó 2 veces en su vida	80,2	88,9
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	92,1	97,3
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	98,0	99,6
Consumir anfetaminas o speed una vez o menos al mes	87,8	96,4
Consumir anfetaminas o speed una vez por semana o más	96,2	98,9
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	84,7	94,7
Consumir setas mágicas una vez por semana o más	94,9	98,9
Consumir ketamina una vez o menos al mes	92,7	97,5
Consumir ketamina una vez por semana o más	98,2	99,7

% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.63.

Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje que se encuentra frecuente o muy frecuente cada situación en el lugar donde vive), en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT  $\geq 8$ ) o no (AUDIT  $< 8$ ), (porcentajes). España, 2013.

	Consumidores de riesgo (AUDIT $\geq 8$ )	No consumidores de riesgo (AUDIT $< 8$ )
Jeringuillas en el suelo	2,6	1,8
Personas inyectándose drogas	2,4	1,1
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio	4,6	2,2
Personas drogadas caídas en el suelo	7,9	3,3
Vendedores que ofrecen drogas	16,4	9,2
Personas esnifando drogas por la nariz (por ejemplo en el baño de bares o discotecas, en portales, coches, etc.)	19,4	7,6
Personas fumando porros	68,3	53,6
Personas haciendo botellón	53,6	43,0

% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.64.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas ilegales\* en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT  $\geq 8$ ) o no (AUDIT  $< 8$ ) (porcentajes). España, 2013.

	Consumidores de riesgo (AUDIT $\geq 8$ )	No consumidores de riesgo (AUDIT $< 8$ )
Solo alcohol y/o tabaco y/o hipnosedantes y/o inhalables volátiles	56,8	90,1
Una sustancia	25,6	8,3
Dos sustancias	10,3	1,1
Tres sustancias	3,7	0,3
Cuatro sustancias	2,1	0,1
Cinco o más sustancias	1,4	0,0

\* Cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.65.

Características de la población de 15 a 64 años que ha que ha consumido alcohol en el último año según tenga un consumo de riesgo (AUDIT $\geq$ 8) o no (AUDIT $<$ 8) (porcentajes). España, 2013.

	18 a 24 años		25 a 34 años		35 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años	
	AUDIT $\geq$ 8	AUDIT $<$ 8								
Sexo										
Hombre	71,1	49,8	85,3	52,1	85,6	52,9	78,1	51,1	96,5	53,8
Mujer	28,9	50,2	14,7	47,9	14,4	47,1	21,9	48,9	3,5	46,2
Situación laboral										
Trabajando	16,1	17,5	45,6	56,5	61,4	61,2	51,0	56,7	37,0	33,5
Parado	25,6	18,4	36,4	28,9	31,7	27,0	23,8	23,6	18,7	14,5
Nivel de estudios										
Primarios	15,9	11,2	13,3	6,1	19,6	8,6	24,5	14,4	32,9	30,1
Secundarios	78,9	81,5	70,4	65,9	69,2	65,3	65,4	66,2	50,1	54,4
Universitarios	5,2	7,4	16,4	28,0	11,2	26,1	10,1	19,4	17,0	15,5
Estado civil										
Soltero	97,6	94,9	77,0	65,2	44,8	26,9	19,4	14,5	15,3	8,5
Casado	1,9	4,8	18,0	32,3	43,5	64,0	58,0	72,9	59,6	76,1
Separado/Divorciado	0,5	0,2	3,9	2,4	11,5	8,5	19,9	11,1	19,8	8,9
Nº de días que ha consumido alcohol en los últimos 30 días										
Entre 1 y 3 días	19,9	39,1	12,6	31,4	10,7	28,0	4,7	24,1	3,1	20,6
Entre 4 y 9 días	49,4	28,3	34,4	28,9	19,2	28,3	7,7	22,8	8,3	20,0
Entre 10 y 19 días	16,6	7,6	21,7	12,2	19,2	11,8	13,4	12,1	12,1	11,1
Entre 20 y 29 días	5,5	1,4	12,6	3,1	12,1	4,7	21,4	5,4	14,7	7,0
30 días	3,4	0,9	16,7	4,7	35,0	8,9	49,5	18,7	61,8	25,2
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 30 días	5,3	22,7	2,1	19,6	3,7	18,3	3,3	16,9	0,0	16,2
Borracheras										
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	93,6	45,7	88,4	33,0	77,0	18,1	59,6	9,3	38,5	4,0
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	70,0	16,2	59,9	10,2	50,7	3,9	36,4	2,0	21,9	0,9
Binge drinking: ha hecho binge drinking en los últimos 30 días										
	87,9	23,6	87,7	21,8	88,9	14,0	84,7	11,1	87,4	8,0
Percepción de riesgo										
% que opina que tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana puede causar bastantes o muchos problemas	19,9	37,1	17,3	34,9	19,5	36,3	20,8	42,4	29,4	46,7
% que opina que tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día puede causar bastantes o muchos problemas	81,5	90,7	75,5	90,3	74,3	90,6	64,0	91,2	66,5	92,2

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.66.

Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT  $\geq 8$ ) entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M
Prevalencia bebedores de riesgo	5,0	8,0	1,9	9,5	13,3	5,6	6,1	10,1	1,8	4,0	6,6	1,2	3,5	5,6	1,5	3,2	6,1	0,2

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.67.

Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT  $\geq 8$ ) entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.68.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.69.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.70.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.71.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2013.



### 1.1.72.

Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15 a 64 años			15 a 34 años			35 a 64 años		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Hipnosedantes con o sin receta									
Alguna vez	22,2	16,8	27,6	13,4	11,0	15,9	27,0	20,0	34,1
Último año	12,2	8,5	16,0	6,4	4,8	8,0	15,5	10,6	20,5
Último mes	8,9	5,8	12,1	3,4	2,6	4,2	12,0	7,6	16,4
A diario	6,8	4,3	9,4	2,1	1,5	2,8	9,4	5,8	13,0
Tranquilizantes/sedantes con o sin receta									
Alguna vez	20,1	15,1	25,3	12,3	10,1	14,7	24,5	17,9	31,1
Último año	10,6	7,3	14,0	5,6	4,2	7,1	13,4	9,0	17,9
Último mes	7,7	5,1	10,4	2,9	2,3	3,5	10,4	6,6	14,2
A diario	5,9	3,7	8,1	1,9	1,3	2,4	8,1	5,1	11,2
Somníferos con o sin receta									
Alguna vez	9,6	7,1	12,3	5,1	3,8	6,3	12,2	8,9	15,6
Último año	5,5	3,7	7,3	2,4	1,8	3,1	7,1	4,8	9,5
Último mes	4,0	2,6	5,5	1,4	1,0	1,8	5,5	3,4	7,5
A diario	3,1	1,9	4,3	0,9	0,7	1,1	4,3	2,6	6,0

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.73.


Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.74.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en últimos 12 meses y últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013.



	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombres	8,5	5,8
Mujeres	16,0	12,1
Total	12,2	8,9

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.75.


Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).


1.1.76.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.




1.1.77.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2013.



### 1.1.78.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años. España, 2005-2013.



### 1.1.79.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15 a 64 años			15 a 34 años			35 a 64 años		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
<b>Hipnosedantes sin receta</b>									
Alguna vez	2,7	2,6	2,8	2,3	2,1	2,6	2,8	2,8	2,9
Último año	1,2	1,1	1,3	1,1	0,9	1,3	1,3	1,2	1,4
Último mes	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,6
<b>Tranquilizantes sin receta</b>									
Alguna vez	2,2	2,1	2,2	1,9	1,8	2,0	2,3	2,3	2,3
Último año	0,9	0,8	1,0	0,8	0,6	1,1	1,0	1,0	1,0
Último mes	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,5
<b>Somníferos sin receta</b>									
Alguna vez	1,5	1,5	1,5	1,0	0,9	1,2	1,7	1,8	1,6
Último año	0,6	0,6	0,7	0,5	0,3	0,6	0,7	0,7	0,8
Último mes	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.80.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



### 1.1.81.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas\* en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años según haya consumido hipnosedantes sin receta o no en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013.

	Ha consumido hipnosedantes sin receta	No ha consumido hipnosedantes sin receta
Ninguna sustancia	0,0	13,8
Una sustancia	11,0	44,8
Dos sustancias	38,1	30,1
Tres sustancias	27,8	9,0
Cuatro sustancias	13,8	1,6
Cinco o más sustancias	9,3	0,7

\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.82.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis y edad media de inicio en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




1.1.83.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.84.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.85.

Continuidad en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.86.

Prevalencia de personas que han consumido tabaco y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013.

15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-17 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
7,8	11,0	4,6	17,0	21,9	11,9	12,4	18,3	6,4	6,2	9,1	3,2	4,1	5,5	2,8	1,5	2,5	0,5	11,5	14,2	8,6

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.87.

Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013.


15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-17 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
5,8	8,7	2,9	12,5	17,1	7,7	9,3	14,2	4,3	4,8	7,2	2,1	2,9	4,5	1,5	1,0	1,8	0,2	6,6	9,4	3,6

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.88.

Categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado la escala. España, 2013.



### 1.1.89.

Prevalencia de consumo de riesgo, consumo de bajo riesgo y consumo no problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según sexo y edad (%). España, 2013.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años			15-17 años		
	Total	H	M									
Consumo riesgo (% positivos CAST $\geq$ 4)	25,0	29,0	15,2	24,0	26,7	17,1	27,1	33,3	11,4	20,4	25,5	10,2
Consumo bajo riesgo (% positivos CAST = 2 o 3)	27,8	30,1	22,0	29,4	32,1	22,9	24,5	26,2	20,1	23,5	23,5	23,4
Consumo no problemático (% positivos CAST = 0 o 1)	47,2	40,9	62,8	46,6	41,1	60,0	48,4	40,5	68,5	56,1	51,0	66,4

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.90.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general (porcentajes)\*. España, 2013.

	Consumidores de riesgo (CAST $\geq$ 4)	No consumidores de riesgo (CAST <4)	Población general
Cannabis	91,4	90,8	64,6
Heroína	47,3	38,1	31,6
Cocaína	76,6	70,8	46,9
Alucinógenos	56,0	47,6	33,0
Éxtasis u otras drogas de síntesis	60,3	48,6	32,7
GHB o éxtasis líquido	48,0	35,4	27,5
Anfetaminas o speed	61,7	50,0	32,6
Setas mágicas	48,7	40,5	27,7
Ketamina	46,2	34,5	26,2

\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.91.

Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general. España, 2013.

	Consumidores de riesgo (CAST $\geq$ 4)	No consumidores de riesgo (CAST <4)	Población general
Fumar un paquete de tabaco diario	77,8	83,1	88,7
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	22,6	22,9	43,5
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	79,9	85,6	90,7
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	11,6	15,3	61,2
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	29,3	44,1	82,4
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes	51,6	46,6	57,6
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez por semana o más	75,0	75,3	78,5
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	45,7	49,0	74,8
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	77,0	86,6	95,1
Consumir éxtasis una vez por semana o más	94,8	96,8	99,0
Probar cocaína una o dos veces en su vida	39,4	43,8	72,4
Consumir cocaína una vez o menos al mes	72,5	81,1	93,8
Consumir cocaína una vez por semana o más	95,8	96,7	99,0
Consumir heroína una vez o menos al mes	93,3	94,6	97,2
Consumir heroína una vez por semana o más	98,7	99,1	99,6
Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes	81,5	86,7	94,4
Probar cocaína en forma de base o crack 1 ó 2 veces en su vida	77,6	80,4	89,5
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	87,6	93,4	97,2
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	96,2	99,0	99,5
Consumir anfetaminas o speed una vez o menos al mes	81,8	90,0	96,3
Consumir anfetaminas o speed una vez por semana o más	94,9	97,3	98,9
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	79,1	84,0	94,8
Consumir setas mágicas una vez por semana o más	94,3	95,9	98,8
Consumir ketamina una vez o menos al mes	90,7	94,0	97,4
Consumir ketamina una vez por semana o más	97,8	98,9	99,6

% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.92.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general. (porcentajes). España, 2013.

	Consumidores de riesgo (CAST $\geq$ 4)	No consumidores de riesgo (CAST <4)	Población general
Alcohol	88,7	96,7	78,3
Tabaco	91,4	84,1	40,7
Hipnosedantes	19,0	11,1	12,2
Cocaína (polvo y/o base)	29,0	14,6	2,2
Éxtasis	9,3	4,4	0,7
Anfetaminas/speed	9,6	4,4	0,6
Alucinógenos	4,5	2,8	0,3
Heroína	1,5	0,3	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,5	0,1

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.93.

Características de la población de 15 a 64 años de edad que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST  $\geq 4$ ) o no (CAST  $< 4$ ) y entre la población general (porcentajes). España, 2013.

	15 a 24 años			25 a 34 años			35 a 64 años		
	CAST $\geq 4$	CAST $< 4$	P. GRAL.	CAST $\geq 4$	CAST $< 4$	P. GRAL.	CAST $\geq 4$	CAST $< 4$	P. GRAL.
Sexo									
Hombre	76,1	64,1	51,1	82,0	72,9	50,6	88,2	66,0	50,2
Mujer	23,9	35,9	48,9	18,0	27,1	49,4	11,8	34,0	49,8
Situación laboral									
Trabajando	14,6	18,6	16,6	38,3	49,6	53,6	34,9	52,8	48,7
Parado	37,6	24,2	20,1	47,9	36,1	30,0	41,7	34,4	22,7
Nivel de estudios									
Primarios	26,6	12,8	14,2	14,9	7,3	7,7	18,5	14,5	19,0
Secundarios	72,7	80,7	79,1	78,0	67,5	66,9	71,0	66,1	61,9
Universitarios	0,8	6,5	6,8	7,2	25,2	25,4	10,5	19,4	19,1
Nº de días que ha consumido cannabis en los últimos 30 días									
Entre 1-3 días	7,4	25,7	4,3	10,0	21,9	2,5	7,7	25,7	1,0
Entre 4-9 días	14,0	15,2	3,1	7,1	12,7	1,7	14,0	13,7	0,7
Entre 10-19 días	13,2	12,1	2,4	12,4	12,4	1,7	18,9	7,4	0,5
Entre 20-29 días	12,0	4,3	1,3	13,9	6,6	1,1	12,4	5,1	0,3
30 días	45,8	9,5	3,6	48,3	17,3	3,4	41,9	17,0	1,1
No ha consumido cannabis o marihuana en los últimos 30 días	7,7	33,2	23,2	8,2	29,1	31,1	5,1	31,0	21,4
Nunca ha consumido cannabis	0,0	0,0	62,1	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	75,1
Percepción de riesgo									
Porcentaje que opina que fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes puede causar bastantes o muchos problemas	5,3	19,1	52,3	11,6	15,3	51,8	16,6	11,3	66,4
Porcentaje que opina que fumar hachís o marihuana una vez por semana o más puede causar bastantes o muchos problemas	24,7	49,4	77,7	29,6	45,3	77,4	32,9	37,2	85,2
Borracheras									
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	78,9	73,1	41,4	60,7	65,2	29,7	48,2	40,6	10,4
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	48,9	41,2	18,1	29,9	28,4	11,1	24,3	17,1	3,1
Binge drinking: Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días									
	62,8	50,7	25,0	49,9	47,2	21,3	45,0	36,5	11,3
Consumo de otras drogas ilegales (cocaína polvo, base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos). Ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses									
	28,4	14,2	4,1	41,3	19,2	4,6	35,1	21,4	1,8
Consumo de spice. Ha consumido alguna vez en la vida									
	1,4	1,7	0,4	8,5	3,2	1,0	10,8	3,3	0,4

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.94.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.



1.1.95.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 1999-2013.



### 1.1.96.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad. España, 1999-2013.



### 1.1.97.

Continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.




1.1.98.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




1.1.99.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo y/o base) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.



1.1.100.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.




1.1.101.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




### 1.1.102.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.




### 1.1.103.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013.




### 1.1.104.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




### 1.1.105.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.106.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013.




1.1.107.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




1.1.108.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.109.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013.




1.1.110.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.



1.1.111.

Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.




1.1.112.

Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.



1.1.113.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.114.

Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ninguna sustancia	4,4	3,3	5,6	13,6	10,4	16,9	23,0	17,2	29,0
Una sola sustancia	19,6	17,4	21,8	44,3	44,5	44,2	43,3	44,6	42,0
Dos sustancias	36,3	35,9	36,8	30,2	31,1	29,3	26,2	28,5	23,9
Tres sustancias	24,3	24,1	24,5	9,3	10,3	8,2	6,2	7,8	4,6
Cuatro sustancias	8,2	9,2	7,1	1,8	2,5	1,0	1,0	1,5	0,4
Cinco o más sustancias	7,2	10,2	4,1	0,9	1,2	0,5	0,3	0,4	0,2


\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.115.

Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* alguna vez en la vida en la población de 15-64 años. España, 2013.




\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.116.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* alguna vez en la vida (porcentajes) en la población de 15-64 años. España, 2013.



1.1.117.

Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses, según edad y sexo en la población de 15-64 años. España, 2013.




	15-24 años		25-34 años		35-44 años		45-54 años		55-64 años	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Ninguna droga	12,9	17	8,6	16,8	10,4	16,9	9,7	15,2	11,4	19,4
Una droga	40,7	42,6	39,3	43,2	45,3	46,1	45,4	42,1	51,6	46,6
Dos drogas	23,5	26,4	31,2	30,6	32,2	28,8	35,3	32,1	30,7	26,9
Tres drogas	18,1	10,6	14,5	7,3	7,9	6,9	7,1	9,8	6,1	6,9

\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles. H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.118.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses, según edad y sexo (porcentajes) entre la población de 15-64 años que ha consumido alguna sustancia psicoactiva. España, 2013.



1.1.119.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes) entre la población de 15-64 años que ha consumido alguna sustancia psicoactiva. España, 2013.



### 1.1.120.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas\* según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes de columna) entre la población de 15-64 años. España, 2013.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro sustancias	Cinco o más sustancias
Alcohol	85,6	95,0	98,6	99,5	98,6
Tabaco	9,8	82,3	96,7	97,1	94,3
Cannabis	0,2	4,2	58,5	92,8	94,1
Éxtasis	0,0	0,1	0,9	7,2	48,1
Hipnosedantes	4,5	17,9	40,6	41,0	42,5
Cocaína en polvo	0,0	0,3	4,1	52,7	84,4
Cocaína base	0,0	0,0	0,2	0,9	6,5
Anfetaminas/speed	0,0	0,1	0,3	4,2	57,2
Alucinógenos	0,0	0,1	0,3	4,5	25,4
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,1	5,3
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5

\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.121.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2013.

	15-17	18-64	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Ninguna sustancia	30,9	13,1	14,9	12,6	13,5	12,5	15,4
Una sola sustancia	39,6	44,5	41,7	41,2	45,7	43,7	49,1
Dos sustancias	17,3	30,6	24,9	30,9	30,5	33,7	28,8
Tres sustancias	10,1	9,2	14,4	11,0	7,4	8,5	6,5
Cuatro sustancias	1,5	1,8	2,3	2,8	2,1	1,3	0,1
Cinco o más sustancias	0,6	0,9	1,8	1,5	0,7	0,3	0,1

\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.122.

Proporción (% en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes, cocaína, anfetaminas/speed y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2013.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Éxtasis	Hipnosedantes*	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos
Alcohol	100,0	85,4	94,3	95,8	73,4	96,8	94,2	98,2
Tabaco	44,4	100,0	85,3	81,3	47,2	84,6	84,0	82,9
Cánnabis	11,1	19,3	100,0	74,7	9,6	75,4	81,2	82,3
Éxtasis	0,8	1,3	5,3	100,0	1,1	15,8	46,4	45,1
Hipnosedantes*	11,5	14,2	12,8	21,3	100,0	20,5	21,6	12,5
Cocaína (polvo y/o base)	2,7	4,5	17,7	51,6	3,6	100,0	66,3	46,5
Anfetaminas/speed	0,7	1,3	5,5	43,8	1,1	19,2	100,0	53,4
Alucinógenos	0,4	0,7	3,1	23,1	0,4	7,4	29,5	100,0

\* Hipnosedantes (con o sin receta). Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.123.

Proporción (% en filas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes, cocaína, anfetaminas/speed y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2013.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Éxtasis	Hipnosedantes*	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos
Alcohol	100,0	44,4	11,1	0,8	11,5	2,7	0,7	0,4
Tabaco	85,4	100,0	19,3	1,3	14,2	4,5	1,3	0,7
Cánnabis	94,3	85,3	100,0	5,3	12,8	17,7	5,5	3,1
Éxtasis	95,8	81,3	74,7	100,0	21,3	51,6	43,8	23,1
Hipnosedantes*	73,4	47,2	9,6	1,1	100,0	3,6	1,1	0,4
Cocaína (polvo y/o base)	96,8	84,6	75,4	15,8	20,5	100,0	19,2	7,4
Anfetaminas/speed	94,2	84,0	81,2	46,4	21,6	66,3	100,0	29,5
Alucinógenos	98,2	82,9	82,3	45,1	12,5	46,5	53,4	100,0

\* Hipnosedantes (con o sin receta). Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.124.

Estado civil, nivel de estudios y percepción del estado de salud entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas\* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes).  
España, 2013.

	Ninguna o una sustancia (no policonsumo)	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Estado civil				
Soltero/a	35,1	37,8	53,6	74,0
Casado/a	57,0	51,7	35,5	16,1
Separado/a - Divorciado/a - Viudo/a	7,9	10,5	10,9	9,9
Nivel de estudios				
Primarios	16,6	15,2	14,9	13,1
Secundarios	62,7	68,6	70,6	72,8
Universitarios	20,7	16,2	14,5	14,1
Percepción estado de salud				
Buena/muy buena	85,4	82,1	79,4	77,7
Regular	12,4	14,8	16,9	17,3
Mala/muy mala	2,2	3,0	3,7	5,1

\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.125.

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de heroína, cocaína u otras sustancias psicoactivas ilegales a través de inyección en la población de 15-64 años, según sexo y grupo de edad (porcentajes).  
España, 2013.

Total	Hombre	Mujer	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	15-17 años	18-64 años
0,4	0,6	0,2	0,1	0,2	0,5	0,8	0,2	0,0	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.126.

Percepción de riesgo (porcentaje que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas\*) entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas\*\* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013.

	Ninguna o una sustancia (no policonsumo)	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Fumar un paquete de tabaco diario	92,1	85,0	81,3	82,1
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	51,3	36,0	26,5	20,4
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	92,7	89,0	86,4	82,2
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	70,8	56,3	31,5	12,8
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	89,4	80,7	58,5	34,3
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes	63,0	53,1	43,2	40,2
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez por semana o más	82,2	75,5	68,1	67,9
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	80,2	72,4	59,1	37,6
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	96,9	95,1	90,2	73,2
Consumir éxtasis una vez por semana o más	99,5	99,0	97,9	92,9
Probar cocaína una o dos veces en su vida	78,2	70,4	55,1	27,6
Consumir cocaína una vez o menos al mes	96,2	94,4	86,6	61,6
Consumir cocaína una vez por semana o más	99,6	99,0	97,6	92,9
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,7	97,4	95,5	91,1
Consumir heroína una vez por semana o más	99,8	99,5	99,3	98,0
Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes	95,6	95,0	89,9	77,6
Probar cocaína en forma de base o crack 1 ó 2 veces en su vida	91,1	89,4	85,3	72,1
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	97,7	97,8	94,9	85,8
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	99,8	99,5	99,1	96,8
Consumir anfetaminas o speed una vez o menos al mes	97,5	96,8	92,3	78,9
Consumir anfetaminas o speed una vez por semana o más	99,2	99,0	97,8	94,2
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	96,4	95,3	88,3	74,3
Consumir setas mágicas una vez por semana o más	99,4	98,8	97,3	92,2
Consumir ketamina una vez o menos al mes	97,9	97,8	95,5	88,1
Consumir ketamina una vez por semana o más	99,8	99,6	99,2	96,9

\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

\*\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.127.

Percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil\*) entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas\*\* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013.

	Ninguna o una sustancia (no policonsumo)	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Hachís, cannabis, marihuana	58,3	68,2	82,5	91,4
Heroína	29,0	33,3	38,7	40,9
Cocaína	40,6	50,0	64,0	79,2
Alucinógenos (LSD, ácido, tripi...)	28,8	34,8	45,6	53,2
Éxtasis u otras drogas de síntesis	28,2	34,6	45,7	58,5
GHB o éxtasis líquido	24,6	29,0	36,0	40,6
Anfetaminas o speed	28,0	33,9	46,5	61,2
Setas mágicas	24,4	28,5	38,8	44,6
Ketamina	23,4	27,3	35,2	40,0


\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos de ns/nc

\*\* Alcohol, tabaco, hipnosedantes en general, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.128.

Proporción de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.129.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas)\*. España, 1997-2013.


	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	Diferencia 2013-2011	Diferencia 2013-1997
Consumir heroína una vez por semana o más	99,4	99,6	98,8	99,3	99,3	99,4	99,4	99,6	99,6	0,0	0,2
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2	-0,8	-0,4
Consumir cocaína una vez por semana o más	98,5	99,2	97,9	98,5	98,7	98,9	99,0	99,1	99,0	-0,1	0,5
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8	-0,7	0,3
Probar cocaína una o dos veces en su vida	-	-	-	-	-	-	77,4	76,5	72,4	-4,1	-
Consumir éxtasis una vez por semana o más	98,6	98,9	97,8	98,3	98,7	98,3	98,3	98,9	99,0	0,1	0,4
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1	-0,3	2,6
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	-	-	-	-	-	-	76,7	78,2	74,8	-3,4	-
Consumir alucinógenos una vez/semana o más	99,1	99,4	98,5	99,1	99,2	-	-	-	-	-	-
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96,0	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6	94,4	-2,2	-1,6
Consumir tranquil./som. una vez/semana o más	81,4	86,8	84,8	85,4	81,8	79,7	79,7	79,9	78,5	-1,4	-2,9
Consumir tranquil./som. una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	-4,9	-2,8
Consumir cannabis una vez por semana o más	84,0	87,6	83,1	79,2	80,8	83,0	81,6	85,5	82,4	-3,1	-1,6
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	-8,2	-7,7
Probar cocaína base 1 o 2 veces en su vida	-	-	-	-	-	-	95,7	91,8	89,5	-2,3	-
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7	90,7	-1,0	1,5
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45,0	49,3	43,5	-5,8	-2,1
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	-0,4	9,0
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	-	-	-	-	-	-	-	99,4	99,5	0,1	-
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	-	-	-	-	-	-	-	97,8	97,2	-0,6	-

\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.130.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Consumir heroína una vez por semana o más	99,4	99,6	98,8	99,3	99,3	99,4	99,4	99,6	99,6
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2
Consumir cocaína una vez por semana o más	98,5	99,2	97,9	98,5	98,7	98,9	99,0	99,1	99,0
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8
Consumir éxtasis una vez por semana o más	98,6	98,9	97,8	98,3	98,7	98,3	98,3	98,9	99,0
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96,0	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6	94,4
Consumir tranquilizantes/somníferos una vez por semana o más	81,4	86,8	84,8	85,4	81,8	79,7	79,7	79,9	78,5
Consumir tranquilizantes/somníferos una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6
Consumir cannabis una vez por semana o más	84,0	87,6	83,1	79,2	80,8	83,0	81,6	85,5	82,4
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7	90,7
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45,0	49,3	43,5
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

### 1.1.131.

Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013.

	15-64			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64
	Total	H	M	Total						
Fumar un paquete de tabaco diario	88,7	86,9	90,6	89,1	88,0	88,6	88,2	90,2	91,5	88,6
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	43,5	38,4	48,8	41,2	38,1	42,0	46,2	51,1	51,6	43,3
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	90,7	88,4	93,0	90,9	89,9	90,7	90,7	91,7	94,7	90,6
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	74,8	72,2	77,4	69,6	69,3	72,6	77,7	85,6	73,5	74,8
Probar cocaína una o dos veces en su vida	72,4	69,0	75,8	67,9	67,3	69,9	75,0	82,7	73,3	72,3
Probar cocaína en forma de base o crack una o dos veces en su vida	89,5	88,6	90,5	87,5	87,6	89,5	90,1	93,2	89,6	89,5

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.132.

Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo una vez o menos al mes de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013.

	15-64			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64
	Total	H	M	Total						
Fumar hachís o marihuana	61,2	55,9	66,6	52,3	51,8	59,4	66,5	76,6	64,1	61,1
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos	57,6	57,7	57,5	60,3	59,0	56,3	56,0	57,6	68,1	57,3
Consumir éxtasis	95,1	94,1	96,2	93,7	93,6	94,6	95,9	97,8	95,8	95,1
Consumir cocaína	93,8	92,7	95,0	92,4	92,2	93,1	94,5	97,3	93,2	93,9
Consumir heroína	97,2	97,0	97,5	96,3	96,5	97,1	97,6	98,5	95,8	97,3
Consumir alucinógenos	94,4	93,7	95,2	92,6	92,7	93,9	95,7	97,3	93,3	94,5
Consumir GHB o éxtasis líquido	97,2	96,8	97,6	96,3	96,5	97,0	97,5	98,7	97,5	97,2
Consumir anfetaminas o speed	96,3	95,5	97,1	95,5	95,3	95,9	96,9	98,2	96,8	96,3
Consumir setas mágicas	94,8	93,8	95,7	93,2	93,4	94,2	95,7	97,5	95,3	94,7
Consumir ketamina	97,4	97,0	97,8	96,8	96,8	97,2	97,6	98,5	97,5	97,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.133.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez por semana o más). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según sexo y edad. España, 2013.

	15-64			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64
	Total	H	M	Total						
Fumar hachís o marihuana	61,2	55,9	66,6	52,3	51,8	59,4	66,5	76,6	64,1	61,1
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos	57,6	57,7	57,5	60,3	59,0	56,3	56,0	57,6	68,1	57,3
Consumir éxtasis	95,1	94,1	96,2	93,7	93,6	94,6	95,9	97,8	95,8	95,1
Consumir cocaína	93,8	92,7	95,0	92,4	92,2	93,1	94,5	97,3	93,2	93,9
Consumir heroína	97,2	97,0	97,5	96,3	96,5	97,1	97,6	98,5	95,8	97,3
Consumir alucinógenos	94,4	93,7	95,2	92,6	92,7	93,9	95,7	97,3	93,3	94,5
Consumir GHB o éxtasis líquido	97,2	96,8	97,6	96,3	96,5	97,0	97,5	98,7	97,5	97,2
Consumir anfetaminas o speed	96,3	95,5	97,1	95,5	95,3	95,9	96,9	98,2	96,8	96,3
Consumir setas mágicas	94,8	93,8	95,7	93,2	93,4	94,2	95,7	97,5	95,3	94,7
Consumir ketamina	97,4	97,0	97,8	96,8	96,8	97,2	97,6	98,5	97,5	97,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.134.


Evolución de la prevalencia de consumo de un paquete de tabaco diario en los últimos 30 días y riesgo percibido ante el consumo diario de tabaco (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.135.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez al mes o menos). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según sexo. España, 2013.



1.1.136.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez a la semana o más). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según edad. España, 2013.



### 1.1.137.

Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2013.



### 1.1.138.

Evolución de la percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil)\*, entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2013.


	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Cannabis	50,3	52,1	51,8	59,5	59,2	66,2	59,8	69,6	67,0	64,6
Éxtasis	41,1	40,9	39,9	48,2	46,1	49,7	43,8	51,9	45,6	32,7
Cocaína	39,5	39,2	39,9	46,7	46,5	53,3	43,8	56,7	54,4	46,9
Heroína	37,0	36,2	37,2	41,2	39,2	43,4	39,5	44,7	44,9	31,6
Alucinógenos (LSD)	37,1	37,0	37,2	42,7	40,0	44,8	40,2	48,7	45,4	33,0
GHB o éxtasis líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5
Anfetaminas o speed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7
Ketamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2

\*% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos de ns/nc

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.139.

Prevalencia de consumo de cannabis (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013.




1.1.140.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013.



1.1.141.

Prevalencia de consumo de éxtasis (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013.



1.1.142.


Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las sustancias psicoactivas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2013.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	Diferencia 2011-2013
Nada importante	19,6	22,3	19,1	20,9	14,8	20,5	20,4	27,5	23,0	-4,5
Algo importante	28,1	32,1	34,3	34,3	27,9	29,7	30,7	32,5	37,8	5,3
Muy importante	46,4	37,3	39,3	36,3	52,0	49,8	48,9	40,0	39,2	-0,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.143.

Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2013.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Jeringuillas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2	3,8	2,9	2,0
Personas inyectándose drogas	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8	2,9	2,1	1,3
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio (fumando chinos)	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6	4,4	3,3	2,4
Personas drogadas caídas en el suelo	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6	6,2	5,2	3,8
Vendedores que ofrecen drogas	11,4	10,0	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2	13,5	10,7	9,4
Personas esnifando drogas por la nariz	-	-	-	-	-	-	11,6	10,4	8,6	7,9
Personas fumando porros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9
Personas haciendo botellón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.144.

Visibilidad en el entorno cercano de personas fumando porros o haciendo botellón (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive)\*. España, 2013.




1.1.145.

Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre drogas y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2013.



1.1.146.

Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Educación en las escuelas	94,3	93,1	91,8	89,4	89,5	88,8	90,6	90,4	91,8	90,4
Tratamiento voluntario a consumidores	86,3	87,1	84,8	81,6	82,7	82,4	83,2	85,1	84,9	83,2
Control policial y aduanero	85,8	83,7	82,1	80,5	78,8	79,8	83,3	84,7	84,2	81,2
Campañas publicitarias	84,5	81,5	79,8	77,6	75,6	77,7	79,1	77,7	81,0	78,7
Leyes estrictas contra las drogas	79,3	77,0	76,9	75,5	73,2	75,3	77,9	80,6	80,3	76,6
Administración médica de metadona	63,8	62,9	67,5	66,6	67,1	68,4	66,8	65,8	72,4	69,3
Tratamiento obligatorio a consumidores	56,2	57,2	57,9	62,8	59,7	58,2	56,3	57,2	65,7	59,9
Administración médica de heroína	43,3	47,5	53,9	58,2	59,3	59,9	52,8	48,9	60,2	59,1
Legalización de cannabis	27,3	30,2	33,3	38,5	37,1	35,2	23,4	29,6	32,7	33,1
Legalización de todas las drogas	19,8	21,5	24,6	27,1	23,5	21,4	16,6	15,6	20,9	19,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

### 1.1.147.

Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995, 2003 y 2013.



### 1.1.148.

Valoración de la legalización del hachís y la marihuana como “muy importante” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	Hombre	Mujer	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años
Muy importante	35,5	30,5	32,5	35,1	35,5	33,0	27,4
Algo importante	22,9	19,7	22,3	23,8	21,7	19,6	19,1
Nada importante	41,5	49,8	45,2	41,1	42,8	47,4	53,5

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.149.

Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años (porcentajes)\*, según sexo y edad. España, 2013.




1.1.150.

Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año según tenga consumo de riesgo (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8), por sexo. España, 2013.




1.1.151.

Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año según tenga consumo de riesgo (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8), por edad. España, 2013.




1.1.152.

Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST ≥4) o no (CAST <4), por sexo (%). España, 2013.




1.1.153.

Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST  $\geq 4$ ) o no (CAST  $< 4$ ), por edad (%). España, 2013.




1.1.154.

Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años según hayan consumido cocaína (polvo y/o base) en el último año o no, según sexo (%). España, 2013.



### 1.1.155.

Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años según hayan consumido cocaína (polvo y/o base) en el último año o no, según edad (%). España, 2013.



### 1.1.156.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	15-64 años			15-17 años			18-24 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	3,0	4,6	1,3	1,3	2,1	0,4	4,1	5,9	2,3	4,9	7,2	2,5	1,9	3,1	0,7
Últimos 12 meses	0,7	1,1	0,3	0,9	1,6	0,2	1,8	2,5	1,2	1,4	2,1	0,7	0,3	0,4	0,1
Últimos 30 días	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	1,0	1,3	0,6	0,6	0,9	0,3	0,2	0,2	0,1

Pregunta cuestionario: En la actualidad se encuentran disponibles nuevas sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste si las ha consumido alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días.

Total = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.157.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2013.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Setas mágicas	1,9	2,9	0,8	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0
Ketamina	0,8	1,4	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,6	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Spice	0,5	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,5	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Salvia	0,5	0,8	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nexus	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Research chemicals	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piperazinas	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.158.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	15-64 años			15-18 años			15-34 años			35-64 años		
	Total	Hombre	Mujer									
Ketamina	0,8	1,4	0,3	0,9	1,7	0,0	1,3	2,1	0,6	0,6	1,0	0,2
GHB	0,6	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,2	0,5	0,7	0,2
Spice	0,5	0,9	0,2	0,5	0,3	0,7	0,7	1,2	0,3	0,4	0,7	0,2
Piperazinas	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Nexus	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,6	0,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
Metanfetamina	0,5	0,8	0,1	0,2	0,4	0,0	0,7	1,2	0,3	0,4	0,7	0,1
Setas mágicas	1,9	2,9	0,8	1,1	1,9	0,2	3,2	4,7	1,5	1,1	1,9	0,4
Research chemicals	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,5	0,8	0,2	0,3	0,7	0,0	0,8	1,3	0,3	0,3	0,6	0,1
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.159.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, (porcentajes). España, 2011 y 2013.




1.1.160.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 2013.




1.1.161.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-18 años (porcentajes). España, 2011 y 2013.



1.1.162.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.



## 1.1.163.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2011 y 2013.

	2011							2013								
	15-64	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-34	35-64	15-64	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-34	35-64
Ketamina	1,0	1,4	2,0	1,0	0,4	0,0	1,8	0,5	0,8	1,0	1,6	1,2	0,2	0,2	1,3	0,6
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	1,0	0,9	0,3	0,1	0,7	0,5
Spice	0,8	1,0	1,4	0,9	0,4	0,1	1,2	0,5	0,5	0,4	1,0	0,8	0,3	0,1	0,7	0,4
Piperazinas	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,1	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Nexus	0,2	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1
Metanfetamina	0,8	0,9	1,2	1,0	0,3	0,1	1,1	0,5	0,5	0,5	0,9	0,7	0,2	0,1	0,7	0,4
Setas mágicas	2,4	3,3	4,9	2,1	1,0	0,1	4,3	1,2	1,9	2,2	3,8	2,1	0,7	0,3	3,2	1,1
Research chemicals	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Legal highs	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Salvia	0,9	1,1	1,8	0,8	0,3	0,1	1,5	0,5	0,5	0,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,8	0,3
Esteroides anabolizantes	0,3	0,3	0,6	0,4	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

## 1.1.164.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 2011 y 2013.

	2011		2013	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Ketamina	1,5	0,5	1,4	0,3
GHB	-	-	0,9	0,2
Spice	1,2	0,3	0,9	0,2
Piperazinas	0,2	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,2	0,0	0,1	0,0
Nexus	0,3	0,1	0,3	0,1
Metanfetamina	1,2	0,3	0,8	0,1
Setas mágicas	3,5	1,2	2,9	0,8
Research chemicals	0,1	0,0	0,1	0,0
Legal highs	0,1	0,1	0,0	0,0
Salvia	1,3	0,4	0,8	0,2
Esteroides anabolizantes	0,5	0,1	0,3	0,1

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.165.

Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (porcentaje\* de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013.

	15-64 AÑOS			GRUPOS DE EDAD				
	Total	Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Consumir GHB una vez o menos al mes	92,6	92,3	92,8	92,4	93,7	92,4	92,9	91,0
Consumir GHB una vez por semana o más	94,9	95,0	94,9	95,4	96,7	94,7	95,4	92,1
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	89,9	89,0	90,8	88,9	90,4	89,9	90,5	89,2
Consumir setas mágicas una vez por semana o más	93,7	93,4	94,1	93,8	95,3	94,1	93,9	90,8
Consumir ketamina una vez o menos al mes	90,6	90,1	91,1	90,8	92,5	90,8	90,3	88,1
Consumir ketamina una vez por semana o más	92,7	92,6	92,9	93,5	95,2	92,8	92,3	89,4

\* % teniendo en cuenta todas las respuestas, incluido Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.166.

Disponibilidad percibida de nuevas sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes)\*. España, 2013.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
GHB	27,5	29,8	25,1	28,1	29,5	26,7	31,2	34,1	28,2	29,8	33,0	26,3	26,4	27,8	25,0	19,7	21,7	17,8
Setas mágicas	27,7	30,3	24,9	30,4	32,1	28,5	32,3	36,5	28,0	28,7	31,6	25,4	25,9	27,3	24,5	19,3	21,3	17,3
Ketamina	26,2	28,3	24,0	27,1	28,6	25,4	29,8	33,0	26,4	28,1	30,7	25,2	25,2	26,4	24,1	18,9	20,3	17,6


\* Eliminando los casos que señalan que han contestado Ns/Nc

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

### 1.1.167.

Lugar de obtención de nuevas sustancias psicoactivas\* en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.



### 1.1.168.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre las personas de 15-64 años que han consumido ketamina, GHB, spice, metanfetamina, setas mágicas y salvia alguna vez en la vida (porcentaje de columna). España, 2013.

	Nuevas sustancias*	Ketamina	GHB	Spice	Metanfetamina	Setas mágicas	Salvia
Alcohol	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tabaco	96,9	97,5	99,0	97,2	97,2	97,0	98,4
Inhalables volátiles	13,3	24,1	24,5	21,7	25,2	16,4	21,3
Anfetaminas/speed	58,4	82,7	79,8	70,3	87,3	63,3	65,7
Alucinógenos	66,9	84,2	80,3	71,2	78,9	82,0	69,4
Heroína	12,8	20,0	26,1	28,5	25,8	13,5	9,7
Tranquilizantes	34,0	37,5	46,4	43,0	49,6	33,8	33,5
Somníferos	23,6	28,4	38,8	30,9	37,7	24,4	26,8
Hipnosedantes	37,6	39,2	49,2	43,5	51,1	38,6	34,2
Cannabis	96,1	96,3	95,1	97,1	96,5	98,5	97,1
Éxtasis	60,5	86,9	89,0	74,4	81,4	63,4	68,0
Cocaína en polvo	78,1	95,5	93,8	91,4	94,7	80,9	78,5
Cocaína base	18,4	28,0	34,0	33,6	40,0	19,2	17,9
Cocaína (polvo y/o base)	78,6	95,5	93,8	91,4	95,2	81,7	79,1


Interpretación: El 99,7% de las personas que han consumido ketamina alguna vez en la vida, también ha consumido alcohol.

\* Sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis, etc.) y que se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.169.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas\* entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2013.



1.1.170.

Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad. España, 2013.

15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			Menores (15-17)		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
74,1	70,9	77,3	69,1	66,5	71,9	70,3	66,5	74,2	72,2	68,1	76,7	76,3	74,4	78,0	82,9	80,2	85,6	75,6	72,2	79,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.171.

Estado civil y nivel de estudios de la población de 25 a 34 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (porcentajes). España, 2013.

	Ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida	No ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida
Estado civil		
Soltero/a	80,1	61,1
Casado/a	16,6	36,3
Separado/a - Divorciado/a - Viudo/a	3,3	2,6
Nivel de estudios		
Primarios	7,0	7,7
Secundarios	74,1	66,5
Universitarios	18,8	25,7

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.172.

Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 25-34 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (porcentajes). España, 2013.

