

ESTADÍSTICAS 2016

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

**INDICADOR ADMISIONES A TRATAMIENTO
POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS,
1987-2014**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Rosario SENDINO. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación Adjunta al Delegado del Gobierno.

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Aurora RUIZ. Eva SÁNCHEZ-FRANCO.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Rosa ARANGUREN

Francisca BIBILONI

Juana VANRELL

Canarias

Baltasar FERNÁNDEZ

Amelia M^a HERNÁNDEZ

Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

Castilla-La Mancha

Berta HERNÁNDEZ

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier ROCA

M. Teresa BRUGAL

Extremadura

Antonia María VAS

M^a Pilar MORCILLO

Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Madrid

Ana RUIZ

M^a Angeles GUTIÉRREZ

Murcia

Andrés ALCARAZ

Pedro PARDO

Josefa DURÁN

Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@msssi.es

Internet: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-16-095-1

ÍNDICE

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2014 5

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2014

2.1.1.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2014	5
2.1.2.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2014 . .	6
2.1.3.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2014 . .	7
2.1.4.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2014 . .	8
2.1.5.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2014	9
2.1.6.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinó- genos. España, 1996-2014	10
2.1.7.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2014 . .	11
2.1.8.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2014 . .	12
2.1.9.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoac- tivas (total tratados). España, 1996-2014	13
2.1.10.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoac- tivas (tratados por primera vez). España, 1996-2014	14
2.1.11.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2014	15
2.1.12.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2014	16
2.1.13.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2014	17
2.1.14.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2014	18
2.1.15.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014	19
2.1.16.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014	20
2.1.17.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014	21

2.1.18.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014	22
2.1.19.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2014	23
2.1.20.	Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2014	24
2.1.21.	Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2014	25
2.1.22.	Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2014	26


Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2014

2.1.23.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2014	27
2.1.24.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2014	28
2.1.25.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2014	29
2.1.26.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014	30
2.1.27.	Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2014 . . .	31
2.1.28.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2014	33
2.1.29.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según existencia o no de tratamiento previo, y según sexo. España, 2014	33
2.1.30.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal que motiva el tratamiento. España, 2014	35
2.1.31.	Prevalencia de infección por VIH entre los inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas en %. España, 2014	38
2.1.32.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (%). España, 2005-2014	39
2.1.33.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (% y números absolutos). España, 2005-2014	39

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2014

2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2014.




	Nº de admisiones
1998	54.338
2002	46.744
2004	52.128
2005	50.630
2006	49.283
2007	50.555
2008	53.155
2009	52.549
2010	53.434
2011	50.281
2012	49.678
2013	51.946
2014	48.926

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	-
1992	20.017	15.956	-
1993	18.977	16.703	-
1994	18.770	17.526	-
1995	17.878	20.369	-
1996	16.647	28.382	-
1997	12.993	30.173	-
1998	11.867	30.756	-
1999	10.473	26.031	-
2000	8.151	26.412	-
2001	7.461	24.844	-
2002	5.051	21.162	-
2003	4.337	17.867	23.225
2004	3.836	15.617	20.532
2005	3.604	14.005	18.653
2006	3.318	14.502	18.803
2007	3.672	14.331	18.904
2008	3.840	13.616	17.456
2009	3.412	12.750	16.989
2010	4.526	12.166	17.325
2011	2.951	10.391	13.898
2012	2.555	9.302	12.238
2013	2.572	8.940	11.756
2014*	2.356	8.555	10.911

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	-
1992	932	367	-
1993	1.146	431	-
1994	1.265	491	-
1995	1.415	516	-
1996	1.892	932	-
1997	3.129	1.402	-
1998	4.174	1.838	-
1999	6.126	2.576	-
2000	5.499	2.773	-
2001	5.977	3.046	-
2002	7.125	3.893	11.904
2003	11.851	5.893	18.359
2004	14.126	6.747	21.646
2005	15.258	7.562	23.746
2006	13.463	8.036	22.242
2007	13.429	8.753	23.037
2008	12.847	10.786	24.680
2009	12.142	9.107	23.132
2010	12.130	9.095	22.087
2011	10.637	8.889	20.335
2012	10.142	8.855	19.497
2013	10.734	8.726	19.848
2014*	9.683	8.182	17.864

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	-
1997	1.768	387	-
1998	2.412	407	-
1999	2.335	418	-
2000	2.487	408	-
2001	2.966	540	-
2002	3.972	665	4.772
2003	4.613	871	5.711
2004	5.319	928	6.500
2005	4.426	844	5.524
2006	4.125	941	5.304
2007	4.619	1.114	5.936
2008	5.058	2.055	7.419
2009	7.273	1.705	9.503
2010	8.639	2.101	11.192
2011	9.736	2.603	12.873
2012	10.982	3.402	14.869
2013	12.912	3.585	16.914
2014*	12.968	3.510	16.478

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	-
1997	144	111	-
1998	197	143	-
1999	165	147	-
2000	214	154	-
2001	299	170	-
2002	350	242	-
2003	382	225	-
2004	441	224	693
2005	383	209	618
2006	466	223	717
2007	503	261	795
2008	463	352	845
2009	598	312	963
2010	580	323	944
2011	709	386	1.143
2012	648	421	1.083
2013	787	374	1.175
2014*	871	321	1.192

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2014.




	Anfetaminas	Éxtasis	Alucinógenos
1996	319	226	74
1997	323	237	85
1998	347	154	62
1999	339	135	50
2000	288	240	64
2001	255	335	83
2002	342	452	68
2003	266	254	63
2004	330	236	44
2005	386	229	39
2006	426	165	37
2007	415	172	43
2008	400	155	43
2009	461	127	69
2010	501	93	66
2011	595	102	83
2012	512	134	107
2013	671	201	120
2014	635	133	82

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2014.




	Admisión a tratamiento (droga principal)	Admisión a tratamiento (droga secundaria)
2005	8	50
2006	10	59
2007	22	107
2008	20	112
2009	43	130
2010	46	132
2011	54	157
2012	66	164
2013	70	141
2014	49	109

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652
2014*	15.240	12.418	27.658

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total tratados). España, 1996-2014.




	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014*	6.360	1.664

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Inyección en 2014.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (tratados por primera vez). España, 1996-2014.




	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014*	1.065	261

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Inyección en 2014.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2014.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7
1988	25,4	19,8
1989	25,7	19,8
1990	26,2	20,0
1991	26,4	20,3
1992	26,6	20,3
1993	27,2	20,3
1994	27,8	20,6
1995	28,5	20,6
1996	29,3	20,6
1997	30,0	20,7
1998	30,7	20,6
1999	31,3	20,8
2000	32,0	20,6
2001	32,0	20,8
2002	33,6	20,9
2003	33,9	20,7
2004	35,4	20,8
2005	35,6	20,6
2006	36,4	20,3
2007	36,0	21,0
2008	37,5	21,1
2009	37,9	20,9
2010	38,4	21,4
2011	39,3	20,8
2012	40,4	20,7
2013	40,8	20,9
2014	40,9	21,1

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2014.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6
1992	26,0	20,6
1993	26,4	20,7
1994	27,3	21,0
1995	27,9	21,2
1996	28,6	21,3
1997	29,2	21,4
1998	29,9	21,2
1999	30,3	21,8
2000	30,9	22,1
2001	31,4	22,3
2002	31,8	22,6
2003	31,9	22,3
2004	33,0	22,8
2005	33,0	22,0
2006	33,0	21,5
2007	34,1	23,3
2008	35,0	22,9
2009	34,5	22,8
2010	35,0	23,5
2011	36,7	22,6
2012	38,1	22,4
2013	38,2	22,3
2014	37,9	23,5

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2014.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9
1988	26,1	21,3
1989	26,2	21,2
1990	26,5	21,4
1991	27,0	21,9
1992	27,6	22,1
1993	27,9	22,0
1994	28,5	22,0
1995	29,1	22,5
1996	29,3	22,3
1997	29,1	22,2
1998	29,1	22,1
1999	28,6	21,7
2000	29,1	21,5
2001	29,8	21,6
2002	29,8	21,9
2003	29,8	21,3
2004	30,0	21,3
2005	30,5	21,0
2006	31,2	20,8
2007	31,6	21,2
2008	32,1	21,0
2009	32,5	20,7
2010	33,3	20,8
2011	33,9	20,7
2012	34,4	20,7
2013	34,9	20,6
2014	35,3	20,6

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2014.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9
1992	27,2	22,3
1993	27,6	22,3
1994	28,2	22,2
1995	28,6	22,6
1996	28,8	22,4
1997	28,6	22,4
1998	28,4	22,2
1999	27,8	21,9
2000	28,2	21,6
2001	29,0	21,8
2002	28,8	21,7
2003	28,8	21,5
2004	29,1	21,4
2005	30,0	21,1
2006	30,4	20,9
2007	30,8	21,5
2008	31,2	21,1
2009	31,6	20,9
2010	32,4	21,2
2011	33,0	21,1
2012	33,4	21,1
2013	33,9	21,0
2014	34,1	20,8

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822
1992	9.585	8.232	1.219
1993	10.493	7.129	995
1994	10.873	6.435	978
1995	11.161	5.033	1.028
1996	10.934	4.488	696
1997	8.487	3.011	887
1998	7.884	2.518	910
1999	7.033	1.969	968
2000	5.917	1.414	532
2001	5.461	1.276	471
2002	3.540	894	399
2003	2.805	748	386
2004	2.690	648	358
2005	2.487	544	350
2006	2.320	486	303
2007	2.842	470	327
2008	2.891	455	285
2009	2.719	386	256
2010	3.589	465	258
2011	2.211	365	201
2012	1.870	276	159
2013	2.047	283	175
2014	1.670	154	125

Notas: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8
1992	50,0	42,9	6,4
1993	56,1	38,1	5,3
1994	59,2	35,0	5,3
1995	64,5	29,1	5,9
1996	67,0	27,5	4,3
1997	67,2	23,8	7,0
1998	68,3	21,8	7,9
1999	69,3	19,4	9,5
2000	74,1	17,7	6,7
2001	74,9	17,5	6,5
2002	71,8	18,1	8,1
2003	69,3	18,5	9,5
2004	68,0	16,4	9,0
2005	69,0	15,1	9,7
2006	73,8	15,5	9,6
2007	77,4	12,8	8,9
2008	78,5	12,4	7,7
2009	79,7	11,3	7,5
2010	82,0	10,6	5,9
2011	77,7	12,8	7,1
2012	78,3	11,6	6,7
2013	79,6	11,0	6,8
2014	80,6	7,4	6,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	315	139	109
1992	547	196	121
1993	611	278	108
1994	714	238	97
1995	739	287	74
1996	1.307	413	82
1997	2.172	741	100
1998	3.073	856	128
1999	4.777	1.048	128
2000	4.067	1.172	105
2001	4.413	1.284	91
2002	5.613	1.403	156
2003	9.228	1.242	485
2004	11.140	1.837	693
2005	12.298	1.755	793
2006	11.155	1.617	103
2007	11.393	1.295	130
2008	10.391	1.276	117
2009	10.272	1.139	136
2010	9.952	1.203	166
2011	8.787	1.205	97
2012	8.346	781	95
2013	8.995	1.320	129
2014	6.798	986	56

Notas: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2
1992	62,7	22,5	13,9
1993	60,8	27,7	10,7
1994	67,4	22,5	9,2
1995	66,5	25,8	6,7
1996	71,7	22,6	4,5
1997	71,0	24,2	3,3
1998	74,8	20,8	3,3
1999	79,5	17,4	2,1
2000	75,2	21,7	1,9
2001	75,2	21,9	1,6
2002	77,0	19,2	2,1
2003	83,0	11,2	4,4
2004	80,9	13,3	4,8
2005	80,6	11,5	5,2
2006	86,0	12,5	0,8
2007	88,0	10,0	1,0
2008	86,9	10,7	1,0
2009	87,7	9,7	1,2
2010	86,8	10,5	1,4
2011	85,5	11,7	0,9
2012	88,3	8,3	1,0
2013	83,8	12,3	1,2
2014	82,6	12,0	0,7

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2014.



2.1.20.

Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2014.




	Cocaina	Cannabis	Hipnosedantes	Opiáceos	Estimulantes	Alucinógenos
2005	57,4	42,7	8,9	10,9	5,9	0,6
2006	58,7	44,1	9,0	11,8	5,2	0,9
2007	58,0	43,3	8,5	12,3	4,6	0,8
2008	66,1	49,1	10,6	11,8	4,3	1,2
2009	61,5	50,9	9,8	5,9	3,9	0,9
2010	63,4	52,0	9,9	6,6	4,3	1,3
2011	63,7	51,6	9,3	6,5	4,9	1,5
2012	62,1	52,9	10,1	7,1	4,6	1,2
2013	60,8	53,5	9,1	6,7	4,8	1,2
2014	56,7	48,3	8,1	4,5	2,8	0,4

El 76,9% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a la admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 24,1% restante (n = 6.394) que han consumido otras sustancias (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2014.




	Hombre	Mujer	Total
1996	35,9	43,4	37,1
1997	32,4	41,0	33,7
1998	32,4	39,7	33,6
1999	31,9	40,2	33,0
2000	32,7	37,9	33,5
2001	32,7	40,2	33,7
2002	30,9	38,9	32,0
2003	31,5	39,3	32,6
2004	27,7	38,3	29,3
2005	31,5	39,5	32,7
2006	32,7	37,4	33,4
2007	30,0	36,2	30,9
2008	26,7	33,3	27,6
2009	26,0	32,2	26,9
2010	29,8	31,7	30,2
2011	28,5	30,0	28,7
2012	28,2	30,0	28,4
2013	24,2	26,1	24,4
2014	26,3	24,4	26,0

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013 y 27,2% en 2014.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2014.



	< 25 años	25-34 años	> 34 años
1996	20,3	39,3	48,9
1997	17,5	34,0	46,4
1998	15,1	33,4	45,8
1999	15,2	32,0	44,0
2000	13,1	30,5	45,5
2001	14,0	29,1	44,4
2002	12,1	26,7	42,8
2003	9,2	25,5	43,8
2004	7,1	20,9	39,4
2005	9,7	23,1	41,9
2006	7,2	21,4	42,2
2007	3,2	18,7	40,3
2008	3,2	16,9	35,6
2009	2,2	15,2	34,7
2010	8,1	14,8	38,0
2011	9,9	14,5	35,6
2012	8,6	11,7	35,4
2013	4,7	8,9	30,4
2014	5,9	12,0	31,2

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013 y 27,2% en 2014.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.23.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2014.


Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	17.864	23,3
Cocaína polvo	17.185	22,4
Cocaína base	673	0,9
Opioides	12.032	15,7
Heroína	10.911	14,2
Metadona (mal uso)	477	0,6
Otros opioides	644	0,9
Cannabis	16.478	21,5
Hipnosedantes	1.192	1,6
Estimulantes	860	1,1
Anfetaminas	635	0,8
Éxtasis y derivados	133	0,2
Otros estimulantes	92	0,1
Alucinógenos	82	0,1
Inhalantes volátiles	20	0,0
Otras drogas ilegales	398	0,5
Alcohol	27.658	36,1
Total drogas ilegales	48.926	63,9
Total drogas ilegales y alcohol	76.584	100,0

Nota: Las admisiones por cocaína no suman debido a la existencia de 6 casos cuya sustancia de admisión a tratamiento son otras formas de cocaína diferentes al clorhidrato o la base.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.24.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2014.



	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	15,7	6,8	0,4	15,4
Cocaína	23,3	22,5	2,6	19,7
Cannabis	21,5	31,1	92,3	22,7
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc)	1,1	1,5	0,6	0,8
Alcohol	36,1	35,4	2,1	38,5
Número de admisiones	76.584	36.633	2.340	7.233


* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2014.



	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	24,6	10,5	0,4	25,4
Cocaína	36,5	34,8	2,7	32,6
Cannabis	33,7	48,1	94,3	37,6
Otros estimulantes	1,8	2,3	0,7	1,3
Otras sustancias	3,4	4,3	1,9	3,1
Número de admisiones	48.926	23.656	2.290	4.378


* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014.



	TASAS (España 104,94 casos/100.000 habitantes)	NÚMERO DE CASOS (Total 48.926)
Canarias	181,59	3.814
Ceuta	172,08	145
Melilla	171,76	147
Andalucía	152,04	12.770
Extremadura	144,92	1.584
Comunidad Valenciana	124,70	6.211
Baleares	114,62	1.266
Galicia	108,70	2.970
Cataluña	92,73	6.962
Madrid	91,01	5.858
Murcia	85,40	1.253
La Rioja	77,59	246
Cantabria	74,51	436
Castilla-La Mancha	73,96	1.523
País Vasco	66,96	1.466
Castilla y León	55,95	1.383
Aragón	43,56	574
Navarra	26,07	167
Asturias	14,36	151

Nota: Tasas brutas calculadas con la población de cada Comunidad/Ciudad Autónoma a 1 de enero de 2014 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2014.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Nº de casos	48.926	18.786	23.656	41.044	7.718
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	55,7	–	–	54,9	60,9
Edad media (años)	33,7	37,3	30,5	33,6	34,2
Mujeres (%)	15,8	14,8	16,5	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,2	1,5	1,1	1,2	1,2
Enseñanza primaria	55,9	58,1	56,4	56,9	50,1
Enseñanzas secundarias	38,9	37,3	38,7	38,2	42,6
Estudios universitarios	4,0	3,2	3,9	3,6	6,1
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	26,6	24,9	27,2	27,4	22,3
Parado no habiendo trabajado	7,6	6,9	8,4	7,5	8,2
Parado habiendo trabajado	43,7	49,7	40,5	43,8	42,8
Otras	22,1	18,5	23,9	21,3	26,6
Nacidos fuera de España (%)	9,3	7,7	9,6	9,2	10,1
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	6,0	10,8	1,6	5,6	7,8
Médicos generales, atención primaria de salud	10,2	6,8	13,4	10,0	11,4
Hospitales u otros servicios de salud	6,3	5,4	7,5	5,6	9,8
Servicios sociales	3,2	2,5	3,9	2,5	7,0
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	7,7	11,0	6,1	8,4	4,1
Servicios legales o policiales	10,9	7,6	15,2	11,7	6,6
Empresas o empleadores	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Familiares o amigos/as	11,8	7,8	16,4	12,0	10,9
Iniciativa propia	41,3	46,6	32,9	41,7	39,2
Otras	2,5	1,4	2,8	2,4	3,0
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	12,0	14,4	9,7	12,2	10,6
Únicamente con pareja	10,4	10,7	9,9	9,5	15,2
Únicamente con hijos	3,3	2,9	2,7	2,3	8,5
Con pareja e hijos/as	15,7	15,4	16,1	15,7	15,5
Con padres o familia de origen	42,4	34,9	48,8	44,0	33,5
Con amigos	2,8	2,9	2,4	2,7	3,5
Otros	13,5	18,7	10,4	13,5	13,1
Número de hijos	0,7	0,8	0,6	0,6	0,9
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	87,4	81,8	91,5	87,0	89,7
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	6,5	9,9	4,7	7,1	3,5
Otras instituciones	2,5	3,3	1,9	2,4	3,1
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,7	0,3	0,5	0,4
Alojamientos inestables/precarios	2,6	3,6	1,5	2,5	2,7
Otros lugares	0,5	0,6	0,2	0,5	0,6

2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	48.926	18.786	23.656	41.044	7.718
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	24,6	42,9	10,5	24,8	23,3
Heroína	22,3	40,1	8,8	22,7	20,1
Metadona	1,0	1,2	0,8	1,0	1,1
Otros opioides	1,3	1,5	1,0	1,2	2,2
Cocaína	36,5	37,0	34,8	37,2	33,0
CLH Cocaína	35,1	35,8	33,2	35,8	31,8
Cocaína otras	1,4	1,2	1,6	1,4	1,2
Otros estimulantes	1,8	1,3	2,3	1,6	2,4
Anfetaminas	1,3	1,1	1,6	1,2	1,9
Éxtasis y derivados	0,3	0,1	0,5	0,3	0,2
Otros estimulantes	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3
Hipnosedantes	2,4	1,5	3,3	1,8	5,9
Barbitúricos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benzodiazepinas	2,2	1,4	3,0	1,7	5,2
Otros hipnosedantes	0,2	0,1	0,3	0,1	0,7
Alucinógenos	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Cannabis	33,7	16,4	48,1	33,7	33,6
Otras sustancias	0,8	0,7	0,7	0,7	1,5
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,3	19,5	19,0	19,0	21,2
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	46,2	42,0	50,0	45,6	49,0
4-6 días/semana	7,3	6,3	7,8	7,5	5,9
2-3 días/semana	13,5	11,8	14,7	13,8	12,1
1 día/semana	5,5	5,1	5,7	5,5	5,5
Menos de 1 día/semana	7,4	7,7	6,9	7,5	6,9
No consumió	20,2	27,1	14,9	20,1	20,5
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,8	5,4	7,5	5,8	11,6
Pulmonar	56,1	53,4	59,3	56,5	54,1
Intranasal	32,6	33,1	31,5	33,1	29,7
Parenteral	3,8	7,3	1,0	3,8	3,6
Otras	0,8	0,9	0,7	0,7	1,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	13,0	24,3	4,5	13,3	11,3
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	3,4	6,6	1,1	3,5	3,1
Prevalencia mínima VIH**	3,8	6,9	1,3	3,6	4,8
Prevalencia mínima Hepatitis C**	7,6	14,6	2,0	7,6	7,5
Prevalencia mínima Hepatitis B** (portador crónico)	0,8	1,5	0,4	0,8	0,8

* El número de casos con o sin tratamiento previo o el número de hombres más el número de mujeres pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en estas variables.

** Positivos entre el total (prevalencia mínima).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2014.

Admitidos a tratamiento por alcohol	Número absoluto	Porcentaje
Han consumido sólo alcohol	21.264	76,9
Han consumido alcohol y otras drogas	6.394	23,1
Una droga más	4.725	17,1
Dos drogas más	1.379	5,0
Tres o más drogas	290	1,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.29.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según existencia o no de tratamiento previo, y según sexo. España, 2014.

	Total	Tratamiento previo por alcohol*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	27.658	10.571	12.977	21.470	6.101
Tratados por primera vez por alcohol (%)	55,1	–	–	54,9	55,7
Edad media (años)	45,7	46,7	44,9	45,6	46,0
Mujeres (%)	22,1	21,4	21,9	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,1	1,0	1,3	1,2	0,9
Enseñanza primaria	51,7	53,7	52,7	53,5	45,0
Enseñanzas secundarias	39,5	38,6	38,8	38,7	42,5
Estudios Universitarios	7,7	6,6	7,2	6,6	11,6
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	35,5	31,9	38,2	36,6	31,8
Parado no habiendo trabajado	2,8	2,7	3,0	2,3	4,3
Parado habiendo trabajado	41,1	43,7	40,0	41,4	40,2
Otras	20,6	21,7	18,8	19,8	23,7
Nacidos fuera de España (%)	10,8	7,8	11,4	9,8	14,3
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	3,4	4,8	1,3	3,1	4,1
Médicos generales, atención primaria de salud	25,8	20,2	32,3	26,0	24,6
Hospitales u otros servicios de salud	12,5	11,8	14,4	11,7	15,6
Servicios sociales	5,4	5,6	5,9	4,9	7,5
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	2,3	2,5	2,6	2,7	1,1
Servicios legales o policiales	2,2	2,3	2,4	2,5	1,2
Empresas o empleadores	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
Familiares o amigos/as	12,3	11,7	14,6	12,6	11,6
Iniciativa propia	33,8	38,8	24,3	34,4	32,1
Otras	1,9	1,9	1,9	1,8	2,0

2.1.29. (continuación)

	Total	Tratamiento previo por alcohol*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	18,4	20,2	17,0	18,9	16,6
Únicamente con pareja	14,0	13,5	14,3	13,3	16,4
Únicamente con hijos	5,4	5,0	5,4	3,5	12,5
Con pareja e hijos/as	25,6	23,2	28,2	26,0	23,8
Con padres o familia de origen	22,7	21,8	23,0	24,5	16,5
Con amigos	2,3	2,3	2,0	2,3	2,5
Otros	11,5	13,9	10,1	11,5	11,6
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	92,0	89,9	93,7	91,2	94,9
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	1,8	2,1	1,9	2,1	0,7
Otras instituciones	2,4	3,7	1,4	2,5	1,9
Pensiones, hoteles, hostales	0,7	0,8	0,5	0,8	0,5
Alojamientos inestables/precarios	2,8	3,2	2,4	3,0	1,9
Otros lugares	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2
Edad al inicio del consumo de alcohol (años)	18,8	18,0	18,7	17,7	21,6
Frecuencia de consumo de alcohol en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	58,6	56,9	61,7	59,2	56,4
4-6 días/semana	6,2	5,7	6,2	6,1	6,8
2-3 días/semana	11,3	9,4	12,3	11,2	11,7
1 día/semana	4,2	4,0	4,3	4,0	4,9
Menos de 1 día/semana	5,5	5,8	4,9	5,3	6,1
No consumió	14,2	18,3	10,5	14,2	14,1
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	3,9	4,7	3,0	4,1	2,9
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	0,6	0,7	0,4	0,6	0,5
Prevalencia VIH positivo**	1,0	1,3	0,9	1,0	1,0
Prevalencia Hepatitis C**	2,8	3,7	2,1	2,9	2,7
Prevalencia Hepatitis B (portador crónico)**	0,5	0,7	0,4	0,5	0,4

* El número de casos con o sin tratamiento previo o el número de hombres más el número de mujeres pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en estas variables.

** Prevalencias mínimas (positivos entre todos los admitidos a tratamiento).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal que motiva el tratamiento. España, 2014.

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Número de casos	17.864	16.478	12.032	10.911	1.192	1.082	477	635	133	82	20
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	54,2	78,7	23,6	21,6	73,1	72,4	43,2	64,5	89,5	67,1	57,9
Edad media (años)	35,3	26,2	41,0	40,9	39,9	39,4	42,2	33,1	26,3	29,4	29,6
Mujeres (%)	14,3	15,8	15,0	14,3	38,2	37,0	17,5	22,9	13,5	19,5	25,0
Máximo nivel de estudios completados (%)											
Sin estudios	0,9	0,5	2,5	2,5	3,2	2,9	4,9	0,3	0,0	0,0	5,6
Enseñanza primaria	52,2	55,7	62,5	62,8	59,4	59,6	64,0	43,8	36,9	48,7	66,7
Enseñanza secundaria	42,2	39,9	32,4	32,3	30,3	31,0	29,4	48,9	53,1	47,4	22,2
Estudios superiores	4,7	3,8	2,6	2,3	7,1	6,6	1,6	7,0	10,0	3,8	5,6
Situación laboral											
Trabajando	38,7	20,8	16,8	16,7	19,0	18,8	14,0	30,0	31,8	26,6	11,1
Parado sin trabajo previo	4,1	10,6	8,1	8,2	15,3	16,1	8,4	5,8	6,8	7,6	5,6
Parado habiendo trabajado	45,4	34,6	53,8	54,2	43,4	43,2	56,8	50,1	32,6	46,8	38,9
Otras situaciones	11,8	34,0	21,3	20,9	22,2	21,9	20,8	14,1	28,8	19,0	44,4
Nacidos fuera de España (%)	8,3	10,3	9,7	9,8	9,4	9,7	7,8	5,9	8,0	6,2	55,6
Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%)											
Otros servicios tto. drogodependencias	4,2	2,0	14,4	13,9	2,2	2,2	25,0	6,8	2,3	2,5	0,0
Médico general, At. Primaria de Salud	12,0	11,0	4,9	4,6	22,2	20,5	2,4	13,8	5,3	16,0	25,0
Hospitales u otros servicios de salud	5,8	7,9	3,5	2,9	14,8	14,8	6,0	11,0	4,5	4,9	20,0
Servicios Sociales	2,4	4,9	1,8	1,8	3,0	3,2	1,5	3,9	2,3	1,2	30,0
Prisión, centros reforma o internamiento menores	6,5	5,3	12,9	13,3	11,6	12,3	12,2	4,0	4,5	9,9	10,0
Servicios legales o policiales	7,4	19,7	4,2	4,3	4,1	4,6	4,1	11,8	39,1	12,3	0,0
Empresas o empleador	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,5	0,0
Familiares y amigos	13,6	14,8	5,5	5,7	8,0	7,9	2,8	14,2	11,3	8,6	0,0
Iniciativa propia	46,3	30,5	50,6	51,4	31,6	32,0	44,9	31,9	28,6	38,3	10,0
Servicios de educación	0,2	1,1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Otras situaciones	1,4	2,6	1,6	1,6	2,0	2,0	1,3	2,4	2,3	3,7	0,0
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Solo/a	11,7	8,1	17,3	17,3	14,4	14,6	17,1	14,8	12,9	12,5	10,0
Únicamente con pareja	12,7	7,0	11,7	11,2	12,0	12,2	16,7	10,6	2,3	5,0	20,0
Únicamente con hijos/as	3,5	2,7	3,0	3,0	6,1	5,8	1,8	5,1	0,0	5,0	5,0
Con la pareja e hijos/as	22,6	9,3	14,2	13,9	20,2	19,7	16,4	7,2	5,3	13,8	5,0
Con padres o familia de origen	34,8	60,4	29,6	29,7	33,2	33,5	28,5	47,3	63,6	38,8	15,0
Con amigos/as	2,3	2,6	3,9	4,0	2,1	2,1	2,2	4,5	3,8	5,0	0,0
Detenido	4,9	3,1	8,9	9,0	4,6	4,7	9,4	5,3	7,6	6,3	15,0
En instituciones no detenido	1,5	1,9	2,8	2,8	2,4	2,5	2,0	1,4	1,5	0,0	20,0
Otras situaciones	5,9	4,9	8,8	9,1	5,0	4,9	5,9	3,7	3,0	13,8	10,0

2.1.30. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Nº de casos	17.864	16.478	12.032	10.911	1.192	1.082	477	635	133	82	20
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Casas, pisos, apartamentos	90,1	92,7	75,8	75,4	88,4	88,2	76,6	88,6	91,7	91,4	70,0
Prisión, centros reforma o internamiento menores	5,6	3,1	12,8	13,3	5,7	5,8	10,3	4,9	6,1	8,6	0,0
Otras instituciones	2,0	2,5	3,5	3,3	1,9	1,9	3,6	2,9	1,5	0,0	25,0
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,3	1,0	1,0	0,3	0,3	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0
Alojamiento inestable/precario	1,6	1,1	6,0	6,1	3,7	3,8	5,8	2,5	0,8	0,0	5,0
Otros lugares	0,4	0,3	0,9	0,9	0,1	0,1	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0
Edad de inicio consumo droga principal (años)	20,6	15,6	21,6	21,1	27,0	26,5	29,0	20,5	19,9	21,3	21,7
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)											
Oral	2,8	2,3	6,4	0,8	98,7	98,7	91,1	21,6	91,1	47,2	5,6
Pulmonar	13,8	96,8	72,7	77,8	0,7	0,8	6,3	3,6	1,6	0,0	50,0
Intranasal o esnifada	81,4	0,4	5,7	5,9	0,3	0,3	0,4	73,5	5,6	52,8	44,4
Inyectada o parenteral	1,3	0,0	13,7	14,2	0,0	0,0	1,3	1,0	0,8	0,0	0,0
Otras	0,7	0,4	1,4	1,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,8	0,0	0,0
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Todos los días	21,0	66,6	54,2	52,4	83,1	83,2	88,0	24,9	10,6	28,4	31,6
4-6 días a la semana	10,7	5,9	4,4	4,5	2,5	2,4	2,6	10,7	4,5	6,8	0,0
2-3 días a la semana	23,8	8,6	5,7	6,0	3,6	3,7	0,9	24,4	14,4	20,3	21,1
1 día a la semana	10,2	2,7	2,3	2,4	1,1	1,2	0,4	8,9	11,4	10,8	5,3
Menos de 1 día a la semana	12,8	3,7	3,9	4,1	1,2	1,1	0,9	11,1	18,2	12,2	26,3
No consumió	21,6	12,5	29,5	30,6	8,4	8,2	7,2	20,0	40,9	21,6	15,8
Otras sustancias consumidas los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento											
Opioides	5,7	1,8	8,8	8,6	7,5	7,5	17,8	2,6	1,3	8,3	14,3
Heroína	5,2	1,4	0,7	0,0	5,6	5,7	16,5	2,3	0,0	6,3	14,3
Metadona	0,3	0,1	7,4	7,9	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros opioides	0,3	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	1,3	0,3	1,3	2,1	0,0
Cocaína	0,4	29,6	44,4	45,9	24,2	23,7	15,3	27,5	35,0	37,5	14,3
CLH Cocaína	0,2	29,3	39,5	40,9	21,5	21,0	10,2	27,2	33,8	35,4	14,3
Cocaína base	0,2	0,4	5,2	5,2	3,0	3,0	5,1	0,3	1,3	2,1	0,0
Cocaína otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.30. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Nº de casos	17.864	16.478	12.032	10.911	1.192	1.082	477	635	133	82	20
Estimulantes	4,4	7,2	1,7	1,6	3,6	3,9	0,8	5,7	7,5	10,4	0,0
Anfetaminas	2,4	4,0	1,1	1,0	1,9	2,1	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
Metanfetaminas	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	0,0	0,0
MDMA y derivados	1,9	2,7	0,4	0,5	1,3	1,4	0,0	4,9	0,0	4,2	0,0
Otros estimulantes	0,2	0,4	0,1	0,1	0,4	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes	4,7	4,0	14,0	13,6	3,2	2,7	21,6	2,8	5,0	4,2	0,0
Alucinógenos	0,9	1,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,4	3,1	6,3	0,0	0,0
Sustancias volátiles	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Cannabis	45,5	0,0	45,3	45,2	54,1	54,6	49,2	57,3	50,0	35,4	42,9
Alcohol	67,5	77,0	28,9	28,4	42,5	43,2	35,2	45,5	47,5	52,1	57,1
Otras sustancias psicoactivas	0,7	0,6	0,5	0,6	1,3	1,4	0,0	0,5	3,8	2,1	0,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	4,7	2,0	43,9	44,0	7,4	7,4	51,2	5,6	0,8	4,2	7,1
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	1,4	0,3	11,8	12,2	0,7	0,8	5,1	1,8	0,8	1,4	0,0
Se inyectó drogas en los últimos 30 días	0,8	0,2	6,3	6,5	0,4	0,4	2,1	1,3	0,8	1,4	0,0
Prevalencia mínima VIH positivo	1,7	0,7	11,6	11,7	3,1	2,9	11,7	1,9	2,3	2,4	0,0
Prevalencia mínima de Hepatitis C	2,6	1,3	24,4	24,9	4,4	4,3	21,4	2,8	1,5	3,7	0,0
Prevalencia mínima de Hepatitis B (portador crónico)	0,4	0,2	2,2	2,1	0,8	0,7	2,7	0,3	0,0	0,0	0,0

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.31.

Prevalencia* de infección por VIH entre los inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas en %. España, 2014.

	Inyección en 12 meses previos a la admisión			Inyección alguna vez en la vida		
	Total	Tratamiento previo**		Total	Tratamiento previo**	
		Sí	No		Sí	No
Total inyectores (nº)	1.387	1.068	242	5.224	3.948	974
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.010	822	133	3.992	3.156	610
Prevalencia de infección por VIH (%)	26,0	26,5	18,8	30,9	31,1	27,9
Hombres inyectores (nº)	1.191	929	201	4.505	3.401	852
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	871	716	111	3.425	2.710	526
Prevalencia de infección por VIH (%)	26,3	26,4	19,8	30,1	30,2	27,8
Mujeres inyectadoras (nº)	191	135	41	695	529	118
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	135	102	22	549	432	81
Prevalencia de infección por VIH (%)	24,4	27,5	13,6	35,7	36,6	28,4
Inyectores < 25 años (nº)	64	32	29	96	42	43
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	34	19	13	47	25	18
Prevalencia de infección por VIH (%)	5,9	5,3	0,0	4,3	4,0	0,0
Inyectores 25-34 años (nº)	347	235	94	702	488	181
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	225	166	47	470	344	107
Prevalencia de infección por VIH (%)	12,0	13,9	6,4	11,3	12,5	7,5
Inyectores > 34 años (nº)	975	800	119	4.424	3.416	750
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	751	637	73	3.474	2.786	485
Prevalencia de infección por VIH (%)	31,2	30,5	30,1	34,0	33,7	33,4
Inyectores consumidores de opiáceos**	1.185	1.014	167	4.333	3.495	591
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	861	743	115	3.342	2.788	360
Prevalencia de infección por VIH (%)	27,9	28,0	27,0	32,2	32,3	28,6
Inyectores no consumidores de opiáceos	202	124	62	891	453	383
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	149	98	40	650	368	250
Prevalencia de infección por VIH (%)	15,4	13,3	17,5	24,3	22,6	26,8

El número de casos con o sin tratamiento previo pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en esta variable.


* Las prevalencias están calculadas sobre el nº de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las otras variables que se cruzan.

** Se incluyen tanto los admitidos a tratamiento por dependencia de opiáceos como los admitidos por otras drogas psicoactivas que han consumido opiáceos en los 30 días previos a la admisión.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.32.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (%). España, 2005-2014.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
% inyectores (alguna vez en la vida) que conocen estado serológico (VIH)	73,3	78,2	76,8	74,6	74,1	74,7	78,0	78,6	77,4	76,4
% inyectores (último año previo a admisión) que conocen estado serológico (VIH)	68,7	74,9	72,5	70,5	68,7	70,1	73,0	74,6	73,6	72,8
Prevalencia (%) de VIH en inyectores alguna vez en la vida	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6	30,9
Prevalencia (%) de VIH en inyectores último año previo a admisión	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4	26,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.33.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (% y números absolutos). España, 2005-2014.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total inyectores último año previo a admisión (nº)	4.358	4.892	4.575	4.546	3.763	3.549	3.094	2.562	2.237	1.387
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	2.996	3.665	3.319	3.203	2.585	2.487	2.259	1.910	1.646	1.010
Prevalencia de infección por VIH (%)	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4	26,0
Total inyectores alguna vez en la vida (nº)	9.533	11.601	11.249	10.895	9.637	9.697	8.385	7.580	7.026	5.224
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	6.991	9.068	8.643	8.126	7.143	7.243	6.546	5.957	5.439	3.992
Prevalencia de infección por VIH (%)	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6	30,9

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.