

ESTADÍSTICAS 2017

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

**INDICADOR ADMISIONES A TRATAMIENTO
POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS,
1987-2015**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Rosario SENDINO. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación Adjunta al Delegado del Gobierno.

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Aurora RUIZ. Eva SÁNCHEZ.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Izaskun BILBAO

Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Juana VANRELL

Francisca BIBILONI

Canarias

Baltasar FERNÁNDEZ

Amelia M^a HERNÁNDEZ

Luz Marina MORENO

Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

Castilla-La Mancha

Berta HERNÁNDEZ

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier ROCA

Xavier MAJO

M. Teresa BRUGAL

Extremadura

Antonia María VAS

M^a Pilar MORCILLO

Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Sara FERREIRA

Madrid

Ana RUIZ

M^a Angeles GUTIÉRREZ

Murcia

Andrés ALCARAZ

Pedro PARDO

Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES (OEDA)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@msssi.es

Internet: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-16-001-3

ÍNDICE

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2015 5

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2015

2.1.1.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2015	5
2.1.2.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2015 . .	6
2.1.3.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2015 . .	7
2.1.4.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2015 . .	8
2.1.5.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2015	9
2.1.6.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinó- genos. España, 1996-2015	10
2.1.7.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2015 . .	11
2.1.8.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2015 . .	11
2.1.9.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos). España, 1996-2015	12
2.1.10.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos por primera vez). España, 1996-2015	13
2.1.11.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2015	14
2.1.12.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2015	15
2.1.13.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2015	16
2.1.14.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (tratados por primera vez). España, 1991-2015 . . .	17
2.1.15.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015	18
2.1.16.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015	19
2.1.17.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015	20

2.1.18.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015	21
2.1.19.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2015	22
2.1.20.	Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2015 . .	23
2.1.21.	Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2015	24
2.1.22.	Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2015	25

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2015

2.1.23.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2015	26
2.1.24.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2015	27
2.1.25.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2015	28
2.1.26.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2015	29
2.1.27.	Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2015 . . .	30
2.1.28.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2015	32
2.1.29.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2015	33
2.1.30.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2015	35
2.1.31.	Prevalencia y conocimiento del estado serológico sobre infección por VIH, hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC) entre los inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas (nº absolutos y %). España, 2015	41
2.1.32.	Prevalencia de infección y conocimiento de estado serológico sobre VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada alguna vez en la vida o último año (%). España, 2005-2015	42
2.1.33.	Evolución del número de inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (nº absolutos y %). España, 2005-2015	42

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2015

2.1.1.


Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2015.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	-
1992	20.017	15.956	-
1993	18.977	16.703	-
1994	18.770	17.526	-
1995	17.878	20.369	-
1996	16.647	28.382	-
1997	12.993	30.173	-
1998	11.867	30.756	-
1999	10.473	26.031	-
2000	8.151	26.412	-
2001	7.461	24.844	-
2002	5.051	21.162	-
2003	4.337	17.867	23.225
2004	3.836	15.617	20.532
2005	3.604	14.005	18.653
2006	3.318	14.502	18.803
2007	3.672	14.331	18.904
2008	3.840	13.616	17.456
2009	3.412	12.750	16.989
2010	4.526	12.166	17.325
2011	2.951	10.391	13.898
2012	2.555	9.302	12.238
2013	2.572	8.940	11.756
2014*	2.356	8.555	10.911
2015	2.202	7.713	10.978


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	-
1992	932	367	-
1993	1.146	431	-
1994	1.265	491	-
1995	1.415	516	-
1996	1.892	932	-
1997	3.129	1.402	-
1998	4.174	1.838	-
1999	6.126	2.576	-
2000	5.499	2.773	-
2001	5.977	3.046	-
2002	7.125	3.893	11.904
2003	11.851	5.893	18.359
2004	14.126	6.747	21.646
2005	15.258	7.562	23.746
2006	13.463	8.036	22.242
2007	13.429	8.753	23.037
2008	12.847	10.786	24.680
2009	12.142	9.107	23.132
2010	12.130	9.095	22.087
2011	10.637	8.889	20.335
2012	10.142	8.855	19.497
2013	10.734	8.726	19.848
2014*	9.683	8.182	17.864
2015	8.445	7.248	17.327


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	-
1997	1.768	387	-
1998	2.412	407	-
1999	2.335	418	-
2000	2.487	408	-
2001	2.966	540	-
2002	3.972	665	4.772
2003	4.613	871	5.711
2004	5.319	928	6.500
2005	4.426	844	5.524
2006	4.125	941	5.304
2007	4.619	1.114	5.936
2008	5.058	2.055	7.419
2009	7.273	1.705	9.503
2010	8.639	2.101	11.192
2011	9.736	2.603	12.873
2012	10.982	3.402	14.869
2013	12.912	3.585	16.914
2014*	12.968	3.510	16.478
2015	11.185	3.448	15.676


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	-
1997	144	111	-
1998	197	143	-
1999	165	147	-
2000	214	154	-
2001	299	170	-
2002	350	242	-
2003	382	225	-
2004	441	224	693
2005	383	209	618
2006	466	223	717
2007	503	261	795
2008	463	352	845
2009	598	312	963
2010	580	323	944
2011	709	386	1.143
2012	648	421	1.083
2013	787	374	1.175
2014*	871	321	1.192
2015	742	256	1.068


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2015.



	Anfetaminas	Éxtasis	Alucinógenos
1996	319	226	74
1997	323	237	85
1998	347	154	62
1999	339	135	50
2000	288	240	64
2001	255	335	83
2002	342	452	68
2003	266	254	63
2004	330	236	44
2005	386	229	39
2006	426	165	37
2007	415	172	43
2008	400	155	43
2009	461	127	69
2010	501	93	66
2011	595	102	83
2012	512	134	107
2013	671	201	120
2014	635	133	82
2015	636	157	77

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.


Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2015.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652
2014*	15.240	12.418	27.658
2015	13.457	11.254	27.469


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos). España, 1996-2015.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014**	6.360	1.664
2015	5.904	2.413


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos por primera vez). España, 1996-2015.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014**	1.065	261
2015	1.038	367


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2015.




	Edad media admisiones a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7
1988	25,4	19,8
1989	25,7	19,8
1990	26,2	20,0
1991	26,4	20,3
1992	26,6	20,3
1993	27,2	20,3
1994	27,8	20,6
1995	28,5	20,6
1996	29,3	20,6
1997	30,0	20,7
1998	30,7	20,6
1999	31,3	20,8
2000	32,0	20,6
2001	32,0	20,8
2002	33,6	20,9
2003	33,9	20,7
2004	35,4	20,8
2005	35,6	20,6
2006	36,4	20,3
2007	36,0	21,0
2008	37,5	21,1
2009	37,9	20,9
2010	38,4	21,4
2011	39,3	20,8
2012	40,4	20,7
2013	40,8	20,9
2014	40,9	21,1
2015	41,3	21,5

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2015.




	Edad media admisiones a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6
1992	26,0	20,6
1993	26,4	20,7
1994	27,3	21,0
1995	27,9	21,2
1996	28,6	21,3
1997	29,2	21,4
1998	29,9	21,2
1999	30,3	21,8
2000	30,9	22,1
2001	31,4	22,3
2002	31,8	22,6
2003	31,9	22,3
2004	33,0	22,8
2005	33,0	22,0
2006	33,0	21,5
2007	34,1	23,3
2008	35,0	22,9
2009	34,5	22,8
2010	35,0	23,5
2011	36,7	22,6
2012	38,1	22,4
2013	38,2	22,3
2014	37,9	23,5
2015	38,0	23,8

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2015.




	Edad media admisiones a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9
1988	26,1	21,3
1989	26,2	21,2
1990	26,5	21,4
1991	27,0	21,9
1992	27,6	22,1
1993	27,9	22,0
1994	28,5	22,0
1995	29,1	22,5
1996	29,3	22,3
1997	29,1	22,2
1998	29,1	22,1
1999	28,6	21,7
2000	29,1	21,5
2001	29,8	21,6
2002	29,8	21,9
2003	29,8	21,3
2004	30,0	21,3
2005	30,5	21,0
2006	31,2	20,8
2007	31,7	21,2
2008	32,1	21,0
2009	32,5	20,7
2010	33,3	20,9
2011	33,9	20,7
2012	34,5	20,7
2013	35,0	20,6
2014	35,3	20,6
2015	36,0	20,7

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (tratados por primera vez). España, 1991-2015.




	Edad media admisiones a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9
1992	27,2	22,3
1993	27,6	22,3
1994	28,2	22,2
1995	28,6	22,6
1996	28,8	22,4
1997	28,6	22,4
1998	28,4	22,2
1999	27,8	21,9
2000	28,2	21,6
2001	29,0	21,8
2002	28,8	21,7
2003	28,8	21,5
2004	29,1	21,4
2005	30,0	21,1
2006	30,4	20,9
2007	30,8	21,5
2008	31,2	21,1
2009	31,6	20,9
2010	32,4	21,2
2011	33,0	21,1
2012	33,4	21,1
2013	33,9	21,0
2014	34,1	20,8
2015	34,8	21,1

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822
1992	9.585	8.232	1.219
1993	10.493	7.129	995
1994	10.873	6.435	978
1995	11.161	5.033	1.028
1996	10.934	4.488	696
1997	8.487	3.011	887
1998	7.884	2.518	910
1999	7.033	1.969	968
2000	5.917	1.414	532
2001	5.461	1.276	471
2002	3.540	894	399
2003	2.805	748	386
2004	2.690	648	358
2005	2.487	544	350
2006	2.320	486	303
2007	2.842	470	327
2008	2.891	455	285
2009	2.719	386	256
2010	3.589	465	258
2011	2.211	365	201
2012	1.870	276	159
2013	2.047	283	175
2014	1.670	154	125
2015	1.831	167	145

El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8
1992	50,0	42,9	6,4
1993	56,1	38,1	5,3
1994	59,2	35,0	5,3
1995	64,5	29,1	5,9
1996	67,0	27,5	4,3
1997	67,2	23,8	7,0
1998	68,3	21,8	7,9
1999	69,3	19,4	9,5
2000	74,1	17,7	6,7
2001	74,9	17,5	6,5
2002	71,8	18,1	8,1
2003	69,3	18,5	9,5
2004	68,0	16,4	9,0
2005	69,0	15,1	9,7
2006	73,8	15,5	9,6
2007	77,4	12,8	8,9
2008	78,5	12,4	7,7
2009	79,7	11,3	7,5
2010	82,0	10,6	5,9
2011	77,7	12,8	7,1
2012	78,3	11,6	6,7
2013	79,6	11,0	6,8
2014	80,6	7,4	6,0
2015	83,7	7,6	6,6

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	315	139	109
1992	547	196	121
1993	611	278	108
1994	714	238	97
1995	739	287	74
1996	1.307	413	82
1997	2.172	741	100
1998	3.073	856	128
1999	4.777	1.048	128
2000	4.067	1.172	105
2001	4.413	1.284	91
2002	5.613	1.403	156
2003	9.228	1.242	485
2004	11.140	1.837	693
2005	12.298	1.755	793
2006	11.155	1.617	103
2007	11.393	1.295	130
2008	10.391	1.276	117
2009	10.272	1.139	136
2010	9.952	1.203	166
2011	8.787	1.205	97
2012	8.346	781	95
2013	8.995	1.320	129
2014	6.798	986	56
2015	7.005	1.078	30

El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2
1992	62,7	22,5	13,9
1993	60,8	27,7	10,7
1994	67,4	22,5	9,2
1995	66,5	25,8	6,7
1996	71,7	22,6	4,5
1997	71,0	24,2	3,3
1998	74,8	20,8	3,3
1999	79,5	17,4	2,1
2000	75,2	21,7	1,9
2001	75,2	21,9	1,6
2002	77,0	19,2	2,1
2003	83,0	11,2	4,4
2004	80,9	13,3	4,8
2005	80,6	11,5	5,2
2006	86,0	12,5	0,8
2007	88,0	10,0	1,0
2008	86,9	10,7	1,0
2009	87,7	9,7	1,2
2010	86,8	10,5	1,4
2011	85,5	11,7	0,9
2012	88,3	8,3	1,0
2013	83,8	12,3	1,2
2014	82,6	12,0	0,7
2015	83,5	12,9	0,4

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2015.



2.1.20.

Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2015.




	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Opiáceos	Estimulantes	Alucinógenos
2005	57,4	42,7	8,9	10,9	5,9	0,6
2006	58,7	44,1	9,0	11,8	5,2	0,9
2007	58,0	43,3	8,5	12,3	4,6	0,8
2008	66,1	49,1	10,6	11,8	4,3	1,2
2009	61,5	50,9	9,8	5,9	3,9	0,9
2010	63,4	52,0	9,9	6,6	4,3	1,3
2011	63,7	51,6	9,3	6,5	4,9	1,5
2012	62,1	52,9	10,1	7,1	4,6	1,2
2013	60,8	53,5	9,1	6,7	4,8	1,2
2014*	56,7	48,3	8,1	4,5	2,8	0,4
2015	60,3	51,4	8,2	5,3	4,4	0,5

* El 76,6% de los admitidos a tratamiento por alcohol solo han consumido alcohol (30 días previos a la admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 23,4% restantes (n= 6.428) que han consumido otras sustancias (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2015.




	Hombre	Mujer	Total
1996	35,9	43,4	37,1
1997	32,4	41,0	33,7
1998	32,4	39,7	33,6
1999	31,9	40,2	33,0
2000	32,7	37,9	33,5
2001	32,7	40,2	33,7
2002	30,9	38,9	32,0
2003	31,5	39,3	32,6
2004	27,7	38,3	29,3
2005	31,5	39,5	32,7
2006	32,7	37,4	33,4
2007	30,0	36,2	30,9
2008	26,7	33,3	27,6
2009	26,0	32,2	26,9
2010	29,8	31,7	30,2
2011	28,5	30,0	28,7
2012	28,2	30,0	28,4
2013	24,2	26,1	24,4
2014	26,3	24,4	26,0
2015	33,4	35,4	33,7

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014 y 29,1% en 2015.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2015.



	< 25 años	25-34 años	> 34 años
1996	20,3	39,3	48,9
1997	17,5	34,0	46,4
1998	15,1	33,4	45,8
1999	15,2	32	44,0
2000	13,1	30,5	45,5
2001	14,0	29,1	44,4
2002	12,1	26,7	42,8
2003	9,2	25,5	43,8
2004	7,1	20,9	39,4
2005	9,7	23,1	41,9
2006	7,2	21,4	42,2
2007	3,2	18,7	40,3
2008	3,2	16,9	35,6
2009	2,2	15,2	34,7
2010	8,1	14,8	38,0
2011	9,9	14,5	35,6
2012	8,6	11,7	35,4
2013	4,7	8,9	30,4
2014	5,9	12,0	31,2
2015*	11,5	12,1	38,4

* En 2015, el número de inyectores con VIH menores de 25 años fue de 3 personas.

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014 y 29,1% en 2015.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.23.


Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2015.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	17.327	23,2
Cocaína polvo	16.659	22,3
Cocaína base	663	0,9
Opioides	12.146	16,2
Heroína	10.978	14,7
Metadona (mal uso)	452	0,6
Otros opioides	716	1,0
Cannabis	15.676	21,0
Hipnosedantes	1.068	1,4
Estimulantes	924	1,2
Anfetaminas	636	0,9
Éxtasis y derivados	157	0,2
Otros estimulantes	131	0,2
Alucinógenos	77	0,1
Inhalantes volátiles	18	0,0
Otras drogas ilegales	72	0,1
Alcohol	27.469	36,7
Total drogas ilegales	47.308	63,2
Total drogas ilegales y alcohol	74.777	–

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.24.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2015.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años*	Nacidos fuera de España
Opioides	16,2	7,3	0,5	16,5
Cocaína	23,2	22,7	1,8	19,1
Cannabis	21,0	30,0	93,9	21,9
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,2	1,5	0,5	1,1
Alcohol	36,7	36,1	2,7	40,2
Número de admisiones	74.777	37.234	2.198	7.274

* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2015.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años*	Nacidos fuera de España
Opioides	25,7	11,5	0,6	27,6
Cocaína	36,6	35,5	1,9	31,9
Cannabis	33,1	47,0	96,4	36,6
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	2,0	2,4	0,5	1,8
Otras sustancias	2,6	3,6	0,6	2,1
Número de admisiones	47.308	23.777	2.139	4.349

* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2015.



	TASAS	NÚMERO DE CASOS
	(España 101,47 casos/100.000 habitantes)	(Total 47.308)
Canarias	181,64	3.815
Andalucía	147,78	12.412
Extremadura	135,96	1.486
Melilla	130,87	112
Comunidad Valenciana	121,47	6.050
Baleares	104,39	1.153
Galicia	97,32	2.659
Cataluña	89,78	6.741
Madrid	88,83	5.718
Ceuta	86,63	73
Murcia	73,54	1.079
Castilla - La Mancha	70,66	1.455
Cantabria	68,36	400
La Rioja	68,13	216
País Vasco	64,04	1.402
Aragón	61,16	806
Castilla y León	52,18	1.290
Navarra	31,38	201
Asturias	22,83	240

Tasas brutas. Población de cada Comunidad Autónoma a 1 de enero de 2015 (Datos INE).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2015.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	47.308	19.519	23.777	39.616	7.602
Tratamiento previo (%)					
Sí	45,1			46,0	40,0
No	54,9			54,0	60,0
Edad media (años)	34,38	37,79	31,21	34,29	34,86
Sexo (%)					
Hombre	83,9	85,9	82,6		
Mujer	16,1	14,1	17,4		
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8
Enseñanza primaria	57,9	59,0	57,3	59,0	52,1
Enseñanza secundaria	36,8	36,1	37,4	36,3	39,9
Estudios universitarios	4,4	3,8	4,4	3,8	7,3
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	28,0	26,1	29,8	29,0	22,9
Parado no habiendo trabajado	7,2	6,5	7,8	6,9	8,4
Parado habiendo trabajado	42,6	48,5	38,1	42,6	42,5
Otras	22,3	18,8	24,4	21,5	26,2
Nacidos fuera de España (%)	9,6	7,7	10,6	9,4	10,5
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	6,8	12,5	1,7	6,4	8,6
Médico general, Atención Primaria de Salud	10,1	6,9	13,1	9,7	11,9
Hospitales u otros servicios de salud	6,8	5,7	8,1	6,2	10,1
Servicios Sociales	3,1	2,4	3,8	2,4	7,0
Prisión, centros de menores	7,2	10,0	5,0	7,7	4,3
Servicios legales o policiales	10,2	6,7	13,8	11,1	5,8
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Familiares y amigos	12,3	7,6	16,9	12,4	11,8
Iniciativa propia	40,7	46,0	34,0	41,4	37,0
Servicios de educación	0,5	0,2	0,7	0,4	0,8
Otra	2,3	1,8	2,6	2,2	2,7
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	12,9	15,6	10,4	12,9	12,9
Únicamente con pareja	10,6	11,1	9,9	9,7	15,4
Únicamente con hijos/as	3,2	3,2	3,0	2,3	8,2
Con la pareja e hijos/as	16,2	16,0	16,5	16,2	16,2
Con padres o familia de origen	42,1	35,6	47,7	43,6	33,8
Con amigos/as	3,0	3,2	2,7	2,9	3,4
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	6,0	7,8	4,8	6,5	3,6
En instituciones no detenido (ej. albergue)	1,8	2,1	1,6	1,8	2,1
Otros	4,3	5,4	3,3	4,2	4,4

2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de hijos (media)	0,8	0,9	0,7	0,7	1,1
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	87,2	82,5	91,1	86,6	89,8
Prisión, centros de menores	6,1	8,1	4,7	6,7	3,0
Otras instituciones	2,1	2,6	1,7	2,1	2,4
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,8	0,2	0,5	0,5
Alojamiento inestable/precario	2,1	2,9	1,4	2,1	2,5
Otros lugares	2,0	3,0	1,0	2,1	1,9
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	25,7	42,2	11,5	25,6	25,8
Heroína	23,2	39,5	9,3	23,5	21,8
Metadona	1,0	1,1	0,8	0,9	1,2
Buprenorfina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Fentanilo	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3
Otros opioides	1,4	1,5	1,2	1,2	2,4
Cocaína	36,6	37,1	35,5	37,4	32,6
CLH Cocaína	35,2	35,9	33,9	36,0	31,1
Cocaína base	1,4	1,3	1,6	1,4	1,4
Cocaína Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estimulantes	2,0	1,5	2,4	1,9	2,4
Anfetaminas	1,3	1,2	1,5	1,3	1,8
Metanfetaminas	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
MDMA y derivados	0,3	0,1	0,6	0,3	0,3
Catinonas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros estimulantes	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Hipnosedantes	2,3	1,3	3,1	1,5	6,1
Alucinógenos	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Sustancias volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cannabis	33,1	17,7	47,0	33,3	32,5
Otras sustancias	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4
Edad de inicio droga principal (años)	23,0	23,0	22,0	22,5	25,2
Frecuencia de consumo de la droga principal (%)					
Todos los días	46,9	43,5	50,3	46,4	49,5
4-6 días a la semana	7,4	6,2	8,1	7,6	6,2
2-3 días a la semana	13,8	11,7	15,2	14,0	12,6
1 día a la semana	5,1	4,6	5,5	5,2	4,9
Menos de 1 día a la semana	7,0	7,4	6,6	7,1	6,6
No consumió	19,8	26,7	14,3	19,7	20,2

2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Vía de administración droga principal (%)					
Oral	6,1	4,7	7,2	5,1	11,0
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	56,8	54,5	59,0	57,0	55,4
Intranasal o esnifada	32,8	33,4	32,1	33,4	29,6
Inyectada o parenteral	3,6	6,6	1,0	3,7	3,1
Otras	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	14,5	25,5	4,7	14,8	12,7
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	5,9	10,2	1,7	6,0	5,5
Prevalencia mínima** de VIH positivo					
Positivo	4,1	7,1	1,6	3,9	4,7
Prevalencia mínima** de hepatitis C positivo					
Positivo	8,1	15,4	2,1	8,1	8,1
Prevalencia mínima** de hepatitis B (portador crónico)					
Portador crónico	0,7	1,3	0,4	0,7	0,8

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

** Positivos entre el total (prevalencia mínima).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2015.

	Número absoluto	Porcentaje
Han consumido sólo alcohol	21.041	76,6
Han consumido alcohol y otras drogas	6.428	23,4
Una droga más	4.729	17,2
Dos drogas más	1.424	5,2
Tres o más drogas	275	1,0

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.29.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2015.

	Total	Tratamiento previo por alcohol*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	27.469	11.254	13.457	21.294	6.128
Tratamiento previo agrupado (%)					
Sí (misma droga y/o otra)	45,5	100,0	0,0	45,7	45,1
No por esta sustancia	54,5	0,0	100,0	54,3	54,9
Edad media (años)	46,1	47,0	45,4	46,0	46,8
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	0,9	0,6	1,2	1,0	0,7
Enseñanza Primaria	52,0	51,9	52,8	54,3	44,0
Ha finalizado la Educación Secundaria Obligatoria	20,5	21,4	20,4	20,4	20,9
Ha finalizado Bachillerato o Ciclo Formativo Grado Medio	17,0	17,2	16,5	16,1	20,2
Ha finalizado Estudios Superiores	9,6	8,9	9,1	8,2	14,2
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	35,6	32,4	38,5	36,7	31,8
Parado no habiendo trabajado	2,6	2,6	2,7	2,4	3,2
Parado habiendo trabajado	40,9	43,0	39,8	40,9	40,8
Otras	20,9	22,1	19,0	19,9	24,1
Español o extranjero (%)					
Español	88,8	91,3	87,0	89,5	86,3
Extranjero	11,2	8,7	13,0	10,5	13,7
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	3,7	6,1	1,4	3,5	4,4
Médico general, Atención Primaria de Salud	26,2	20,4	32,6	26,2	25,9
Hospitales u otros servicios de salud	13,5	12,5	15,3	12,7	16,4
Servicios Sociales	5,3	5,2	5,6	4,7	7,3
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	2,0	2,1	1,9	2,4	0,5
Servicios legales o policiales	2,1	2,1	2,2	2,4	1,1
Empresas o empleador	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Familiares y amigos	12,2	10,6	14,2	12,7	10,7
Iniciativa propia	32,6	38,8	24,0	33,1	31,0
Servicios de educación	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Otra	2,0	1,9	2,3	2,0	2,3
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	20,3	22,3	18,8	20,7	18,9
Únicamente con pareja	14,8	14,2	15,4	13,7	18,4
Únicamente con hijos/as	5,6	5,8	5,2	3,5	13,0
Con la pareja e hijos/as	25,8	23,1	28,4	26,3	24,0
Con padres o familia de origen	23,2	23,4	23,2	25,1	16,7
Con amigos/as	2,5	2,5	2,3	2,5	2,6
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	2,6	2,6	2,3	2,9	1,6
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,3	2,7	1,8	2,4	1,8
Otros	2,9	3,3	2,6	2,9	3,1

2.1.29. (continuación)

	Total	Tratamiento previo por alcohol*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,5	90,1	93,2	90,5	94,9
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	1,7	1,8	1,8	2,0	0,6
Otras instituciones	2,2	2,7	1,6	2,3	1,6
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,8	0,4	0,7	0,4
Alojamiento inestable/precarios	2,3	2,6	1,8	2,5	1,4
Otros lugares	1,7	2,0	1,3	1,9	1,1
Edad de inicio droga principal (años)	18,9	17,9	18,7	18,0	22,2
Frecuencia de consumo de la droga principal (%)					
Todos los días	58,9	56,4	59,9	60,0	55,0
4-6 días a la semana	6,4	6,0	6,9	6,0	7,6
2-3 días a la semana	11,5	10,1	12,8	11,1	12,8
1 día a la semana	4,3	4,2	4,7	4,2	4,6
Menos de 1 día a la semana	5,2	5,6	4,9	5,0	5,7
No consumió	13,8	17,7	10,8	13,6	14,2
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)					
No	96,0	95,0	96,9	95,7	97,0
Sí	4,0	5,0	3,1	4,3	3,0
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)					
No	99,2	99,0	99,6	99,2	99,4
Sí	0,8	1,0	0,4	0,8	0,6
Prevalencia de VIH entre todos**					
Positivo	1,1	1,2	1,0	1,1	0,9
Negativo	32,3	39,8	28,1	31,8	34,1
Desconocido o pendiente de resultado	66,6	59,0	71,0	67,1	64,9
Prevalencia de hepatitis C entre todos**					
Positivo	3,0	4,0	2,3	3,1	2,8
Negativo	29,8	36,5	26,9	29,4	31,3
Desconocido o pendiente de resultado	67,1	59,5	70,8	67,5	65,9
Prevalencia VHB entre todos (portador crónico)**					
Desconocido, no realizado test u otros resultados	99,5	99,2	99,6	99,4	99,5
Portador crónico	0,5	0,8	0,4	0,6	0,5

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

** Positivos entre el total (prevalencia mínima).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2015.

	Opioides	Heroína	Metadona	Otros opioides	Cocaína	CLH Cocaína	Cocaína base	Estimulantes*
Total	12.146	10.978	452	716	17.327	16.659	663	924
Tratamiento previo agrupado (%)								
Sí (misma droga y/o otra)	75,1	77,8	51,9	48,8	46,2	46,5	38,9	33,8
No por esta sustancia	24,9	22,2	48,1	51,2	53,8	53,5	61,1	66,2
Sexo (%)								
Hombre	83,8	84,9	80,5	70,3	85,7	85,8	83,7	79,8
Mujer	16,2	15,1	19,5	29,7	14,3	14,2	16,3	20,2
Edad (años)	41,5	41,3	43,1	42,9	35,9	35,9	37,2	33,2
Máximo nivel de estudios completados (%)								
Sin estudios	1,7	1,8	1,6	0,6	0,7	0,7	1,4	0,0
Primaria	64,3	65,1	63,7	51,6	54,3	53,5	72,9	46,7
Secundaria	30,6	30,0	32,6	39,4	39,8	40,5	22,3	44,0
Ha finalizado estudios superiores	3,4	3,2	2,1	8,4	5,2	5,3	3,4	9,2
Situación laboral (%)								
Trabajando	17,4	17,2	16,1	21,9	40,6	41,6	17,1	33,3
Parado no trabajando	7,5	7,7	8,0	4,7	4,0	3,9	7,0	5,3
Parado habiendo trabajado	53,6	54,5	53,2	41,3	43,3	42,6	59,4	42,7
Otras situaciones	21,4	20,6	22,7	32,2	12,1	11,9	16,5	18,7
Español o extranjero (%)								
Español	89,5	89,5	90,7	88,9	91,7	91,7	92,2	91,0
Extranjero	10,5	10,5	9,3	11,1	8,3	8,3	7,8	9,0
Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%)								
Otros servicios tratamiento drogodependencias	15,3	15,0	26,4	13,4	5,5	5,6	3,3	5,6
Médico general, Atención Primaria de Salud	5,3	4,7	5,2	14,7	11,4	11,6	7,0	14,2
Hospitales u otros servicios de salud	4,2	3,3	4,3	17,3	6,3	6,4	5,3	12,7
Servicios Sociales	1,6	1,6	1,1	1,6	2,2	2,2	2,7	3,1
Prisión, centro reforma o internamiento menores	11,5	11,9	10,1	5,8	6,6	6,4	9,7	3,9
Servicios legales o policiales	2,8	2,9	0,7	2,9	6,3	6,5	3,6	16,3
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4
Familiares y amigos	6,1	6,3	4,3	4,1	14,1	14,1	12,9	12,9
Iniciativa propia	51,1	52,2	46,6	37,6	45,7	45,4	52,9	28,3
Servicios de educación	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
Otra	2,0	2,0	1,4	2,3	1,6	1,6	2,1	2,4
Número de hijos (media)	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	1,2	0,5

2.1.30. (continuación)

	Opioides	Heroína	Metadona	Otros opioides	Cocaína	CLH Cocaína	Cocaína base	Estimulantes*
Total	12.146	10.978	452	716	17.327	16.659	663	924
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Casas, pisos, apartamentos	77,8	77,1	79,6	87,4	89,4	89,8	78,2	88,5
Prisión, centro reforma o internamiento menores	9,3	9,6	9,2	5,2	6,2	5,9	14,7	4,0
Otras instituciones	2,9	2,9	1,4	2,4	1,3	1,2	2,7	2,7
Pensiones, hoteles, hostales	0,9	0,9	2,1	0,7	0,4	0,4	0,3	0,2
Alojamiento inestable/precario	4,8	4,9	4,3	3,2	1,2	1,2	1,7	2,2
Otros lugares	4,2	4,5	3,4	1,1	1,5	1,5	2,4	2,4
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Solo/a	18,4	18,2	21,5	19,2	13,0	13,1	11,8	15,4
Únicamente con pareja	12,2	11,9	13,4	15,4	12,8	12,9	11,0	9,0
Únicamente con hijos/as	2,9	2,7	3,7	4,9	3,6	3,7	2,0	2,7
Con la pareja e hijos/as	14,5	14,0	18,2	20,4	22,8	23,0	18,2	11,5
Con padres o familia de origen	30,2	30,5	26,1	26,8	34,8	34,8	33,9	46,8
Con amigos/as	4,3	4,4	3,9	4,3	2,2	2,3	1,7	4,4
Detenido (centro penitenciario o inserción social)	9,0	9,3	9,2	4,3	6,1	5,8	14,0	4,3
En instituciones no detenido (albergue)	2,3	2,4	1,6	1,6	1,1	1,1	2,3	2,0
Otros. Especificar	6,2	6,5	2,3	3,1	3,5	3,4	5,2	4,0
Edad de inicio droga principal (años)	22,1	21,5	29,6	28,3	20,7	20,7	21,1	21,5
Vía de administración droga principal (%)								
Oral	6,3	0,7	93,5	33,7	2,7	2,8	0,2	33,6
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	73,0	78,3	4,0	36,6	14,6	11,5	90,2	5,0
Intranasal o esnifada	6,6	6,6	1,1	9,8	81,0	84,0	8,2	59,3
Inyectada o parenteral	12,7	13,1	1,1	13,7	1,0	1,0	0,5	1,7
Otras	1,5	1,2	0,2	6,2	0,7	0,7	1,1	0,4
Frecuencia de consumo de la droga principal (%)								
Todos los días	56,0	53,9	90,6	66,1	21,6	20,8	41,0	25,6
4-6 días a la semana	4,6	4,7	3,2	3,9	11,0	11,1	9,0	9,1
2-3 días a la semana	5,9	6,2	1,4	4,8	24,4	24,6	17,3	21,8
1 día a la semana	2,1	2,2	0,5	2,1	9,6	9,8	5,3	9,2
Menos de 1 día a la semana	3,6	3,8	0,9	1,5	12,5	12,7	8,6	12,7
No consumió	27,9	29,3	3,4	21,5	20,9	21,0	18,8	21,5
Otras sustancias consumidas los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Opioides	10,9	10,4	25,1	11,2	6,6	5,8	22,7	2,1
Heroína	1,0	0,0	23,7	6,4	6,0	5,4	20,0	1,7
Metadona	9,0	9,5	0,0	4,4	0,4	0,2	3,2	0,0
Otros opioides	1,0	0,9	1,8	0,4	0,2	0,4	0,9	0,6
Cocaína	44,1	45,2	20,5	38,8	0,5	0,2	5,6	30,9
CLH Cocaína	38,6	39,6	15,1	34,4	0,3	0,0	5,6	30,7
Cocaína base	5,7	5,8	5,5	4,4	0,2	0,2	0,0	0,4

2.1.30. (continuación)

	Opioides	Heroína	Metadona	Otros opioides	Cocaína	CLH Cocaína	Cocaína base	Estimulantes*
Total	12.146	10.978	452	716	17.327	16.659	663	924
Estimulantes	1,8	1,8	1,8	2,0	5,5	5,6	2,6	8,3
Hipnosedantes	15,7	15,7	13,2	15,2	6,4	5,9	17,2	3,0
Alucinógenos	0,4	0,4	0,0	1,2	0,9	0,9	0,2	3,6
Sustancias volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2
Cannabis	52,2	52,4	51,6	46,4	48,6	47,9	63,1	60,6
Alcohol	36,0	36,0	38,8	35,6	71,2	72,1	53,6	49,3
Otras sustancias psicoactivas	0,5	0,4	1,8	0,8	0,5	0,5	0,0	1,1
Inyección alguna vez en la vida (%)	45,6	46,2	44,5	35,8	5,5	5,1	13,8	6,5
Inyección últimos 12 meses (%)	19,2	19,7	7,8	18,6	2,3	2,3	2,5	3,1
Inyección últimos 30 días (%)	16,7	17,2	3,8	17,6	1,9	1,9	1,3	2,6
Prevalencia de VIH entre todos (%)								
Positivo	11,4	11,4	13,3	9,5	1,9	1,9	3,3	2,9
Negativo	48,4	49,5	38,5	38,4	39,1	39,1	39,5	30,7
Desconocido o pendiente de resultado	40,2	39,1	48,2	52,1	58,9	59,0	57,2	66,3
Prevalencia de VIH entre los que conocen resultado (%)								
Positivo	19,0	18,8	25,6	19,8	4,7	4,6	7,7	8,7
Prevalencia de hepatitis C entre todos (%)								
Positivo	25,0	25,6	22,8	17,6	2,9	2,8	6,3	3,0
Negativo	32,4	32,8	28,3	28,1	35,9	35,9	35,9	26,2
Desconocido o pendiente de resultado	42,6	41,6	48,9	54,3	61,2	61,3	57,8	70,8
Prevalencia de hepatitis C entre los que conocen resultados (%)								
Positivo	43,6	43,8	44,6	38,5	7,5	7,2	15,0	10,4
Situación hepatitis B (%)								
Nunca se ha realizado el test	6,8	6,7	6,6	7,5	13,4	13,3	14,5	20,5
Inmune: vacunado o hepatitis B pasada**	15,3	15,8	11,9	10,3	10,5	10,5	10,3	11,7
No inmune	11,3	11,5	7,3	11,2	11,9	11,9	10,9	7,6
Portador crónico (HBs Ag positivo)	1,9	1,9	1,5	1,7	0,4	0,4	0,9	0,3
Desconocido	64,7	64,0	72,6	69,3	64,0	64,0	63,5	60,0
Prevalencia VHB entre todos (portador crónico) (%)								
Desconocido, no realizado test u otros resultados	98,1	98,1	98,5	98,3	99,6	99,6	99,1	99,7
Portador crónico	1,9	1,9	1,5	1,7	0,4	0,4	0,9	0,3

* Estimulantes: otros estimulantes diferentes de la cocaína.

** Inmune: vacunado (AC Anti HbS) o hepatitis B pasada (AC Anti HbC).

El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30. (continuación)

	Anfetaminas	MDMA y der.	Hipnosedantes	Benzodiacepinas	Alucinógenos	Sust. volátiles	Cannabis	Alcohol
Total	636	157	1.068	929	77	18	15.676	27.469
Tratamiento previo agrupado (%)								
Sí (misma droga y/o otra)	39,6	12,7	25,7	27,3	28,6	26,7	23,6	45,5
No por esta sustancia	60,4	87,3	74,3	72,7	71,4	73,3	76,4	54,5
Sexo (%)								
Hombre	78,3	83,2	56,3	57,7	80,5	88,9	84,2	77,7
Mujer	21,7	16,8	43,7	42,3	19,5	11,1	15,8	22,3
Edad (años)	33,7	28,8	41,8	41,2	31,7	27,4	26,7	46,1
Máximo nivel de estudios completados (%)								
Sin estudios	0,0	0,0	1,4	1,2	0,0	11,1	0,5	0,9
Primaria	48,4	44,1	56,1	55,5	45,2	77,8	57,9	52,0
Secundaria	43,1	48,0	33,3	34,2	49,3	11,1	38,1	37,5
Ha finalizado estudios superiores	8,6	7,9	9,3	9,1	5,5	0,0	3,5	9,6
Situación laboral (%)								
Trabajando	32,3	33,1	24,1	24,6	28,4	0,0	22,2	35,6
Parado no trabajando	5,1	9,1	9,0	8,4	9,5	16,7	10,3	2,6
Parado habiendo trabajado	46,5	33,8	43,7	44,5	33,8	44,4	33,3	40,9
Otras situaciones	16,1	24,0	23,3	22,6	28,4	38,9	34,2	20,9
Español o extranjero (%)								
Español	92,3	92,1	92,9	92,7	95,8	38,9	89,5	88,8
Extranjero	7,7	7,9	7,1	7,3	4,2	61,1	10,5	11,2
Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%)								
Otros servicios tratamiento drogodependencias	5,8	2,6	3,6	4,1	2,6	6,3	2,0	3,7
Médico general, Atención Primaria de Salud	15,4	7,2	24,5	21,2	15,6	12,5	10,9	26,2
Hospitales u otros servicios de salud	13,6	5,9	16,8	18,0	11,7	6,3	8,2	13,5
Servicios Sociales	3,2	0,7	2,2	2,3	1,3	0,0	5,3	5,3
Prisión, centro reforma o internamiento menores	3,9	6,5	4,7	5,2	9,1	18,8	5,0	2,0
Servicios legales o policiales	13,3	35,9	2,9	3,2	7,8	0,0	20,3	2,1
Empresas o empleador	0,5	0,7	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,3
Familiares y amigos	13,3	13,1	8,9	9,3	9,1	18,8	15,3	12,2
Iniciativa propia	28,6	24,2	33,8	34,0	39,0	25,0	28,6	32,6
Servicios de educación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,2	0,1
Otra	2,4	3,3	2,3	2,5	3,9	6,3	3,1	2,0
Número de hijos (media)	0,5	0,3	1,2	1,2	0,5	0,3	0,4	1,3

2.1.30. (continuación)

	Anfetaminas	MDMA y der.	Hipnosedantes	Benzodiacepinas	Alucinógenos	Sust. volátiles	Cannabis	Alcohol
Total	636	157	1.068	929	77	18	15.676	27.469
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Casas, pisos, apartamentos	88,1	87,7	89,0	88,1	84,9	50,0	91,7	91,5
Prisión, centro reforma o internamiento menores	3,2	9,0	5,1	5,6	6,8	11,1	3,6	1,7
Otras instituciones	2,9	1,3	1,6	1,7	0,0	22,2	2,5	2,2
Pensiones, hoteles, hostales	0,3	0,0	0,2	0,2	2,7	0,0	0,3	0,6
Alojamiento inestable/precario	2,5	0,6	3,2	3,3	1,4	5,6	1,0	2,3
Otros lugares	3,0	1,3	1,0	1,1	4,1	11,1	1,0	1,7
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Solo/a	17,3	9,0	15,7	16,0	13,5	5,6	8,2	20,3
Únicamente con pareja	9,5	8,4	13,1	13,1	9,5	5,6	6,9	14,8
Únicamente con hijos/as	2,9	0,6	8,1	7,6	5,4	0,0	2,7	5,6
Con la pareja e hijos/as	11,9	7,1	22,4	21,6	6,8	16,7	10,1	25,8
Con padres o familia de origen	44,2	55,5	28,9	29,4	43,2	27,8	59,6	23,2
Con amigos/as	4,6	4,5	2,2	1,8	5,4	0,0	2,7	2,5
Detenido (centro penitenciario o inserción social)	3,5	7,7	5,5	6,1	6,8	16,7	3,7	2,6
En instituciones no detenido (albergue)	1,8	2,6	1,2	1,3	1,4	16,7	2,2	2,3
Otros. Especificar	4,3	4,5	2,9	3,0	8,1	11,1	3,7	2,9
Edad de inicio droga principal (años)	20,7	21,3	28,7	28,3	22,1	16,6	15,6	18,9
Vía de administración droga principal (%)								
Oral	20,5	84,8	98,3	98,5	42,1	12,5	1,5	99,6
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	2,9	1,3	1,0	0,9	5,3	18,8	97,7	0,2
Intranasal o esnifada	75,4	11,3	0,3	0,2	50,0	37,5	0,4	0,1
Inyectada o parenteral	0,8	1,3	0,3	0,2	1,3	0,0	0,1	0,0
Otras	0,3	1,3	0,2	0,2	1,3	31,3	0,3	0,1
Frecuencia de consumo de la droga principal (%)								
Todos los días	26,4	13,9	84,8	85,3	32,4	38,5	66,6	58,9
4-6 días a la semana	10,8	3,3	2,2	1,9	11,8	7,7	5,7	6,4
2-3 días a la semana	22,3	18,5	3,1	2,7	20,6	7,7	8,4	11,5
1 día a la semana	9,2	9,9	1,1	1,2	10,3	15,4	2,5	4,3
Menos de 1 día a la semana	12,5	19,2	1,4	1,2	7,4	23,1	3,6	5,2
No consumió	18,9	35,1	7,5	7,7	17,6	7,7	13,2	13,8
Otras sustancias consumidas los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Opioides	2,4	2,2	8,8	9,4	0,0	14,3	2,4	5,3
Heroína	2,1	1,1	6,1	7,0	0,0	14,3	2,0	4,6
Metadona	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,1	0,4
Otros opioides	0,5	1,1	2,0	1,7	0,0	0,0	0,2	0,5
Cocaína	32,1	26,9	27,4	26,8	41,7	28,6	32,3	60,3
CLH Cocaína	31,8	26,9	26,6	26,2	41,7	28,6	31,8	59,4
Cocaína base	0,3	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,6	1,0

2.1.30. (continuación)

	Anfetaminas	MDMA y der.	Hipnosedantes	Benzodiacepinas	Alucinógenos	Sust. volátiles	Cannabis	Alcohol
Total	636	157	1.068	929	77	18	15.676	27.469
Estimulantes	8,0	8,6	5,4	5,6	25,0	42,9	9,7	4,4
Hipnosedantes	2,7	5,4	0,3	0,3	0,0	28,6	4,9	8,2
Alucinógenos	3,4	4,3	0,5	0,0	2,1	0,0	1,4	0,5
Sustancias volátiles	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Cannabis	61,5	64,5	53,5	55,8	58,3	57,1	0,0	51,4
Alcohol	50,1	47,3	50,1	49,7	41,7	57,1	77,8	0,0
Otras sustancias psicoactivas	1,1	2,2	0,8	0,6	2,1	0,0	0,4	0,4
Inyección alguna vez en la vida (%)	6,5	4,1	6,3	7,1	6,8	7,1	2,1	4,0
Inyección últimos 12 meses (%)	2,7	1,4	1,0	0,9	1,7	0,0	0,4	0,8
Inyección últimos 30 días (%)	2,0	1,4	0,8	0,8	1,7	0,0	0,3	0,6
Prevalencia de VIH entre todos (%)								
Positivo	2,2	3,8	3,7	3,7	6,5	5,6	0,9	1,1
Negativo	33,0	23,6	35,1	36,7	29,9	33,3	24,0	32,3
Desconocido o pendiente de resultado	64,8	72,6	61,1	59,6	63,6	61,1	75,2	66,6
Prevalencia de VIH entre los que conocen resultado (%)								
Positivo	6,3	14,0	9,6	9,1	17,9	14,3	3,4	3,2
Prevalencia de hepatitis C entre todos (%)								
Positivo	2,8	3,2	5,3	5,5	1,3	5,6	1,3	3,0
Negativo	27,2	22,3	32,0	33,6	32,5	33,3	22,6	29,8
Desconocido o pendiente de resultado	70,0	74,5	62,6	60,9	66,2	61,1	76,2	67,1
Prevalencia de hepatitis C entre los que conocen resultados (%)								
Positivo	9,4	12,5	14,3	14,0	3,8	14,3	5,3	9,2
Situación hepatitis B (%)								
Nunca se ha realizado el test	18,1	33,8	16,6	15,8	11,7	16,7	22,7	13,7
Inmune: vacunado o hepatitis B pasada**	11,2	14,0	9,5	10,0	11,7	0,0	8,7	8,2
No inmune	8,2	7,0	13,9	14,4	10,4	22,2	7,5	11,1
Portador crónico (HBs Ag positivo)	0,3	0,0	0,7	0,5	1,3	11,1	0,2	0,5
Desconocido	62,3	45,2	59,5	59,2	64,9	50,0	60,9	66,3
Prevalencia VHB entre todos (portador crónico) (%)								
Desconocido, no realizado test u otros resultados	99,7	100,0	99,3	99,5	98,7	88,9	99,8	99,5
Portador crónico	0,3	0,0	0,7	0,5	1,3	11,1	0,2	0,5

* Estimulantes: otros estimulantes diferentes de la cocaína.

** Inmune: vacunado (AC Anti HbS) o hepatitis B pasada (AC Anti HbC).

El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.31.

Prevalencia y conocimiento del estado serológico sobre infección por VIH, hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC) entre los inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas (nº absolutos y %). España, 2015.


	VIH		Hepatitis B		Hepatitis C	
	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
TOTAL						
Total inyectores (nº)	5.904	2.413	5.904	2.413	5.904	2.413
Prevalencia de infección (%)	31,5	33,7	10,5	12,2	66,5	68,9
Conocen estado serológico (%)	72,6	70,9	37,7	33,0	71,3	70,5
SEXO						
Hombres inyectores (nº)	5.083	2.057	5.083	2.057	5.083	2.057
Prevalencia de infección (%)	30,7	33,4	10,1	12,4	65,9	68,8
Conocen estado serológico (%)	72,4	71,4	37,9	33,3	71,4	71,3
Mujeres inyectoras (nº)	813	354	813	354	813	354
Prevalencia de infección (%)	35,8	35,4	13,1	11,2	70,5	70,1
Conocen estado serológico (%)	73,8	67,8	36,5	30,8	71,2	66,1
EDAD						
Inyectores < 34 años (nº)	880	547	880	547	880	547
Prevalencia de infección (%)	10,9	12,1	41,7	44,1	1,3	2,1
Conocen estado serológico (%)	58,4	56,1	58,5	56,9	33,0	30,7
Inyectores ≥ 35 años (nº)	5.024	1.866	5.024	1.866	5.024	1.866
Prevalencia de infección (%)	34,3	38,4	70,0	74,5	11,7	14,7
Conocen estado serológico (%)	75,1	75,2	73,6	74,5	38,6	33,7
CONSUMO DE OPIÁCEOS						
Inyectores consumidores de opiáceos (nº)	4.934	2.126	4.934	2.126	4.934	2.126
Prevalencia de infección (%)	31,6	33,8	68,4	66,2	10,7	12,9
Conocen estado serológico (%)	73,6	72,0	72,1	71,6	37,7	33,2
Inyectores no consumidores de opiáceos (nº)	970	287	970	287	970	287
Prevalencia de infección (%)	30,8	32,4	56,6	57,8	9,2	6,6
Conocen estado serológico (%)	67,6	62,4	67,7	62,7	38,1	31,4

Prevalencias calculadas sobre los casos que conocen el estado serológico.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.32.

Prevalencia de infección y conocimiento de estado serológico sobre VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada alguna vez en la vida o último año (%). España, 2005-2015.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% inyectores (alguna vez en la vida) que conocen estado serológico (VIH)	73,3	78,2	76,8	74,6	74,1	74,7	78,0	78,6	77,4	76,4	72,6
% inyectores (último año previo a admisión) que conocen estado serológico (VIH)	68,7	74,9	72,5	70,5	68,7	70,1	73,0	74,6	73,6	72,8	70,9
Prevalencia (%) de VIH en inyectores alguna vez en la vida	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6	30,9	31,5
Prevalencia (%) de VIH en inyectores último año previo a admisión	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4	26,0	33,7

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.33.

Evolución del número de inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (nº absolutos y %). España, 2005-2015.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total inyectores último año previo a admisión (nº)	4.358	4.892	4.575	4.546	3.763	3.549	3.094	2.562	2.237	1.387	2.413
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	2.996	3.665	3.319	3.203	2.585	2.487	2.259	1.910	1.646	1.010	1.710
Prevalencia de infección por VIH (%)	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4	26,0	33,7
Total inyectores alguna vez en la vida (nº)	9.533	11.601	11.249	10.895	9.637	9.697	8.385	7.580	7.026	5.224	5.904
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	6.991	9.068	8.643	8.126	7.143	7.243	6.546	5.957	5.439	3.992	4.287
Prevalencia de infección por VIH (%)	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6	30,9	31,5

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.